




START




REEL 125



Microfilmed 1990

**University of California
Reprographic Service
Los Angeles, CA 90024-151804**



6 inches

Reduction Ratio 11:1

**National Preservation Program for
Biomedical Literature:**

**Preservation of Persian and Arabic
Medical Manuscripts**

**Funded in part by the
National Library of Medicine
and the
University of California at Los Angeles**


(Contract Number N01-LM-9-3534)

October 1989 - September 1990

**The material on this microfilm
is of varying quality. Portions
of the material may be illegible
due to:**

**Aged paper
Foxed, stained, or insect
damaged paper
Water damaged paper
Glossy paper
Illegible script or faded ink**

**Red and purple within the
manuscripts may appear paler.**





AIM

Association for Information and Image Management


1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202





MS303-1980


Centimeter



Inches



MANUFACTURED TO AIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.



**Los Angeles,
University of California**

Louise M. Darling Biomedical Library

**History and Special Collections
Division**

Persian Medical Manuscript Collection

(Shelved as Ms Collection 60)

**For permission to publish, or obtain
copies of microfilm, write to:**

**History and Special Collections Division
Louise M. Darling Biomedical Library
University of California, Los Angeles
Los Angeles, CA 90024-1798
U.S.A.**

*Ms.
coll.
no.60
RARE

Persian medical manuscripts. -- ca.
1100-ca. 1900.
150 v. ; 15 x 8-38 x 24 cm.
Entire collection microfilmed as part
of a National Library of Medicine
preservation project: the preservation
master negative is at NLM; the printing
master negative is at the University of
California's Southern Regional Library
Facility; a positive copy is housed in
the UCLA Biomedical Library's History
Division.
Formerly a part of: Near Eastern
manuscript collection, Dept. of Special
Collections, University Library,
University of California, Los Angeles,
and assigned accession no. 1117.
Transferred to the History Division
of the UCLA Biomedical Library in
CLU-M ejf 891113 CLUHsl SEE NEXT CRD

*Ms.
coll.
no.60
RARE

Persian medical manuscripts. ... ca.
1100-ca. 1900. (Card 2)
March, 1986.
Finding aids: Annotated and indexed
list available in library: Richter-
Bernburg, Lutz, Persian medical
manuscripts at the University of
California, Los Angeles : a descriptive
catalogue (Malibu : Undena
Publications, 1978)
1. Medicine, Arabic. 2. Manuscripts,
Medical. I. University of California,
Los Angeles. Louise M. Darling
Biomedical Library. History and Special
Collections Division. II. Series: Near
Eastern manuscript collection ; no.
1117.

CLU-M ejf 891113

CLUHsl

Persian Medical Manuscript Collection

Ms. 127

Author: Jakob Eduard Polak

Title:

1. 'Alāj al-Asqām
2. Risāla-yi Kh̲hālī
3. Makhzan al-Fawā'id dar
A'māl-i Yad va Qaṭṭā'ī

196 fols., 8.75 x 5.75 in.
(223 x 146 mm.)

Ms. not catalogued in Richter-Bernburg.
Description supplied by Dr. Hossein
Ziai, Department of Near Eastern
Languages and Cultures, UCLA (June
1990).

فهرست جلد اول

مقدمه	در حمیات اورام	۱	فصل ناسع	در درم سفید	۴۸
مقاله اول	در حمیات اقسام	۲	فصل عاشیر	در درم سفید	۴۹
باب اول	در حمی وری	۲	فصل حادی	در درم سفید	۵۲
فصل اول	در حمی وری	۲	فصل ثانی	در درم سفید	۵۲
فصل ثانی	در حمی وری	۳	فصل ثالث	در درم سفید	۵۴
فصل ثالث	در حمی وری	۵	فصل رابع	در درم سفید	۵۵
فصل رابع	در حمی وری	۶	فصل خامس	در درم سفید	۵۶
باب ثانی	در اورام و التهابات	۸	فصل ششم	در درم سفید	۵۸
فصل اول	در بین التهابات	۸	فصل سابع	در درم سفید	۶۰
فصل ثانی	در تقسیم اورام	۱۶	فصل ثامن	در درم سفید	۶۳
فصل ثالث	در علاج اورام	۱۹	فصل ناسع	در درم سفید	۶۶
علاج غایب			فصل عاشیر	در درم سفید	۶۶
باب ثالث	در اورام مختلفه	۲۷	فصل واحد	در درم سفید	۶۷
فصل اول	در سره فغویا	۲۷	مقاله دوم	در درم سفید	۶۸
فصل ثانی	در حریق	۳۰	باب اول	در اقسام حریق	۶۸
فصل ثالث	در تشریدن آبرو	۳۲	فصل اول	در تشریدن آبرو	۶۸
فصل رابع	در درم بسط	۳۵	فصل ثانی	در علاج حریق	۷۱
فصل خامس	در فراخ و تنگی	۳۶	فصل ثالث	در طریق بخیه نمودن	۷۹
فصل ششم	در درم لوزتین	۳۷	فصل رابع	در اقسام بخیه	۸۱
فصل سابع	در درم ندین	۳۹	فصل خامس	در اقسام بخیه	۸۲
فصل ثامن	در سوزنک	۴۱	فصل ششم	در اقسام بخیه	۸۴
مبحث	در سوزنک	۴۱	فصل سابع	در اقسام بخیه	۸۵

فصل نهمین	در جراحات	۸۸	فصل نهمین	در جراحات	۸۸
فصل ناسع	در مرض کزاز	۹۳	فصل نهمین	در جراحات	۹۳
باب ثانی	در جراحات و اذیه	۹۵	فصل نهمین	در جراحات	۹۵
فصل اول	در جراحات و اذیه	۹۵	فصل نهمین	در جراحات	۹۵
فصل ثانی	در درم ساق	۹۸	فصل نهمین	در جراحات	۹۸
فصل ثالث	در انقباض و دماغ	۹۹	فصل نهمین	در جراحات	۹۹
فصل رابع	در انقباض و دماغ	۱۰۰	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۰
فصل خامس	در اذیه نمودن لاسر	۱۰۱	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۱
فصل ششم	در جراحات و اذیه	۱۰۳	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۳
فصل سابع	در جراحات و اذیه	۱۰۳	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۳
فصل ثامن	در جراحات و اذیه	۱۰۴	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۴
فصل ناسع	در جراحات و اذیه	۱۰۷	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۷
فصل عاشیر	در جراحات و اذیه	۱۰۸	فصل نهمین	در جراحات	۱۰۸
فصل حادی	در انقباض و دماغ	۱۱۲	فصل نهمین	در جراحات	۱۱۲
باب ثالث	در جراحات و اذیه	۱۱۲	فصل نهمین	در جراحات	۱۱۲
فصل اول	در تقسیم انقباض و دماغ	۱۱۲	فصل نهمین	در جراحات	۱۱۲
فصل ثانی	در درم غلام و اطفال	۱۱۷	فصل نهمین	در جراحات	۱۱۷
فصل ثالث	در درم غلام و اطفال	۱۲۱	فصل نهمین	در جراحات	۱۲۱
فصل رابع	در درم غلام و اطفال	۱۲۵	فصل نهمین	در جراحات	۱۲۵
فصل خامس	در درم غلام و اطفال	۱۲۸	فصل نهمین	در جراحات	۱۲۸
مقاله ثالث	در تفرق اقسام	۱۳۰	فصل نهمین	در جراحات	۱۳۰
تفرق و تاسیر و خلع و خلع و خلع			فصل نهمین	در جراحات	۱۳۰
خروج و خلع و ابرو و ریم و غیره			فصل نهمین	در جراحات	۱۳۰

۱۸۵	در اعوجاج به سبب علل	۱۶۱	در تعریف فلیح سبب علل
۱۸۶	در اعوجاج غرق	۱۶۲	در فلیح مفاصل اعضا فردا
۱۸۷	در اعوجاج عمار	۱۶۳	در فلیح با اقسام و علل
۱۹۰	در اعوجاج وطنی	۱۶۴	در تعریف تقسیم فلیح
۱۹۲	در اعوجاج بدو اصابع	۱۶۵	در فلیح بطن
۱۹۲	در انوریزم دودا و خیلان	۱۶۶	در فلیح فلیح و علل
۱۹۲	در انوریزم عسکری	۱۶۷	در فلیح بر نخین
۱۹۵	در انوریزم اعضا فردا فردا	۱۶۸	در فلیح فلیح
۱۹۶	در انوریزم شریان ابط	۱۶۹	در فلیح فلیح
۱۹۷	در انوریزم شریان عصب	۱۷۰	در فلیح فلیح
۱۹۸	در انوریزم شریان فمور و فلیح	۱۷۱	در فلیح فلیح
۲۰۰	در انوریزم دوالی	۱۷۲	در فلیح فلیح
۲۰۱	در انوریزم دوالی	۱۷۳	در فلیح فلیح
۲۰۲	در انوریزم دوالی که در جل بیضی	۱۷۴	در فلیح فلیح
۲۰۳	در انوریزم دوالی که در جل بیضی	۱۷۵	در فلیح فلیح

BLANK PAGE

کتاب علاج الاسقام

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى و آله الطيبين الطاهرين
 چون حکیم خداقت سیر معتم فضیلت کسرت و کمر پولاک نسادی معلم مدرسه دار الفنون
 و طبیب خاصه در بار معدلت مدار عیضرت شایسته اسلام و معین ملت تازی
 سلطان سلاطین ناصر الدین شاه غازی کتابی در علوم جراحی و امراضیکه علاج و از آنکه
 منوط است باعمال صادره از ید تصنیف نموده است میرزا جرج حسن که اثر کاروان
 مرتبه اول حکیم مذکور است این علوم را مبتوب منظم ساخته و به علاج الاسقام سرور
 کرده و این کتاب شصت و یک مقدمه و سه مقاله و ثمانی فصل در تعریف عمومی علم است
 بدان علم جراحی را که برینانی خبر و در فایانامیده اند یعنی اعمال یدیهی عبارتست از عملی که
 از او شناخته میشود علیککه اغلب بطریق ظاهر بدن انسان عارض و وارو و باعات
 حواس خمس ظهیری تشخیص داده میشوند و هم اغلب اوقات باعات اعمال صادره از ید
 و سبب علاج پذیرفته و زایل میگردد و واضح است که حکما حدی صحیح و کامل باین
 علم طب و جراحی بیان ننموده اند بجهت اینکه دیده شده بعضی امراض باطنه را که باطن
 ظاهر بچون نموده و دفع گردیده و بالعکس و لهذا حدی کامل باین علم جراحی و طبیبان

در کتاب

بیان نمود و هم لازم است که صاحبان این فن در علم طب حاذق و ما هر باشند و عمل جراحی
 چون اصعب اعمال است باید مبشرین بد و معرفت کامل بعلوم شریح داشته باشند
 و هم بجهت تکمیل این عمل باید چندین درغش مثبت مشق نموده تا در ابدان حیث مشق نمایند
 و نیز از شرایط اوست معرفتی تام باحوال الایکله بجهت هر یک عمل ترتیب داده
 و وقت آنها از مریضه و بارخیز و طریق بکار بردن آنها در مواضع لازم و اما برای
 این نعمت عظیم نعمت کثیر موجود است زیرا اغلب اعمال جراحی در مواضعی بکار میرود
 که بقسم دیگر علاج ممکن نباشد و بعضی این اعمال بتوان نجات داد و دی روجیه از اذیت
 اما مقاله اولی در بیان مجلی از جمیات و اورام وارده بر اعضا و آن مشتمل
 بر سه باب است باب اول در جمیات و اقسام و سبب علامات و علاج آنها و مشتمل
 بر چهار فصل است و اگر چه جمیات متعلقه با امراض باطنه و ذکر آنها در این موضع مجموع
 میشود لیکن از آنجا بیکه اغلب جراحات با بالذات و یا با بعضی و یا اتفاقا و یا بطنه
 عمل یدیهی لازم افتاده است بناء علی ذلک مجلی ازاد و در اینجا ذکر نموده و بر این جراحی
 این علم مقدم داشته ایم و در امراض باطنه تفصیل هر یک بیان خواهد شد
 کما فی عمل عبارتست از حالتی غیر طبیعی که بواسطه او اضطرابی در اعمال و احوال
 آلات بدنیه بر سر سیده مورث غیظان دم و اشتغال اعضا گردد و این جمی اغلب
 با امراض عاده سمراء و علامات لازم طبیعیه اینست که صداع عارض شود و جرج
 قطن و نخاع و سستی و درین اعضا با ضعف قوا و عضلات و اختلال حواس و سایر
 معوط و سرعت نبض و سده اشتها و عطش معوط و باره زبان باخسرت و سستی
 سیم در جمیات معونی و قوت بول و عرق و سایر ترشحات طبیعی و هزال بدن
 بسبب امراض مخصوصه هر یک از اقسام جمی و علاج رفع سبب و سستی و تجماع
 عنقریب در فصل هر یک بیان میسائیم ثانی مقاله فصل اولی در جمیات و مشتمل
 در جمی درمی و او عبارتست از جمی عادیست که سبب توهم یکی از اعضا می باشد
 یا باطن بوده باشد و چون سبب این جمی درمی است از کثرت و حیوان غلبان و

بنا علی هذا وراحمی سو فوخص با فله فوفا ناسیده اند و اما علامات او اینست که اولاً
 از بی شید عارض شود و بعد عوارقی در بدن مشتعل گردد با حرمت و خشونت
 جلد و وجه و عوارت او با صلابت و سرعت نبض و عظم او و خشونت لسان و عطش
 مغرط و تند شهت و قوت و حرمت بول و کمی سایر ترشحات بدن و صداع و
 خشونت کلی اعضا با غلظت و اضطراب و هذیان در حالت تراید مرض و وجع قطن
 و امثال آنها و عوارضات مذکور شبها شدید گردد و هرگاه از صاحب این
 قسم حی فصد نمایند دم او و درغوه در سوب خواهد بود و بعد از آنجا سطح فی
 او مقرر گردد و چون در دم رویت سناقص نهد بول کثیر و نبض بطی و لین گردیده
 شهت بکشد و عطش تسکین یابد و طبیعت ماده را بفرق بجان نمود و عوارضات
 مذکوره زایل و حی تمام شود و سبب این حی بخو که قبل مجاز گرفت و رمی است
 که عارض شود در اعضا باطنه مانند آنکه در کبد و ریه و غیره و باشد که از
 ضربه و سقطه وارده بر عضوی اینجی بهر سبب و چون اغلب بعد از قطع عضوی
 اینجی عارض میشود و از لوازم جراحات است لهذا او را نیز حی جراحی نیز نامیده اند
 اما علاج باید فصد نمود و اگر کفایت ننماید مکرر فصد نماید و در حالت
 تراید در دم و شدت حی و مجرب است آنکه محل نشستن سیم باشد و آنجا نیکو سبب
 حی و رمی باشد در ظاهر اعضا و هم در بعضی او را باطنی مانند ذات الجنب
 و دلت الریه و امثال آنها وضع علی موضع متورم نافع است و هرگاه سبب
 حی و دم نخاع یا جیب دماغ باشد حیات با شرط انفع استفرغات است
 و از او و نیز نافع شرب شور و تسکین قی است مقدار منقعه بدین قسم
 که بکشد شیر بادام تنه از روغن بادام شیرین و صمغ عربی سه سیر شوره
 قلی از چهل با شصت کدم شربت ریوس یا قوت سیاه چار مثقال اطافه
 ساعتی یک قاشق میل فرمایند صفت دوائی نافع بکشد آب گشنیز سه سیر نیک
 طریقه کثقال شربت روت سیاه یا آلبومی بخار سه مثقال مغرط نموده میل

آنانند

فرمایند و شرب دوائی موسوم به اسنات مانا نیک یعنی سرکه و جرم زوشت در
 اینجی نافع و معین بر عرق است و هم استعمال کلل نافع و در غیر او را مجنب و در شرب
 ماء بارد مفید و سکن عینیت و هرگاه با این حی قلی و اضطراب عظیم و سهر مغرط
 باشد باید قدری افیون بکار داشته و از اغذیه مبررات ختمیاء فرموده اند
 کوم و موسوم حبت ناب و در زدن فصل نالو کز ناب و قلی در حی اضطرابی و او نیز
 از جمیات دموئی است الا اینکه در این قسم حی اعراض عصبیانی بر دموئی عا
 و لهذا اعمال افعال بدن بحد مضطرب میباشد اما علامات او این است که
 صداع شدید در جمیع اجزای راس عارض شود با قلی و اضطراب کت و الت
 رحمت و همین اعضا سهر مغرط با خوف و هم و ثقلی عظیم در نواح قلب معبد
 و نالیدن و کزیت و خشونت و تواتر نفس و سرعت نبض با صغر او و لین الت
 و هذیان و ارتعاش اعضا و اما سبب اینجی اسبابی است که سابق در حی و رمی
 بیان شد الا اینکه در اینجی بواسطه ذکاوت حس اعضا چنانچه در اطفال
 و ضعیف الا بدان و زنان صاحب خست خستاق رحم و شهت سیکه در بدن آنها چون
 قلیل است و صاحبان کرم و حبس حیض را چون جراحی دارد آید یا یکی از اسباب
 حی و رمی ایشان را موجود شود حی اضطرابی بهر سبب و اعمال بدن بد بواسطه
 محفل کردند و اما علاج باید از آنکه سبب اینجی نمود چنانچه اگر سبب جود
 دیدان معمولی باشد باید ادویه بکار داشت که اسقاط آنها شده معده و
 قوت گیرند تا در آنها تولید کرم نشود و آنجا نیکو سبب اینجی متلاء معده و
 از غذا و فضولی باشد باید با عانت مینات و سهلات رفع امتلاء نمایند
 و اگر سبب اسهال باشد معاجیه سهال باید نمود و هرگاه سبب ضعف
 قوای بدن باشد باید مقویات بکار داشت با بککه اولاً باید سبب
 تیز داده بر وفق او معاجیه فرمایند و استقراغ دم در این قسم حی جایز
 نیست زیرا که ضرری عظیم خواهد کرد و بد بلکه بجهت تسکین قوای عصبیانی

مورث

باید مخدرات از قبیل افیون و مارفون و شراب و امثال آنها میل فرمایند
 مثال اگر کسی را جراحی کوچک با نمل یا عضو دیگر او وارد آید اغلب اوقات
 بدون جراحی است و اگر هم باشد جراحی درمی خیزد و اما فرض کنیم که طفل لطیف
 و نازنین یا زن صاحب خستناق و همراهمین جراحی دارد آید جراحی
 عارض شود و با اضطراب و هذیان و سایر اعراض عصبانی لازم آید و این
 جراحی را می نامیدند فصل لث از باب اول در بیان جراحی دق که بر
 لزوم او جراحی لازم و بجهت تصرف و از آن به نمودن بدن جراحی قبول نمایند و سبب
 این جراحی نیست مگر اینکه با تحلل بدن اکثر از بدل و تغذیه اش باشد چنانکه
 در مرض سل بدین واسطه جراحی از لوازم اوست و دیگر آنکه اسهال الدم
 مزمن بسیار در دستار یا مورت اینجی میگردد چون در اسهال الدم غش
 مخاطی امعاء مجروح و دق دقاق او منقطع و عصیر غذا را علی بنفعی نمیشوند
 جذب نموده بدل با تحلل از بدن در تغذیه عضو نقصانی روی
 و جراحی دق عارض شود و دیگر از جمله اسباب مورت اینجی ضعف بدن و قلت
 دست چنانچه اگر جراحی بر عضوی وارد آمده از کثرت سیلان دم و تیره
 بدن ضعیف و مایه او تحلیل گردد و هم بواسطه نقصان در تغذیه اعضا جراحی
 عارض شود و یا سبب اینجی اختلاط و امتزاج بول مایه است با خون چنانچه اگر
 ماده در آلات رئیس از بدن مانند کبد و دماغ و صفرا و جوف دریدی
 مجروح باشد افوا لامر ماده مذکوره را طبیعت در دواران دم داخل گرداند
 و با عضو میرسد و بدن تصرف تمام در او نموده جراحی دق از او وجود آید و یا
 اینجی تغذیه قلیل و حرکات کثیره و ضعیفه است علی ای تقدیر هر چیز که مورت
 نقصان مایه بدن گردد جراحی دق از او عارض خواهد شد اما علاج مایه
 اوست هزال بدن و فرو رفتن صدغین و غویمین و سر مغوط در ابتدا
 شب و خواب رفتن علیل طرف آغوش و لاغری سینه و تهی اطراف

المنزل

و اشتعال حرارت بعد از اکل غذا و تشویه مستطام تحلیل او و سرعت و ضعف
 دلین آلت با جرت کنار زبان و عطش مغوط و عرق کثیر و راج بسیار خواب
 و در قرب مورت اسهال عارض نمیشود بلکه اگر در اندام علاج او حکیه اینست که
 تعدیل مزاج نموده و علی سدا به سیلاق فرستاده و از اغذیه دادویه مقویات
 فرمایند زیرا که از تقویت طبیعت و قوا باشد که بدن همه معاجزات رفع
 مرض گردد و بهترین ادویه در اینجی کینه کینه است بدقیسم که بکیرند پوست کینه
 چهار شغال و در آب بقدر دو ساعت طبع داده و صاف نموده با ضافه اشتعال
 شربت نارنج در یکروز هر ساعتی یک قاشق میل فرمایند و اگر بدین نسخه قدری
 جوهر گوگرد بیفزایند النفع و اقوی بیت صفت جراحی نافع بکیرند افیون یک
 کدم و زیتال مسوق نیم کدم رب سوس دو کدم مخلوط نموده و یک حب ساخته
 قبل از خواب فرو برند و چون عرق نمودن در اینجی مورت ضعیف عظیم میشود باید
 ادویه بکار داشت که سد عرق نماید و بهترین ادویه اینست که بکیرند جوهر گوگرد
 یک شغال آب شصت شغال رب شاه زنت دو شغال قند بقدر کفایت
 نموده ساعتی یک قاشق بنوشند و آنجا که سبب اینجی اسهال باشد بجهت سردی
 میل فرمایند صفت او بکیرند کرد و در پنج کدم ثعلب مصری مسوق پنج کدم
 قند بقدر حاجت اجزاء را کوفته مخلوط نموده قبل از خواب میل فرمایند طریقی
 صفت کردار و اینست که بکیرند اسپو کا کو آن یک کدم افیون یک کدم قند
 هشت کدم اجزاء را مسوق و مخلوط نموده در عین حاجت بکار دارند صفت
 حقه نافع در جمیع تمام اسهال شدید از این دوا روزی دو نوبت حقه فرمایند
 و هم در بنقیسم اسهال شرب جوهر متحد از مار و موسوم به تنین نافع و عالس
 اسهال است و از اغذیه سریع الهضم و صاکی الکیوس کل سکا و ارا و دوزولی
 و شورابی طبعی و طوبی بکاه و نخود آب و کباب بره است فصل رابع از باب
 اول در جراحی غلطی با اسباب و علامات و معاجزات او و سبب اینجی نقصان

مطرح شده کیرند
 تعدیل افیون و صفت
 در اسهال و شربت
 (قره)

هرمانند آنکه در حیات و افاده و یا بواسطه اکل غذای غلیظه و سیرج بعضی مانند
 لکوم متعفن و قدید و مالخ ایمنی عارض شود با بجملة سبب ایمنی مرض محرقة و طبقة و
 و سقطة است که اعضا و رئیس را شوش سازد و اعمال آنها را معوشش گرداند
 از امتزاج بول و صفرا با دم و مرض شقاق و سوس و غائر ایامورت تعفن دم و ظهور
 حمی غلیظی گردد و هرگاه زیاد از مجروحان را با هم در یک منزل بجا باند حمی درمی
 بجای غلیظی متولد خواهد شد و اما علائم آن ایمنی است سرعته و صفربض نبی
 نظامی او و بشرة بگون مس کرده باخوش و عوارت جلد و بیست لبان
 و اثرار کون او و سواد دندان و کبودی لب و دیکان با دهن اعضا و قوا و
 حوش غشی ظاهر و اختلال آنها و حرکت او تا رنج دست و پم در بعضی اوقات
 صاحبان اینجیمه اعراف عارض شود و هرگاه در انتهای این مرض فواق عارض شود
 و سیل ملاکت و حبس البول از علامات ردی و دالت بر استرخاء و تنوع
 و اعصاب قطن و اسهال الدم در ایمنی ارد و علائم است و بالعکس زحمی
 و نبض و یلست بر بجان بقر و سلامت حال علیل و کثرت بول از علامات
 حیده و دالت بر میل موده از اعمال با سافل میل بشیاء و موضوعت علیل
 و دالت بر نجات و نیکوئی حال او و اما علاج باید دفع فساد و سخرت دم
 نمود و شرب مایه بار و تیره بعد تیره صف و دایمی نافع بکیرند جوهر که در کیمتقال
 آب سیر شربت توت سیاه چهار مثقال منزوج نموده بهر ساعت کفشان
 که چک میل فرمایند که از شرب و حرارت بدن کین یافته مورت تعفیل
 مزاج گردیده و تعفن را بایل سازد و همچنین نوشیدن جوهر شوره و نمک و لیمو
 صاحبان اینجیمه نافع و انجائیکه با ایمنی تیره و سرفه همراه باشند این دوا میل فرمایند
 صفت او بکیرند امرو کا که اتاده کنندم در سیر آب دم نموده صاف نمایند
 و با ضافه چهار مثقال شربت کوکبا در هر ساعت قاشقی از او بنوشند
 که مسکن سرفه و موق قویست و هرگاه در حالت نقاست تعافت ضعیفی عارض

نکته

شده باشد نوشیدن شراب کهنه جایز است که هر ساعت فغان کو چکی از او بنوشند
 و همچنین تعفیل اعضا با آب منزوج با سرکه در ایمنی موقی نافع است و چون علیل از حبس البول
 عارض شود باید در مدت متخذه از شوره و شیتال و سورنجان و امثال آنها بکار دارند و اگر
 کفایت در تعفیل نمودند باید با عانت کشته تر بول با کشاید و اگر از زیاد خوابیدن
 علیل یا دیگر مواضع او فرقه بهر این مرم استمال فرمایند صفت او بکیرند کافور
 قیصری یک مثقال با دو عدد زرد و تخم مرغ بطریقیکه در قسم است مرم نموده و لته بدو الو
 بر موضع متعفن نهند و علاوه بر معالجات و تدابیر مذکوره تعفیل هوای منزل اکل افاده
 و شرب آب شرب بر طیفه و مضمه نافع و تعفیل مزاج میساید و اما حمی نویسه چون از امر
 باطنی است لهذا در اینجا ذکرش نموده ایم ولی باید دانست که اگر مجروح حمی نویسه
 شود اتفاقی است و هیچ وجه نسبت با جراحت ندارد و باشد که صاحبان دق را
 حمی بطور نویسه بیاید و شتبه گرداند حمی و قیران نویسه در این صورت از سایر علائم باید
 مابین این دو حمی تمیز داد و لیکن علی ای قسم کان استعمال جوهر کهنه نافع است با بانی
 از مقلله اولی در بیان اورام و التهابات بدن می عضو کان با اقسام و سبب
 و علائم و معالجات آنها کلیه و شملت بر سه فصل فصل اول در تعریف و رم
 و ماینه به اما درم را که التهاب نیز نامیده اند عبارت است از تفرق اتصال و انقلاب
 آلتی از آلات بدن بواسطه تحریک و سیجان و انقباض دم و ترشح او در جوار
 عضو که بدین واسطه وجع و حرمت و التهاب و تسج در آن عضو یافت شود و جمیع آلات
 بدن قابل ترشند سوای ناخن و موی و بشرة فوق جلد ظاهر و باطن اعضا و چون
 سیده و دم در عروق و قلیت موسوم بشیر این شریقه بناء علی ذلک در هر عضوی که
 عروق مذکور بیشتر است استعداد او بدین بیشتر خواهد بود و از لوازم در دست
 وجع شدید یا خفیفی باز که درت حس و حرمت عضو مرم بجو یکدم ممکن در عروق
 غیر مرمی او مرمی ظاهر شوند مانند آنکه در دم طبقه نتیجه چشم که رمد میزد
 شده باشد تدا و عوارت و اختلال عمل و ترشح آن عضو با بطلان آنها در صورتیکه

کشته تر مرم نویسه مجروحات
 که بر اثر دفع بول در مجروحان
 در زمانه خلافت

حالات و عوارضات مذکوره شدید کردند همی نیز علیکرا عارض شود و بیاید و
که وجع نیزه تمرد اعضا حساسه مفروضه در عضو متورم است بدینقسم که بواسطه
بیجان دم و انقباض او بر عضوی او عینه انقباض متکلی گردیده و با عصاب
خود منقبض زده و مورث وجع میگردد با حکه و در غده و ادراک برالم در ابدان
مختلف است در بعضی وجع غلظه و در بعضی وجع است با انقباض و اما حرمت
و حرارت عضو متورم مساوی حرارت و کثرت عروق شعریه است و چون
دم پیش از قسط لایق تغذیه بوق شعریه عضوی انقباض یابد ترشح مائیتی
او نیز پیش از حالت سخت خواهد بود و لهذا این رطوبت ترشحه مورث تبسج
متورم میگردد و با وجود اینکه در ابتدا دم موضعی میباشد لیکن بعد از اشتداد
حمی علت مزاجی میگردد بخوبی که اگر در این هنگام صاحب درمرا خد نمایند در او
زبد و الیاف کثیر پدید آید و هر علتی که بر عضوی اذیت نماید مورث تورم
او می تواند شد ولی استعداد مختلف است بواسطه استعداد انسان و این وجه
و آلات مانند اینکه در سن شباب و در افزه و موی و صفراوی و اعضا
عروق شعریه در آنها کثیر است استعدادشان بدم زیاد است ولی سبب
غریبه سیاه سوز مزاج مانند آبله و زنگ و خنازیر و قهرس و سده ترشی که طبیعت
بدفع او عادی بوده مانند دم بواسیر و خشک شدن موضع و اع و سمیت سیر
مانند ماده جدی و ضربه و سقطه و منقبضه و چاییدن نهکایک بدن بواسطه
کرم روده و سوختن عضوی از آتش و ادویه اکاله و محرقه مانند جوهر که کرم
اکال و غیره مورث دم میشوند و کل او را هم ای قسم کان منستی کردند یکی از
چند حالت اول تجلیل شدن ماده مورمه قائله ترشح گردیدن مائیتی
از او با جوائ انقباض که بدینواسطه تبسج از او بوجود آید ثالث تبسج عضو
متورم را بعلل بابت و تجر ماده در اجزاء عضو متوقف خاصه به لئیت
در فوات عضو متورم سادس بقا تقریبا به رسیدن در انقباض است و در

موردی که

موردی که عوارضات و درم خفیف و وجع او بدون ضربان باشد یا در حین درم حرارت
بعرق یا با درامی صاحب رسوب است و بد باید معالجه مستطر تخلیه باشد و بعد
از تجلیل درم اعراض لازمه او معدوم و وجع و حرارت حرمت تبسج از انقباض
زایل گردند و اما تبسج در او را هم بدین نحو است که در انتهای درم مائیتی از دم
ترشح و تبسج واقع در تحت جلد عضو متورم منقبض گردیده مورث تبسج
در تبسج انقباض میگردد و این قسم از اشیا اغلب در او را هم تبسج و تبسج
موجود میشود و بنا بر این چنان تصور نموده بطلان میفیند که سبب هر اماسی درم است
بلکه از تبسج عضوی بواسطه عسر رجوع دم تبسج و تبسج در انقباض بهر سبب بدون درمی
و هر گاه درمی منبسطی رسد و ماده او تجلیل نموده قاعده است که منقبض گردیده و ماده
از او دفع شود و اما درم رطوبتی است ترشح از عروق شعریه مفروضه در عضو متورم
که بعضی از او بآن بیاض لیس منجمدی کرده که بیارسی سید نامندش و در ابتدا
این شسته ریم منجمده با طراف خود ملصقت و بمرور تبسج یافته و حل شده بصورت
ریم دفع شده و در صورتیکه ماده در ریم مجتمع گردیده و او را از او به نماید و مل ریم نامند
و بدانکه اگر درم شدیدی بسرعت به نهایت رسد تمدد و اما سبب او بقایید و تبسج
ضربانی داشته باشد علیکرا قشری بر عارض شود و موضع متورم لئیت یابد و در وسط
او فرونی پدید آید و از مل حس تبسج از او بظهور رسد و جلد رقیق گردد و است
بر اینکه این درم منفرجه خواهد شد و در صورتیکه در عمق عضوی ریم بهر سبب باشد
طل کشد تا انفجار و تبسج باشد که منفرجه گردد و درم از موضع بکلیت نزول با بعضی
مادون خود نماید و یا با طراف منفرجه شود و اینجا یک در یکی از اعضا طبعی باشد
که به و طحال غیر هم بعد از دم ریمی بهر سبب چون دفع و خروج او بصوبت دارد پسند
علیل ادراک نماید تعلی عظیم در عضو متورم و بعد از علامت حمی دمی مانند قشور
مکر و حرارت کفین سیما بعد از اکل غذا با حرمت و جبه و بهزال بدن و در وقت
صدغین و عرق مغرط و سهال بظهور رسد و باشد که از طراف هر در جلدی حمای

۱۰۱
عضو مقدم و علی عارض و منفر که در و تریم از باطن بطن میل نموده منفر شود زیرا
که ریم هر یک عضو مایل به سوی خارج است و لیکن میشود که با معالضه بیا بد
چنانچه دیده شد که گاهی ریم یکی از اعضا باطنه منقب کزیده و با برادر دفع
در بنا افشام ویم ماکه ریم یا جید است یا روی که در هم جید رطوبتی است
که در اصغر مایل به بیاض با غلظت قوام و نتن مخصوصی با جلالت طعم که در نتنش
بیش از آب و مرکب است از کلون و نایت و نایت و نشان است که دم جمیع
اجزا و اطلاع او در این نیز موجود است بتفصیلی که در کتب تشریح لوفاف او را نوشته
و کلون مایه و صغیر و محدب است که بجز با دره بین مرئی نشوند و اما دریم در
است که قوام او رقیق و نون او اکثر مایه ای بود با کراهت نتن و آمیخته باشد
با اجزای حیسی و هرگاه در ریمی علاوه بر این صفات کیفیت الکاله باشد او را صید
نامند و بیا بد است که اگر در بطن یا معانی یا قریب بمقدیری هم رسد نتن بر
از او مشوم شود سوای آنکه امعاء متفرج یا آنکه جراحی بر آنها وارد آمده باشد
و این نیست مگر متکیف کزیدن ریم به کیفیت و نتن بخار متصاعده از برادر
و بد آنکه در امرجه رویه و ششی ضعیف البنیه و قلیل الدم و در نقابت بعضی از
امراض شدید و در صاحبان مرض خنایز و داء افرنجیه بعضی اوقات و مایلی
عارض شوند بدون آنکه علیل ادراک درمی کنند یا آنکه جلد از ظاهر حرمت تسج
بهر رسانیده باشد و بعد از انقباض او ریمی با رقت زیاد مانند آب دوع دفع
شود و چون در این قسم درم حرمت و تبجی با سایر اعراض لازمه درم ظاهر
بناء علی هذا او را در مل ریمی بارد نامیده اند و مقدمه این قسم از مایل روشت
مزاج است با عدم اشتها و کمالات و دهن جمیع اعضا و سر مغرط و غلب موضع
عروض و باین کیفیت و حد و صلب و خذاست و چون نفع و مایل عظیم شود
بحدیکه قریب بیک یاده چار یک ماده در آنها جمع گردد باشد که بدین واسطه
علی الاشی دتی عارض شود بنحویکه قبل باین آن را نموده ایم و باشد که یکی از اعضا

ریمی

سیما عظم قطن یا عضلات نواحی او متورم و منفر کزیده ریم مجتمع در تحت آنها
بواسطه کمیت و وزن تحت معانی منقب کزیده و در این موضع ادراک او غایب
این قسم از دل یا بعزائنه البس بر کوفه سپنان نامند یعنی ریم حاصل شده در
موضعی و جمع کزیده در موضع دیگر بیا باشد که طبیعت ماده و طیرا متوسط آورد
دعوق جذبه منجذب و یکی از اعضا باطنی مانند کبد و طحال و ریه و قلب و غیرهم
مستقل سازد و در انقباض و ملی بوجود آید و بنفیس را در مل انتقالی نامند و اما بعض
و مایل ظاهری ریمی را بواسطه عراضی که سابق در او را مکرر نموده ایم مانند صلابت
اطراف و لیت موضع و مل و توج ریم و شمال آنها باید نمود و لیکن در صورتیکه
ریمی در عین اعضا در تحت عضلات گرد آمده باشد جمیع اعراض مذکوره خفی باشند
و چون در جلد فوق او تغییراتی بهمین رسد و توج ماده از بعد مسافت ادراک نشود
بسته تشخیص صعوبت دارد لیکن جراح احادیث میباید تبج جلد انموضع و غیره
مکرر و وجع صعب زیرا که این حالات داند که در عین ماده بوجود آمده است و هم
بعضی اوقات از فرد بودن آلتی مرسوم به تروکار است بنا طر بر وجود ریم میسر نمون
و انباشتی بیکر دست متفرج کزیدن عضو متورم و این قرصه یا سالم و یا کمال است
و تا کل ریم و آلت بر تبدیل و دم متفرج اکال بدین قسم که ریم این قرصه هر موضع که
بر خود تسج او را از او نماید و در قوام رقیق و در طعم عفص و کبر النتن باشد و این
قرصه عارض شود در عضو متورم سنگامی که صدمه بر او وارد آمده باشد یا آنکه
اضده و بر اهرام حادی در او استعمال نموده باشند و یا از سوء مزاجی مانند مرض
خنایز و آبله و فرنگ و اسکر بوت و شمال آنها قرصه اکالی در عضوی که رسد
و انباشتی دیگر در دست صلابت و تبج موضع متورم و او بدین نحو است که چون
لازمه هر یک درم افتاده است ترشح رطوبتی از عروق شعریه بعضی اعضا متورم
همدا باشد که از طوب ترشح منعقد و تبج کزیده و بدین واسطه صلابتی در انقباض
بهر رسد بدون تغییر لون جلد فوق او و این صلابت مختلف است در بعضی کثیر و در بعضی

بدانها نمواند رسيد و بدین جهت غذای آنها ناقص مانده و بدین لحاظ بسيخى نقرایا بر
 دلبد دیده شده که شرائین عضو مشوف در این اشخاص شکسته کی بهر سینه
 چنانچه در قشر کج آنها مشاهده میشود که غشاء جوف شرائین حقیقه عظمت بهر سینه
 یکدیگر که سینهها محکم است و بخوبی که قبل بیان نموده ایم این مرض غلب شيوخ را عارض
 شود ولی باشد که جوانان مستعد از حرکت عنیفی بطولای بدین قسم غا نقرایا شود
 و در بلادیکه مرض ریه و سینه بیک قسم غا نقرایا دیده میشود که شبان را عارض
 میشود بدین قسم که اولاد یکی از اطراف بدن وحی شدید در مفاصل بهر سینه
 یکدیگر که از شدت او بخواب نروند و بعد از چندى بعضی از آنها مل و حذر شده
 دلشان کوبد و ضربان ششها این مغرور شده در آنها مفقود گردد و بهر و حذریت
 و برودت طبعشان بفراید و بالاخره در سلامیات اخیر غا نقرایا عارض شود
 و این قسم از غا نقرایا را که در ایران شفا فلوکس نامند غلب مجرود و بدین کج
 نمومینماید یکدیگر که ماهها و سالیها طول کشد اما در بعضی باشد که بسرعت زایل
 شود و دلیل را فاسد سازد و شبیه است بغا نقرایا یکدیگر در فرنگستان
 غا نقرایای شيوخ نامند و هم در این قسم اکثر اوقات شرائین عضو مشوف
 مسدودند بخوبی که در میان قطع خون از آنها سیلان نمینماید و اما قسمی
 غا نقرایا غلیظت که عارض شود بموضی که زیاد بدو یکدیگر داده و خوابید باشند
 یعنی در اشخاص صغیر بخصوص در صاحبان مرض حرقه و مطبقة و حصبة و فلیج
 از خوابیدن بیک جهت سیمما در موضعی که بستر او را هموار و چین داشته
 باشد از انقباض او عذرا غا نقرایا عارض شود و موضع بر بدن این قسم غا نقرایا
 غلب در صلب و کفین و رزقی و زانند تین فدا است که اولاد یکی از اینها
 حرقه شبیه بودم حرقه عارض شود و بهر عت غا نقرایا مبدل گردد و اگر چه
 انقباض مورت غلظت این علت میشود لیکن سبب و تقفن دم و نفاذ او
 یا نقصان قوای عضلانی است و گاهی در دماغان از سنج و دماغت حلقه

و گاهی

چونایکه از و با اثر سیمی مرده اند و بعضی از اعضای آنها مادی از آن حیوان بر خورده
 در آن موضع کله سرخی ظاهر و بهر عت بشوری شود و ممثلی از ماده غا نقرایا فی و جوا
 خود مغرورش کرده و با وجود بر اینکه اما من و جع او قلیل است ولی بعد خدیوم
 عی غوفی عارض شود و بنض صغیر و غیر مستطعم گردد و بدین کوبد با وجع و غلظت
 و قی دست دهد و اگر در علاج اهلای در زنده نرود می علید اطلاق است از و این مرض
 بتره روحی نامیده اند و بواسطی دل و می است که غنقریب ذکر خواهیم کرد باشد
 و اما غا نقرایای موسوم بدار شغافى اغلب در غزوات عارض میشود و سیمما در
 مجروحین را با صاحبان مرض حرقه و مطبقة و سیمما را مرض غوفی بنشین سازند
 از مجروحان باشد که جواحت خرنی و سالم را وجعی صعب عارض شود و گاهی جواحت
 حمرت شدیدی بهر سینه لبان آنکه در ورم حمزه و غشاء کاذبی رمادی لون او بر پو
 و دست بهر سینه و در اطرافش قرصی عارض و پرمزده شود و مده سیمما از او
 مسدود گردد و بالاخره صدیدی متعفن از او پالوده و بدین کج اطراف فاسد سازد
 و محتمل است که عضلات و عروق و عظام نواحی او فاسد شوند بخوبی که از فساد و جرم
 عروق عضو مذکور دم کثیری سیلان یابد و هم میشود که بسیار اشخاص این مرض سیریت
 نموده و بعد از چند یوم علامات رذائت مزاج مانند قلت اشتها و وجع فواد و قی
 و صغر بنض با قلی و اضطراب و غیره بطور رسد و هم باشد که حی و قلیل را عارض
 هلاک سازد و اما قسم دیگر غا نقرایا غلیظت که از رذائت مزاج و انحراف او از
 حالت طبیعی در صاحبان مرض حرقه و مطبقة و حصبة و جدری بهر سینه و غلب
 ضمای دمان و تنگ قلصه واقع و بدین کج آلات را فاسد سازد تا عظام
 و اگر چه اغلب صاحب خود را هلاک سازد لیکن باشد که باین عضو سالم و سیت
 خلی حصار می بهر سینه و علیل بر بد فضل ثانی از باب ثانی در تقسیم او را هم بدانکه
 کل او را هم بهر سینه نموده اند بهر سینه که در تحت هر یک قسام است اول
 انقسام یافته بنا بر علامات و اعراض در فارقان و بهر سینه سیمما و سیمما

حالت موافق نفع عضو متورم اما بواسطه علامات و عوارضات نیز منقسم گردیده بود
 حادث و مزمن اما درم حاکم آنرا پسند که جمیع عوارضات او بسرعت بظهور رسید
 و زایل شوند و درم مزمن آنرا نماند که بعکس عوارضات او بتدریج عارض و بطول
 انجامند و هم منقسم میشود و درم مفرد و درم سببی بلغمی و عرقی و خونی اما درم
 آنرا نماند که عوارضات ورمی صاحب او را بهر سبب و رفتار او سریع باشد
 بدون حوادث و اغلب عارض شود از جبهه سبب را منتهی کرد و تحلیل یا انقباض
 اما درم هجاء آنرا نماند که با مزاج و دمی زکی احسن عارض شود و در بدن آنها
 دم بقیان آید و با وجع شدید باشد و هم عارض عصبانیت صاحب آن را بطور
 و اما درم بلغمی آنرا نماند که عارض شود بلغمی مزاج را بهر سبب که در قوی
 آنها و مبنی روی داده باشد و وقت اعصاب آنها قلیل گردیده باشد یا خفت عوارضات
 ورمی و مزمنیت او اما درم عرقی آنرا نماند که واقع شود ششها صیر که خون در بدن
 آنها فساد بهر سبب باشد مانند آنکه در مرض حرقة و طبقة و انشال آنها و بسرعت
 مبدل و منتقل شود با فقرایا و اما درم خونی آنرا نماند که عارض از مزاج و خفیف
 بلغمی باشند و بدانکه او را مزاج بنا بر سبب مرمر منقسم نموده اند و درم نالبت
 و درم بالعرض و درم خاص و درم انتقالی و درم بالجماعه و اما درم بالذات آن را نماند
 که از ضرب و سقطه و انشال آنها بعضوی واقع شود و اما درم بالعرض آن را نماند که
 عرض باشد از مرض دیگر و بعد از رفع مرض اصلی درم که عرض او مست زایل شود
 بکلی مانند ورم بعینه که سبب حرقة البول باشد و اما درم خاص آنرا که نماند که
 عارض شود از ماده سببی مخصوصی مانند ورمی که حاصل شود از کزیدن عقرب در ریه
 و غیره و اما درم انتقالی آن را نماند که اولاً در عضو از اعضا درمی واقع شود
 و بعد منتقل گردد بدگر عضو مانند ورم حراره بسر سبب و ذات الریه و ذات الحجب
 و امثال آنها و موافق نفع عضو متورم و درم منقسم نموده اند و او را درم جلد و او را درم
 غشاء مخاطی و او را درم غشاء صفاقی و غشاء لیفی و عروق و عصاب و عظام و اما درم

جلد

جلد را قاعده است که تحلیل رفته و بشره عادی او مانند سبب ساقط شود و در هر یک که درم
 او شدید باشد و جمیع ملتهب با جوقه او را بهر سبب و بشره او مانند عادی برآید
 محلی از رطوبت و اما درم کم اما سبب عظیم و تمدد قوی و وجع او ضربانی و منتهی گردد
 با فقار یا غلظت یا او را درم غده و وجع و حرارت حیف و رفتار او زیاد و مزمن و
 منتهی گردد بصلابت و بی میلان و اما درم غشاء مخاطی چنان است که در
 ابتدا ترشح او فانی گردد و با جمیع ملتهب منضبط با حرمت شدیدی بعد از طویلی
 از او ترشح گردد و بعد از چند یوم بلغمی از او ترشح نماید و این قسم از او را درم نامند
 بزمینیت و نکث و عود و چون درم چند ی طول کشد غشاء مذکور مستغرق شود
 بحدیکه مانند دانهایی بواسطه شوره از او آید و بختی باشد و اما درم غشاء صفاقی
 مانند صفاق لطن جنب و دماغ و غیره و وجع شدید و بسرعت در جمیع جوانی غشاء مذکور
 معروش گردد و مانند آن است که تیری بر او سرتند و منتهی گردد این درم تحلیل
 یا بالحقاق جزء متورم از غشاء یا بجا خود مانند آنکه در ذات الحجب باشد که بواسطه
 ورم غشاء مجلی ریه بصدر ملحق گردد و هم باشد که بپستقا منتهی شود و اما درم
 غشاء لیفی مانند ام الغلیظ و سحاق و غیره و وجع شدید است و در ششها زیاد گردد
 و مانند بدلتکه کو یا با منقبی او را سوراخ میکنند و حرمت او قلیل و منتهی گردد
 بتحلیل یا انتقال یا صلابت یا قروح و اما درم ورم عروق از جمله ورم سبب
 شریان نا در وقوع است و در ورم آورده جمیع اضطرابی باقی علیل عارض شد و این
 کوید و در ورم متورم تمدد و صلابتی بهر سبب و این ورم غلبه لسان را بعد از وضع
 عارض شود و هم باشد که از قصد نمودن یا مبضع یا پاک و دید می متورم گردد اما
 درم عروق جذابه اکثر بواسطه قروح خبیثه که در نا امل یا سایر مواضع بدن پدید
 باشد حادث و از موضع تورم عروق جذابه خطی سرخ برآید تا غده جذابه قریب
 چنانچه اگر کسی از انقباض صبح بضر او طرود گردیده باشد خطی سرخی از جانب
 انسی زند اسفل برآید تا تحت ابط و متورم گردد و شبکهای جذابه اطری از ورم

عصب خدر حس حرکت نمی در عضو هم میرسد با وجی محک مانند تحریک چرخ لکس
که چرخ صاعقه نیز گویند و هم بهر علت تشنجی در عضو متورم العصب بطور رسد و اما
درم عظام این درم در ضریح و یا در جرم آنها هم میرسد و سستی کرد بصلاست
و یا آنکه عظم متورم را ریم سازد و اما انداز او را درم مختلف است بسته است
و حدت درم و مزاج علیل و عضو متورم فصل ثالث ذی باب در طریق علاج او را
عموما باید دانست که قصد معالج در درم تحلیل است الا در بعضی او را درم و یا یک
بجوان باشند مرضی را و هم باید آنکه اولاً رفع سبب از آنکه او نموده استگاه ادویه
و تدابیر ضد درم بکار دارند از قصد و ارسال علق و حجامت و شرب شور و طریح
و مثال آنها درم باید دست از تدابیر لایقه ندارند و از اغذیه مبررات میل فرمایند
و عضو متورم را با مله آرام دارند و در صورتیکه وجع شدید در عضو متورم میرسد
وجی خطرانی عارض شود باید مخدرات مانند افیون و بزرالنج و آب بادام تلخ
استعمال فرمایند شرب با طلاء و هرگاه علامات هتلاقی در علیل مشاهده شود
میل طبیعت متقی و سهل بکار دارند و در او را درم عفونی شرب حموضات معدنی
قبیل جوهر کرک و منقرم نافع و در او را درم خاص یعنی درمیکه سبب داء افرانچیه
و خناریر و تقرس باشد علاج آنها علاج مرفوع میلی و از آنکه است و از معالجات
موضعی که در او را درم بکار میرود قصد و حجامت و استعمال طلیه را و عده و اخفیه
محلله و اکندة حارة بالفعل و بالقدرة و مرهم و شمعات و قابضات و مخدرات است
و استقراغ درم را بچند نحو میتوان نمود یکی بواسطه قصد دیگر با ارسال علق و اسکم
آنستکه زلوا در موضع متورم بنشانند لسان آنکه در درم از آن باید بفرق
حلق او را نشانند و دیگر است حجامت که چون عضو متورم را تمدد قوی یا داده
در علق باشد مانند آنکه در عرق النساء و درم و در مقام حجامت انفع است از
سایر استقراغات و از زوداع میرد و ماء مشوج و شکر سرب محلول در ماء قزل
ممنوع میباشد بسیار فرمود و هرگاه ضرب یا سقطه بر عضوی وارد آید و موش

خ

فسخ عروق او گردیده باشد و در سکنایک دم تحت جلد بفساب یافته باشد بزرین طلیه
را و عرق در شش مزوج بماء است و چون بعضی او را درم عاده ملتهبه حکا لستنج
بعضی متورم را مازون نموده اند لهذا باید پارچه از پنبه یا باین دولته نهاده و بموضع
به بندند و از اخفیه بزرگ و نان خشک و سبوس کنند و آرد و جو مغلو با لپین بپزند
فرمایند و اگر آنستکه ادویه مذکوره را بعد از طنج بمابین دولته نهاده و بر عضو
به بندند و بیاید دانست که در بعضی امراض حکا حرات یس کاد را از حرات
رطب ضما و انقع دانسته اند مانند آنکه در ورم مائی و ورم حمراء و تقرس و مزاج
افرسه لهذا در این امراض باید کاد بکار داشت و این کاد یا از ادویه یا سب یا
صوف و پنبه و در آلوده باید بکار داشت و هرگاه عضو متورم را وجی صعب باشد
باید اخفیه مخفیه از برک شوکران و بزرالنج و کوکنا رختیار نمود و چون
در او را درم بلغمی و درم سبجان میل درم بعضی متورم قلیل است لهذا باید مخفیه
محلله مخفیه از ادویه عطره مغلو با عرق استعمال نمود و هم طلای شکر سرب و آب
که صفت آنست که در تخته کتاب نوشته خواهد شد و ترنج با دکان عطره
و جوهر نوت در استعمال شمع اشق و مثال آنها این قسم در امراض نافع و از اغذیه
مقویات و مسج درم از قبیل کباب خرد سبب کباب و شرب قلیلی از سب
خنثیاری نماید و هرگاه ماده مورمه مایل باشد انتقال بعضی شرب غیرا بچند نوع او
ادویه بکار داشت که ماده را از آن عضو منصرف بطاهر جلد مخفیه سازد زیرا که
در بعضی مشاهده شده است که امراض آلات شریفه بدن بد ما میل جلد بجان
صلاح پذیرفته اند و از جذبات مستعمله شمع سرب از زرا رنج و خوش شدن
و ترنج ادماست که بواسطه آنها جلد آبله نماید از قبیل این ما خود از فوفون
و ما زبون و غیره و انجا آنکه ماده مورمه تعدد انتقال بموضع دیگر باشد معالجه است
که از استعمال ضما و خردل و شمع زرا رنج ما در مستعمله را بموضع خود عود داده
و از مشروبات ادویه بکار دارد که ماده بطاهر جلد مایل و با عرق منفع شود

و چون در می مستحق شود به تر بل باید از شر و بات مدرات از قبیل شوره و طایر و
 سورنجان و مثال اینها خستیا فرموده و بموضع علت لحد بکار دارند و هرگاه با نجات
 استر خاف و وینی در اعضا یا بند و تیتال و مفصل کل استعمال نمودن مفید است
 و اگر از اجتماع و کثرت رطوبت خوف هلاک باشد مانند آنکه در اناس صفات
 لابد باید با عانت آتی موسوم به تر و کار رطوبت جمعه را خارج سازند و در
 صورتیکه اماسی در لیم واقع در تحت جلد بهر سیده باشد علاوه بر تدبیر مذکور
 استعمال صمغ معطره مانند نعنع و پودنه و کل بوبادران و مثال اینها نافع است و اگر
 بدین تدابیر اماسی تحیل نرود بهتر است که قطعه سرب بر آن عضو به بندند یا آنکه
 در آن پیش نمایند و هرگاه از علامات استنباط نمایند که درم بریم نیستی خواهد شد
 لازمست که طبیعت را در نفیج ماده به استعمال صمغ حار و عانت نمایند و اگر
 وجع شدید باشد وضع علی با طراف آن عضو نافع و آنجا نیکه از ضعف بدن قوی
 طبیعت عامی عاجز باشد در نفیج ماده باید آنکه با عانت صمغ قویه ماده را در نفیج
 دهند و بجهت این مطلب باید خمیر ترش بمزج بادین بید آنکه و پیاز بریان
 ضماد نموده و بموضع متورم و اطراف او را بشمع اشق و باززد و در غلیظن هر یک
 که حاضر باشد بپوشند و لیکن اغلب صمغ در نفیج ماده کفایت نماید و چون بدین
 تدابیر نفیج یافت یعنی صلابت اطراف او به لیت مبدل گردید اگر طبیعت
 خود منفر ساخت قها والا باید با عانت بموضع منفرش ساخت و آنجا نیکه دل
 صغیر یا در لیم غدهای نند پستان و غیره واقع شود و یا قریب جلد بهر سیده باشد
 اسلم است که واکنداده و منفرش سازند اما بعضی اوقات لازم میشود که بدون مل
 منفر نموده آن جگه چون تند و عضو متورم عظیم و وجع او شدیدی باشد از خوف و جری
 غا نقرایا باید قبل از نفیج طبیعت موضع دل را منفر ساخت مانند آنکه در دوم
 و همچنین سکناسکامیکه در در تحت عضله جمیع گردیده و بیم آن باشد که از کثرت
 نزول باعضا و ماردن خود نموده و مورت فساد آنها گردد باید بدون مل کشانید

دیگر آنکه

دیگر آنکه در دمایل دانه قریب باعضای غریبه و دمایلی که در نواحی لیم رخوی عارض شد
 باشند مانند آنکه در اطراف شرح عرق باید لبرعت کشود و هم دمایل دانه قریب
 بمفصل را بدون مهت کشانید مبادا ماده بکوف مفصل نصب فاسدش سازد و یا
 دمایلی که قریب بعروق دم واقع شده باشند اسلم است که واکنداده تا ماده بجا
 در موضع وقوع دل منفر جمع گردیده برآید تا در حین انفجار صدمه و جرحی بر عرق
 مذکوره وارد نیاید و یا آنکه در سکناسکام و جوب اختیار طایف مل منفرش سازد و بیا
 و است که منفر ساختن دمایل یا با عانت آله قطعه مانند مشروط و موضع است
 و یا در بطه ادویه الکانه و محرقه و در بعضی اوقات دمایل عقیقه را جایز است که با عانت
 نهادن منفر سازند و موضع کشودن باید اذق سایر مواضع مل باشد و لعلی است که
 مریض را بکشاید که در از کثرت خود لیسوت بتواند خارج گردیده و چیزی از او
 باقی نماند مبادا مورت فساد می عظیم شود و هم باید ثقبه دفع ده و سبع باشد
 و انفجار دمایل در بطه سبب اغلب موضع است که با عانت اصبع ابرام و سبب
 عموم فرود برند تا جوف مل آنجا بخورنا بقوت بشکافند لیکن در دمایل اعاق
 از خوف و درد و جرحی در حین عمل عرق عظیم مل بدو قسم ملو اند منفر ساخت
 یکی آنکه نصف عرق آن موضع را شکافند نگاه به استعمال فقیه طبیعت را عانت نمایند
 در انفجار باقی دیگر آنکه اول مریض را که می خواهند منفر سازند با اصبع مس نموده و
 از تشخیص آنکه در این نواحی عرق عظیم استوارند و در لیم با مشرقی و سب
 از مل هر باطن بشکافند تا مقصود حاصل آید آنوقت قوری پسته محلول قید ر حشر
 در او نهاده و صمغ حار را بفعل بکار دارند و آنجا نیکه بعد از انفجار صلابتی در
 اطراف مل باقی ماند باید قسیمه استعمال نمود تا ماده صلبه نفیج یافته دفع شود
 و آنجا ادویه الکانه و محرقه را اکثر در دمایل مابوده و خیار یککه سبب آبله فرنگ
 باشد باید بکار و شست و از آن قسمل است قلیاب الکال که لوله کوچکی از آن منفر
 مل فرود برده و منفرش میسازند و دیگر آنکه اطراف مل را حلقه از شمع و غلیظن

بعضی را بدون مهت کشانید مبادا ماده بکوف مفصل نصب فاسدش سازد و یا دمایلی که قریب بعروق دم واقع شده باشند اسلم است که واکنداده تا ماده بجا در موضع وقوع دل منفر جمع گردیده برآید تا در حین انفجار صدمه و جرحی بر عرق مذکوره وارد نیاید و یا آنکه در سکناسکام و جوب اختیار طایف مل منفرش سازد و بیا و است که منفر ساختن دمایل یا با عانت آله قطعه مانند مشروط و موضع است و یا در بطه ادویه الکانه و محرقه و در بعضی اوقات دمایل عقیقه را جایز است که با عانت نهادن منفر سازند و موضع کشودن باید اذق سایر مواضع مل باشد و لعلی است که مریض را بکشاید که در از کثرت خود لیسوت بتواند خارج گردیده و چیزی از او باقی نماند مبادا مورت فساد می عظیم شود و هم باید ثقبه دفع ده و سبع باشد و انفجار دمایل در بطه سبب اغلب موضع است که با عانت اصبع ابرام و سبب عموم فرود برند تا جوف مل آنجا بخورنا بقوت بشکافند لیکن در دمایل اعاق از خوف و درد و جرحی در حین عمل عرق عظیم مل بدو قسم ملو اند منفر ساخت یکی آنکه نصف عرق آن موضع را شکافند نگاه به استعمال فقیه طبیعت را عانت نمایند در انفجار باقی دیگر آنکه اول مریض را که می خواهند منفر سازند با اصبع مس نموده و از تشخیص آنکه در این نواحی عرق عظیم استوارند و در لیم با مشرقی و سب از مل هر باطن بشکافند تا مقصود حاصل آید آنوقت قوری پسته محلول قید ر حشر در او نهاده و صمغ حار را بفعل بکار دارند و آنجا نیکه بعد از انفجار صلابتی در اطراف مل باقی ماند باید قسیمه استعمال نمود تا ماده صلبه نفیج یافته دفع شود و آنجا ادویه الکانه و محرقه را اکثر در دمایل مابوده و خیار یککه سبب آبله فرنگ باشد باید بکار و شست و از آن قسمل است قلیاب الکال که لوله کوچکی از آن منفر مل فرود برده و منفرش میسازند و دیگر آنکه اطراف مل را حلقه از شمع و غلیظن

انداخته و بواسطه او دواى موسوم به سمير و مين ريخته و مدت پنج دقيقه رها دارد
بردارند و صفت دواى مذکور بگيرند آنک باده چمر قليب کال مساوى
و با عرق و تخته خمير نموده بخور ماورى که مقام ضرورت استعمال فرمايند و اما
خوش نهادن دانه در دمايل بکار ميدارند الا آنکه بعضى حکما در بعضى دمايل باره
دقه در عمان ثاب يا جاز داشته که خوشکشيده منقرشان سازند و اما در دمايل
بارده بجهت روايت مزاج بايد ادويه و تدابيرى بکار دارند که مودت صلاح او کرد
و کسم نقل به ميلاقات نافع و از اغذيه مقويات ميل فرمايند و از ادويه نافه استعمال
چون برغله و فوشيدن شراب کهنه است و کسم تخام بمياه حاره معدينه و
اين عمل را مديز بگويند و کثر مشاهده شده که از مبادرت باعمال و تدابير مذکوره
و ميل باره تبديل رفته اند اما در صورتى که تحليل نزود وريم کثيرى در او جمع گردد و
انگار باشد بواسطه بقاءت اکتى موسوم به قزو کا و کچم بجهت را بخوشى خارج سازند
که بواسطه خوف او در غل نشود آنکه قديمى شيع و خيلون ثاب موضع رفا و نمايد تا مانع
آيد و تحليل بدارد و اما آنکه بموضع درم بخوشى کشيده و استعمال فتيده بمردود حاصله
در او مداخل سازند و حتى الا مکان اين قسم ميل را بموضع اکت قطعى نبايد منقرشت
زيرا که اغلب بده شده استخا صير که بموضع کشوده اند و درمى حاد و ملتبس بموضع
او موجود و مودت بکالت آنها گرفته است و در آنجا نيکه بعد از اقرار و ميل
چرا و الا بکالت مى نمود و خروج مده غلبت لحم آنها بايد از مبادرت استعمال
همده حاره بمحال همده تا تاليسام يابد و هم بعد از انقار استعمال ادويه کثير
الطرازه جايز است از خوف آنکه مبادا موضع منقرض شود و در انفرجه باره
و دمايل سترخيه و هنگامى که اطراف دلى رنوخ و طيس الحى و اثر القدر يامده
ريقى از او يا لايد استعمال ادويه حاره مانند دهن سقر و مثال او و دمايل
بازتر مى محلول در عرق نافع و ممتلى سترخيه جفت دلى با پنبه کتان و مايند
مسک جهنم بگردد و نشيدن بطرح انجبار و وج و ادويه مقويه فلواديه رنوخ

و چون در ردی لم زاید برودید بجزه از به او یکد و نوبه باید سنگ جنم مالید و بآلبه الوده
شمع و این چنین موضوع را سخت پیچیده تا تحلیل رود و بایاد و نوبت که اگر مده را مانعی باشد
از اندفاع لابد آنکست خود با سافل میل نموده و مجرائی متاوی کشاید و اگر حیوانات
این حالت بطول انجامد که ناسر شود و در خوف و غشاء که از بی مسکن کرد و عصر الطلوع است
لکن با وجود بر این سیزده از دفعی بکات حید و مانع آیند عرض را سیر یعنی چون می بینند
که ریم مقبضه از دمل خارج میشود ثقبه معبره او را وسیع سازند یا اینکه در تحت او ثانیاً
موضع کشاید و عضو علیل را موضعی بداند تا ماده بکثرت خود منفع که دیده و مصلحت
در این مورد البته ناموسی ماضی نخواهد شد و اما اگر ناسور بهر سیده و مریض کرد و از
معالجه عاجی خواهد بود بواسطه آنکه غشاء موجود در خوف او مانع استیام است لهذا
بجزه علاج او باید معالج با عانت ادویه حاده یا که مانند قطره تقطیر زردیج و سنگ جنم
و مثال اینها غشاء مذکور را از لاله و از به نماید و اگر استعمال آنها کفایت نمود باید ناسور را
بشکافند یا با آهن تابیده او را بسوزانند و سنگهای که در موضعی از موضع بدن ریخته می
شود و اجزا را در است مراعات قوه فاضله و آلات غذا و چون مایه زبان و است ناسور
معه و مهم و راحت لهذا بعد از بهر سیدن با روز زبان سهلی مرتب از روید چینی
با سناء یکی و یک فرنگی میل فرمایند و هرگاه بعد از درم مصلحتی در عضو متورم باقی ماند
با عانت ادویه محکمگیل برند و انفع جمیع مکالات استحال شمع اشق و با روید و سبب
و غشاء برک شوکان و کلیل المنک است و هم بعضی اوقات ارسال علی نافع و کچ و کچ
از غزبات است و هم شرب ادویه قلیا میوه و سیاه میوه طبیب معتقد که کلیل مصلحت
بهترین معین اند و از آنجا اینکه این ادویه را وقت قوی است باید در استعمال آنها احتیاط
کامل مری داشت و هرگاه عضوی بعد از تورم صلب کرده و غلظه از او منترت باشد
اسم شقوق قطع است با آلات قطعیه و اما آنچه علاج مزه غلظه یا معجزه
چهار است است اقل منع از بروز او دانست که مریض باشد که با عضوی فوق
ذمجه از خود مریات ننماید ثالث آنکه طبیب معتقد در عضو میت مانت نمایند

بعضای فوق و ما بجا و در صورتی نتواند نمود با سایر معالجات و تدابیری که قبل
 مذکور داشته ایم باز ایشان کفایت آن را در درگاه درام مختلف الوقوع است که بعضی
 از آنها مخصوص بعضی درون عضوی نباشد و بعضی مخصوص باشند عضوی یا غیر عضوی
 و این بحث محل است بر بلیت و یک فصل فصل اول در درم حمزه و غلغونیا با سبب
 و علامت و علاج آنها اما حمزه که با سبب باد سرخ مانند عبارت از درم منبسط
 که واقع شود در جلد و عروق شریه مغروش در او و غلب از تغییر هوا مانند یک
 امراض و آفته بهر سبب این علت با بدو قسم منقسم نموده یکبار حمزه صلی و مغزو و دیگر را
 حمزه عرضی و غلط مانند و اما حمزه مغزو قبل از وقوع و بروز این درم بعضی حالات و خوا
 بر او سبقت گیرند و مقدمه باشند او را از آن سبب است که سالت و همین اعضا
 و حساس نقلی غلیظ در عضو مستعد درم با هم مغزو و صداع و هذیان و غلبه نوم و غمی
 با دراک نقلی در موده و وجع فزاد و بارش و غلیان و بعد از این اعراض حسرتی
 مایل بصفت در عضو منوف بروز و سرعت با طراف خود مغروش کرد و چون
 موضع متورم را بغضارند حمرت زایل و به باض مبدل گردد و لون او دوازده رشتن
 صبح حمرت زایل معادوت نماید و بعد از ظهور درم اعراض مذکوره تخفیف یافته
 و درم از موضع خود بجای دیگر مجاوز نماید و باشد که از حدت درم بشرفه جلد متورم
 س قلا در موضع او آبله بهر سبب و بنا بسورت و حدت ماده وقت از درم
 لیکن قاعده چنین است که درم تکلیل و ماده متورمه در طبیعت لبرق و او را کج
 نماید و بعد از تکلیل بشرفه جلد موضع علت ساقط گردیده و تکلیل شفا یابد و
 نباید و نیست که این درم منفرجه شود و جلا برای آنکه صاحبان سوء المزاج را هرگاه
 درم حمزه عارض گردد باشد که بخواهند آنرا با قهر منبسطی شود و در صورتی که
 بواسطه قصور در علاج در دشت اندامیر یا از چنانچه در طبیعت باقی در مرض بهر سبب
 باشد که طبیعت ماده در را بعضوی دیگر مانند دماغ و ریه و غیره منبسط
 ساخته و صورت مرضی صعب باشد که در سبب و ذات الیه گردد و اگر سبب

و اما

و اما این درم صفرائی است محرق و فاسد اگر چه از اضطراب عمل کبد و سده باب
 استلای موده و اکل غذای رویه بطی انهم باشد که این علت حادث شود و لیکن غلب
 در تبستان و پائیز بطوریکه سایر امراض و آفته میشود که انهم در بدی بهر سبب و حمزه او
 مجول باشد و باید دانست که در بعضی اوقات در جلد حمرتی که در لون و هیات
 شباهت تامی بدین درم دارد و سبب مختلفه عارض شود و مانند آنکه از تاثیر
 ششاع قناب با جوارت ناز و برودت هوا و یا از تپیدن دکان حار و ششاع حاد
 محرقه چون زاریج و خردل و ساق سم و لفظا و میل عمیق که در تحت او واقع باشد
 یا از تپد قوی در جلد حمرت و تبجی بن درم حمزه حادث میشود و باید دانست که طبیعت
 ماده مرضی دیگر بجلد منقبض نموده و صورت این درم شود چنانکه صاحبان مرض لبرق و زان
 بعد از وضع عمل که حالت غشاست مانند و غیره بدین درم مبتلا شوند و این قسم را حمزه عرضی
 و غلط میگویند و اما این درم با درم جلد بهر سبب او را بلفه لایق اریتم و یا در غلظت
 که او را غلغونیا نامیده اند و سبب غلغونیا یا تپد و غلظت است مانند آنکه در درم حمزه یا
 از انتقال ماده است از موضع دیگر که از حدت ماده متورمه در اندک زمانی کم و بیش
 در تحت جلد عضو متورم متفرج متفرج گردد و مانند این لحظت خارج طویل شود و بدین
 واسطه غلظت کسیری از جلد عضو فاسد شده و با صدید می قیق می شود و ساقط
 و در صورتی که درم غلغونیا بجز غلظتی از جلد عارض نشود و با طراف با کجا و خوردن
 گردد باشد که علی سلا حمرتی عارض و پاک شود ولی با وجود این قسم درم هرگاه قوت
 کافی و پینه قوی باشد درم حمزه مغزو و حقیقی بدین نحو است که باید او را علاج صفراور
 فساد او نموده و ادویه بکار دارند که طبیعت ماده در را بجلد بکوان نماید و در شرفه
 متقی خستیا فرموده و از سبب حمرت و در زنده و هرگاه بعد از شرفه متقی عرض
 درم تخفیف نیابد استعمال سہلات مبرده مانند تر مند و رنگ طایفه و لوس
 خیار شنبه و شال آنها نافع است در نهایی درم ادویه که طبیعتا بدفع ماده است
 نماید استعمال فرمایند و در این حکام فضل ادویه مدراتند و سیمندات مازده از

درم حمزه و درم جلد و لایق حمرت
 روید و علی سلا حمرت باید و اما علاج درم

نشد و در علاج او چنانچه در کتاب جداگانه تفصیل آنجا ذکر یافته و آنجا که اعراض درم شته
 باشد و از علل جلات مذکوره تخفیف نیاید و انریل مادی به مانع علیل بنایان کفایت نکند
 و صداع و سایر علامات و مانع عارض شود لازم است که فصد نمود و برین روش زولت نیاید
 و بواسطه جهات ساقین و غماد خزل و یا ثویه از خمش عاده عذاب مادی و اندک
 منصرف و به سائل میل دهند و لازم باید دانست که در یک وافر فصد دفع و در دیگری
 ضار تلقین فقاوه است و از ادویه موضعی کمادات محله تخفیف از کل بدن و با بون
 و غلبه غلبه و انریل ملک و آرد با قلا کرم نموده بخار دارند و از استعمال فصد و
 و غیره که از آن در خوف و غم و اضطراب مادی از ظاهر بیاطل و حساس و جز از لازم
 و در صورتی که بعد از آنکه مرض تهیی در عضو متورم باقی ماند باید آنکه بر کمادات
 که فوراً بفرایند و هرگاه این درم بقصر یا فاعله استی شود علاج آنرا بخوبی است که در آنجا
 خود ذکر شده و خوب است و چون مشاهده نماید که درم جلیب است که بهما بخار و غش
 شود بهتر است که بهر آنکه است که جلیب جلیب بدور او کشند تا مانع آید بکار آورد
 و چون در موضع متورم بفره عارض شود باید که با آلتی متعینش نموده و در طوبت جلیب
 او را خارج ساخته و بر وی اسکنک جلیب مانند و بعضی طوبت تمام سطح عضو متورم را
 اسکنک جلیب مالیده و مانع دیده اند و قسم او نه امیر لازم است آنکه عضو متورم کرم
 پوشیده و از سرما محافظت نمایند تا صلابت تهیی از او باقی نماند و اما جزو
 که در ظاهر جلیب بفرایند باشد چون علامات تحلیل میروند معالجه لازم ندانند الا اینکه
 استعمال ملاهی آب مزج شکسیر آب تبین در موضع تحلیل و کماتی است
 و اما طریق علاج درم فلفونیای این است که باید از آنکه سبب نموده مانده آنکه اگر
 سبب نموده باشد بدون ابل موضع متورم را شرط و منفرجه اند اگر چه منفرجه
 نیافته باشد و در فلفونیای سبب جلیب باشد بجهت کسر صورت و درم عین کرا
 فلو و مندر و در صورتی که این درم از تعال با دیگر بفرایند باشد بدون
 تامل موضع فلفونیای قوی نموده تا مانع فصد دفع گردد و باطراف خود منفرجه

مرض

کذا

نمود و جدا رانند و از شراب و کلین و جلیب باید نمود تا طبیعت مادی و درم را
 منصرف و به سائل منفرجه سازند و اما بعد از شرط موضع و درم استی منفرجه و درم
 عطره تهی فصد مادی و کلین و با درم کلین سرخ و شاد و مسکط و شمع و کافور مانع است و اگر
 بغیر ضعیف و قوی بدنی کافی باشند معویات مانند شراب و مطبوخ پوست کینه کینه
 و مثال آنها میل باید فرمود و قسم باید دانست که چون درم مسره در بلدی و اندک
 عام باشد هرگاه کسی را جراحی صغیر دارد باید بستره عضو جرح بدین درم بستلا کرد و سیم
 در صورتی که ادویه عاده نیز کار برده باشند و این قسم جرحه را که موسوم است به سیم جرحی
 در نهایت روایت میباشند و سرعت باطراف خود منفرجه و هم غلبه صورت هلاکت
 که در آنجا مشاهده شده است که این مرض در بلدی بطور و باقی بفرایند و بعضی فلفونیای
 عمل بدنی مانند بیرون آوردن سلفه صغیری بن درم بستلا و هلاکت رسیده اند
 بناء علی ذلک در صورت عمومیت این علت اگر عمل بدی و جلیب باشد تاخیر اندازند و اما
 علاج او چنان است که قبل ذکر نمودیم از استعمال متقی و کمادات با سیرت امیر سبق
 و علاقه بر آنها و لیدن اسکنک جلیب بطور متورم بسیار مانع و آرد و است و بعضی از طبای
 عضو متورم را با این نافه سوخته و نفی کلی دیده اند فصل ثانی از اثبات این درم
 و قره که بواسطه احتراق نار در عضوی بفرایند باشد با علامت و درمات و علاج آنها
 بدانکه چون حرارت نار بعضی بر خورد در جلیب او فی الجمله اثری نموده و حرارتی جزئی باقی
 خفیف در او بفرایند و بعد از چند یوم بشرت آنموضع آبل گردیده و بصلاح آید این
 درم را درم اولای از احتراق نامیده اند و یکم چون از تاثیر حرارت نار محرق گردد
 و در موضع او آبل ممتلی از رطوبت بفرایند فالی از درم نیم بخار بود و جلیب است که این
 رطوبت تحلیل رود بعد از چند یوم و از او اثری باقی نماند و یا آنکه طبیعت او است
 از حرقت رطوبت مذکور را بریم تبدیل سازد و علی قسم نوجی شده و ملتهب بفرایند
 و از خوردن هوا و تاثیر اوج عضو محرقه استند و یا بکسیما در صورتی که بشرت
 جلیب و از ابل گردیده باشد و یا آنکه عدا او را برداشته باشند این قسم درم را درم

فانی از حترق نامند و هم باشد که از شدت حترق غایب یا عارض شود و حیات
عضو متوقف فانی شود و این سه درجه ثالث از حترق نامیده اند و هرگاه حترقی
عظیم عضوی را وارد آید بعضی احوال فانی می شود و بعضی بمرکت و بعضی قشری
قبل از بروز حرجی با بر طرف و غیر لون بدن و مثال آنها عارض شود و اگر همانا نصف
کسی بسوزد و نفس کشیدی صاحب خود را با سرفه و سرفه و سرفه عارض شود
و در بیان کوبه و در آنها فاجعه هلاک کرده بدین واسطه که از سوختن عمل عارض فانی شده
و لهذا رطوباتی که باید از منافذ جلد دفع شود بر می نهد و صورت مسال و نفس
کرده و صاحب خود را هلاک سازد و این انداز این مرض در درجه اولانیک و بدون
اصلاح آید و در درجه ثانی مختلف بسته است بمقدار عظم حترق و عضو متحرکه مانند
حرق آلات شریقه و واسطه بدن را خطر در دانت بیش از آنست که اطراف دیگر آنکه
هرگاه بعد از سوختن عضوی عظیم و سرفه و سرفه عارض شود یا آنکه قبل
از سوختن جلد بمرض مزاجی بوده یا علی در اجزای صدر و دشته است انداز اولی خفیه
خواهد بود و دوم باید دانست که جلد عضو سوخته مستعد تمدد و قرقره دارد و دام
بیش از جمیع جروح قروح است و این تمدد و تقصص که نتیجه سوختن است باشد که
تا یکسال طول کشد و اما علاج در درجه اولی النفع در جمیع معالجات و تدبیر بجهت
تسکین و جمع سه علل آب سرد است بر عضو متحرکه و در درجه ثانی
بعد از آنکه تمدد نمودن باید آن نیز را مشقوب ساخته بقدریکه رطوبت جوف او خارج
شود بدین آنکه صندل بر بستر دارد و آنکه زایل سازندش و بجهت تسکین
و جمع قشری و سببه را بدین مرتب از روغن بزرک و آب آبله آلوده بطوریکه صابون
شود و بعد از آن صندل و اما آنکه صندل بر بستر دارد و آنکه زایل سازندش و بجهت تسکین
از حترق با معالجات نمایند از دریم که تا اثر او در عضو متحرکه باقی نماند و از آنست
قبل از آنکه عده قدری محلول مسک جهنم بدو بمالند و یا آنکه عضوی که با سوختن
خوب به چینه و یکن چون شروع نمایند بماده آدن و استعمال نموده عارضه باغسل

امثال

امثال نوزند و چون لازمه حترق فاجعه تمدد انجای عضو متحرکه اند باید بر طبق بوده آن
عضو را بجز طبیعی که در شسته و ادویه که جزء غلظت آنها سرب قلع باشد بکار دارند
و یا آنکه خود در قهای سری بدن موضع به بزنند و از آنجا بیکه بعد از سوختن عضوی اضطرار
شدید در بدن بهم میرسد بناء علی ذلک بعد از خوشن و دوفغان چای تاثیر آب کهنه و بید
عیسل را باید نوشاند که مقوی طبیعت و بدن و رافع اضطرارند و اگر بدینا تسکین
نیافت قدری افیون یا مرقیون که جوهر اوست باید میل فرمود که بهترین مسکن است
و جمع و اضطرار است سیما بعد از خوشن و هرگاه علاوه بر اضطرار علی در درجه بزرگ
و بواسطه او مسال عارض گردیده باشد این بطوریکه میل فرمایند صفت او بکیرند امی پاک
ده گندم و در شصت و چهار دم آب دم و صاف نموده با ضافه دو گندم کافور و گندم
صنع عربی و چغندر شربت کوکبا بنوشند و اگر عضوی از باروط سوخته شده باشد
قرقره او بجز از آنچه موجود است میماند بواسطه سواد لون آن موضع باید در این جهت
علاوه بر معالجات مذکوره همین ماده آدن با نوک سوزنی از جای صفار از باروط که مسال است
جلد بکنند بیرون آورد و الا سواد او باقی خواهد ماند سیما در جلد وجه که این عمل بسیار
مطلوب است فصل سیم از باب ثالث در تاثیر برودت در بدن و مشتمل است بر دو جمله
جمله اول در تاثیر برودت در بدن جمیع بدن از بر روی مغرط و طریق علاج او بدن آن فاعده
است که در حالت طبیعی سی و دود در حرارت دشته باشد که اگر بسبب از اسباب درجه
حرارت مذکور مغرط گردد بدن را منقلب اند چون این مطلب مغرط گردید باید
دانست که باشد بعضی اشخاص را در هوای بارود در خلا می معده یا بعد شرب عرق زیاد یا ازگی
لباس و بدت در بدن آنها اثر نموده و این عوارضات در آنها بروز هلاک شوند پس چسبند
این است که اول آنست حرکت عملی در اعضا و جوارح بیابند با حرمت جلد و نفی او و اگر تاثیر
قوی باشد جلد بعد از حرمت و نفی باقی بپرساند با ستر خا و وجود اعضا و کسالت
مغرط بعد از کار و حرکت بالمره باز ماند و نوم بر او غلبه نموده و بگویند او را ابد
و هرگاه این شخص را شرح نمایند ظاهر شود مستلانی شدیده اندم در دماغ و تجا دلف او

که بر سطح برب از برودت خون باطن عشاء و دماغ میل نموده و از تهلهای حروق دماغی و
 بقضاط آنها سکنه عارضی هلاک گردیده و آب باشد که از تاثیر برودت ستر فاء و
 جمودی عارض شود بحدیکه آن را با بزمه از حرکت بپندارد لیکن با وجود بر این حالت
 حیات و باقی باشد و از تداوم بر جیده صحت یافته و حیات از سر گیرد و اما عاقل باید
 اولاً بدن را از سیر مایه فطرت نمود بدین نحو که در هوای مایه لباس زیاد بپوشد و
 لباسهای پشمین قبل از حرکت و خروج از منزل غذای مقوی میل فرموده و در یکوضع
 ساکن نماند و اما چون برودت بر کسی تاثیر کامل نمود بحدیکه میل بخواب ببرد و
 از خوابیدن و در آنجا نماند باید نمود و یکدفعه بر هوای گرمش داخل گردد بلکه در آنجا
 او را گذارده و با برف و یخ جمیع بدن را بپوشد و بگوید که حرارت غیر نرمی او با ششها
 آمده از باطن بطریق میل نماید و چون از دلتک با برف و یخ و لته آلوده با آب سرد
 حواریت لغو و بطریق میل نموده و بدینت و حواریت کی بر سر آید عیال را در
 بستر می سرد گذارده و لته را که بماء مشعوج و مخمور و با برف و یخ و لته آلوده باشد
 بر عارضای و پشمیده و بقوت و کشش فرموده و بتدریج بر هوای گرم نقش نمایند و
 ثانیاً در فصل ثالث در ذکر متاثر گردیدن یکعضو از برودت بدانکه در بعضی اوقات
 از یزیدن بوی سرد و پر خوردن او بر عضوی متاثر ساختن او را حس حرکت محل در آن
 بهر با حرکت و نفشی این او و هم غصون کشی در جلد برساند و این قسم از سرد
 بر دوز اسه درجه است درجه اولی هنگامی است که از تاثیر برودت حرارت و نفشی
 عضو برسد درجه ثانی هنگامی را نامند که علاوه بر عارض درجه اولی از تاثیر برودت
 بشره متعلی از رطوبت در آن عضو وجود آید درجه ثالث هنگامی است که از شدت برودت
 حیات عضوی فانی و شفا قلوبس برساند و این قسم اخیر غلبه اشخاصی را واقع شود
 که قاعده علاج ندانند و عضو سرد را برده و از نزدیک آتش بدارند و اما عاقل بگوید باید
 نمود که در جمله اولی ذکر یافت که در صورتی که در عضو برسد باید از تداوم آن جلوگیری
 و استیاء و بارده مرتبه بعد مرتبه بجا و در وقت طبیب است استعمال آنها مستقر گردد

انکه

انکه تریخ اومان مانند دهن ماخوذ از سفوفت مزوج با بوم و شال آنها جایز و دلتک عرق
 و لاف و شکر سبب محلول در آب نافع و همچنین دلتک با بوم از منی محلول در آب و
 دوا می موسوم به آب تدینی و تریخ با دمان ماخوذه از پنجه روی دروغن کجند و دلتک
 با تقطیر افیون از فربابت است و در درجه ثالث که غایب یا بهر سبب باشد علاج
 بخوبی باید نمود که سابق در باب خود به تفصیل ذکر نموده ایم و هم از این قبیل است
 تاثیر جزئی که برودت بعضی نماید که او را بلاتین پرینا نامیده اند و این علت در
 اجزا و عضای بعیده از قلب مانند اطراف و جبهه ششم الاذن و این هم میرسد و
 بناید و نیست که بعضی اشخاص و از جمله را بدین قسم از سرد کردن استعدا است
 حال که بعضی از اجزا و زمانی که سوزن کارند باشد که از برودت جزئی بپایان می که در
 ابتدا و انتهای رستان میوزدی از عضای مذکوره آنها متاثر گردیده و بدین واسطه
 غلظی در اجزای آن عضو هم رسد و بدین سبب چون در حکم شدیدی بحدیکه بخارند
 تا خون جاری شود و هم باشد که قرصه او بقی رفته تا استخوان رسد یا آنکه قرصه
 بغایب یا مبدل شود و اگر چه این علت در عجل نرمنه و همه ساله عارض نماید چنانچه
 در بعضی اشخاص مشهود است لیکن حکم نیست در دلتی ندارد و اما علاج در وقتیکه
 کسی این مرض مبتلا شود بکام تغییر هوا و هوای یخ باید همه روز عضو مستعد را
 با آب برف و یخ و دلی قوی نمود تا از عود متاثر گردیدن مانع آیند و باید قبل از
 ورود هوا می با بر داند عضو را با برندی بشویند و بعد از آن حرارت نیز باید مسهم نمود
 از شستن عضو با آب سرد و تعاف فل نوزیده و از دهن متخذ از سفوف و لفظ سیه
 و زفت تریخ فرمایند و همچنین دلتک با بوم از منی و زاج سفید و جوهر کد که در مزوج
 با آب و آب تدینی و جوهر نوره و سبک جسم محلول در آب بسیار نافع است
 صفت دهنی نافع بکبریه عطر سفوف کبره و زنج کون چهار جزء عمل مصفی و دوز بطریقی
 که رسم است دهنی تربیب نموده و روزی دو نوبت بر عضو شوف بجا اند
 صفت دهنی دیگر بکبریه سبک و در عرق و آتش حل نموده بر عضو بجا

جسم باشد که شقاق در آن عضو
 واقع و موضع مشت متفرج گردد
 ص

صفت قیر و طی نافع بکبره در غرض نبوتن سه درم موم کا فوری یک درم و نیم با آتش ملایم مخلوط
 نموده و با قند نمایند بر او خردل مسحق یک درم یک کی دوازده درم بخود تقطیر افزون
 نیند درم کا فوری که کلاب کبیر روغن کل سرخ پنج مثقال چغنی که رسم است ترتیب
 در روزی دو نوبت بر عضو متاثر ابروده بمالند که بهترین سکنست عکس موقوف و او
 همچنین بستر آن عضو مالمه آلوده باشم و طبعون و ترنج درین ستر بجه تسکین عکس از
 خوب است و چون شقاق بهر سبب باشد بجه تسکیم او بهترین اددیه ترنجید
 و این است صفت او بکیر نه کره که او بکشتال زینت هر دو کند خوب مخلوط نموده بر
 موضع شقاق بمالند و هرگاه در این وقت نیز غایب عارض شود و کلبش بخوبی باید نمود
 که قبل از کشتال فصل با لایع از اب ثالث در میان دمل سبب با سبب و علاه و علاه
 او آن درم صلب محرومی است با حمرت و نفشی بون و وجع که عادت شود
 از سبب اجتماع مده در غده از غده های دسومت و قعر در فرج و ساق با جلد که با
 نفخ فیه منقر کرده و علاه آن است که اولاد بکوضع جلد بهر سبب و اما سبب
 صلب و وجع ظاهر در غده و محرومین حی نیز با دمل و بول و بمرور مده و عکس در جوف
 او نفخ فیه و در وسط منقر گردیده و درین خون آلوده از او مندرج شود و بعد از نفخ کامل
 و کلبان سبب از او خارج و صلابت او تحلیل فیه عکس شقایب و اگر چه صلب
 سبب اکل اغذیه ردین و ساد مده است لیکن باشد که بعد از مرضی عاده و نقامت
 او و مایل در بدن عارض شود بکوانا برای دفع بقیه ماده مرض مذکور و رسم باشد
 که در وقتی از اوقات این علت نه بدی و افند باشد و صحت مرض خفا در بدن
 و بکوان اغذیه غلیظه و مغریین در آنها و شقایب که سبب است و از او یک سبب بیه و یاد
 است نموده اند اگر بدمیل بر مننه مبتلا شوند و اما علاه باید ندرک نمود
 و طبیعت نفخ ماده انکانت نمایند با سبب اضمه و مده مر قبه از بر رکتان و
 پوست خفاش گانج مغلو بشیر کا و مثال آنها و هرگاه وجع او شدید باشد
 انده عارض با فعل از تسبیل نیاز بر این و غیره باید مخلوط با دهن بید انجیر و عمل

در

و شش و طبعون نافع در استعمال روان ستر از و حب است بجه آنکه باشد طبیعت ماده
 از ظاهر جلد منصرف و بعضی شریف مستقل سازد و مرث فساد عظیم کرده و این سبب
 بعد از خروج مده صلابتی در موضع او باقی مانده باشد چون کلب عبت عود او خواهد شد
 لهذا باید که شفقی از اش منقب با سبب که ترتیب داده بر آن عضو بمالند تا صلابت او را
 تحلیل دهد و هرگاه طبیعت از انفجار اوعای مده و وجع او شدید باشد بجه عکس
 منظر بی عارض شود باید بدن نایل دمل و منفر ساختن آنکه مده مذکوره را بکار دارند
 که بعد از انفجار وجع بدن شدت نسبت تسکین خواهد یافت چون علی مرتضی در موضع
 دیگر مستقل کرده و باید استعمال نفحات و مسهلات ماده را از بدن استغراق نمود
 خاص این باب ثالث در قراج که بسیار سی کفیکرک مانند با سبب و علاه و علاه
 و اما انجیر عبارت از درم فاد و عاری است که عارض شود یکی از قطعات جلد و کم
 واقع در تحت او با صلابتی شدید که تمام اجزای موضع متورم بمغزایا منستی و
 مبدل گردد و اما سبب این علت مجهول لیکن اغلب صاحبان مرض تقریر عارض شود و
 در بعضی اوقات اکل اغذیه ردین و ساد و غلاط و منفع مزاج مرث عودت این مرض
 میگردند و علامت او این است که در موضعی از بدن حی صعب الهیابی عظیم عارض
 شود و با بعد از موضع او بفر صلب محسوس و موجود گردد آنکه چند آنکه در اطراف او
 ظاهر شوند که بعد از انفجارش جلد منقب گردد و این آنکه خانه زنبوره از این
 صدد بی غسالی مندرج و سرعت تمام جلد موضع علت سیاه گردیده و ساقط شود و بعد
 از سقوط قطعات لحم واقع در تحت او مانند سبیله نامی ایل شوند بکلی که او را و عضلات
 و عظام محاط آنها ظاهر گردند و مقدار این درم مختلف در بعضی بقدر کفایتش
 کمتر است و اکثر موضع وقوع و بروز او خلف عنق و باین کفین با موضعی از مواضع کرا
 و این درم حالی از درم نیست یا جید و یا ردی اما خارج جلد عبارت از آنکه بعد
 از قطع و زوال جزء میت از عضو موقوف لحم میگردند و بعد از آید و اما انجیر
 ردی را که بر نیانی انتر اکسن میدهند عبارت از آنکه فاقرایا بعضی محاور

۳۷

در حالات عمیق خود منور شود که دیده و حی غوفی با غلیظ و غلیظ را عارض و بکالت است
 و اما علاج باید بودنی و در وقت شب و مازده نمود در بعضی فصد نافع و در بعضی لازم
 نخواهد شد بلکه از استعمال مقلی و مسهل استغراق غلط نموده و در شرب جویهر
 که در حی غوفی را علاج نمایند و در حین نقای غافرا یا از استعمال مقویات اعمال
 و از آنجا که در ابتدا جودت و در وقت معلوم نیست نه با هم است که بعد از
 ظهور درم صلیب و از موضع منور شد کافیه و شمع مازده استقر منقول باطل برادر
 نمند و در صورتی که لم مانع است پس با شروع بخروج نماید لازم است که با عانت
 انبر با لکه آنها را برهنه آورند و اگر مده دفع از او جید باشد طبیعتا دفع او
 بهستمال آمده عانت نمایند و هرگاه با وجود بر این تدبیر غافرا یا بهر سبب
 قابل موضع او را شش ط نموده و با مقلی لم میت را بر داشته و چند بخند
 از خنایش عطره مانند باور و غشاع و پوز و شاد و امثال آنها با قیاسی کافور
 بکار دارند و سبب باید ملاحظه نمود که صید او در حین دفع و غشاقی نماید بلکه با لکه
 دفع شود و اما چون خراج بدی باشد بخوبی که ذکرش نموده ایم باید بعین شرط
 نموده حی و سایر اراض او را محوط داشته و در وقت هر یک علاج فرمایند و چون با
 وجود معالجات و تدبیر مذکور غافرا یا از سرایت و اغراض با کجا و محسوس
 نکرد لازم است که اطراف عضو مشغوف با آب آهین فته بریزانند تا از سرایت
 و فساد منغش نماید فصل سادس از باب ثالث در درم نوزدین این درم اگر
 شد بد باشد غش و از در او متعبر گردد و علیل از خیشوم حکم نماید و از اجتماع
 و احتضاق بلغمی که در حلق است متشادی باشد و چون زبان را فرو آورند درم آنرا
 مشهور گردد و از آن جای که با این درم مجرای موموم بسته چنانکه در غلیظت با این
 دمان کوشش چنانچه در کتاب تشریح تبصیر است اگر او نموده ایم غلبه متورم میشود
 بناء علی ذلک از درم او است طنین شدیدی در کوشش و چنان غده واقع در
 تحت لادن نیز مجاورت متورم نموده باشد که از شدت درم مجرای حلق با لکه

مسدود

۳۸

مسدود شود و اغلب این علت حی سبب است و سبب او چنانچه و فریاد کردن زیاد
 و سبب است که این درم عرض باشد از مرض دیگر مانند داء افزنجیه و سیره و در غلبه
 شود بحسب اما در صورتی که درم مذکور طول کشد می شود که حی ضرابی در او برسد
 و منقر گردد و هرگاه زیاد بطول انجامد سیما در امر ضربه یعنی باشد که بصلاحت منتهی شود و اما
 حلقه و مختلف است و موافق شدت و خفت حی و سایر اعراض لازمه او است اما در صورت
 خفت درم باید منجمات و معقات استعمال نموده مانند اطلاع مازده از نوبت در و کجا
 و مثال آنها اما چون درم شد بد باشد چند نوبت زلو از طاهر بموضع علت اندخته و
 بدین دو اسباب درت نمایند صفت و بیکرند شیر با دام و حفاقه نمایند برادر و کور
 و بنوشند و سبب که خراش نموده از غلبه حلی و با بونه و سایر چشایش مملو و سکن
 التهاب و بخور دادن از آب گرم نافع و آورده است و هرگاه از شدت و غم و تناس
 خوف خنق است باید بدون مل موضع متورم را چند شرط نمایند تا این از خنق و غم
 جمع باشند به نکات طریقی شرط بدین قسم است که بر دارند مشروطی که نوک او
 و مکه دارد و با لکه تمام او را پیچیده و مراری یک عرض ایهام از او را دارد آنکه
 زبان را با لکه عرضی خوابانیده و مشروط مذکور را فرو برده و چند نوبت بر موضع
 متورم کشید و بعد از فراغت از عمل باید از ششیا عار به الفعل خورده نموده و دم بکشد
 مورت لوزم که دیده دفع شود و هرگاه بعد از که صورت درم تسکین و استرخائی
 در نوزدین باقی ماند بجز غرض مرتب از سقر و قلعه و مازده و پوست انار و پوست کبر
 و مثال آنها دفع استرخاء نمایند و باید حسیطی کامل نموده که مسدود درم نوزدین فرزند
 و در صورتی که طبیعت مستعد و میل شده با نقار و حج ضرابی بهترین بادی است مجرای
 سیما اگر نقطه مهر اللافی در موضع متورم ظاهر باشد و این سیما را از غرض استخرا
 شود و اگر چنانچه اوجان در این حالت از عظم درم نفس متعبر باشد باید با عانت
 مشروط مذکور منفرشت نمود و با شدت کیم و اولاد مان منفجر نشود بلکه تحت زنج ملقظ گردد
 و آنجا نیکه درم نوزدین بصلاحت مستحق شود لازم است استعمال خراش مملو در قیاس

۳۹
 مطبوخ شوکران مخروج بانوشاد و تریج درین پدید آید هر باطراف زنج اوقی محل است
 در صورتی که صلابت او بحد کمال رسیده باشد بمالیدن عصاره خلیه دنیا و بفرغ
 ماخوذ از مطبوخ عصاره خلیه دنیا که قاعده دهرگاه درم لوزیق نرمی گردد و صلابتی
 شدید در او برسد باشد جز بریدن مراد را علاج نیست بدین نحو که نایبی
 با عانت آت عریض الراسی زمان بجایانده و حامل در دست چپ قلابی ذراته
 استخوان کفره و با دوز را محکم نگاه داشته و در دست راست مشروط مکده داری که
 تیغه او را بلسته بسته باشند و از او بعد یک عرض ابرام رگ داد و بفضای دهان
 داخل نموده و لوز را قطع نمایند لیکن از جانب اسفل شروع بعمل نمایند بجهت آنکه
 اگر از بالا بپاشن قطع نمایند خون مانع خواهد شد از دیدن در حین عمل و بعد از فرست
 از غرغره با آب سرد مخروج با سرکه سیلان دم خواهد کرد اما اگر با وجود دوز
 خون زیاد نباشد لازمست که موضع مقلوع را با سنگ جنم بمالایند و چند نوبت از
 قاضیات و طبقات غرغره فرمایند و بهشت که بعد از این عمل قطعه لحم نماندنی در
 موضع آن برود بجهت از آنکه و از آنکه و تحلیل او باید سنگ جنم مالید و نباید دست
 که از درم حلقی که ایست بجاوردت متورم و طویل گردد بحدیکه دم زدن و از دره
 مانع شود و بجز عرض از غرغره او حلق را سرفه شدیدی عارض گردد در صورت
 خفت این درم از مالیدن کات مندی و راج و سنگ جنم تسکین بخشد یافت و هرگاه
 شدید باشد باید بستور سابق یا بفرای قوی از دهانت را بستان آنکه
 روزین را قطع نمایند تا قصیر گردد فصل صالح از باب ثلث در درم مندی و این
 درم نمون را عارض شد غلب در حالت رفاقت در جلد و لحم یا غده مندی یا چون
 درم در جلد می باشد ترشح شیر ممنوع نخواهد بود و هرگاه غده از غده های مندی
 متورم گردد ترشح شیر ممنوع شود و در غلب این درم حلی مسره است و قاعده
 چنان است که درم ظاهر مندی تحلیل و درم غائر او منجم گردد اما در صورتی که در
 در عمق حاصل شده باشد بواسطه قنات و سحافت جرم غده انفجارش بطول آید

درم

۴۰
 درم طبیعت دارد و برابر بمبدل و جان انفجار رسد قریب بکلیه انشیدی و از درم مندی
 بالینت بظهور رسیده و منجم شود و بهشت که این درم بصلابت منستی گردد اما
 صلیت او غلب چنان در صریه دارد و بر مندی یا حرکتی نفسانیت و جسم بشیر
 پستان مورت تورم او که در بناء علی ذلک زانی که بعد از وضع حل با شرت
 بدین عمل نمیشنایند باید در غده اساک نمود پستان را سخت بالا بیهندند و بهتر
 است که چند نوبت سهل از سناء یکی و یک فرخی ترتیب داده میل فرمایند
 اما علاج باید چند نوبت موضع علت از لوث بیده و پستان را بشانه بالسته و در
 درم مندی ترنج و هم استعمال شمع شمع بجهت تحلیل بسیار نافع است و آنجائی که فی
 الحکله صلابتی در موضع منجم باقی ماند معالجات مذکوره را نکرد نمایند و باید آنکه
 بواسطه مکیدن شیری که پستان منجم است بیرون آورد و از تجارب یافته اند که مکیدن
 زائله سک صاحبان این علت را نفی حاصل است و چون علت انفجار بظهور رسیده
 باید ضماوات عارضه منجمه بعد مره بکار داشته و انفجار او را طبیعت و گذارد
 و قاعده است که این درم از چند موضع منجم گردد و قسم از تجارب یافته اند که انفجار
 او را طبیعت و گذاردن شستن بهتر است که با آلتی کشدن و هرگاه بعد از درم چند دکه
 صلیت با ماند باید در علاج و تحلیل آنها سعی بلیغ نمود زیرا که باشد صلابت او
 بطن میل شود و لهذا گنجائی که تحلیل نزود و جب است که به استعمال اوی
 منجم صلابت را به لیت مبدل و با موضع منجمشان ساخت و از محلات ذلک قوی
 و مکیدن و ضماوات منجمه از تخم کتان و شوکران و ترنج و مندی و ووش و بهشت باشد
 که از استعمال آنها صلابت تحلیل نزود بلکه بضع یا فته منجم کردند و آنجا که
 درم مندی در غیر زمان مرصعه عارض شود منجم کرد و بعد از صلابت و غضروفیت
 بهر رساند و این قسم از درم مندی در اکثر بطن مبدل خواهد شد و سبب او نیز
 ضرب مستطبه دارد و بر او است و هم از سوسه مزاجی مانند آنکه از خا نیر و آبله فرنگ
 و یا بواسطه یکی از علل هم این درم عارض شود و بجهت اینکه در این قسم درم صلابت

بعد از مقاربت با زن ناپاک صاحب این مرض حمله شخص می باشد را در نوک حشفه باغبی
 کامل بجای ببرد و در ابتدا برای بل و خفگی با حرارت و جهرت عارض شود و بعد
 یکدور در نوک حشفه بواسطه رطوبتی خون آلود یکسره حمله بفرزاید و برود رطوبت
 مذکور غلط و بیاض ببرد و بعد از چند روز صفه غلط گردد و در این هنگام در انفرجه
 دخی و از حرکات غشیغه و اکل غذایه و شرب شراب و عاده که کثیری قطره قطره
 از حشفه جریان یابد و باشد که نفوذ قوی در قصبه ببرد غلب از نصف شب
 تا صبح بکشد بدین واسطه زیاد متادنی و متالم باشد و هم میزند که همان علت
 جو جایی در قصبه ببرد و اما علامت ادعای این مرض بکشد انفرجه دمویه و عصبیت
 و بطنیه مختلف است چنانچه دموی از جانب را درم و التهاب در نوک حشفه و سینه
 و باشد که از شدت درم بعضی از او غیبه دم منقذع و مد خون آلود منفع شود و در حین
 این غلج نفوذی شده است بن آنکه در فرسوس باغوا ج فکر و هم با اوقطیر
 البول همس البول همراه باشد و در آخر حمله عصبیت نوک حشفه را در می شبیه بودم
 جمره عارض شود و مد مد فوعه از او غلظت نیست که در دموی مزاج و اما در انفرجه
 ریا مرض تبائی و عارضش خفیف است علی ای قیاس آن که صاحب این علت تدابیر
 حیدر می دارد و باشد که این حشفه بدین همه معالجات در پیش خفیف فیتسه
 و مد منقطع گردید و علیل نبات باید لیکن در ضرورتی که معالجات و تدابیر دوی
 یا تریه دائمی نمایند اعراض عادی مبدل بمرضی گردد و اما این مرض مستحی شود
 بقضاء تام بکشد فاعوان قن که مرضی کرده و یا آنکه در قصبه ثانیلی لحامی درموم
 بکشد بلم بروید و سیم شد که بمرض منستقل گردد بمرض دیگر مانند آنکه نفوذ او
 در قصبه باقی ماند یا آنکه جراحی بل منطبق و سیتی گردد و یا آنکه منستقل شود
 بودیم یا در غشاء مخاطی متانده که بواسطه انس البول عارض شود و سیم
 که مد مد نوک غلظت بکشد یا با معالجات سیم و سیم و سیم و سیم و سیم و سیم
 تشنیز باید داد و در این علمرا اعلیات و اعلیات و اعلیات و اعلیات و اعلیات و اعلیات

الذات عارض شده یا از سرایت و مد فوع از حشفه بواسطه سوزنک است یا از قرحه تشنیز
 در جرای بل اگر چه قرحه مذکوره غلب در نوک حشفه عارض و مشهور میشود و اما انداز این
 نیکو و مورث هلاکت نکرد و سیماد صورتی که علیل نباتیت منوطت نماید معالجا
 و سیم بنا بر انفرجه انداز و خفیف خواهد بود چنانچه در حین سوزنک سوزنک انداز و خفیف
 اصعب الطلاج است و انجائی که از ابتدا می برود سیم از آن است که از ابتدا
 خفیف باشد اما علاج بد آنکه معالجا را در این مرض چهار اشارت در صورتی که سوزنک
 بسیط باشد اول منع از بروز و عروض ثانی تسکین درم و التهاب و سایر اعراض لازمه
 و ثالث منع از سیلان مد و رابع از انکه بیایج و ترکیت و اما بجهت منع از بروز سوزنک
 که بعد از جمیع بازمانده مشبه دارند که مستلایدین مرض اند و در بول نموده و با بول
 قصبه را شسته و با آب دزدکی از شرک سرب یا در آنکه محلول در آب بجای بول حشفه
 نمایند اما بعد از بروز بجهت خفیف درم باید از مرز و سخن قوی علاج وادمان خفیف
 در دیده و در غذا اسماک فرمایند و در این حال انفع ادویه است که چند روز آب برک
 شادانه بنشینند و بجهت تسکین نفوذ و حدت بول بر همان دین زکون
 و در هر جرای بول را از دین زین سیمای تریه نمایند صفت دومی نافع سکن نفوذ
 بکشد کافور فیصوری یک کدم فونیم کدم صلایه نموده قبل از خواب میل فرمایند و در
 است که بجهت خفیف درم باید چند علیل آرام ماند و در غذا تقطیل و از لحم حترار نماید
 و چون انفعالات و تدابیر مذکوره درم خفیف یافت شرک سربلی مرتب از سناکی
 و شک فرکی نافع و در کاه علیل از سوزش جرای بل متادنی باشد باید آنکه زودی چسب
 زیت قصبه را در ماء فاتر نهند و چون اعراض و حدت درم خفیف یافت یا آنکه ماند
 خفیف بوده است در این حال بر معالجات است سیمایان مد و در خطه اینک مرض منستقل
 و اما سمد مد را به قسم میتوان نمود یکی با غانت ادویه و اعلی و یکی از حشفه قصبه
 و سیم است که این دو طریق بجهت تسکین و ترکیب و بیکدیگر معالجا سازند و انفع جمیع ادویه
 لسان است سیمایان و سیمایان و سیمایان و سیمایان و سیمایان و سیمایان

tarikhema.org

tarikhema.org

۳۵
 و درین هنگام بطعم و بوی بعضی ادویه قابضه مانند انجیر و کدو و زنجبیل و فلفل سیاه و زانیا
 و امثال آنها نافع و مشرب است و در این مرض از عجزات است و باید آنکه روزی سه
 نوبت از سنی چهل و پنج قطره بلسان کو با پودر با طباشیر مخلوط و با لعاب بیدانه غیر
 نموده چسب ساخته یا آنکه بقند چکانند و میل فرمایند و هرگاه از استعمال این دوا
 در بدن نبات السیل عارض شود یا در کبد و جوی بهر سبب بسته باید دست از او برداشت
 و بهتر آنست که دوا می مذکور را با تریاک ترکیب نموده میل نمایند در صورتی که سعال
 از او عارض شده باشد و کباب چینی را از ابتدا روزی نیم مثقال و نیم مثقال عصاره
 با نبات کف کنند و بر وزن او بیفزایند تا روزی چهار مثقال به نوبت برسانند
 و چون این دو کفایت نمود در مدت یکماه لابدند که این حب فقیان نمایند صفت
 بگیرند کباب چینی یک مثقال بعد از سنی نیم مثقال بلسان کو با پودر آمیخته و چهار نوبت
 در یک روز سه نوبت میل فرمایند صفت جوی دیگر که در این مرض زیاد آرد و است
 بگیرند سقر سفید کباب چینی زاج سیاه از هر یک چهار درم ریشه انجیر و قهقهه
 اجزا را گرفته و با لعاب بز قطره ناخمیه نموده و در مدت حب ساخته روزی ده کوزه
 به نوبت میل نموده و تکرار نمایند تا مرض دفع شود و هرگاه از بد او است و مبادت
 بدین حب تخفیف در مرض بهر سبب باید علاوه روزی بقدر دو سیراب آب یک مبدی
 او سازند و همسم لازمست بجهت اعانت بر علاج روزی یک نوبت حب سیراب
 سرخ حقه نموده صفت حقه ماضع بگیرند کلات کبود نیم کدم آب شربت درم مخلوط
 نموده روزی سه نوبت از این دوا بر تنبیه حقه نمایند ایضا حقه دیگر بگیرند
 جوهر ماده یک کوزه و در وقت درم آب حقه نموده و به ستر سابق حقه نمایند
 ایضا حقه دیگر بگیرند بکسر رب و تا وقت کدم و با شربت درم آب مخلوط نمایند
 و حقه کنند و بجمع آنها اقوی و نفع است که یک کدم سبب حقه را درشت
 یا بهریت و چهار درم آب حل و بر تنبیه حقه نماید و در علاج مرض نادر روز
 باید دست از دوا برداشته و تا چندی انداخته و در وقت نوبت

۳۶
 و دیگر انات را عارض میزد عجزات است از درم غشاء حلی بهیسل سیمیا قطعه از او که در
 بعضی رجم واقع است و هرگاه آنست مخصوصی که با نیکه رجم در سبب بهیسل صاحب این مرض
 که از بندیده میشود که در عصرون و خل او یعنی ملحق و در وقت رجم خسته بهر سبب و اما
 علامات اولین است که چند روزی بعد از مبادت حقه شکریدی در فرج و بهیسل
 و از او رطوبتی دقیق با عدت و لرع سیلان نماید نوعی که معبر خود را خواشید
 و مقشر سازد و بعد رطوبت مذکور غلیظ گردد با صفت مایل بخت و از این
 رطوبت سافل عصاره همیشه ملوث باشد با عدت و درم و قطن فرج و نوبی
 او باشد که با این علت جی همراه باشد و اما رفتار او چنانست که سوزنک عار
 دگور و سبب استعدا و نوبت دارد و میشود که درم از بهیسل بخراشی ل سیراب کند
 و بدین دوا مطهر عسل بول و در بعضی حبس البول عارض شود و چون در بعضی زنان که طث آنها
 قیاس غیر منظم باشد رطوبتی از بهیسل آنها در غلب سیالست لهذا باشد که مشته
 نشود این علت با سوزنک لکن صاحب این مرض را خطی کبود در اطراف چشم ظاهر شود
 و بشیره او صفتی مایل بخت بهر سبب و چون بهیسل او را ملاحظه نمایند خراشی
 در او دیده میشود در طوبت سیال از او بول و قوام شیر و سیراب ندارد بکلاف آنکه
 در سوزنک اما **علاج** آنکه در سوزنک زنان او به دوا علی چندان مؤثر نیست در صورت
 شدت ورم باید با طرف فرج زدن نشاند و روزی چند نوبت با دقا تر ازین
 نمود و اولی آنست که روزی سه نوبت از لعاب حلی و شیر کا و حقه نمایند و بعد
 و بعد از تسکین عدت ورم این حقه کار دارند صفت و بگیرند پوست مارون
 چهار مثقال مازو چهار مثقال در شش سیراب طخ داده صاف نمایند و بوجات
 کبود یا زاج رومی هر یک که حاضر باشد شربت بخورده نموده و با آب سرد
 روزی دو نوبت بهیسل حقه نمایند و نفع آنست که قدری پنبه مخلوط بدین دوا
 با عانت آینه رجم بهیسل فرو برده و بقدر شش ساعت رجا داده و بر وزن
 و این جمل که روزی سه نوبت باید کار داشت بفراسه تن پونات نامیده اند

در ادویه نافع در این مرض مداومت بزاج سیاه است روزی از شش تا
 نوزده و اما در سوزنک نرسن دکور هرگاه نوک حشفه را ملاحظه نمایند و رمی جرت
 و نفیشتی در او دیده شود و جرت آنها قوی تر باشد از آن است که حالت صحت
 و بلغمی که خارج میشود رفیق و مانند آب است میشت و از دفع او روشنی در مجرای
 بول بهترند و آنجا نیکه صاحب این قسم از سوزنک اغذیه و شربه حاره است
 نماید حرقی در بول و روشنی در قنطیر او هر سه بول جنبه کی ندارد بلکه قنطیر
 خارج میشود و باشد که بعد از قنطیر یا یکی از حركات نفسانی و افراط در کمال شرب
 اغذیه و شربه حاره جیبی در بول بهترند بحدی که بالمره قطع شود و درین
 باشد که حکم شدید می در شرح عارض شود و در این هنگام این حکم و الت به
 سرایت ماده سوزناک بدهد و ذی و التهاب با و اما در این قسم سوزنک
 طویل است بنوعی که هرگاه قصودی در علاج او روی دهد با علیل تا ورم آخر
 همراه باشد و قیبه این مرض ضیق موائی بول و از امر ارضی است که با وجود
 معالجات جیده چندی طول خواهد کشید و اما علاج باید حتی علی کمال
 آورده و تدابیر نافع را از دست نداده و از ادویه و اقل بلبان که پاهو راج
 سیده و کبابه سیسی و خ انجبار و قنطیر زراچ میل فرمایند و نوشیدن آب ترش
 معدنی و استحمام در آب بسیار نافع است و شرب دوائی خوش را حکما در این مرض
 نافع دیده اند و از تدابیر نافع انداختن شمع زراچ بر پنده است بر نمابن
 صاحب علت زیاده و الت که علاج این مرض بدون استعمال و مسدودت به
 انداختن میل بجوای بل بسیار متعذر است و بجهت این معنی دو قسم میل میباشند
 بکار است یکی میل است که در معادن خفته باشند و دیگری میل است که در
 خصوص موسوم به صلیک مرتب میمانند و باید روزی دو وقت یکی از
 این دو میل بجوای بول بدهند که بواسطه او دوق ممتلئ غالی و کسفی راجع
 مجری بهر سه و هم فوه حساسه او خفیف گردد و حفته نمودن از جوهر مازود

از نازد

از نازد و حمام در آب گرم معدنی صاحبان این علت را نافع و از نوزده است فصل ناسخ
 از باب ثالث در این ورم بیضیه که بفرساید و بدین فاسد و اوعبارت است
 از ورم غشاء مخاطی جوف اوعیه منی ضمیمه بیضیه و قاعد چنان است که بالجا و غشاء سیر
 بیضیه متورم و از ورم او صفی نیز متورم گردد و اما سبب او قلب سرایت و انتقال ماده
 سوزناک است از مجرای بل با و عیه منی بواسطه ورود صدمه فزنی بر بیضیه و اکثر اوقات بعد
 از رفع سوزنک و التهابی و این مرض عارض غلبه بیضیه الیه است که در ورم بیضیه
 نادر است و اما علامتها او این است که یکدو روز متمدی در بیضیه بهر سیده و بعد از آن
 و درین جهاس شود با وجع قطن سیمایان بیضیه علیل و از فزنی حرکت و بیضیه
 سالم شود و بعد در بیضیه و سیر محیط بدو و صفی و رمی جرت بروز نماید و در کثر جمعی نیز با و
 همراه است و اما بعد از ظهور جمعی کثر سوزناک بالمره کن و سیلان رطوبت از مجرای بل
 فانی و منقطع میگردد و اما رفتار و ورم این مرض منوط است بردات وجودت معالجه
 که از معالجات تدابیر جیده زود علاج پذیرد و از افعال در کمال و سوء تدبیر باشد که قیل
 الماء یا آنکه نرسن و ملائمی در بیضیه بهر سید و اما تشخیص او سهل است بواسطه علامت
 مذکوره و تقدم مرض سوزناک که سبب این علت است اگر چه گاهی سبب میشود
 دانه آفریننده بوده باشد اما علاج قبل از وقوع است که صاحب حرق باید بیضیه را
 در کیه نهاده و بالا باند و چون جهاس متمدی را او شود باید بالمره ارام و از حركات باز
 مانده و چند زل بر نمابن است نیده و مسهل کننده کی و تک فزنی ترتیب داده میل فرماید
 و هرگاه بیک وقت اکتفا نمود لازم است که زل و مسهل را کمر فرمایند و بعد از آن که مرض
 طور کامل نمود باید بیضیه را در کیه انداخته و بر کمر استوار سازند تا نیکه باشد او را
 در فضاء باید یک کمال بجای آورده و مسدودات میل فرمایند و از جماع و طایفه استرا
 جویند و بعد از آنکه مدت ورم تسکین یافت باشد که مرض حرق نکس نموده و
 به و هرگاه بخوبی است که این علت بسبب و نیکوئی علاج پذیرد باید مرتبه بعد از
 که سال علی و شرب سبب افعال نغمه و تا چندی از حركات آرام باشند و بعد از

کرت صورت دوم بهتر است که نشاء را بشمع غلیظ آلوده و بخیار را ببنار آتش
 اعطای نمایند تا ماده مرده را تحلیل دهند طریق استعمال شمع که بخیار را بخیار
 با صبرین ایام و بسیار گرفته و چینه لته طویل آلوده بشمع عرضا بخیار را بخیار
 چینه لته از شمع گرفته و طول آنها را بخیار و دانه آغزی لته بروشته و عرضا بر
 آنها اعطای نمایند و باشد که بعد از دفع مرض صلابتی در جرم غلیظه بخیار
 و تا چندین سال طول کشد و مورث ایلام او شود بناء علی هذا بخیار تحلیل اولاد است که
 بیکرند اشق شغال بپایز غصه بختقال در سر که طبع داده تا حرا شود آنگاه این شمع
 بودی تمیاجی کشید و در بخیار علی کجاست و بگذارد تا خود بیفتد و ایضا تیرنج
 از دهن سیما وید بخیار و مغایر را بهترین معالجات و اقوی محل است صفت دهنی
 نافع بیکرند روغن بادام و در دم شکر است شمع مخلوط در بخیار تحلیل بمالند
 و بعد از آنکه مرض کلی دفع گردید اگر دکه صلبی در بخیار باقی ماند بخیار تحلیل و چند
 نوبت باید کل میل فرمود فصل حاضر از باب ثانی در بیان ضیق مجرای بول
 که یکی از نایج مرض سوزنک و سیم پیچ است شمع که در بول مجرای و نیز بخیار
 تفرج است و از صبر و لند باید آنکه چون مرض سوزنک در بول در موضع سوزنک
 مجرای بول صیقل شود و این مرض به نوع میسر شود تا هر گاه در بول قوی است که بخیار
 قطعه غصه که مجرای بول که بول یک ایام است بواسطه درم ستره خاکی یا بدین
 واسطه مجرای بول و ضیق گردد با سوزنک عروق او در این قسم هر گاه که تری مجرای بول
 خون جاری شود و با آنکه شمع لطیف با طرف مجرای بول ضیق گردد و باقی سگ
 باشد و شمع است که شمع در مجرای بول سوزنک و مورث انقباضی او شود و سبب این
 مرض در غلبه نوزاد است که در صورت فرسودگی باشد این مرض دست دهد و کاهی
 از درون قریب نیز آلت دیگر از خارج مجرای بول مورث این مرض شود و محل
 عروق این مرض قاعده چوبین است که باین قطعه نخودی قصبه و قطعه غصه که باشد
 و نادر است که در نفس قطعه نقر یا غده دوزی بهر شده و علل او است که بول ستر

مندی یا بد و مورث بخیار و بخیار
 قسمی است که در شمع و غصه و سوزنک

دفع گردد و در عین خروج کانه نماید و کاهی بطور انقباض بول نماید و سیم پیچ که باله
 حبس شود سیم در صورتی که صاحب این مرض شرب آب کمی از مسکرات نوشیده
 و باشد که شبانه روزی قریب بیت نوبت او را نماید چنانچه در مرض بخیار
 و هر گاه میل مجرای بول بدو افتد از موضع منطبق تجاوز نموده بکمر مورث می
 مشید خواهد شد و باشد که از انداختن میل غشاء منطی ابتدای موضع ضیق
 پیشه از مجرای بول پاره شده و نوک میل به نکت در افتد و مورث مرض حمله شود
 و قاعده چنین است که در غلف موضع ضیق مجرای بول بواسطه عروق منعی از خروج بول
 دستی بهر رسد که بول در آنجا جمع و مکث تواند نمود و در این صورت از اجتناب
 حدت بول فرقه در این موضع بهر رسد و بدین واسطه نوسه عارض شود و بول
 از این ثقب نوسه می دفع گردد و سیم و کاهی از درم منمن بواسطه حدت بول
 ذکر عارض میشود اما تقدمه المعرفه بدانکه این مرض از امراض صعب و نرسد و عسر
 العلاج است و هر که بنفسه بکمر از معالجات داخلی هم دفع او ممکن نیست و از تخفیر
 او بواسطه علامات مذکوره میسباید نمود و چون شنبه میشود بکمرات نشاء بناء
 علی هذا لازم است که باند خستن کشته تر تیره باین آنها نمود و بجهت تعیین و بهر دن
 طول در شکل موضع ضیق مجرای بول مجرای بول مجرای بول مجرای بول مجرای بول
 در سر او موی نصب نموده اند قرار گذاشته و این میل را مجرای بول فرو برند و چون
 بمیدم موضع ضیق رسیدند میل ثانی را پیش روانیده که شکل و طول آن موضع
 در موی که در سر میل مضروب است نقش بسته و بدین واسطه بهریت موضع معلوم
 معلوم می نمایند و سیم میل مذکور را در حالت در طول که از آنها معلوم
 میگرد مسافت از ابتدای مجرای بول تا موضع ضیق او علاج او بداند که معالج را در
 این مرض مقصود وسیع نمودن موضع ضیق مجرای بول است و بجهت این مطلب
 طریق میسر اند نمود یکی آنکه از خارج موضع علت را بشکافند ثانی آنکه
 باستعمال ادویه الکاله و محرقه وسیعش سازند ثالث آنکه بافت کشته تر برد

و سیس سارند و در قسم اول بن بویاید نمود که اولاً بر طبع انداختن میل در طول و شکل و
موضع ضیق از مجرای معلوم نموده آنکه میل دیگر که خوف و در خوف و چاقوی پنهان است
بحری دو اندیشه چون موضع علت رسد میل پنهان را حرکتی داده که چاقو از خوف و
بیرون جسته و بجانب آن موضع را بشکافد و بعد از این عمل خروج او کشته تر جوی با یکدیگر
انداخت از دو جهت یکی آنکه بول از خوف کشته تر بیاید و موضع خروج بر نموده که صورت
فساد می گردد ثانی آنکه مجرای را وسیع نگاه داشته و مانع باشد از انقباض او و در قسم
ثانی بجهت استیصال او به اگاه بدین بویاید نمود که در اول با عانت میل خوف سابق آنکه
اندازه گرفته و موضع ضیق شده مجرای را معین نمایند آنکه میل که در خوف او مشکبم
مغضوب است بحری دو اندیشه چون موضع علت رسد میل خوف او را پیش ده اندیشه و
بشک جرم موضع محلول را آورده و بیرون آورده و اما قسم ثالث که اسم و دفع است شقوق
که بر پیش از قسم اولی طریقی که با عانت کشته تر جوی را وسیع سازند و بجهت
این مطلب حکما دو قسم کشته تر اختراع نموده اند یکی آنکه در فلات مخصوص از قشر خسته
اول را یک اورا بلند اند و برور بر جسم غلت او میفرایند تا بد رجه کمال رسد و باید به
مناقص کشته تر در مجرای بمبانه از این قسم میل که چه رود تر دفع علت میشود لیکن باشد
که غلبه قاعلم او تمامید در این صورت باید قسم دیگر از کشته تر که از موضع درخت که
بلوغت هندی که چون نامند ساختن و مقولای خوف او دو اندیشه و بیست اند و دیگر که در
مفصل میسران انداخت و هرگاه از ابتدا غلبه از این ختم کشته تر تمام کرد و خوف
بنیاد بود بجهت آنکه بعد از چند وقت عادی خواهد شد و زیاد تمام نخواهد کرد و در
صورتی که میل زکی کسین شد و نتواند تحمل صدمه او گردید باید قدری عصب
برالسیج و سخت مجرای میل جبهه روزه بمالند و هر روز کشته تر را تغییر داده و عدد
حیتم از او را بکار برند تا بعد از دوازدهم که چون بین حد رسید از خوف خود مرض
لا بد باید تا چند ماه هر چند روز یک وقت کشته تر می بویاید بلند از اند و هرگاه مجرای
بحری ضیق باشد که توان این قسم کشته تر انداختن قسم دیگر از کشته تر که از

لغز نموده

ساخته اند باید بکار داشت که دقیق است و لیکن چون در مجرای رطوبتی بدو رسیدن باشد
و وسیع بسیار مجرای را و باشد که بر سطح ضیق مجرای حبس البول بهر سه در این صورت
لازم است که با عانت کشته تر جوی بول را خارج سازند و اگر کشته تر نرود باید با سالی بول
داوه و چند زب از ماء فاطر آبرون نموده و قدری او به مجززه مانند تر باک و جوهر او و عصا
برالسیج و غیره میل فرمایند و اگر بر سطح تدابیر مذکوره بول نکشاید لابد باید که عفا کشته تر
بحری بدو انداخته یا آنکه آتی که بر سر دم است به تر و کار بجهت زده و با عانت اول دفع
نشان را خالی سازند و باید بویاید تر و کار را بر نه داشته و تا ارک نمایند که مجرای وسیع
کرده فصل حاد لغزش از حالت در این مرض بویاید صبر می که با طرف مبول عارض شود
چون قبل بیان نموده ایم که اگر مجرای بول منطبق ضیق گردد در غلظت بوضع ضیق و سعی بهر
بول در آنجا محتبس و متفرج ساخته و موثرت او صبر کردیده و بول از ثقب آنها بیاید و نشی
در خوف این مجرای متاد می عشا می میرود که مانع است تسکین او را و تشخیص این مرض را
باید حق کشته تر و از پارون بول از این ثقب میسند و این قسم از نه صبر می تواند شسته شود
بویاید صبر می که در اطراف مقعد عارض بشود و ثقب این مرض خلیه عسر العلاج و ممکن نیست که عصبه
از آن او شود اما علاج باید اولاً مجرای بول را وسیع ساخته آنکه علاج نه صبر نماید بن
کوک بر سطح میل سرخی که در شش سرخ شده باشد غشاء خوفی همد را سوزانده و از آن
سازند یا آنکه چاقوی نازکی به ثقب متاد می برده و غشاء مذکور را تر کشیده و بردارند
لیکن در حین این عمل باید کشته تر می ایم در مجرای بول بدو انداخته که میاید با سالی بر اجرای مجرای
دارد آید و بعد از چند شرط خوف ان را نموده و قطعه زار یک پس یک جرم محلول در آب پاشا
ظهور نمایند و بدین است که جراح باید بر سطح تدابیر قبل از عمل مجرای منطبق را وسیع سازد
که بدون از آن سبب قع مرض ممکن نخواهد بود و هرگاه نه صبر نمایند و مستقیم بهر سبب
باشد باید آتی که با یلینه مستقیم و مستقیم بمقعد انداخته و هدایت او مجرای مذکور یافته
و با آن سرخ غشاء خوف آنها را سوزانند و لیکن باشد که بول محتبس مجرای را متفرج و
شقوق سازد و ظاهر گردد بلکه تحت جلد منمرد و موثرت غافرا شود و این مرض را

افضل تر سپردن دورين نمند يعني انتشار بول علامات و نشانه چندان بعد از جبر بول
 و استلای نشانه بر اسطه انطباق محوی دیده شود که نشانه خالی و در اطراف جبر بول رمی
 شبیه بطن نیا ظاهر و از لمس او چنان حس شود که در او هم آمیخته باشد و هرگاه
 اتفاقا موضع مذکور را بکشند رطوبتی به نایق و لون قوام بول منفع شود و نبض صاحب
 سرعت و تواتر ببردند و بعد از یک دو روز همین موضع غافرا یا اگر گرفته و علیل را
 هلاک سازد و هم دیده شده که طبیعت با عانت عروق جذبه بول را منجذب
 و در دوران خون داخل و کجج بدن منتشر ساخته و هلاک نموده و این شخص را
 نفس نشین بول است و سبب این مرض نوزاک جو احمی است که بمشانه وارد آید
 و بر اسطه او بول حبس شده و مورت این مرض کرده اما علاج چون سبب ضیق
 محوی بول است لهذا هنگامی که بول حبس شد بجهت ضیق محوی لازمست بدقت نظر
 و تا مل محوی بول را بکشند که بول منفع و مورت این مرض نکود و هرگاه محوی مفتوح
 و بول تحت جلد منقبض و منجمد گردیده و جلد را منقبض ساخته باشد نباید کان نمود
 که این درم فلغ نیا است بلکه موضع مذکور را شرط و روزی چند نوبت از ماء فاتر
 آبرون نموده و بول را با عانت کشته تر خارج سازند و اگر بر اسطه او بول تحت جلد
 و مدت او غافرا یا عارض شود باید معالجه او نمود بدستوری که سابق در این
 ذکر گردیده است علی ای تقدیر نشانه از بول خالی سازند که جبر بول مورت
 فضا و عظیم میزند و فصل مایه عصاره از آب الت در ذکر و درم غده و ذی
 که یکی از نشانه های مرض نوزاک است و علامت او است و جمع موضع متورم و هم عسر
 شده در دفع بول و فی الجمله که تا بمشانه فشاری ندهند بول خارج نگردد و با اشتغال
 مشانه و حکم شده در شرح و اطراف او دارد و درم صبعی بمقتضی تشخیص این
 باید داد و غلبه بول و شیخ و درت نمایند کان بجز این مرض عارض شود
 و سبب او نیست برای مرض نوزاک و اما علاج او چون این درم استعداد
 دارد و بصلابت لهذا بعد از بروز درم باید بالمره آرام داند و چند زانو بر جبین

دلت

و تحت غشای عانده داده و از داخل کل میل فرماید و چون غده مذکوره بر اسطه درم صلب گردد
 باید انکه بدو درم بیدیه میل فرمود تا چندی از دهن بد موضع معلول را تریخ نمود
 فصل عسر از آب درم غشاء مخاطی مستطین باشد که یکی از نشانه های مرض نوزاک
 و هم نرگد مشانه مانند و سبب او اینست که در امی عارضیت بر مشانه صاحب نوزاک و یا
 از چنان صاحب نوزاک این مرض ببرد و هم با شد که از اندامی مژدی که در خود
 مشانه ببرد سیده شد مانند حشرات و غیره مورت و اگر در کمر بول صحن مرض نقره سرا
 استعداد تامی است باین مرض و اما سکرک یا عا و یا نرس است عا و او نیز مستعد
 نرمیت میباشد اما علامت او در حالت عادی عسر البول با وجعی بچسبده و در روز
 آمدن بمشانه جین خروج بول بول منفع رطوبتی است خون آوده با غلظت شدیدی و
 حواس ثقی عظیم در موضع مشانه که از فرستادن مولم کرده با حکم معقد و کمی و وجع سنگنا
 اجابت طبع از منقطه معالجه مستقیم مشانه را باشد و اوقمی کودد و اعراض مذکوره نیز از او
 بردی بر مشانه و بطن قطن شده شود و اما تقدمه المعرفه در صورت جبریت معالجات
 و تدابیر نیکو است اما علاج باید بعد از بروز درم چند نوبت با طراف مشانه زانو زد
 و طبقات مبرده مانند شیر بادام و روغن او وضع عمری و لعاب خطمی و بزرگ و شال
 آنها میل فرموده و از اطلاع چسبنا نمودن لازم و هم نوشیدن آب بکرک شادمانه از
 مجربات است و بجا می آید باید لعاب بزرگ آکفا نمود و هرگاه وجع شدید باشد
 استعمال بعضی از مخدرات مانند افیون و جوهر او و عصاره بزرگ بلسنج و عصاره جبرین
 و شال آنها شربا و طلا و نافع و هم استعمال کمادات عا و تنجده از بزرگ مسجونی و زرد
 سبز و عا شاد و پونه و کرفس و بونه و نفع و استعمال آنها بر پشت زانو نافع و از مورت است
 و باید صحن این مرض بالمره از جومات بازمانده و آرام داند و اطراف همیشه گرم نگاه
 دارند و پوشیدن باله صوفی اگر چه در فصل تابستان باشد و هرگاه صاحبان این مرض از
 معالجات و تدابیر نیکو بجا می نیاورند درم مذکور نرس گردیده و طول کشد و جمع پیش
 مشانه اگر چه چنان قسم عا و او باشد لیکن دائم بول نرسد و یا عا منفع گردد و بر اسطه

نقصان قوه ماسکه مثانه و بول اورا رسو ملیت از خراطای بلغمی لوح بن بایض بسض
اما علاج باید عیسیل تا به بلدان جاره نقل نموده در صورت امکان دلا باید بکسکه اورا
از پاره صوفی ترتیب دهند تا بدین همیشه کم باشد و انفع جمیع ادویه مداومت به
بلدان بکیت مرکب باریشه انجیر و گلات مندی و راج سیاه و کبابه چینی و شال
انهاست و هم از مداومت تر بان قین منروج باریشه انجیر و راج سیاه بلغمی کلی در
این مرض دیده شده و حکما بر ادویه مذکوره دودا می قاضی مخصوص بنیان یافته اند یکبار
بفرستد او را او کوشی و دیگر را پاره بر او نامند که هر یک از آنها را روزی دو شقال
مانند چای طلخ نموده با نبات میل فرمایند و هم نوشیدن آب کباب نافع در این
مرض و از مجرب است فصل دایع عیش از نبات درین درم طبقه طحیبه
چشم از انزیم سوزاک بدانکه باشد ماده سوزاک بر چشم بر خورده و صورت تورم
او گردد و مانند آنکه اگر کسی را دست بمده سوزاک آلوده باشد و غفله بر چشم زند
یا آنکه طفلی مجاور باشد طفلی را که صاحب این قسم در دست از رسیدن مده مذکوره
درم شنید می طحیبه را عارض شود با اعراض نزله و علامات آنکه اولاً حرارتی مانند
فعل طحیبه را عارض شود با غشی او و شفخ طحیبه حفری رخا می گردیدن لون او و درم ملحمه
بکدی است که چنان ظاهر شود که قرنیه عاثر و قرنیه بسته با درم جفین و شرج او را
عدت و معه و در روز اول این درم سیلان و معه قلیل از روز دوم به بعد سیلا
و معه کثیر گردد و با حسن تدو و سوزش طبقات چشم با سایر علامات نزله و موافق
مزاج عیسیل باین مرض مختلف و بدیکر گونه است مانند آنکه در انزیمه و دمویه زرقا
او سوا می آنکه در انزیمه و بلغمی در انزیمه و دمویه درم شدید با جهرت و جمع
کثیر است بحدیکه از مدت و دم باشد که در سه روز با بزر چشم که گردد و درین
اشخاص می نیز سراز است و در صاحبان انزیمه و دمویه نیز و دم و جمع
شد بدو عجزت و بس درق کل سرخ و علاوه بر آن بعضی اعراض عصبیه مانند
قلق و اضطراب و می نظارانی یا او سراز باشد در بلغمی فرا جان و دم و جهرت و جمع

و می خفیف بکن بلغم کثیری از چشم سیال است احدث و سرایت او که اگر قدری از این بلغم
در چشم دیگری نقل شود صورت تورم او گردد و بواسطه عدت این رطوبت هر موضع که بر خور
منقوع و بخارند او را اینها چون بطبقه قرنیه رسد بخارند و مانند الحالی او را بخورند و شوش
سازد بطوریکه رطوبات چشم از این طبقه خارج و با بزره گردد و در صورت کثرت قد
و تنقص درم رطوبت سیاله قلیل دن خوانده شود و اما عاقبت او که چه از امراض شد
و نظیر است بکن هرگاه معالجات و تدابیر جیده بعمل آید نیکو گردیده و شفا یابد و قسم شد که از امراض صورت درم تورم و درم تورم
که بعد از ازادیه او انقلابی میشود در جفن هر سه قبل از تورم و پاره شدن قرنیه امیدوار
باید بود و هرگاه در جبهه جمع صعب عصب را عارض شود دلیل است بر تورم طبقات واقع در
چشم و در این مرض و سبب اولیت سوای رسیدن ماده سوزاک از خارج بر چشم
اما علاج باید اولاً بواسطه زود و حجامت و فصد ماده را از چشم منصرف سازند و
بهر آنکه با چاقو چند خراش بکرم ملحمه دهند که خون را از جاری شود آنکه بهترین
معالجات آنکه هر ساعتی بکنوب چشم را با عانت سفیجه یا آب دزدک خوشن
و در وقت شب از این دوا قطره فرمایند صفت او بکیرند سنگ چشم یک الی شش کنیم
و در ایجه درم کلاب داخل قطره سازند و هر ساعت بقاصه چشم را باین قطره
بشوند و بعد از قطره او ملا حظه نمایند که اگر غشاء کاذبی در چشم بوجود آید بدون تأمل
او را از اندام سازند که بسیار تحت او متفرج شود و چون جمع شد باید باشد خوردن قندی
ایمن و مالیدن اطراف چشم بهترین مسکن است فصل خاصه چشم را با آب
درین درم عضلات دقعه در صلب دوا می او از عضله داخلی فاصره و عضله قاصه
که بیرونی پی سوسن امید شده با علامات اسباب و معالجات آنها بدانکه اغلب درم
این عضلات عضام قطن نیز متورم میگردد و علامات و اعراض این درم با فورا بروز
نماید بدینیکه وجعی شدید و عیسیل با ر صلب عارض از حرکت متناهی و متالم شود
سیما از جفین قطن با سایر اعراض اللذمه درم از تسبیح و حرارت و جهرت و غیره
اما قاعده این است که اولاً در صلب دوا می او نقل زرقی بهر سه و علاوه بر اعراض

درم تورم و درم تورم
درم تورم و درم تورم

دری بجهت شدید آن موضع مذکور عارض و تارکبه نما و از بعضی سیر و رفتار این
 درم که چون و درم که بجهت علیل دراک درمی نماید تا آنکه منفر و ریم از او منفر
 شود و چون این درم را قاعده است که بریم منستی شود بناء علی هذا باشد که ریم کیمیت
 و نقل خود از تحت عضلات بمغایب منتقل منقب کرده و در این موضع منقب شده
 در این صورت هرگاه علیل به پشت بخوابد و یا با را بلند نکند و محسوس شود که منقب
 از مغایب بسیار میزد و بیشتر که بعد از انقباض از زیا دتی ریم علیل را حیاتی قیاض
 شده و هلاک کرده و سبب انقباض نموده و سقطه دارد و بر صلبیت و هم باشد که
 از قیاض منفرط و پیائیدن و از وجع و درک و قطن و نفوس و خنایری که از اعضا
 قطن بهر سیده باشد صورت این درم کردند و اما علاج او این است که اولاً
 بعد از دفع سبب استقراض دم نماید با سال علی وجهی که در موضع درم است
 از منقب از راجح پرند و بنده ازند و چون مدت و درم سکین یافت باید موضع منقب
 واقع نموده یا بخودیکه ماده مورده را از باطن اطباء هر میل و درم است حال معوقات
 منقب از اطلاع نوزاد و از خون منفرج با ای نولاک در این مرض نفی عظیم دارد
 بهر آنکه طبیعت باغات آنها ماده و درم از باطن اطباء هر میل داده و با عرق
 منقب طیار و چون از درم مذکور ریم حاصل شده و بکیت خود بمغایب منقب
 و در آنجا جمع شده باشد لازم است معالج را که بوقت ملاحظه فرمایند که این ماده
 نه به سطر و درم مغایب حاصل بکیت ماده است که از دیگر موضع با آنجا منتقل
 شده است و هم نباید که در البرعت منفرج ساخت زیرا که از تجارب و دیده شده
 که هرگاه معالج بکیت علیل را حیاتی قیاض و هلاک کرده لهذا ادلی است که تامل
 فرمایند تا طبیعت خود منفرج سازد بجهت آنکه انقباض طبیعی بخوبی خواهد بود که منقب
 برود دفع گردد تا از او حیاتی قیاض نشود و هم باید از معالجات و تدابیر مذکور
 اتمال فرمایند چون کاهی باشد که طبیعت و منقب تحلیل برود و هرگاه منقب و وجع
 منقب می باشد موضع تراکم ریم یا بنده باید باغات آلتی موسوم به تر و کار که عبارت

از درم

از درم است خوف و در او میل با برکت تند قرار که اشتباه بر موضع مذکور برده و
 میل او را عقب کشیده تا از لوله او قدری از آن ریم خارج شود انکاه میل را بر دشته و از
 مشمع و فلیون رفا دشش نمایند و چون سبب این درم خفا و یکی از عظام قطن یا عجز
 باشد بهترین ادویه استعمال روغن بامی است موسوم بپور و موسوم ادویه پیده و زولاً
 و در این حالت بسیار مفید است و بعد از تخفیف مرض نشین و استقام باب
 معدن کبریتیه گرم با بره قلع ماده نماید فصل سادس در ریم در این درم
 در خمس و قسام و اسباب و علامات و معالجات او و عبارت از درم است
 که بهر سه درم سلامیات اخیر اصابه مخصوص در پنج او این درم را بجهت منقب یا قاعده
 یکی آنکه درم خفیفی در رمل یکی از طغفار یا کجانی از او بهر سه و در ابتدا وجع خفیف
 و محدود است و هرگاه موضع علت را شرط نمایند قدری ریم خارج کرده و باشد که
 بواسطه این درم ناخن ساقط شود و قسم ثانی درم غاکریت که عارض شود
 بطول تحت جلد منستی سلامیات اخیر و این درم را وجع شدید است بواسطه
 غلظت و سخافت جلد و منقب او بدین واسطه ریم حاصل از او به شوری خارج
 و قسم ثالث از درم خمس درم است غاکر که عارض شود او تار ملصقه بموضع
 مذکور با وجع صعب از سایر قسام بعدی که تا کتف منفرجش و درم او با فصل
 مرفق سرایت نماید و قاعده است که از شدت وجع حی عارض شود و باشد که
 درم سرایت به عظم نموده و صورت قیاد او گردد و قسم رابع از درم خمس است
 از درم است که در غشاء قیرغ و جرم عظم بهر سه و عارض او مانند قسم ثلث
 است الا اینکه در این قسم عظم سلامیات با بره قاعده کرده و سبب این درم
 در غلب معلوم نباشد لیکن از ضرب و سقطه و کوفه شدن و فرود رفتن بر زمین یا قاشکی
 باشد این مرض بهر سه و اما علاج درم اولی از طلا و آب سرد و شکر سرد
 بتخلیل رود و هرگاه تحلیل نرود و ریم از او حاصل شود باید بدون تامل منقب
 ساخت که مبادا ناخن از او نرود و اگر قندی ناخن از محل خود خارج

بمنفع

باشد باقی او را بر نفس نمایند و چون در تحت ناخن جمع شده باشد و بواسطه غلظت و ضخامت او منفرج نتواند شد باید با نوک آن قدری از ناخن را لب بند که تا شود و بعد منفرجش سازند و اگر ناخن ساقط شود و از نو برود باید که او را با نوک لبشکل و وضع بکوبند و بشی که بهمان قسم نمو نماید و در قسم ثانی باید که از ابتدا چه زود موضع منورم نشاند و از آب سرد و شکرب و سفید کج و صاف منورم نماید و با روغن چوبه موضع علت را تمیز نموده و اگر سبب این درم فرو رفتن مشی خارجی باشد مانند سوزن و فاشاک و غیره باید او را برود آورد و تا سبب منورم شود اگر اصلاح پذیرفت فها و لایه بدن تا مل بکشد که ریم هم اگر نباشد رقیق نموده شده و وجع تسکین خواهد یافت و بعد از آن بکار استعمال او و به تنه او از بر البسج و برک شوکران و بزرک نافع و مسکن وجع است و در قسم ثالث این هم علاج چنان است که در قسم ثانی الا انکه در این وجع چون خرفت از انفراسش و بکج اصبع و فاسد کرد ایندن او لازمست که در شکافتن تا غیر نوریده و عین شکافتنگاه اصغره مذکوره را مکررا استعمال فرمایند و هرگاه با وجود بر این درم بر می از موضع دیگر از دست یا در غشاء ضریح عظام حاصل می شود باید که آن موضع را نیز کوفت و در قسم رابع از آنجس علاج چنان است که در قسم ثالث الا انکه چون غلب در این درم به ملامیات منورم و فاسد می شود باید که او را قطع نمایند و این فصل در این فرو نشستن ناخن در لب یا انکه باشد که از پیشین کفشتن شک و فشارش او یکی از ناخن در لب موضع خود فرو نشیند و مورت قروح او گردد و بکجه علاج لازمست که در قه سربی در تحت ناخن فرو نشیند که از دره و قدری مسک چشم موضع متفرق نمایند و هرگاه ناخن زیاد فرو رفته باشد باید او را برود و این عمل را باید و نحو میسر اند نمود یکی آنکه متقاضی بود شسته و یک تیغه از او زیر ناخن بطول فرو برده و تیغه دیگر را به پشت ناخن گذارده و متقاضی نمایند که وقت با چاقوی ناخن را بردارند و یا انکه با چاقو اطراف ناخن را سطح نموده

با این

و با این بر دارندش فصل سابع عشر از باب ثانی درم مفصل و الا و قه در جوف او و او شمل است بر چهار جمله جمله اول در تعریف مفصل چنان بجهت اراض مفصل لازم است معرفت نامی باحوال او لهذا باید دانست که هر یک مفصل را شرطی چند باید موجود باشد تا تعریف مفصلیت بر او صادق آید اول آنکه دو عظم مفصل یکی صاحب حرره و دیگر بر افکاک باشد ثانی آنکه موضع ملاقات در برابر افکاک غصرونی پوشیده و بواسطه باشد ثالث آنکه جمیع اجزای مفصل را از هر دو عظم کلسیه لقیفه از رباط اعاطه نموده باشد رابع آنکه در جوف این کیسه غشاء رقیق صفاقی واقع باشد خامس آنکه رطوبت غلیظه و لزجی مانند بیاض البیض در جوف غشاء مذکور متکثر باشد و هم باید دانست که او را مفصل یا بالذات عارض یا عرض باشد از برخی دیگر و هر یک از آنها یا عادت و یا مزمن و یا متوسط بینهما و هر یک را سه باب مختلف است از ضرب و مسقطه و ارد و بر مفصل و چاییدن او و با سوختن جراحی مادی نهاده و نیز در شک و تفرس و جراحی افره مورتش این موضع شوند و قسم شده که از انتقال داده از دیگر موضع بدین درم حاصل شود جمله ثانی در این درم رابطه مفصل هرگاه این درم خفیف طول کشیده باشد در او باقی میماند و یکس چون حدت شسته باشد و مزمن گردد سخته و درم بالات عقیقه مفصل سرایت خواهد نمود و در درم حار رابطه مفصل وجع صعب عارض شود که از حرکت و فی الجمله سستی شده و باید با حرارت مسس موضع منورم و بر عت تسبیج در زوای مفصل ظاهر شود و با نموده و در غایت و در نیز او بکدی که مفصل منورم منقی گردد و تسبیج و وجع زود باطراف نزاعی خود منورم و جمعی عارض شود و اگر این درم تحیل فرود باشد که صفا مفصل با هم منورم سخته و درم از او حاصل شود و یا انکه وجع خفت بهر سبب تسبیج میزاید و درم مزمن گردد و در درم مزمن رابطه مفصل وجع خفیف تسبیج اولین و بقرا غیر باشد و درون جلد فوق مفصل منورم و تسبیج گردد و چون درم میزاید بواسطه تمدد طلا و شفاقت و درخشندگی ملاحظه شود و در آورده مفروشه در او در و می بر سر نه و باشد که انقباض بواسطه باز ماندن از حرکت منحل برساند و هم باشد که درم مزمن

کما دی سدل شود و در این صورت وجع و سایر اعراض درم عاده مفصلی بهر سده و بطور رسد
 و نقد المعرفة از درم مفصل این است که میتوان بمعالجات و تدابیر لایقه تحلیل نمود
 لیکن اگر درم مدت و آلات عمیق مفصل سرایت نموده باشد تا حدی که منقبض و استخوان
 مفصل رسیم و جمیع قی عارض شود و در درم نرسد نادر است که آلات عمیق سرایت نیاید
 الا آنکه از رطوبت آن مفصل سخت و ضخیم شود که می جمع شدن آنها دشوار و حرکت مفصل
 عسرت بهر سده و اما اسباب او را در مفصلی که قبل بیان نموده ایم در غلب
 این درم در مفصل مرفق و رگبر عارض شود و اما علاج چون درم به یک از اعضا و آلات
 چنان مخوف نیست که مفاصل اینها باید به سرعت تدابیر ضد درم بکار داشت از قصد
 و زود دادن و سبب باید با طاعت منجیات و سهلات ماده را نفیج داده و از غرض متهم
 منصرف و با معالجات دهند و چون بحران این قسم درم با دوا و عرق است که باید با
 یکی از این دو بحران اعانت نمود و آرام داشتن عضلات و این تدابیر معالجه است هرگاه
 سبب درم مفصل ضرب و مسقطه وارده بر او باشد باید از آن منشأ و سبب سر برداشت
 و خاص مکرر اطمینان و چون سبب درم مفصل چنانچه در پیش گفته شد باید قطعه صوفی
 بدخن مصطکی داشته و در مفصل متورم نه بندد و از مشروبات نوش در و انبیهون قی قه
 منقسمه بود بخان میل فرمایند و در صورتی که درم نرسد و دیده باشد انفع جمیع جمادات
 انداختن شمع زواری است با طرف مفصل و ملاحظه نمودن است که چندی علی الاطلاق
 مده از او بیاید و بجهت این مطلب لازم است شمره که اگر شمع بهر سینه مقروض نمود
 بموضع او و این اصل با فرقیون یا دوزیون بمالند که جاذب مده است و هم تریج بدن
 سبب اطراف مفصل را نافع و هرگاه بعد از گذشتن درم و حرکت مفصل متورم
 باقی باشد باید شمع حریق از اشتق و سرکه غصیل بکار داشته و از دهن سبب بیاورد
 تریج فرمایند و چون درم مفصل با نفیج رسته می گردد معالجه لازم است که با طاعت
 نموده قسمی نمایند که ماده جرس نشود و هم باید علی نموده که در استخوان مفصل متورم
 منقبض و متورم گردند و این معالجه برونانی آن کیلوکس نامند و در صورتی که طبیعت با

باشد

باشد با تاد و مفصل لازم است که عضلات بر سیسیتی دارند که مابعد از کار نیفتد چنانچه
 باید در درم مفصل اطراف ساقچه را راست که از تاراه رقت بمنع نباشد و دست را
 کج تا غدا بماند خورده و چون قیاس بدن تحلیل و جمیع قی عارض شود جز قطع عضلات فوق مفصل
 چاره دیگر ممکن نیست جملتاً است و این درم صفاق محیط مفصل متورم شود از ابتدا و
 اسباب رخیف یکدیگر خفیفی که میسر می شود متالم نشود مگر هنگامی که از طرفین مفصل لغت رند
 قدیمی متالم گردد و لیکن که این درم با جمعی عارض شود در این صورت او را جمعی صعب همراه خواهد
 بود و بعدی که حرکت متعبر مل متعبر باشد و بعد از چند یوم استیج توجی در مفصل قدم بطور
 و وجع اشتداد یابد بهر مفرط و جمعی قی بعد چند مفصل متورم و منفرج گردد و در بهترین
 نتایج این درم خشک شدن مفصل است ولی باشد در صورت نرمیت که رطوبتی در جو
 مفصل جمیع و از او اکس طبعی عارض شود و سبب این درم سبب است که عموماً در درم مفصل
 سابق ذکر فرموده و اما نقد المعرفة فرماین علت در صورتی که از ریه و مسقطه بهر سینه باشد
 اسبب است از آنکه از علت نزاجی و از ابتدا بمعالجات و تدابیر نیکو میتوان درم را تحلیل
 نمود و اما علاج او را از آنکه سبب چنانچه اگر سبب درم مذکور مرض نفیس یا ریح مفصل
 یا ریح از ریه باشد سرکه کتان و سایر ادویه مخصوصه بدانها میل فرمایند و هرگاه
 سبب درم خنده باشد روغن ماهی و سرکه ماهی و روغن و ادویه پدید بکار دارند و اگر
 در صورت مدت و درم زود انداخته و آب سرد منجمد به مفید است و خاص مکرر اطمینان
 و بعد از گذشتن درم و شمع وادمان محله از قبیل اشق و سرکه غصیل در روغن
 سبب است که تحلیل نموده و انداختن شمع زواری که بجهت جذب ماده بهر سبب نافع است
 جمعی که قبل بیان بود و هرگاه از معالجات مذکور اثری مترتب نگردد بهر سبب است که
 طرفین مفصل متورم را با آتش داغ نمایند و لازم است که همیشه مراعات بنیه عسل نمود
 و با عذبه مقویه قوامی بن او را حفظ فرمایند و جملتاً اسبب درم غصایف و غطیم
 مفصلی باشد که در درم این آلات عمیق از ابتدا وجع خفیف و بعد از چند یوم درمی آید
 اجزای مفصل بهر سده که بعد از چند روز مده از او حاصل و منفرج گردیده و غرض و

و چون صفاق منقبض می

جوف مفصل فاسد عظم را بریم سازد و اما سبب علاج این چنین است که عموماً در درم مفصل قبل از کوفته و اگر چنانچه نموده ایم تفصیل درم هر یک از آلات مفصل را ولی مع تیر دادن که این درم در جهت از مفصل عارض شده بسیار متعسر حال لیکن بجهت مع تشخیص نمودن این درم در جوف مفصل با تفحص است و در صورت درم مفصل استنباط بدین که درم سخیل بریم شده یا بابت کفایت میماند و نیز آنها بدین تفصیل

در درم جوف مفصل	در درم که با بریم است	مفصل که با امانس طریقی باشد
اگر درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	اگر درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	اگر درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل
درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل	درم که در جوف مفصل ظاهر است و در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل در بعضی مفاصل

فصل نهم در جوف مفصل فاسد عظم را بریم سازد و اما سبب علاج این چنین است که عموماً در درم مفصل قبل از کوفته و اگر چنانچه نموده ایم تفصیل درم هر یک از آلات مفصل را ولی مع تیر دادن که این درم در جهت از مفصل عارض شده بسیار متعسر حال لیکن بجهت مع تشخیص نمودن این درم در جوف مفصل با تفحص است و در صورت درم مفصل استنباط بدین که درم سخیل بریم شده یا بابت کفایت میماند و نیز آنها بدین تفصیل

بدر

و با سفل نصب شود و سبب باشد که درم مفصل را فاسد سازد در این صورت ریس فاسد از جوف خارج و در خلف عظم درک قرار گیرد بنا بر این پاکر تا به و قدم بجانب پس می نماید و در کبه خمیده کی یافت شود و از شدت وجع کثرت ماده باشد که حتی دقایق عارض صورت ملک علیل گردد و یا آنکه چند قطعه از عظم فاسد دریم خارج شده و بجای آن باید و بدانکه این درم سه زمان است در اول زمان علیل با وجع خفیف در درک عارض و از جوفی حرکت خسته و متاخری شود و با ممدادان بعد از برخاستن از خواب در پانصد و خشکی باشد و بعد از چند ساعت خوب شود و در این حالت شباهت دارد بریاج فرس و وجع درک باشد چند ماه طول کشد و بیم باشد که بسال سیما و از راه فرستادن علیل را بکشد و در دوم زمان با علیل طویل نماید و سرین جانب علت صاف و غصص تحت و فرو نشیند و فخذ مسترخ و نهال هرگز و از حرکت متالم شده و بکشد و قدم بجانب چستی میل نماید و اگر علت از راه فوق رگبه است لیکن وجع و انحنائی از رگبه یافت شود و بعد از ظهور این عارض در راس فخذ دریم و از موضع خود بیرون آید این حالت در زمان سیم است و بعد از فساد راس فخذ منقرض شده دریم بکشی منفرج شود که علیل را حتی دقایق عارض و هلاک شود و سبب این مرض نیز سبب است که در او رام مفصل قبل بیان نموده ایم و بخصوص صاحبان مرض خا زبر در حین طفولیت اغلب بین علت مبتلا باشند و اما عاقبت او متخلف از درم اولی هرگاه معالجات و تدابیر جیهه بعجل آرند بکوهست بخلاف آنکه در درجه ثانی و ثانی روایت دارد چون اغلب ملک سازد و یا آنکه پای علیل فک شود و اما علاج باید بنا بر حدت و دردت مرض نمود چنانچه در سیمام اول باید با پارا با لمره آرام و بکشد نمایند بچونیکه مسج حرکت کنند و از او گذشتت جمیع مواضع فخذ را لمس نمایند هر موضع از او که متالم و مومج باشد زدنش نیند و یا جامت بدان موضع نمایند و با عانت مشهلا ماده را از عظم منفرج و با معامیل و منند و از هفیداج رصاص و زدنش در مکر اطلاع نمایند و بعد از گسرت صورت درم تریخ بدین سیماب وید نفی کلی دارد و در درم که سبب این درم ماده خا زبری باشد معالجه بر وفق او نمایند و استعمال روغن ماهی

چند موضع

۶۵
 موم بود و او دویید و فلادیه و پوست سبز کرد و دوج و شال آنها و هرگاه این درجه
 از مرض بطول انجامیده و تجلیل برود لازم است که بموضع علت مشمع پرند اندازند و
 کفایت نماید باید با عانت داغ خورد از باطن مده و در اطراف جذب نمود و در آنها
 مرض استقام نماید حار معدنی و کور کدی بکل رافع علت خواهد بود و اما اگر سنگام دوم
 که از بطه مفاصل غلیظه و علت اعظم سرایت نموده باید با آهون سرخ مفصل متورم را سه
 چهار خط داغ نموده و بعد از آن را بگرد آلوده و بموضع او نهند و اگر بعد از این عمل به بعد
 کفایت خارج نشود لازم است که همه روزه موضع داغ را از دهن با سلیقون و بیل
 نه این نموده و باید داغ را در زائنه بین عظیم و صغیر رسوخ بکارند و در صورتیکه
 طویل از داغ خوف باشد باید از خوشترین بجز قهقهه تغافل نوزند و جودت این
 معالجه را دسیل است تخفیف جمع و استادن یا بجز طبیعی خود و در این وقت بر معالجه
 است نه این بین نیت و دید اطراف مفصل متورم را بجهت اجابت بر تکلیف مده و در
 و در بطه آنکه این درم بکسر مالیت بناء علی نلک در قنات و علیل را در حرکات
 عنیفه و یا قنات است لازم است و استقام نماید معادن که کور بسیار رافع است
 و در سنگام سیم از آرام دادن مطلقا و تحته بند نمودن یا باید طبیعیت اجابت
 نمود که مفصل جدید بنا نماید و بعد باید علیل در حین حرکت عصا بریز بخیل
 گذاشته و با هوای معتدله نقل نمایند تا نجات یابد و در صورتی معالجه استقام
 نماید که در موضعی مده جمع آمده باید او را منفر ساخت و هرگاه اگر کثرت سیلان
 بیم خوف آن باشد که مایه بین ناقص و قوی تجلیل روند باید او دویید و کشته به مقویه
 شراب و جوهر که کثرت و مطبوع پوست او دروغن این بکار دارند و از اغذیه کباب
 و آب که شست با قلیل نان میل فرمایند و در غلبه باشد که در این سنگام چندین
 سال بعضی متعین با سردی در موضع علت باقی و قطعات عظم از آنها خارج شوند
 و بعد از خروج از آنها از معالجات وادویه داخلی استیام پذیرند و بعضی اند
 است و ان این فی دین مرض پس فخر را مکشوف و با آره قطع نموده اند ولی چون

اعمال

اعمال عظیم و خفیه است ترک او را اولی دانسته اند
 فصل شاسع عشر از باب الشربان ورم مفصل عصب و سبب و علامات و علاج او
 و این ورم از نوادر است و مانند آنکه ورم مفصل فخر و از ابتدا او را وجعی است
 که از مرفق او را ک شود و از شترین و حرکت است و اقوی که در سیمای در لیا لی
 بنسبکی بر زال او در سنگام دوم و دست از مرفق منحنی و از بدن دور است و کف
 فرو نشیند و مساعد طویل نماید و اغلب در این وقت جمعی نیز عارض شود و در سنگام
 سیم که پس عصب از مفاصل خارج و بجانب علی و حوشی میل نماید و مذهب روی
 کف صاف و سادی و در آن الکف بر آید و بعد از دست کوتاه نماید در این وقت مفصل
 مده کور منفر ویم از چند موضع منفرع گردد و سبب و علاج این علت بعینه مانند آنکه
 در ورم مفصل فخر گرفته فصل عشرین از باب الشربان ورم
 و چون در این علت از حد ورم جلد که بعد عظیم یافته جلا و شفاف و بیاض بهر
 بناء علی و لک او را ورم السیفی که نیز نامیده و این ورم از او را مرمز منفر و در ابتدا بی
 او را و جمیع خفیف و در که قدری خشک شود و این جمیع یا در جمیع خزای که به مایه باشد و
 یا آنکه از ضغله بجانب حوشی و سببی جمیع عارض شود و این حالت که گاهی خفیف و گاهی
 شدید است و اما و سالها طول کشد تا آخر الامر و جمیع میفراید و در که بر آمده متورم شود
 و در بعضی اوقات این و متورج و در بعضی بکدی متورم است که از صلابت گویا استخوان
 بر آید و از ورم زایل میشود و کبکی منحنی گردد و باه فرستش منفرع شود و جلد مجمل که به سبب و بیاض
 و شفاف بهر است و او دویید و در طبیب کوروی خوب ظاهر باشند و بعد از چندی موضعی از
 جلد حرکت بهر ساند و منفر شده و صدیدی میخند و این از ویداید و اگر میل نقره بد و فرو
 بر سیمای شود و با لا خوه عظم و منفره سیم و با ریح منفرع خواهد کرد و سبب این ورم
 نیز سبب است که قبل در ورم عظم منفرع و کور شده و منفرع صاجان خا زیر و منفرع
 در این جمیع اغلب بین علت مبتلا باشند و علاج آنجی است که در ورم مفصل فخر
 ذکر شده و در این جمیع است که معالجه باید فراموش نماید و نهایت صاحب این علت

که بود بطه ضرب کمر کرده در ادبانی ماند بهشت با سایر اتفاقا و اما بنا بر سبب است و جا
 و جبهه و عین منقسم نموده اند در جراحات طویل و عریض و مورب ظاهر و باطنی عین باطن
 و در جراحی که از شدت ضربت لخته از آن عضو زایل شده باشد و اما موافق تن عضو مجروح
 منقسم گردانیده اند در جراحات جلد و لحم و غضل و اوتار و عصاب و جفت و عظام
 و غیر این و اما بنا بر عضو مجروح منقسم نموده اند در جراحات ریس و عروق و اطراف
 و شال آنها و اما علامات لازم هر یک جراحت و زمان جمله است و جمع و تفریق آن
 و جریان دم و دودم و جوی و بعضی اعراض عصبیه و اما در جراحات با شعب اعصاب
 در عضو مجروح مسدود و بعد از عروق دم و جوی در جمیع اجزای آن عضو بهر سبب که
 شدت و ضعف و بسته است بقوه حیوانیه آن عضو و اما سیلاب دم و موافق
 عروق مجروح است و در جراحات مسدود اند از آنست که در جراحات
 منقطع و منقسمه و اما تفریق عظام و اوتار و جلد آن عضو است و بعد از در
 ضربت و دخول هوا و کوف جراحت باطنی و آن عضو بهر سبب و متدش که در آن
 و بدین واسطه تنگی گردد با حرکت و حرارت نفس آن عضو و خروج شش از آن و اما
 موافق طریقت جراحات و مزاج علیل و قوه و اما شش عضو مجروح و جوی مختلف
 است و این عین که جراحی نامند نه تنها با غلظه جراحی است بلکه از در
 جراحت صغیر و جوی صعب الی عارض شود و بالعکس و اما اینکه کتار گاهی جراحت
 قریب یکدیگر است و با شش با آنکه عین جراحی ماند بهشت یا مادی نفوذ کرده باشد
 ویم و بعضی جراحی نفوذ یافته و کرده و بنا بر مزاج علیل جوی عارضه یا دومی
 یا عصبیه که عبارت از عروق و اعصاب است و یا یعنی و یا عروق است و اما بعضی
 جوی بطور ذره بر روی مایه در اعراض عصبیه و جوی می است باطن و عظم است
 و سبب و بدین تشبیه و اختلاط که از بی المکانه و دم و سبب عروق است و این
 زلات قوه حاشیه بدن یا در و در جراحت است با عصاب و اوتار و شش و اما
 شش جراحی در او و بر خوردن هوای متعفن که طریقی به و کت و دم و نقصان او

و این اتفاق باشد التهاب و قهیر
 خواهد شد اما چون گاهی جراحت یکدیگر
 ع

و اما کت

و اما بعد و وجود و میان عروق و مرث حد و شش اعراض عصبیه و اما طریقت استیم جراحی
 بدو که است یکی طریقت قریب و یکی طریقت بعید و یا مادی اما در صورتی که جراحتی نفوذ کند و پیش
 قریب یکدیگر و التهابش بیشتر رسیده باشد طریقت قریب استیم پذیرد بدینکه اول بعد
 از در و در جراحت بدست سیلاب دم مایه صفر از او سرشش گردیده و مطلق سازد کتار گاهی
 او را یکدیگر انجا طبیعت عروق شریه را نمود و وفو نشان را یکدیگر متصل ساخته و التیام
 یابد و از آنجا یکدیگر این حالت در درسه بعد بعل میا استیم طریقت قریب باید باشد
 و اما چون کتار گاهی جراحی متد باشد و طریقتی آیمخته با خون از او سرشش شده و در جوی
 جراحت تا لیل طانی که از او ریم حاصل میشود برویند و این تا لیل ابتدا صغیر و متصل
 باشد از دم و بر در صلب یکدیگر متحد شوند و با خرقه سطح جراحت از جلدی رفیق
 پر شده استیم باید و این جلد را جلد اثری امید و اند چون این حالت بطول می
 استیم طریقت بعید و مادی امید شده است و اما عاقبت جراحات موافق کتیت
 و کیفیت و مختلف است مانند آنکه جراحات مغز و کتار گاهی عین کتار منقسم
 گردیده باشند اقرب استیم یا طبیب و جراحات ناخن و قاعده و عصبیه یا باشند
 و در صورتی که شش جراحی در جراحت باشد اگر اخراج او ممکن است عاقبت او نیکو
 دلا در ائت دارد و اگر آنکه با لیس و مزاج علیل عاقبت او مختلف است چنانکه در
 سن شباب مزاجی سالم جراحت بهتر از آن استیم پذیرد که در کتار و
 شش صی که مزاجشان بر اسطه خازیر و آبله فرکی مانده کدیده باشد چون این
 اشخاص تحمل است که جراحت مبدل گردد بقره خبیثی دیگر آنکه بنا بر
 شرافت و خاست عضو مجروح عاقبت جراحات مختلف است مانند آنکه در جراحات
 دارده بر عضای شریفه ردت و خطر دارند و لهذا جراحت بدین اسطه منقسم نموده
 بجراحات فکله مانند جراحات دارده بر قلب و کتار گاهی عصبیه که شش
 استیم باید و شاید بهلاکت رسانند و بجراحات خفیفه و هم موافق عضو مجروح
 عاقبت جراحات مختلف است مانند آنکه عضای کثیر العروق و الدم یا صعب است

۷۱
 از شدت آنکه در صورتی که جراحی بر شریان وارد آید مورث مرض او در زیرم خواهد شد و از آنجا که
 عصبی مجروح گردد اعراض عصبی را از او بطور رسد دیگر آنکه موافق حالت صاحب
 جراحت و معالجات مقتضی است باشد آنکه اگر سبب علاج جمع و وقت باقی و معالجات
 حاذق باشد بهتر از آنست که سبب علاج موجود نباشند
 فصل یازدهم از باب اول در طریق علاج جراحات است کلیه بجبهه این معنی لازم است
 که خوب تشخیص ملاحظه فرموده و سیلان دم را سست نمایند و شش خارجی باقی خوف
 او را بخارج و بنا به حالت جراحت تا اگر نمایانستیم او را بطریق قریب صورت
 امکان یا بعید در عدم امکان اعراضی که مستحکم است حاصل میشوند را از آن
 و از امتحان نمودن تشخیص داده میشود آلات مجروح و مقدار جراحت و عمق و وجود خارجی
 در او و اکثر از قوه بصره این حالات مشهود گردیده اند و بعضی از لمس یا با عانت
 باید امتحان نمود و بهترین مستحکم امتحان همین درود جراحت است زیرا که بعد از ظهور
 در دم این عمل صعب خواهد شد و هم باید آنکه ممکن تشیع آلات واقع در عضو را بداند
 یا آنکه از کتاب بخواند و هم باید تفسیر کردید که بجهت این جراحت وارد شده
 است پس داده پیشرفته و آلات جارحه چه بوده است و در بعضی اوقات از رطوبت
 سیاله از جراحت میتوان استنباط کرد آلات مجروح را پس آنکه اگر بول دفع شود
 و آلات برود و جراحت نباشد و اگر صغیرا منفع کرده جراحت که دلیل باشد
 و اگر بواسطه صبار تشخیص میتوان داد لازم است که در صورت امکان از لمس سعی
 یا با عانت میل نقره که در سرد و کما باشد معلوم نمایند آلات مجروح را و بعد از
 امتحان تشخیص معالجات است که بدقت کامل ملاحظه شده و سیلان دم نمایانند هم
 باید دانست که میشود بواسطه ضرب جری بالمره قطع گردد یا به تنها مشغوب شود اما دلیل
 جراحت شریان است که دم اجماعی منفصلا دفع گردد با جهنم کی و از انقباض
 بمافوق و سیلان خواهد شد و از ورید مجروح دم اسود غلیظی بطور اتصال سیال
 باشد و از منقبضه بمافوق انقباض شده و نکند و از عروق شریه مجروح قطره قطره

مانند

۷۲
 مانند آنکه از ابرخون دفع شود و اما سیلان دم یا بنفست خود سه کرد و یا از اعمال
 و صنیاع و اگر شریان وسط الوعائی که نه عظیم و نه صغیر باشد بالمره قطع گردد بواسطه
 تقلص فم او جمع گردیده و سیلان کین یا به یا آنکه قدری خون بخلاف شریان منقبض
 و منجمد گردیده و منقبض سازد او را و بدین واسطه سیلان شود پرور از موضع مجروح
 تا محل انقباض این شریان مسدود گردد و یا آنکه بعد از ان شریان مجروح بهم متصل
 گردیده و مانع آید عبور دم را و اما در صورتی که جراحی بر یکجانب شریانی وارد آید
 از آنجا که طبیعت قوه انقباض ندارد خون بخلاف و منقبض گردیده و حجم او را
 وسیع سازد و محوئی بجبهه خود بنمایند و چون در عین عبور خون در این کسبه ظل
 میشود و در آن محوئی خواهد بود و این حالت را از ورید مجازی یا ضربته مندری که
 از ورید مجروح حقیقی آن است که شریان منقبض گردیده و خزانه بسته باشد
 و جراحات شریانی را در استیام بطریق قریب و اما از عمل بد و بطور
 صحتی سیلان میکند از انقباض شریان یکتا او و یا پیچیدن درین
 و یا استعمال ادویه قابضه و این راغ و مثال آنها و انقباض شریان بواسطه است
 و یا بدین واسطه اما انقباض بدون واسطه بدین قسم است که پنبه یا قدری کاه را بعضی
 ادویه قابضه آلوده و بد آن شریان مجروح نهاده و می بندند اما بدین عمل عثمادی
 نشاید چون باز نمیدارد طبیعت از استیام بطریق قریب پس این استیام نباید
 الا سکاکی که خون از عروق شریه بیاید یا بهیچ وجه او ممکن نکند و در اکثر آنها
 آب نجس متواتر در سداد کافی است اما بواسطه آنرا مانند که با بدین شریان
 مجروح و شریان واقع در فوق او را با انگشت یا سبب معصومه که با صلیح طریقه
 مانند یعنی معصومه به محکم لغزش رند محذک که بعد از ان شریان بهم متصل گردیده و مانع
 از عبور دم گردد و این عمل را غلبه مستحکم عمل بدکار میزنند تا خون زیاد دفع
 نکند و عاید بدن ناقص نمایند یا آنکه مصلی باشد تا بطریق دیگر او نمیند و
 اما با عانت صبیح بدین گونه شریان را منقبض می کنند که با یک اهرام اینان

بر روی سینه نهاده شریان خا هر دو فوق عضو مجروح را محاذی زانده از عظم چنان
 بقدر آنکه که ضربانش ساقط شود مانند آنکه شریان خا را از فوق مجامدی زانده
 عظم خانه و شریان عظم را مجامدی عظم عضه و شریان سبک را مجامدی زانده
 عظم باید فشرده و لیکن از آنجا یک اصابع بود خسته می شود و نایب خوب با همیشه
 حاضر نیست سبک را خارج نموده که از عضله او دوران دم ممنوع گردد و این
 است را طوری که نموده ما خود از وقت طوری یعنی چرخانیدن و دو قسم از این
 می توان بکار داشت یکبار که در همه اوقات ترتیب و ممکن و سهل است و این
 طریق بسیار زنده که پول بستی بمقدار کف دست برداشته و در لته نهاده و
 عضو به بند بقی که سبک بر روی شریان واقع باشد آنجا چوبی در دست
 گذرانیده و به چنانکه تا محکم گردیده و شریان را بجای منضبط سازد که ضربانش
 ساقط گردد و قسم ثانی را که موسوم است به تورنیکت پتی بنام یکمی که فخر
 او است عبارت از دو ورق فلز و میل است که منگنه که این دو ورق را
 بیکدیگر نزدیک و دور نمایند با قطعه چوبی که در جوف چرمی نهاده اند و به پلات
 موسوم کرده با نوادی و طریق بکار بردن او چنان است که پلات مذکور که عبارت
 از کوی چوبی باشد بر روی شریان نهاده و نواد را به دو عضو چیده آنجا میل را
 که به دو قطعه فلز منضوط است به چنانکه تا آنکه نواد متمدد گردد و بدین واسطه
 کوی مذکور شریان را بفشارد و سیلان مسدود گردد و هنگام استعمال این
 جراحان و حبست معرقی کامل بعبر شریان و واضح است که این الترا متدی به
 بعضی نماید که از خوف آنکه مبادا غرقه یا عارض شود و آنجا بیک شریان
 مجروح گردیده باشد از خوف مرض انوریزم لازمست که همه دست را بمسوات
 منقطع کنند و بدین طریق که اولاً با عانت طوری که یا صبیح سید سیلان نموده
 و جراح را با لته آلوده بمشع و اخیلون پوشیده و بعد لته دیگر که چند تو
 نه نموده اند بر روی او نهاده آنجا با نوادی دست را از مجروح به چید و چون

در صورت جراحت
 باید بست و تفصیل این مطلب
 در دویم در فصل مفصل
 آمده است و اما سبک شریان
 بهترین اعمال و سلم شقوق
 در غلب مواضع می توان
 بکار داشت از روی خاطر
 جمعی و شریان را از دو
 موضع می توان بست یکی
 از فوق موضع مجروح
 شریان اصل را که بعد از
 شکوف نمودن می بندند
 بجهت دیگر در موضع
 دیگر و این دو روش
 در بعضی موارد بسیار
 مفید است و در بعضی
 موارد نیز مضر است
 و باید در هر مورد
 احتیاط نمود

در صورت جراحت
 باید بست و تفصیل این مطلب
 در دویم در فصل مفصل
 آمده است و اما سبک شریان
 بهترین اعمال و سلم شقوق
 در غلب مواضع می توان
 بکار داشت از روی خاطر
 جمعی و شریان را از دو
 موضع می توان بست یکی
 از فوق موضع مجروح
 شریان اصل را که بعد از
 شکوف نمودن می بندند
 بجهت دیگر در موضع
 دیگر و این دو روش
 در بعضی موارد بسیار
 مفید است و در بعضی
 موارد نیز مضر است
 و باید در هر مورد
 احتیاط نمود

برقی

برقی رسد رکاب نند از او که زانیده و به بندند و در صورتی که شریان از فوق برقی
 مجروح گردیده باشد بجهت سید سیلان او بکینه لته را و لوله نمایند و آنجا بطول
 موضع مجروح از شریان نهاده و با نوادی محکم به بندند از این عمل سیلان مسدود
 گردد و شریان مجروح در چند روز تسمیم پذیرد و به همین قسم شریان کف و زدن
 در صورت جراحت باید بست و تفصیل این مطلب در دویم در فصل مفصل
 آمده است و اما سبک شریان بهترین اعمال و سلم شقوق در غلب مواضع می توان
 بکار داشت از روی خاطر جمعی و شریان را از دو موضع می توان بست یکی
 از فوق موضع مجروح شریان اصل را که بعد از شکوف نمودن می بندند
 بجهت دیگر در موضع دیگر و این دو روش در بعضی موارد بسیار
 مفید است و در بعضی موارد نیز مضر است و باید در هر مورد
 احتیاط نمود چون این سیلان از شریان خارج می شود و با سیلان می بندند
 چون این سیلان از شریان خارج می شود و با سیلان می بندند
 شریان طبقات او مانع سیلان خواهد گردید البته اگر شریان چنانچه گفته و با سیلان
 بسته و قدری کشند مشاهده می گردد که طبقه داخلی او منضوع و بجانب داخلی شریان منطبق
 شده و معبر او را مسدود سازند بخوبی که اگر آب خون در او بریزند خاموش دارد
 لهذا همین عمل را در غیاب روج مشاهده می شود و می توان عمل نمود باین قسم که با سیلان
 شریان منقطع را بسته و کمی کشند تا طبقه داخلی او منضوع شود و اما طریق عمل
 این است که شریان را در دست بگیرند و با نوادی مجروح و درید و عصب مجاور او را آنجا بکینه
 چفت دارد و در شریان را گرفته و پیش کشیده و نهایت پرده و بعد عمل را بیک محکم
 موم کشیده و برداشته و خفقت نموده و بروی آنرا کلاه داده و با عانت دو صبیح صبا
 پیش و دانند تا بروی شریان رسیده و کشند و تا نیا که نموده و بجانب از سیلان
 مقراض و جانب دیگر را از کلاه جراحات بیرون و باقی گذارند از این عمل بنا بقاعده
 در وقت تا چهار روز شریان از جای که بسته شده قطع گردیده و مافوقش مسدود
 است و باید در هر مورد که شریان منقطع متقلص گردیده و به سبب مجاور
 نیا بند و از شریان سیلان قریب اهل اکت رسد در این صورت باید عمل

نیکوتر آنست یعنی شریان من حیث المجموع آلات مجاوره نموده شریان که با یکدیگر
از عصبان عضلات و او تا ریه و غیره را به بندند و طریقی عمل این است که ریه
موم کشیده محکم را از سوزن منحنی تنگی گذرانیده و سوزن مذکور را بیک جانب عضو
فرد برده و از جانب مقابل خارج ساخته و ایضا از محل خروج فرد برده و از جا
دیگر بیرون آرند تا برسند بموضع که اول فرد برده اند در این صورت شکل
مربعی بوجود خواهد آمد که در وسط او شریان است آنگاه دو لب از ریه را
کشیده و ذکره نمایند از این عمل جمیع آلات واقع در دائره شریان بسته
و شریان مقطوع منقطع را منقطع ساخته و بدین واسطه ریه سیلان خواهد شد
ولیکن این از اعمال بسیار خطیر است بواسطه آنکه از بسته شدن عصب مجاور شریان
باشد که مرض کزاز یا غلغله یا عارض علیل به هلاکت رساند و لهذا در صورت
بهر چه بستن شریان ممکن نکرد اسلم آنستکه مافوق موضع مجروح را کثرت دارانجا
شریان را به بندند بخوبی که غریب در باب مرض اوبیترم و اعمال او بتفصیل ذکر خواهد
شد البته اند و چون ریه سیانی را که شریان با او بسته شده از شیا خارجی
است و میماند طمانت بسیار را علی هذا در وقتی که شریان صغیری مجروح یا قطع
گردیده باشد اسلم شقوق آنستکه با انبری دهن شریان را گرفته و چند نوبت بجا
راند و منند از این عمل طبقات شریان منقطع گردیده و مانند حلقه زدن حلقه زده
و مجبور در اسند و دست و سیلان تسکین یابد و از استعمال قوا بعضی عارض شریان
جمع و دم سیال منجمد میگردد و مستعمل در آنها مایه شلوج عرق و آب تدبیری و کات
کنود و کات کلانی و صمغ عربی و دم الاغین و دراتیانج و مار و کوشال آنها است
و از قوا بعضی است که از آنست که عذرت از جوهر عاجوز از دوده سیاه و اگر چه سیاه
ادویه قاضیه در مسدود عروق صفار کفایت نمیدانند لیکن شریان عظیم از آنها سبکتر
بل التیسام را نیز مانع آید و اما کیرا با این نافه بکار دارند در صورتی که چند شریان
مجروح گردیده و دم از آنها سیال باشد و تقسیم و یکسر و ممکن نکرد و لهذا در

دیگر خارج رخته و از
همین سوراخ خروجی فرد
برده و از جانب جم

از عمل

از عمل بدی که بجوف انف و دمان و سیاق تقسیم بکار برده باشند کاه کاهی لابد شود که
نمایند از برای سه خون دارا بجا بیکه بعد از سیلان ممکن است تا بیاعری کشود
و خون جاری شود لهذا بر جراح لازم است که موطن باشد علیل را همیشه در نظر داشته
باشد و از حرکات منعش نماید و سبب سیلان بعد از شده خروج ریه سیانی است
که با او شریان را بسته اند و بواسطه آنستکه قدری دم دمان عرق گرفته و منجمد
گردیده بود و از اندام او دی عرق مفتوح و سیلان دم عارض شده بجهت علاج
باید آنکه با عانت آلت مرموم به تو ریه و یا باستعمال قوا بعضی مذکور سیلان را
تسکین دهند و هرگاه با این حالت عجز در بدن مشتمل گردیده باشد از قصد نمودن
مجمد است که سیلان دم سد و کرد و دیاید و نیست که در بعضی اوقات باشد که جراحی
بر ریه شریان آنکه سیلان دم عارض شود و سیلان ثانی یا نتیجه نامند و سبب تفرع
جرح شریان یا عارض عجزی عجزی است علیل را و سیما در صورتی که چند استخفاف مجروح
مجاور هم خواهد آمد و بسته باشند بیشتر که در حالت ماده آمدن سیلان ثانی عارض شود
در این وقت بستن شریان موضع مجروح شمر شری نخواهد بود زیرا که از لیت جرح منقطع
خواهد گردید بلکه اسلم آنستکه او و دیقا بعضه بکار دارند اگر سیلان تسکین یافت
و لا بدند در آنکه شریان عظیم واقع در قوف عضو مجروح را شکاف ساخته و به بندند
چنانکه غریب طریقی عمل او را در باب مرض اوبیترم ذکر خواهیم نمود است و الله و اما سیلان
دم دریدگی را با علل ماتی که باقی ذکر نموده ایم تمیز باید داد اگر چه بعضی باشد که دم
هم مانند دم شریان بی مجید دین رو قوی است که در وقت دریدگی مجروح شریان واقع
باشد و کتاحت او حرکت نماید و از انقباض بمادون موضع مجروح ریه سیلان
کرد و در هرگاه در ریه صغیری مجروح گردیده باشد سیلان او بالذات تسکین یابد
سیما در صورتی که علیل را با سیاق استنشق بماند و اما در وقتی که در ریه
عظیمی را جراحی وارد آید بجهت سیلان او اعمال حکمی عقلی باید بکار برد و جراح
دور در بعضی آورده مانده و در این و دریدگی ترقوه و فخذ و ممکن قوا عدا

چنانست که انقباض بجهت سیلان دم و دیدی کفایت نمایند و بنا بر اینست
 لازم شود که مضمضه نه مجدی باید باشد که بالمره و عا و رید را منهدود کند بلکه از
 مضمضه جوئی جدران و رید عظیم گردیده و مانع آید عبور و مرور استنشاق هوای
 معین است که سیلان و هرگاه با وجود بر این عمل سیلان مسدود نگردد
 و خوف هلاک باشد لازمست که موضع خروج از ورید را کمشوف ساخته و از مانع
 و مادن او را به بندند و از آنجا بیکه محکمست از بستن و رید متورم گردد و ورم او را
 خوف عظیم است علی هذا این عمل بکار نرند از آنکه سیلان میگوید که سیلان ممکن
 نباشد و سایر اعمال سودی نباشد و قریب هلاکت رسد و در صورتی که جراحی برنگار
 درید و وارد آمده باشد سیلان و کالنجی سکین نیاید مگر آنکه بالمره و رید خروج را مقصود
 سازند و این قطع عضوی سیلان ام و دیدی خود بالذات مسدود گردد و سیلان
 که علیل از آم و بملایمت استنشاق هوا نموده و نفس عظیم کشد و اگر سکین نیاید
 لابدند و از آنکه و رید را به بندند مانند آنکه شراب را و باید دانست که بعد از
 سیلان بجهت علاج و تسکین جراحات مهم امور از آنکه شش خارجی است که در
 جراحات باقی مانده باشد چون از وجود و بقای آنها الهی عظیم عارض و بعدی بیکم از
 جراحات سیلان نماید که علیل به هلاکت رساند یا آنکه صورت غایب نماید و ظهور
 عراض عظیم گردد و از اینها خارج یا رمل و یا قطعه از آنها پس است که باطله
 در جراحات فتنه با توکل موزون و کار نیست که در جوفیان شکسته شده و باقی
 از عظیمست که بواسطه خربه کمرور گردیده و باقی مانده است و از آنجا جرحه شخص
 داده شود و جوشی خارجی اگر چه بعضی اوقات و جراحات مانند آنکه در جراحات
 نهضت جراحات بسیار عظیم است و لایق آنکه بجهت خروج از آنها بسیار کار
 قلات از جرحه شخصی است که سر را به قاشق از جرحه شخصی موسوم به پرسی و باید
 آنکه شش خارجی را از اقرب طرق بیرون آورند مانند آنکه اگر کسی بکف نشسته و
 قریب پشت دست باشد از پشت دست خارج و به نموده که کف و پنجهائی که

بهرت

جراحی ضعیف و طوع نباشد و خروج شش خارجی را باید آنکه با عانت بعضی دهن جرحه را
 وسیع سازند تا سهولت بتوانند خارج بیرون آورد و چون شش خارجی در وضعی
 از عظم مگرور گردیده باشد بسته خروج او صعب خواهد بود در این حالت اگر شش خارجی
 ظاهر است آنگاه موسوم به کرمش کجوف جراحی فرو برده و تحت و استوار ساخته
 و رقیقش سازند بقاعده جرحه انتقال و اگر غایب یا بین و عظم مگرور و از آنکه او در شمار
 باشد لابدند که صبر نمایند تا آنکه بدنه شسته و اطراف دست شده و باریم خود بیرون
 آید که از آنکه او سهولت بهرسانند و هر نمودن در این حالت اهم از آنست که به باب
 و فیکش شش خارجی مگرور در عظم را بیرون آورد و الا در صورتی که شش خارجی بیکه از
 عظم عجمه فرو رفته باشد از آنکه او بخواهد بیکم او را از راندن است چون بقای
 او منقطع سازد و مانع را دیدن و اسطه علیل به هلاکت رسد و هرگاه ترش از عظم
 گردیده باشد بالمره باید او را بیرون آورد و اگر قدری از او منفصل و قدری متصل باشد
 بطن لازم است که او را به بندند تا بدست یابند و اما بعد از آنکه جمیع عرض
 از هیئت جرحه میسر است و استنباط نمود که بجهت طریق تسکین خواهد یافت و وضع
 است که در صورت میل و استعداد طبیعت تسکین جراحی را بطریق قریب عانت
 بود لازمست الا در جراحات سمیه و آنجا نیکه تفرق بقال منفرد و کنار می جرحه
 متعده نباشد و میل است بر آنکه بطریق قریب تسکین خواهد یافت اما چون تمرد
 عضو خروج قوی یار یا منقطع گردیده قطعه از جلد انموضع متعده باشد بیکم
 که بطریق قریب تسکین پذیرد در صورتی که جراح یقین نداند که جرحه بیکه بخواهد
 تسکین پذیرفت و لی آنستکه اعانت نماید بقیعرا بطریق قریب زیرا که اگر تسکین
 نیاید و بمده نشیند جرحه کوچک خواهد شد مگر در جراحی که زیاد منقطع یا او را
 او منقطع گردیده باشد از این عمل است بکشد و چون قطعه عظمی از ضربه مگرور گردیده و جلد
 فوق از جرحه شده باشد باید آنکه بعد از جرحه قطعه عظمی مگرور جراحی را بیکم متصل
 ختم و به بندند تا بطریق قریب تسکین یابد و بیکم در بعضی اوقات باید ممانعت نمود

طبیعت از این سیام جهت بطریق قریب از آنجه اگر شش خارجی در جراحات باقی باشد
 باید دامن او را کشوده داشت تا آنکه با ریم لهولت خارجش بتوان نمود و همچنین
 در صورتی که خوف آن باشد که بعد از این سیام بطریق قریب سیام در صورتی که جراحی
 قریب باقی تریف عرقی عظیم واقع باشد مانند آنکه در غش و غیره و بجهت این سیام
 جراحات با قریب بطریق جراح لازم است مراعات بعضی شروط از آنجه باید آنکه جراح
 از کثافات میراث خون بجزیکه در اطراف اوست بپوشد و دیگر آنکه عضو مجروح را
 بر وضعی دارند که کنایه جراحی تسخیری باشد نه مستعد و متقلص و لهذا فاعده آن
 که در جراحات عرضی که عضوا در سطح فایضه وارد آید او را منحنی و در سطح به سطح محفوظ
 باید نمود و دیگر آنکه قسمی نمایند که نسجهای مجروح با یکدیگر مساوی و تماس باشند بجهت
 معنی باید عضو مجروح را با نوار یا لته آلوده بشمع و یا قلیون پیچید و یا آنکه بجهت نمود و اما
 نوار مختلف است نسجی که سه لته بودی هم نهاده و وسطشان را دوخته و نسجها
 هر کویا با مقراض سه زبانه نموده و وسط این دستمالها را محاذی جراحات نهاده
 زبانشان در روی جراحات تقاطع نموده و از وقت او کنایه رگای جراحات متصل شوند
 و یا آنکه خود با نوار عضو مجروح را احاطه نماید و اگر چه این عمل کفایت در سیام نخواهد
 نمود لیکن اقوی معلومت او را بهتر آنست که لته را بشمع و یا قلیون آلوده و با او
 عضو مجروح را در فاند نمایند و در جراحات ظاهری هر چه است استعمال شمع و قلیون
فصل ثالث از باب اول در طریق بجهت نمودن جراحات و سیام
 او باید داشت که در جراحات ظاهر چنانکه ذکر رفت شمع و قلیون کفایت نمیشد
 و یکی بعضی از جراحات و مواضع باید بجهت نمود از آن جلد در جراحات غایب که منظور
 این سیام بطریق قریب باشد و در جراحات و در جبهه لابد باید بجهت نمود تا آنکه
 جرس و جبهه سیام پذیرد و دیگر در جراحات عرضی آن در صورتی که قطعه کبیر از جلد
 مفقود و در جراحات عظیمه که برافق وارد شده باشد و در انصداع لحم عیان عین
 تولد یا جماع لازم است آنکه بجهت نمود و اما بجهت بجا قسم است یکی بجهت آنکه

ملک بالمرالات بمن متعل
 و صدمت فلا عظمی
 باینه جراحات از این سیام
 ع

مکندی

مکندی ثالث بجهت رابع بجهت است که در جراحات معاء و شش بکار میدارند اما دو قسم
 اخیر را که اقل از دو قسم اولی است بجهت جلد که در جراحی نمودن است و این سیام
 دیگر را بدین قسم باید نمود که بردارند سوزن منحنی که نوک او مانند دندان دوم باشد و ابروی
 یا کنان سوم زده بد و کشیده به نام را در جانب مقعر و سب را به تحدب و کد لوده و بجهت
 از جراحی عمودا فرو بردند تا غش آنجا دور زده از جانب دیگر خارج خنده و سیام آنکه
 نمایند نه استخوانی که در عین دم از تمهید کسل و همین بجهت نمایند بقدری که کفایت
 نماید و آن جراحی را باید آنکه فاصله مابین بجهت با طول سیام باشد و اول از وسط
 جراحی شروع بعمل نمایند آنجا جانب علی و سفلی را و اما بجهت بجهت را در جراحات
 برافق باید بکار برد بدین قسم که بردارند سوزنی با صفات مذکوره و یکبار و دو بار سیام
 سفید و یکی سرخ کشیده و یکبار جانب جراحی فرو برده و از جانب دیگر خارج ساخته آنجا
 دو سیام سفید از طرفین به دو چوب که چک بسته در سیام سرخ را در فوق جراحی
 که نمایند و حسن این قسم بجهت این است که دو چوب باغذ از تبا عکس را می جراحی
 یکدیگر و بعد از بجهت نمودن باید لته را بشمع و قلیون آلوده و بموضع مجروح نهاده و با قدری
 یا کنان او را پوشیده و بعد لته دیگر بروی آنها کشیده و با ناری تمام موضع مجروح را
 پیچیده و هم لازم است که بعد از بجهت نمودن با خط نمایند که درم از حد تجاوز نماید و بجهت
 این مطلب باید آنکه مبررات استعمال نموده و عضو موقوف آرام دارند و اگر با وجود برکن
 آنها باشد به کوه مکرر از سفیداج رصاص طلایه نمایند اگر تسکین فیت فیها و لاله
 بر آنکه طبیعت ثلثیت بر آنکه جراحی را بطریق قریب سیام دهد در این صورت بجهت با
 بردارند و در جراحی با قلع بعد از چهل و شصت ساعت باید بجهت با را برداشت چون
 است در سیام و اما در سایر ریه ها بعد از شصت یا هشتاد و دو ساعت باید بردارند
 در بر کشتن بجهت تعافیل در زنده جرحت بمده نشسته و آنکه را که طبیعت تدانک دید
 بجهت سیام فاسد نشده و با ریم دفع شود و اما در صورتی که از جراحی از سیام
 مذکوره با قبل جراحی استعدا و سیام قریب باشد لابد با بطریق بعدی و مده بجا

تا بیل الحانی تسیمم خواهد بود به رقت در این وقت باید جراحی با پنبه آلوده به بنی پوشیده
 اگر علیل قوی و التهاب شدید در آن عضو بهر سید باشد طلا می باید و میتوان بکار داشت
 و الا فلا و بعد از سه چهار روز که ماده خون آلودی از جرحت سیلان باشد لازم است آنکه بهر
 روزه از ما و فخر او را داشته و پنبه را بر دغنی آلوده و بموضع جرح نهاده و بالته به بند
 و چون بخواهند که باین حالت جراحی بر عیلت تسیمم باید باید صمغ حاره یا بصل شمشیر
 نمایند تا تا بیل الحانی که مدتها از آنها مترشح شود و در جوف جراحی برود و بعد از آن
 جوف جرحت بر رویه از لیم ممکن کردید یا با شمع و فیلون جلد را از طرفین جرحت
 متبث و بید یک مقصل سازند تا تسیمم باید و تا هنگامی که مده حاصله از جرحت
 سلامت روزی یک بویست شستن کافی است و هرگاه مده سیال فاسد و متشن باشد
 روزی دو نوبت او را بشویند و آنجا میکه لون جراحی باخته و گند را بایش مترجی
 باشد یا از جرحی لمس خون را و جاری شود باید مقویات از قبیل مطبوخ پوست کینه
 و بید و ج میل فرموده و جراحی را از دهن با سیلقتن و کاج بیالاید و اگر کنار کاه
 جرحت متورم باشد لته را بر دغنی با دام آلوده و بموضع جرح نهاده و صمغ حاره
 مرتبه از بزرگ و کل خطمی و امثال آنها استعمال فرمایند و چون لیم زانندی در جرحت
 بروید باید آنکه قدری سنگ چشم به و مالید و ورقه سربی بروی او بست تا او آید نموده
 تحلیلش دهد و در صورتی که از کثرت مده سیال از جراحی علامت محی دتی و
 ذبول علیل را عارض شود باید مقویات مانند کینه کینه و مطبوخ پوست او و بید و ج
 و تراب کینه میل فرموده و از اغذیه محوم و شیا و سرخ تحلیل ختمیار نموده و در صورت
 امکان علیل را به بیلاق نقل کنند و الا هوای منزل را به روایح طیبیه تعدیل نمایند
 فصل در علاج زبانی در این جراحات مقطوعه و مضروب به شمشیر و امثال او
 و این قسم از جراحات را صلاحیت و اعتقاد تا نیست در تسیمم بطریق قریب و علاج
 آنها علاجی است که عموماً در باب جراحات ذکر رفته مگر چند ملاحظه در باب آنها بیان
 نمودن لازم است از آنکه چون و تری طلا قطع شده باشد فاعده چنانست که به وین

تسیمم

تسیمم باید بر روی آنکه در بعضی باشد که خلاف و تر جرح متورم گردیده و تسیمم او را بتوین انداز
 و هم در حین سوء المزاج میشود که در می شبیه کجراه را و عارض و بغافل یا ملتی گردیده و بهر
 رساند علیل را در صورتی که و تری عرض قطع شده باشد و دستها او مقصص دارد یکدیگر متفرق
 کردند در این حالت اگر جراح بتواند به سیری نموده که دستهای اطراف مقطوعه از و تر یکدیگر
 وصل شده و تسیمم باید فیه و الا خوانه به باین آنها نشتر نموده و بعد از چندی استحکام
 یافته و بدین واسطه تسیمم پذیرد و اگر دو قطعه ای از مجاری یکدیگر نباشد ممکن نیست تسیمم
 باید در این صورت تسیمم حرکت عضو مقطوعه الوتر متعسر است و هم لازم است که عضو را توخا
 دارند که دستهای و تر قریب یکدیگر باشند مانند آنکه اگر جراحی بر فوق ید دارد
 باید دست را منطفف نگاه داشت که دستهای و تر بهم وصل کردند و چون قطعه کبیری از
 عصب عضوی مقطوع شده باشد بر طه تقصص اعضا را بدون و مفلوج کردند و بعد از چندی که عصب
 مقطوع به واسطه یا با واسطه تسیمم پذیرد حرکت عضو معادوت نماید دیگر آنکه هرگاه
 قطعه از جلد عضوی منفصل و آویخته باشد باید آنکه جراح قطعه جلد مذکور را بموضع خود قرار
 دهد بخوبی که کنار دای و هماس باشند با جلد قابل آنکه بخیه نموده و لته را بر داشته بروی او
 بچسبند و تا مده در رخت او جمع گردد و تسیمم پذیرد و اگر با وجود باین می در رخت او
 گرد آید باید آنکه قسمی نمایند که خارج شود در این حال اسلم تسیمم مادیون آن موضع را منفرج سازند
 تا مده بیکت خود دفع شده و مجلس گردد که صورت فساد می عظیم شود و آنجا میکه قطعه از
 عضو بر طه ضربه باطله سقط گردیده باشد مانند انف و اذن و غیره اما چون دیده شده که
 قطعه سقطه در بعضی اوقات تسیمم پذیرفته بنا علی ذلک لازمست که قطعه مذکوره را بر دغنی
 و بموضع خود نهاده و بخیه نموده و بالته آلوده بمشع در فیلون بسته و قسمی نمایند که حرارت غریزیه
 فائده از او معادوت نماید بجهت این مطلب صمغ حاره باید بکار داشت اگر تسیمم فیت
 فیه و الا چون شروع بغافل یا نماید بخیه را کسخته و بر دار بندش
 فصل در جراحات ناخس و او عبارتست از جراحاتی که با آلتی
 نوک دارد و نیز مانند تیره و خنجر و امثال آنها عضوی را در آورده و تقسیم از جراحات تر و خطرات

چون عیقند و اکثر ممکن نیست مشاهده نمودن آلات مجروح و عمیق او قاعده چنان است که با این جراحت
 جمعی شدید می باشد با عرض صحت بسیار خود را عارض دریم در او حاصل شده منجر گردند و اگر جراحت
 ناحیه استقامت بعضی فرو آید و با علی دیگر ترکیب شده محتمل است که بطریق قریب
 پذیرد و اما علاج آنها به قسم است که اطراف جراحت را بابت منضبط خسته تا خون منجمد
 در جوف باقی است دفع شود و اسلم شقوق است که کمتر را مرتبه مرتبه نه نموده و موضع
 مجروح بسته و از مایه بارد بمراته کثیره طلایه نمایند از این اعمال باشد که جراحت مذکوره
 بطریق قریب تسام یا به دیگر چون درم و التهایی شده در موضع مجروح هر سه با اطراف
 زلزلش نبیند و قصد نمایند با استعمال صند عاده طبیعت اعات نمایند تا بدین
 که بطریق دیگر ممکن نیست تسام او در عین آن ماده لازم است که موهب بوده و
 از انضغاط دریم حاصل در او را بمراته دفع سازند بکمتر است که در آن جراحت آکسوده و وسیع
 ساخته با در جانب بعضی موضع مجروح معبری بکشایند تا بهیچ ماده شش جمع نگردد که
 صورت فساد می شود و سیما در صورتی که بواسطه این قسم جراحت و تور بعضی استسجلی
 منضغع گردیده و از حدت درم و قوت تمه و خوف عروض غافرا یا باشد یا از شدت
 و جرح عراض عصبی بطور رسد لازمست که بدون تأمل جراحت مذکوره را شکافته و وسیع
 سازند و هرگاه جراحتی ناخشن بعضی دارد آید قاعده آنست که خنلاج و عدد در عضو
 هر سه باشد و سایر اعراض عصبی بهم باشد که بدین واسطه علیل را که از عارض شود
 و علاج او این است که اولاد و به ضد درم بکار داشته و علاوه بر آنها بعضی از حدت
 مانده افزون و مرفون و مثال آنها میل فرمایند تا زکات قوه حاسه عصبان علیل و اعراض
 مذکوره خفیف شوند و چون جراحتی ناخشن بر شریانی دارد آید و سیلان دم دست و باید که
 جراحت شکافته و وسیع نموده آنکه شریان مجروح به بندند بقواعدیکه قبل مذکور شده و در
 قدیم جراحتی قاعده چنان بود که جمیع جراحت ناخشن را شکافته و وسیع ساختند لیکن
 در آنجا نیکه بعضی اوقات و شخاص مشاهده شد که تقسیم جراحت بطریق قریب تسام
 یا قاعده دست از این عمل کشیده و جراحتی شکافتند و اینکامی که از وجود اعراض مذکوره

گردد

کوشن و جوب برسانید باشد و چون نرسدن یا سنجاقی فرود و در سکا میکه ممکن است و جبهه
 او را انقباض اولی آنکه شکافه با بره فاحش سازند و چون در گوشت ضخیم فرورفته باشد
 کار جراحت مشکل است ولی اتفاقا پیشود که پیدا شود و اولی است که و اگر از آن چون از دو حال
 خارج نیست یا مد فارج خواهد شد بمراته بجای دیگر منتقل شده و بعد از مدت چند سال فارج
 میشود بطوریکه دیده شده است صورتی به پشت فرورفته و از کف یا فارج گردیده بی ادیت
 و همچنین مشاهده شده که سوزن غذا خورده شده بعد از چندین سال از کف یا فارج شده
 است و هرگاه حکم خیال نماید که با جرح الماس را آورد بمراته بطل است
 فصل سادس از باب جراحت منضغع و منضغط این قسم از جراحت که بواسطه
 و تمه و غیره در سجا عضو مجروح بهم میرسد غیر منظم شکل و گاه با شش یا با عروق بعضی
 قطعه کبری از جلد رایل شود و قاعده آنست که از شدت منضغط جرم عصبان متغیر گردیده و
 بدین واسطه از استیامی درود و جرح حش عضو مجروح قلیل و با وجود بر اینکه عرق عظیم قطعه
 با مجروح شده باشد سیلان دم نیز قلیل است اما سرعت و می شدید با وجود عضو
 مؤلف را عارض گردد و می در صورتی که سنج عضو زیاد فاسد شده باشد خوف آنست که
 غافرا یا عارض شود و اما علاج چون این جراحت بطریق قریب تسام نخواهند پذیرفت
 ابداً البته باید آنکه قدری پنبه یا کتان بگرفت و نهاده و از مایه بارد بمراته کثیره طلایه نموده
 و اطراف موضع مجروح را زلزلش نبیند و بعد از حصول آرام و سیلان او باید منضغع نموده
 از نزدیک مغلوبا لیل و جایش معطر و مثال دیگر داشت و بعضی باشد که از شدت
 منضغط اطراف جلد عضوی سالم مانده چنانچه هرگاه چوبیرا بپارچه به پیچند و بعد بجا
 بزنند چوب شکسته و پارچه سالم ماند لیکن آلات واقع در وقت او فاسد و مجروح
 و عروق دقاق او منضغع و دم تحت جلد نشتر نماید در این صورت باید طلای از آب
 و عروق و کافور بکار داشت اگر تحلیل رفت فها و اگر تحلیل نرود مقدار دم منشر شده
 باشد لازم است که آن موضع را شکافته و دم منجمد را دفع نمایند و هرگاه با این جراحت
 شریانی منضغع گردیده باشد بجهت سیلان او باید با فوق انقباض اکثر شریان دفع

در آن موضع را به بند بجهت عقرب تقصیل آن ذکر خواهد شد
 فصل سابع در جراحت کلوله و آنچه که از قوت باروت عضو را بخرج سازد
 اگر چه جراحت کلوله نیز مانند سایر جراحت منضبطه است ولیکن از آنجا که معرفت کلالی
 باحوال او واجب بود ذکر کردیم و این قسم از جراحت را از ابتداء می درود سیلان هم قلیل
 خفیف است کلوله که تند و بقوت بعضوی رسد و بشیرانی برخورد و منضبط سازد
 سیلان دم شدیدی دست دهد همین نحو که کلوله تند شیشه را بر سطح نموده و میگذرد
 بخلاف کلوله که شیشه را می شکند اما چون کلوله کند باشد در حرکت و صدای کلالی نشانی
 دارد و نباید سیلان و خفیف خواهد بود و هر چه حرکت کلوله لطیف باشد نسبی عضو را
 بیش منضبط سازد و قاعده چنانست که کلوله هر عضو که وارد آید از شدت ضربه او عضو
 ارتعاش و مجاورت او در تمام بدن ارتعاش ببرد و نتیجه این است که غشی و خنک
 اعضا و قی و عرق بارد و در او رسد و صغر بعضی عذر بدن عضو موجود با تمام بدن
 با چندی و بسبب کلوله که عضو موجود از کلوله را غرقایا عارض شود دیگر آنکه بعد از ورود
 کلوله در می عظیم در اطراف عضو موجود ببرد و علیل اجمالی در می یا منضبط است
 دهد با ظهور اعراض صلب و سیلان مده و بنا بر مسافت کلوله و سرعت حرکت
 و هم بنا بر غلظت و سخافت عضو مضروب و اعراض لازمه جراحت مختلف است و در اغلب
 بر اساسه غلظت نفخش که از آن می شود است معبر کلوله و مسافت جراحت بود از این توان
 نمود و در صورتی که کلوله بر بعضوی وارد آید و از تمام نسج کالی او گذشته و عظیم
 بدون آنکه آسیبی بدو رسانیده و شکستش سازد و در زنده و از جانب دیگر او خارج
 ماند آنکه در اکثر دیده شده که کلوله بر سینه کسی خورده و از خلف خارج گشته
 و عظام کمر او آسیبی نرسیده و جراحت کلوله خالی از چیزی قسم نخواهد بود یکی آنکه اگر
 کلوله ضعیف القوه باشد و بعضوی رسد خود فرو رود اما از ضربه او اجزای لیسه انضغ
 منضبط گردد بلکه بشه عظم را نیز میسوزاند و دیگر آنکه کلوله بعضوی دارد آمده و در
 همان موضع بماند و دیگر آنکه کلوله بعضوی برخورد و از جانب دیگر او بر بدن رود

تقصیر

حقیقت آنست که
 جراحت کلوله را
 در بعضی مواضع
 از عظم کمر
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ریه
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم کتف
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ساق
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ران
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم پستان
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم کمر
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ریه
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم کتف
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ساق
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم ران
 می گذرانند
 و در بعضی مواضع
 از عظم پستان
 می گذرانند

الانقباض

الانقباض فخرج او عظم از مدخل او باشد از جهت آنکه قوت وحدت کلوله در عین خسرو ج
 اقل میباشد و یا آنکه کلوله عضورا بالمره ببرد و در اغلب میشود که ششی بواسطه کلوله بعضو
 فرو رود و در او باقی ماند مانند کهنه که کلوله را در او پیچیده اند یا قطعه از لباس
 دیار براده از عظم انموضع که میسوزد دیده باشد و اما انداز جراحت کلوله مختلف است در
 صورتیکه از حد مده کلوله که کلوله عضو را فاسد و یا آنکه عضو را ببرد و یکی از کتف
 باشد یا التماس عظمی هر سینه و مده کشیری از او سیلان نماید و یا آنکه عضو موجود را
 غرقایا عارض شود خطر و در آنست دارد و میسوزد که در عین درود کلوله از ضربه
 او اعضا متحرک گردیده و صاحب خود را فی الفور بهلاکت رساند و اما علاج در صورتیکه
 بواسطه کلوله آلات عضو را فاسد گردیده باشد باید قطع نمود و الا با عانت است
 باین مسافت جراحت و وجود ششی خارجی باقی در او را امتحان نمایند اگر کلوله با چیز
 دیگر در جراحت باقی باشد با این برپوش آورند و در بعضی اوقات کثورن جراحت
 کلوله لازم میشود از آن جمله جوششی خارجی در جراحت باقی ماند یا از ضربه قطعه عظمی
 گردیده و بهیچ وجه خروج آن ممکن نباشد تا بی حس گشتن نسج یعنی او را عضو موجود را
 منضبط یا متمد گردیده باشد از خوف عارض غرقایا باید جراحت را کشود تا آنست که
 صورتیکه عرقی موجود منضبط شده باشد بجهت سیلان دم جراحت را کشاید تا
 در عین مده آمدن اگر بواسطه مالمی ریم جرس گردیده باشد از خوف آنکه سبب امور
 فساد می شود جراحت را کشاید و بعد از آنکه ششی خارجی و سیلان دم تعقیب کند
 جراحت نهاده و فادش نماید و از ماء بارد و زرد در محلول در آب و سفید
 و صابون مکرر موقوف ملاحظه کنند و موافق شدت و خفت التهاب و مزاج علیل عمل
 نموده و او را به مناسبت بدو بخوراند و از آنجا که جراحت مایل بمده نشستن باشد بجهت
 اعانت او و مده عاده بالفعل بکار دارند و نباید در بعضی اوقات مده که بواسطه کلوله
 عرقی منضبط موجود شود و در شدت احتراق مده غلیظی در موضع موجود متکون شود و عرق
 منضبط را مسدود و خسته و مانع آید سیلان را و این در عین آنست که مده در دلیل و باید در دفع

دانیاسیلان دم بهر سردی درین حال بجهت علاج باید آنکه آب سرد استعمال نموده و عرق عظیم
 مافوق موضع مجروح را منضبط سازند و با سایر تدابیری که قبل بجهت تسکین دگر نموده ایم
 عمل نموده تا سید سیکان گردد و بر معالجات لازم است که ملاحظه بنماید عمل نموده و با سید
 مقویات قوای بدنیه او را حفظ و هوای منزل را بر دایج طیبه قبل نماید و بستن مایه
 بهار از فضول پاک سازد و بعضی اوقات باشد که از جراحی جید ماده روی و معقبات
 یا آنکه ماده جید رسد و سبب چند چیز است یکی فساد حال موده و متلاطم آنها
 از فضول دیگر سید کثافتی یا قیاسی خارجی یا قطعه غلیظی در دهان جراحت در این صورت
 باید بهار از فضول غالی و جراحی را در کثافت پاک شد و موضع مجروح را شفافه و شوی
 خارجی قوی در او بریزند و با اوردن جراحت بعیدش سازند و هرگاه جراحت
 کلوله با کثرت موضع مجروح و کثرت است اگر چه صعب العلاج است لیکن همیشه جراح باید
 در قطع عضو موقوف سیماد صورتی که سبب علاج جمع و کمال را فرستد باشد بجهت علاج باید
 آنکه موضع مجروح را کثرت و قطعه کسور و عظم را بریدن آورده و بکوتاهی صاحب بجهت
 عضو را بسته و موضع کسور را تحت بند نمایند بنقص می شود که در مدت چند ماه جراحت
 و عظم کسور سیمایافته علیل نجات یابد و اگر عین استیام بعدی مده از جراحت سیمال
 باشد که قوای بدنیه ضعیف و قریب بطلان است و سبب باید بدون عامل عضو علیل قطع نموده
 که جراحت کلوله طول کشیده و بقعه دم کشیری از او جاری شود و این سیمال غلب اند
 عروق شعریه و سبب ضعیف بدن قوی و روانت مزاج و ممکن در هوای کثیف و محاذ
 مجروح است چنان برض غافرا یا مجروحه و مطبقه و سایر امراض عفونی علاج باید اولاً
 سبب نموده وادویه مقویه مانند جوهر ککه کته و جوشان مصلیه و امثال آنها استعمال
 و ازادویه متخفیه طایفیات بکار دارند اگر سید سیکان گردید فیهام باید با آب آهسته
 عطر را که در بعضی اوقات قطع عضو مجروح از کلوله و جویب سیمال از ان جمله
 عضو می باشد و ساقط یا آلات لیسنه و صلیبه زیاد منضبط گردیده باشد از خون غافرا یا
 باید بدون عامل قطع نموده دیگر صورتی که جراحت عظیم از شر این آورده و عصب

فاسد یا بواسطه کلوله ضعیف القوه عظمی کمبود خورد کرد و اگر چه فساد می در هر حال بهر سبب
 باشد باید عضو را قطع نمود دیگر اگر کلوله بر مفضل بر خورد و کمبودش از سیمال مفضل
 یا آنکه کلوله در جوف مفضل مرکز گردیده باشد باید عضو موقوف را قطع نمود و بهترین اوقات
 بجهت قطع نمودن عضو قبل از آن است که جراحت بسته باشد یعنی در ۲۴ ساعت از
 اول ورود کلوله باید عمل نمود زیرا که اگر در عین در جوب از قطع عضو اقبال و زنده ها
 از چند قسم ضرر بخورد بود یکی آنکه عضو مجروح غافرا یا کیر یا آنکه علیل را اعراض عصبیه
 مانند کزاز و عرشه و خملاج و امثال آنها عارض شود یا آنکه از جراحت بعدی مده جاری گردد
 که قوای بدنیه را ضعیف ساخته و عی دق دست و پد یا سیکان دمی است که
 سدا و حال باشد فصل نهم در بیان جراحت
 سیمایا و علامات و علاج آنها و این قسم از جراحت چنان بسته که بدون تفرق
 عظم سیمایا عضو نفوذ نموده و مورت فساد گردد و از این قبیل است جراحتی که از میت
 عین تشریح باز نمود و عقارب ریل و مار و سگ دیوانه بگی وارد آید یا سبب
 سمیت بدین نحو است که بعضی اوقات عین تشریح اشتباهی که از او با یرض
 مجروح و مطبقه و سایر امراض عفونی مرده شده و همچنین لعش را بر می شود که جراحتی بر عضوی از
 عامل وارد آید بواسطه آنکه با او عضوی از شخص را تشریح نمایند و در سمیت
 عضو مجروح متفرق گردد با جوی صعب و تنفخ او عیه جذابه تقبی که خلی سرخ از موضع مجروح بر آید
 تا شب که جذابه قریب بدو عکسدا اعراض عصبیه و عی اضطرابی یا عفونی عارض شود
 اما علاج او این است که جراحت را چند نوبت بسته و در صورت امکان بکند بدو
 خوف چون از تمکین سیمی روی بخوابد داد و بعد از ظهور درم بدون عامل زلو باطرا
 آن موضع نشانیده وادویه ضد درم بکار دارند و هرگاه در موضع مجروح طی ممکن از مده
 عارض شود سمیت او را بکشایند و اما زنبور را سمیت قبل و از لسع او و جوع و آهنگ
 در عضو بهر سیماد صورتی که کیش او در موضع مسوع باقی مانده باشد و دیده شده
 که طفلی شیر خوار از لسع زنبور تلف شده است علاج او این است که با انبری

بیرون آورده و از برگ تنباکوی مغفول در عرق برندی ضمادی ترتیب نموده و بموضع ملوث
 نهند و اگر بواسطه سسم او ورمی در موضع علت بر سسم باید بارسال علق و موضع مجبه
 صورت او را سسکه ساخته و با دهن زیتون اطراف موضع ملوث را تیرنج فرموده و هرگاه
 موضع طفل پشه مطبوخی از سنبل الطیب ترتیب داده بد و بنوشانند و بستگی
 کافور و مشک با صمغ عربی قوامی او را حفظ فرمایند و سسم شرب جوهر یا خود از گلاب
 و شامخ کوزن و امونیاک صاحبان این علت را نافع است و سسم در ابتدا امونیاک که جوهر
 نوش در است وقتی که حاضر باشد مالیدن موضع ملوث را با او بهترین علاج خواهد بود
 و علاج کردن کرم خاکی و سایر حشرات قلیل الیمته را بدین دستور باید نمود و اما
 لسع از عقارب و کبک در ابتدا با روغن خفیف و بتدریج بیغزاید و از حدت سسم آنها
 عروق و شکبهای جذابه منورم شده و عضو مؤلف امانی بر سسکه و در مجرای شش
 اسوداللون ظاهر علیل با ضیق النفس عارض گردد و با صفر نفی و بردن اعضا و فوق
 و نهان دمی سهال شدید و بالاخره در حالت اغما افتاده کامی ملک شود و اما
 علاج باید اولاً با فوق عضو گردیده شده را محکم بسته و موضع ملوث را صلیب و از شکافته
 و با دکش نموده و قدری امونیاک در او ریخته یا از قلیاب لال انمو صغیر آلوده
 و اطرافش را با دهن زیتون تیرنج نمایند و هم شرب امونیاک بهترین تر باقیست و اگر
 و اگر ورمی شدید در محل شش بر سسکه باشد لازمست که بارسال علق و شرط
 صورت او را سسکه ساخت و در صورتی که علیل را ضعف عارض شود و بنفص صفر
 بر سسکه باید او را به مقویه و منغشه مانند چای و سنبل الطیب و سنکا و مشک و کافور
 و افیون و اشغال آنها استعمال نمود و سسم شرب مطبوخ نباتی موسوم به سریش یا
 صاحبان این علت را نافع است و اما طه از گردیدن او علامات مرض عفونی مایه نوبه
 شکل عارض شود بخصوص در چند بزرگ و مدد در شش میانه تر است که دارد که بواسطه
 عروق و شکبهای جذابه منستفج گردد و با کسالت اعضا و ضعف و علیل راحت
 چنانی نوبه بر سسکه باشد که شکبهای جذابه موضع ملوث و عده بریم نشسته منفر

گردید

کردند و اما علاج البعینه چنانست که در اندام عقرب بیان نموده ایم باید آنکه جوهر نوش
 همراه داشته باشد و بعد از گردیدن شدن قدری بموضع ملوث و عده بماند که نقصانی را
 نخواهد داد و چون مدتی از گردیدن گذشته باشد مالیدن دهن زیتون و امونیاک
 محلول که عبارت از جوهر نوش در است نافع هم شرب آنهاست و چون علق
 منفصلی مانند نوبه عارض شود اگر چه نوبت نیست لیکن از جوهر که نفعی حاصل
 خواهد و اما اندام و جرحت او باید است که ما را از چند صنف است بعضی از آنها
 سمیت جدی است که در سه روز و این را از زرد رنگ علی و ناب جوشت که در خلف
 هر یک فخذ ممسک از طوبت واقع است و از طوبت نیست کرم طبعه دیگر از مارا بر است
 نیست و از زدنشان آسیبی جرح است روی نهد و بعضی از اشخاص سمیت مار چندان
 اثری ننماید بواسطه آنکه بدن آنها استعداد ندارد قبول سمیت او را مانند آنکه اگر کسی بکشد
 از مار طبعه که در دجیات باید باز دیگر اگر ماری او را بکشد سمیت او را در این شخص با هیچ اثر نمی
 یابد بسیار کم و همچنین کسی که بکشد سمیت او را در این شخص با هیچ اثر نمی
 اصلا در این دو مرحله اگر حکمت متدیان است و افیون ایشان و هم باید دهنست که در
 رطوبتی متولد میگردد که کیفیت بعضی از سسم فاسد سیناید بخوبی که سبب تر نتوانند نمود
 بدان آنکه اگر کسی بزدن بکشد سمیت او را فخذ نموده و بخورد و هیچ جرمی اثر نکرد
 بخلاف آنکه اگر کسی با سسکه سسم کور و فرد بر نهد بعضی احوال و چنان شد که از مار
 گردیده شده و همچنین سسم دیگر موسوم بکرازه که اولی است سسی شرب و شغال او
 بدن سح از ندارد و اما اگر عسکر کند ماز او را به ششی آلوده و با او عضو را جرح زدن فی الفور
 بهلاکت رساند او را و از همین جهت که یکیدن زخم مار سسکه شش زدن او را از گردیدن
 مار و جرحی طبعه بر سسکه در حوالی موضع ملوث خون ترشح و مجد کرده و بعد از یکد و عت
 خطی سرح از آن موضع بر آید تا شکبهای جذابه قریب بدو در این حال قلب و سایر اعضا
 ضعیف و نفوس متواتر گردیده و لون جلد صفرت بر سسکه ببارد و بعضی
 الدم و سهال الدم و علیل را غشی درست داده و بالاخره قلب از حرکت باز آید

عارض شود

در سه روز بعد از زدن سسکه
 در سه روز بعد از زدن سسکه

و اطفاء حرارت غریزی او کرده بمیرد اما علاج باید اول موضع ملوع را از پشم وادویه
استعمال نمایند که باطل سازد کیفیت و اثر او را تا فی انکه تریاق مخصوصی که بجهت شتم
معین نموده اند میل فرمایند تا آنکه قسمی نمایند که قوای علیل به تحلیل نرود و
از ضعف بدن هلاک نشود و لهذا باید اول موضع ملوع ببل نموده و با عضو رانسته
تکیده و مافوق او را با پنبه ای محکم بسته و با کش قوی نموده و انقباض را با دهن
ترنج فرمایند تا آنکه موضع ملوع را از قیاب جوهر زنده یا جوهر شوره و نمک که کرد
بیا لایند تا اثر هم باطل شود و انجا میگوید که در سلاطینات مملوک که در سلاطینات
انقباض را قطع نمایند و بهترین تریاق اولین است که بکیرند قسم الفار یک کدوم و با قند سیاه
شش قسمت نموده بر چهار ساعت یکی از او را میل فرمایند و بجهت تقویت بدن قوی
باید ادویه شسته استعمال نمود مانند مشک و کافور و مطبوخ سنبل الطیب و فلفل و خربزه
و انشال آنها و اما کلب کلب حیواناتی که از جنس افعال باشند از گردن آنها مرصع شود
صلی را عارض شود یعنی خوف از آب و آب و مایع و سمیت این حیوانات در لعاب آن
انها است که بعد از گردن و جروح نمودن از حصین لعاب مملوک که جراحات عظیمی
روی دهد و ملاک شمس از و سپین آن در حالت غلبه حرط و رطوبت و در انش
سمیت بر سبب از جوهریکه اگر کسی را بکوزد باشد که هلاک نماید و اگر کسی از سنگ دیوانه گرد
شده باشد و در حالت جنون دیگر را بکوزد سمیت این شخص را در پیشانی سرایت نموده
و از گردن سنگ دیوانه صبیحه جنون و اعراض را می جوهریکه بکوزد بکشد مستعدین
سمیت است نماید و غیر مستعدین را نماید و بکوزد آنکه اگر کسی عارف باشد بدینکه از گردن
سنگ دیوانه چه عارض میسرید بسته بعد از گردن جنون عارض او خواهد شد
بخلاف اگر کسی عارف نباشد و مستعد نیست که سمیت بر او اثر نموده و بجای
اما اعراض جنون سنگ دیوانه بر قسم است و چون بر یکم از حقه حفظ صحت است
که عالم بر علامات جنون سنگ دیوانه باشد و بعضی از او را در اینها می نامیم
قسمی آنکه زیاد شرارت و سمیت دارد و علامات او اینست که اولاً چون روز مغرب گردد

در زبان

در زبان بشما بارده و مسسم شبانی که قابل تقدیر نیستند چون پشم و پنبه و انشال آنها
بجای دهد و از حرکت دهان آنکه نمکی از هوا بر باید و در یک موضع قرار نگیرد و بهشت که از آب
مخوف باشد و مالک خود را از غیر تشخیص ندهد و بعد از چند روز که بدین منوال گذشت
حرمت شدید از چشمهایش ظاهر در زبان را آویخته دارد و دانه نش خشک و مرطوب
بدن بر خیزد و لاغر گردد و ذنب خود را در پایین پای نگاه داشته به ستقامت بود
تا آنکه خسته و عضایش مستحج گردیده و بمیرد و قاعده آنستکه از اول دیوانگی تا ده
روز و بعضی تا سه روز پیش زنده نماند و قسم فی از سنگ دیوانه آنستکه شرارت ندارد
و حرکت زیاد نمی نماید لیکن اگر کسی را بکوزد همان حالات بهر سبب که قسم سابق را
و علامات و بعینه نماند و قسم اول است الا آنکه در اینجا سنگ ارام و حرکت در بی نهایت
دلب فردین را آویخته دارد و نباید دانست که سنگ در هوای زیاد گرم یا سرد دیوانه
می شود و بخصوص سگان خانه کی قسم اگر سبب از جماعت یا شرب آب ممانعت نمایند
از فرط عطش دیوانه خواهد شد و اما چون سنگی دیوانه کسیر بکوزد از شدت جراحات او
تکلم مستلزم نمود که این سنگ دیوانه بوده یا نبوده و مسسم باشد که جراحات او مانند سیاه
جراحات زود التیام نیاید و از او رطوبتی کال سیلان یابد و جراحات بقصره الکالی
مبدل گردد علی ای تقدیر بعد از هفت یا چهارده یا بیست و یک یا بیست و هفت یا چهل روز
بعد از گردن شدن موضع التیام یافته و جراحات را هکته شدید بهر سبب و متفرج گردد
و اگر التیام نیافته زیاد شود و در این حال علیل را علامات موضعی عمومی عارض خواهد
گردید از علامات موضعی این است که موضع جروح خواه التیام یافته و خواه نه متفرج
گردد با وجع صعب حرکت عضلات عضو مؤلف و تورم عروق جذبه و اقع در او و اما
علامات عمومی لازمه این علت است هم مفرط کمال غشها و صداع شدید که از ضو
و صورت اشتداد یابد با که ورت عین و مالخو نیا و در خواب چیزهای غریب و صورت آن
سکر ادیده بی حجاب خیره زده و آه سر دگشت و چون چند روزی بدین منوال گذشت
حرمت شدید در چشمهایش بهر سبب عارض نشی بر او را عارض شود و سیما عضلات

نیزد اما سمیت یافته و اورث
جنون گردد و مکرر جراحات التیام

و بعضی ایشان را خدر سازد مانند آنکه مشاهد نموده ایم که بعضی جان مرض کزاز در هر دو
 بیت کندی افزون داده اند و علامت سستی از او بطور رسیده و بعضی از حکماء استیمن
 بمقدار عظیم نیز استعمال نموده اند
باب ثانی از عقایلی ناله
 در ذکر جراحات وارده بر اعضا فردا با سبب علامات و معالجات آنها و ستم است
 بر بازو فصل اول در جراحات وارده بر سس و آلات و مانند سحاق و حبسه
 و آتین و نفس داغ و اما جراحات سحاق یعنی جلد کاسه سروان جراحت هرگاه باقی
 دیگر ترکیب نباشد مانند سایر جراحات بمعالجات لایق التیام پذیرد بدین قسم که موی
 اطرافش را ترشیده و بکجه نمایند یا آنکه تفستیک او را بپوشند و نته را با آب سرد
 و مکرر بموضع نهند مباد که داغ متورم شود و سس باید عییل را چند نوبت سسلی بنوشد
 و چمن حصول مده و سیلان او جراحه اشباع و اخیلون بنوشانند و در استعمال اضمده
 جترار جویند از خوف صبحان و میل دم بدماغ و آنجا نیکه شراب صندغ یا جبهه یا قحدر
 شده باشد از سس و اضمده سیلان دم خواهد شد و هرگاه اضمده عاده بموضع جروح
 نهند یا به غیر لایق کار دارند یا با این جراحت متعالی در مده و اما باشد در نظر
 جراحت انفخ و حرمتی عارض و برودتجا در نماید کجه و وجه بنوعی که شباهت داشته باشد
 بدم حمره در این صورت جراحت بقرصه مبدل گردیده و حنی عارض شود با صندغ و بدین
 و غشیان و لیثه غس و علاج او اینست که فصد نموده و بموضع علت زدنش اند و بواسطه
 مسهلالت مرتبه از سس و حنی و ناله آنها مده و اما را از فصول خالی سخته
 و جراحه از کشافات و سس عاده پاک دارند و در صورتی که با نیره و تر عریض رس
 و این دم عارض و بواسطه مده و احواض مذکوره بر سسیده باشد باید آنکه بدون تحمل جترار
 بکشایند و ماده را بمستعمل استفرغات مرض نمایند با سایر معالجاتی که ذکر نموده ایم
 و آنجا نیکه که از ضربه بقطعه از سسحاق از موضع خود برداشته شده باشد بکجه علاج اول
 که آن موضع را بشسته و با شمع و اخیلون بسته و بروی التفستیک نهاده و با ناله حنی لایق
 او را به بندند تا ساقط گردد و اگر این قطعه از سسحاق بواسطه ضربه بایده منصفان شده باشد

الک

غلب بطریق قرینت سیام پذیرد و لیکن چون التیام نیاید و در تحت اوده جمع شود باید بدون
 انموضع را کسوده و ماده مجلبه را دفع نمود مباد از بقای او آسیبی روی دهد و بعضی پیشه
 که بقطعه از سسحاق بالبره ساقط و استخوان انموضع برهنه مانده و فاسد گردیده زایل شود
 در محل او لحم برودید و اصلاح پذیرد و باشد که از ضربه و صغطه او در جلد رس و اما میل عارض
 شوند مانند و این را میل یا اما سسی باشند بمقتل از رطوبت و یا از دم اگر رطوبی باشند
 بکجه تحلیل آنها باید و رقا از سس ترتیب داده و بروی آنها بسته و از مایه بارد طلا و ناله
 و اگر دم باشد باید آنکه شکافته دم مترشح نمجد در جوف آنها را دفع نمود و اما جراحات
 و جراحی که با و قطعه از جسمه کسور گردیده باشد این نیز خالی از دو قسم نخواهد بود
 یا چنان است که قطعه کسور در موضع خود برقرار ماند و یا آنکه فرو نشیند و اما در صورت
 که ضربه غشی بر ججه وارد آید بنا بقاعده عروق دمی که از ام الغلیظ بد و پیوسته اند منصف
 و از ترشح و انصب دم در این موضع از آتین التیامیت و بدین واسطه بعد از چند روز
 صلیع شدیدی عارض گردد و سس مغرط و ثقل سس و ثقل و اضطراب عظیم غشیان و
 سرعت و صلابت بنفص ناجی و بدین و بعد از این اعراض عرق بارد و طاهر و ناله عارض
 و هلاک گرداند او را و اما علاج او این است که ضد التهاب عمل نمایند از فصد مکرر
 و از رسال علی موضع علت و خلف اذن و طلا و آب سرد بمستعمل مسهلالت مده را
 و با معالسی دهند و بعد از آنکه از ظهور بعضی علامات استنباط نمودند که در موضع متورم
 مده حاصل شده لازمست که بمستعمل منضجات و محلات ماده را تحلیل دهند و اگر
 تحلیل نرود و بیم هلاک باشد بقول بعضی از استادان این فن جایز نیست که آن موضع
 از کاسه سر را سراج نموده دریم بوجود در او را خارج سازند لیکن از اعمال خطیر و در اکثر
 نیست و از آنجا نیکه حکیم میداند شرارت پنهانی و فساد این علت را که گاه کامی برک
 فحاجه یا حیثون بقتله مبدل گردد لهذا در صورت عارض یکی از اعراض مذکوره که ظاهر
 شود از خوف عارض این دم و فساد او باید بخلف عنق خوش کشیده یا کی نموده و بدین
 مدید ماده را دفع و منصرف سازند و اما جراحی که از اضمده عادی ججه دارد شود

جمعه را منقسم نموده اند و هر که از ضربه وارد آید
 یا زرا لمر قطع یا نیکه ججه ضعیف

شده از دو حال خارج نخواهد بود اگر چه آنچه آلت مذکوره تند و برنده باشد استخوان را قطع نماید
بدون اینکه براده یا جزئی از استخوان را بیل گرفته و دماغ را منصفه سازد در این حالت کجبه
علاج باید ادویه و تدابیر واقع و هم بخار و هشت از طلا، بیا، بار و وار سال علی با طراف
موضع مجروح و جراح را با تفکیک پوششند تا التیام پذیرد و اما اگر آلت قطع و ضربه
کند باشد می شود که چند براده از عظم مجروح دماغ فرو نشیند یا آنکه از ظاهر ضربه عظم
ظاهر نباشد لیکن طبقه داخلی جسمه کمور گردیده و دماغ را منصفه سازد در این حال باید که
معالج از عمل تره یا سیدن که عنقریب ذکر میشود براده عظم کمور در موضع مجروح که از عروق منصفه
موضع مجروح ترشح گردیده خارج ساخته و با تفکیک جراح را پوشیده و تدابیر مذکوره
بخار دارند تا التیام پذیرد و باشد که ضربه بجسمه وارد آید و قاعده دماغ کمور گردد اگر
چه علاج پذیر نیست ولی مع هذا معرفت اولان هم هست بواسطه آنکه در این حالت با وجود
بر اینکه از ظاهر برده ضربه آسیبی نمایان نیست ولی از کسوف عده جسمه علیل است
در شکم باشد که موضع از جسمه کمور و کناری از آن موضع مرکب شده یکدیگر را این
صورت قطع مرکب دماغ را منصفه سازد و بدین واسطه عوارضات دماغی
بظهور رسد بجهت علاج باید قطعه کمور را با عانت از ده دور از پس زایل ساخت و اما
جراحات امین باید دقت که اگر از آلتی قطع یا قطعه از عظم کمور ضربه بر پس
وارد آید خالی از چند حالت نخواهد بود یا چنانست که آلت منقطع و یا منصفه سازد
و یا از شدت ضربه از جسمه جدا گردند و یا متورم شوند و یا از انصداع عروق و بعضا
آنها انفجاریا بد و یا آنکه بریم نشسته و منفجر گردد چون جراحی وارد آید جرم دماغ را
و متورم سازد و زیاد خطرناک است و اما علاج باید اول با عانت انبرشی است
خارج را خواهد جرم دماغ بمشند و خواه در این برون آورد و اگر ممکن نکرده اند
که جراح را بکشانند یا با آره مدور از جسمه را منقب نموده و شوی خارجی را از ایل
در فاند طلایی بخار داشته و موضع مجروح را با تفکیک کمی پوشیده و ادویه
معدوم استعمال نمایند و هرگاه جراح بریم نشیند باید قسمی نمود که قاعده

بخار

بخار نرود و ماد مجتنب نمایند و در این حالت از استعمال محففات مانند آب کبک و مطبوخ نرود
در مکی محلول عرق جراح را نفی کلی حاصل گردد و در بعضی دیده شده که کلور بر پس دارد
در جرم دماغ سالها توقف نموده بدون آنکه صاحب خود را هلاک سازد یا آسیبی از او
دهد لیکن اغلب مورت حتی نسیان و لیغزش و صرع و تشنج خواهد کردید
فصل ثانی در سراسم و ادعبارت از تورم جرم دماغ یا غشیه او
و سبب این علت صدایت است که جسمه را وارد آید از ضربه و سقوطه و ضربه و انشال آنها
مانند آنکه اگر از ضربه قطعه از عظم بر پس کمور و فرو نشیند دماغ و غشیه او را متلاطم و متورم
سازد و همچنین در هنگامی که ماده در بطون دماغ موجود شود یا از شدت ضربه و انصداع
عروق و انصباب دم ضربه دماغ و امین واقع و مورت تورم ایشان گردد علی ای تقدیر
این تورم با عا و یا نرمن است و لیغزش به تحلیل گردد اما غالباً طبیعت ماده مورت را
بریم تبدیل کرده و منفجر خواهد نمود اما درم ها و امین را علامات این است که بعد از ضربه
با وجود یکی از سبب مذکوره بچهار پنج روز صاعی شده و عیله عارض شود با حرارت طبعی
و دبیان و صغریض با صلابت و متورم او و لایبی بسیار سریع و لایبی بسیار بطی گردد و انبرش
اعضا و تجزیه آنها و اگر درم مذکور منفجر شود صاحب او را اختلاجی در عضلات بر سر و بعض
صغیر غیر مستطیم گردد با التیام حقه و فی نفس عارض شده علیل را هلاک سازد و اما
درم نرمن امین را قاعده چنانست که دوالی چهار هفته بعد از ضربه عارض شود با صدا ع و علامت
است لایمعه و سرعت نبض بسیار باشد که در سحاق محاذی بموضع علت درمی آید
و متفرج شود و اما درم حاد جرم دماغ لبرعت بعد از ضربه عارض شود با صدا ع شدیدی قلیق
و اضطراب و برطرف و برافروختن بشره و حرارت عینین و حرارت طبعی و متلاطم نبض
و صلابت او و اختلاج عضلات تشنج و هذر بودن اعضا و دبیان و بعد از انقباض عیله انبرش
و انما درست داده و هلاک شود و اما درم نرمن دماغ را علامات یکدی خفیف و خفیف است
که بصورت تشنج توان داد تا آنکه صدا ع عارض شود و عضلات بدن ترنجی شوند و بعد از
انقباض اعراض مذکور ظهور رسیده و صاحب خود را هلاک سازد و اما اندر درم امین مختلف

نیز است و اگر تحلیلی

و بسته باز است اگر سرعت تحلیل زود و مده از او حاصل شود و خروج او ممکن نباشد
 البته علل را با یک سبب سازد و سببین درم جرم دماغ زیاد و دردی و خطرناک است اما
 علاج باید آنکه بعد از زود صدقه بر سرش از خوف عروق سرسام بسبب است و در وقت
 دافعه درم بخار دارد از صد بکر بود و قیغال یا دواج ظاهر و ارسال علی و سیمار
 طلای یا مشعشع بمرات کثیره نفعی کلی موجود است صفت شلج مصنوعی بکشد شوره چای
 جزو نشاء در دوزخ سرکه تند دوازده جزو آب صد و بیست جزو اجزا در مخلوط و نه را
 بد و آلوده مکرر بر سرش بپاشند و از این بابت است که جراحت بعد از زورم آلات ظاهر
 رس بدون تامل ضد می نمایند از خوف آنکه مبادا درم با بین یا دماغ سرایت نماید
 و اما در صورتیکه دماغ یا غشیه او متورم کردند معالجات مذکوره را مکرر نمایند و اگر
 تحلیل نماید شاید درم تحلیل رود اما اگر با وجود بر این تدابیر علت تخفیف نیابد
 دالت بر آنکه طبیعت ماده مورد را بریم مبدل ساخته یا خواهد ساخت در این حالت
 آخرین علاج آنست که با زهره مدرار رس موصی از حبه را مشقوب نموده و به یمنی خارجی
 که در جوف است بیرون آرند و از هم گذشته باید مده را و اما در از فضل
 دارند لیکن با وجود بر همه این مایه در علاج و بری مراد اینست و باشد که مده
 بر سرش وارد آید مانند سیلی و مورث سرسام شود چنانکه در بعضی جراحت از ظاهر جوفی
 نماید ولیکن مینماید که در بطن زیاد فاسد باشد

فصل ثانی
 از زهره بانی در انقباض دماغ چون در بعضی اوقات ضربه وارده بر سرش مورث
 سرسام و از عجاج و انقباض دماغ میگردد بنا علی آنکه در اینجا ذکر آنها نموده ایم و بسیار
 که در بعضی اوقات مینماید که بواسطه ضربه عروق رس مفسد و دم از آنها جوف رس
 منصب شود یا بری در او موجود و مکتبیس اندیشی خارجی بدو داخل گردیده و دماغ را
 منقبض ساخته مورث فساد عظیم گردد در صورت خفت این مرض اعراض او این
 که علل را صداع و در او رسد عارض شود با همسین کوش و ساع صدقه و بطو حرکات
 یا بسته فاد اعضا در خند بودن آنها و نسیان چون قدری علت عظیم باشد علاو

این

بر این علامات علل را لیس بر سر با نفس و خراخرو خیره کی چشم تشنج عضلات
 نبض اندفاع بول و بر از بدون اراده و اکثر با خیالت از انف و اذن دم سیلان
 و سکه صاحب و را عارض گردیده و هلاک شود و اما آنکه مختلف است در صورت
 امکان از آنکه سبب بیکو و اللت دارد مانند آنکه اگر سبب انقباض دماغ نصیب دمی باشد
 که توان او را تحلیل بر بجات یابد و الا هلاک شود البته و اما علاج بعد از آنکه سبب
 طور است که در سرسام بیان نموده ایم

فصل ثالث
 در از عجاج دماغ بدانکه در بعضی اوقات از ضربه و سقوط عظیم دماغ منزعج و بدین واسطه
 صاحب خود را هلاک سازد بدون اینکه موضعی از مواضع رس مکتور گردیده باشد علامت
 او این است که شخص مضروب بغتة میفتد و چندی پس بیهوش میگردد و تمام اعمال او باطل
 در صورتیکه از عجاج خفیف باشد زود بهوش آید و صداع مراد را عارض شود با سر
 اعضا و خدر بودن آنها و طنین کوش و میل بخواب لیکن در صورت شدت علل
 مدت یک ساعت پس آنکه میفتد و بشه مگردد با برد اطراف و صغر نبض و کلیت
 نفس بعد از بهوش آمدن در زبان بکشتی بهر ساند لیکن اعراض مذکوره زایل شوند
 و اگر این حالت اشد باشد در همان انجا بماند و بهوش نیاید ابد و قاعده چنانست
 که بعد از از عجاج عظیم قی صفراوی درست دهد و اما فرق مابین از عجاج دماغ و انقباض
 او بدین نحو باید نموده که در از عجاج دماغ علل زود بهوش آید با برد اطراف و کلیت
 نفس بخلاف در انقباض او که مدتی در حالت کتت باقی ماند با خراخرو نفس
 که این هر دو علت در یکی موجود باشد و اما سبب این علت اغلب ضربه است که عارض
 جمجمه وارد آید مانند آنکه از سیلی باشد که این حالت درست دهد و هم مینماید که بیهوش
 حرکت عنسیفه تمام بدن دماغ منزعج شود مانند افتادن از مکانی مرتفع و اما
 اندام موافق شدت خفت و دهن و قنات او طویل و مورث وجود بعضی از امراض
 و مانی و معدنی مانند جوق و رعوت و نسیان و موی الهضم و مراق و امثال آنها
 میگرد اما علاج باید در حالت انجا بهوشی باستمال ادویه منقشه و محرکه قوای

اورا بهیچان و ثوران آورد و بجهت این مطلب تشنگی و قشوع و جگر زشت در ناف و مالید
 او بر صدقین و حقنه از فلان و از مشروبات شراب و چای میل نمایند و آنجا نیکو بعد
 از هوش آمدن خوف از نورم دماغ باشد باید از استعمال ادویه و تدبیر واقعه ورم
 بطوریکه در سرسام ذکر نموده ایم بهیچ وجه تغافل نورزند بلکه بر سر و نواحی او شمع
 زردارنج بپسندازند و بعد از خود صحت باید از تقب و حرکات بدنی و نفسانی تا چند
 احتراز جویند و آنجا نیکو بعد از انزعاج دماغ ستر خانی و فلی در بدن بر سریده باشد
 بجهت علاج او باید کترب کچول و جگر او مبارک است نموده و عصاره می کلیل را هم روز
 بخورف الماسس ندارند تا بحالت صحت معادوت نماید و هرگاه بعد از این حالت صداع
 دائمی علیل را عارض شده باشد انفع جمیع معالجات خوش نهاد نیست بهیچ کرون
 و بر صاحبان بر علت و طبیعت که بعد از رفع مرض همیشه طبعه را با لیت نکند و
 و از شراب چای و قهوه بکلی احتراز جویند
فصل خامس
 از باب ثانی در طریق معالجه پاناسیون و ادعبارت است از راه نمودن بکومض که
 از آن شئی خارجی که امین یا نفس دماغ را منضط میسازد و بدانکه متعقد بین این محل را
 زیاد می نمودند و بسیاری تلف می شدند و لیکن متاخرین بجهت اسارت او را محدود و
 از آنجمله چون یکی از عظام حجه کسور و قطعه از او زنده باشد دیگر چون ترشه از کاسه سرفرو
 نشیند و بهیچ وجه بر تفع نکند دیگر هنگام که در فضای ریش شئی خارجی ممکن باشد باین
 عمل نمود و در عین ضرورت در جمیع مواضع حجه میسوزان آره نهاد لیکن در صورت امکان
 احتراز نمایند از عمل نمودن بطوریکه قطعه فلزی عظم صغ و اکنه که همای باشند بواسطه
 دم و ریدی دماغ از آنها عبور نمایند و بدانکه عمل تره پاناسیون را بکار زمان منقض نموده
 اول در کثوف ساختن عظم تلفی در آره نمودن او ثالث بر تفع نمودن نتوان و لایع باز آله
 و خروج آنچه فروشته است از شئی خارجی و غیره اما بجهت کشف عظم بکیرند بادی و
 شکل یا بطور صلیب شکافه و بعد سحاق را از نقطه الف تا به نقطه ب پس کشیده
 و بادم چاقو ضربت را نیز بگذاشتند آنجا آره دوریکه بدور اویش هست و از جهت شایسته

باب

بالمجر

به اکلیل آره تاجی نامند که شسته بطوریکه نیش از تاج آره برآمده بایستد و باره شیک
 هر سه آنوقت نیش را پس کشیده و بچوب موضع نیش گذاشته و بهیچانند تا جای بچوب نماند
 و بعد آره را تا نیانها در بریده بردارند و بچوب را بموضع خود استوار ساخته بکشند تا
 بر کشته شود آنجا شئی خارجی که بهما بین حجه و امین یا امین دماغ قرار دارد باری
 بیرون آرند و هرگاه شئی خارجی در ام الغلیظ نشسته باشد هر آتش که غشا و مکرور را
 منشق ساخته تا با ساقی او را بتوان خارج ساخت و در بعضی لازمت که بچوب موضع
 تاجی نهاده و فاصله باین آنها را با کانی بچسبند و بعد آ قوری سپید یا کتان آلوده بدانی در
 آن موضع نهاده و بار خادی ملایم به بندند و بروی سحاق لته نهاده و با آب سرد مکرر طلا نمایند
 و روزی دو نوبت رانند او را عوض باید نمود و بجهت آن ضریع را باقی گذاشته اند که بایستخوان
 تازه در آن موضع بروید و یا جلد سخت و در سخت ماده یعنی هر سه که بپوشد آن موضع و چون
 شروع نماید بدن مده باید بوی بپسند که مسدود نشود و هرگاه با وجود بر این عمل غلا
 و عراض فشار و صدمات دماغی تسکین نیابد دلالت بر بقا شئی خارجی در دماغ است
 در امعا و اگر ریم رقیقی و شئی از آن موضع پالا یا مقویات باید بکار داشت و باشد که از
 غشا ام الغلیظ کمی زانده روئیده و در عقبه که با آلت بر سریده مانده خارج بر آید
 در این صورت باید قوری سنگ جهنم مالید یا با سر بر او بخت و یا با چاقو قطع نمود
 چون بعد از رفع جلد او این موضع زکی الحس شود لازمت با قطعه از نقره یا فلزی دیگر
 او را بپوشند و بدانکه از اعراض عمومی ضربه وارده بر سر نسبت محمولی این است که
 در کبد دمایلی بر سر و باشد که ماده آنها از باطن میل بظا هر نموده و جلد محاذی بدو
 منفر کرده و دفع شود یا آنکه آن ماده با معا و منقب و با بر از خارج گردد و یا آنکه بواسطه
 او علیل با عراضی دفعی عارض و پاک شود و معالجه لازمت که بعد از ورود ضربه بر سر
 هرگاه از جانب کبد و جگر و ریمی بیاید بدون قائل زود آده و کل استعمال نماید و چون
 به بندند که جلد ظاهر برآمده و مستعد است با نفیار بایشش بوی و دل را بکشاید
 خارج شود بلکه از جمیع آنچه بیان نموده ایم در جراحات حجه نباید جراح نماید تا غافل
 شود

چون دیده شده که جراحتی جزئی صاحب خود را هلاک یا مجنون یا مغلوب یا مضرع یا بدق
 ساخته است این پنج عصبه العلاجه
فصل سادس در جراحت و درده بر کلیه و تقصیل او اما چون مقصود در
 عمل است که جراحت را از اثر زشتی نماند لهذا باید در صورت امکان از بخیه نمودن
 نوزند و در جراحت طویل وارد بر عاجین بشمع داخلون رفا نماید تا التیام
 پذیرد اما جراحت عرضی او را حکا باید بخیه نموده و جراحت وارد بر عاجین و
 خوب موجب بشند تا گوشت نکودید چشم باز نماند و لهذا در بعضی اوقات جراحت
 او را عمدتاً منع نمایند از التیام بطریق قریب که سبب از گوشتی آنرا جفت باز ماند
 یا بعکس که منطبق شود و در جراحت وارد بر اذن بواسطه کثرت تحب و تقرآن
 جمع نمودن صعب است و باید بعد از بخیه نمودن قدری پنبه بر غلاف اذن نهاده و البته
 به بندند و جراحت وارد بر الف را با عانت شمع یا بخیه التیام باید داد و قاعده
 آنست که لته آلوده بمشعیر بطور بلالی از تحت الف انداخته و طرفین آنرا در تحت
 عین بچسباند تا آنکه او را تکیه بشند و جراحتی که بخند و آرد شود هرگاه جراحت
 براق مجروح شده باشد باید حکا بخیه نمود و اگر کفایت نکرد باز از جراحت لعاب
 جاری باشد از غف نامود کردید او باید سنگ جهنم مالیده و قدری سرب بچسب
 غده سمان که واقع در تحت اذنت نهاده لته را بر زیر زنج انداخته و بقوی راسن
 بندند تا ترشح براق کمتر شود و تقطیل در غده نموده و ششیا مایع میل فرمایند و از تکم زیاد
 احتراز باید نمود و چون جراحتی بر لب هر لسان و انداید بالذات التیام پذیرد اما جراحت
 غائر او را باید بخیه نمود
فصل سیاه در جراحت و آلات واقع در او و جراحت یا بر جلد و عضلات
 و یا بر اوعیه دم و عصبان یا بر مجز و مری و نخاع وارد می آید اما جراحت جلد عموماً
 با عانت شمع داخلون باید التیام داد و مواظب بشند که لته نماند و وقتی متیتر
 و منکوس گردد و اما جراحت و داج ظهرا نیز بشمع یا پنبه و از فشار رسیده

لته

نمود و در جراحت غائر غنی هرگاه عرقی مجروح شده باشد که بستن او ممکن نکرده و بواسطه سیلان
 دم علیل زود هلاک خواهد گردید و چون جراحتی بر عصب ریه و معده وارد آید آواز گرفته
 و بسرعت از منیت النفس هلاک میگردد و همچنین چون عصب محرک حجاب طراز اجراحتی
 آید ممکنست و اما جراحت وارد بر مجز یا بطول یا بعرض وارد می آید و بعد از ورود
 برای تنفس از موضع مجروح خارج و با طرف پراکنده و ضیق النفس شدید عارض
 هلاک گرداند و بجهت علاج او چون جراحت عرضی وارد آمده باشد باید اولاً سبیلان دم
 نمود و از بخیه احتراز جویند زیرا که از ابریشمی که با بخیه باید نمود سرفه عظیم عارض میگردد
 لهذا باید راس را بکون دارند تا التیام پذیرد و چون قاعده آنست که با این جراحت سرفه
 تشنجی شدید همراه باشد لازمت که بدون تامل فصد نموده و کلل مجروح با برز السنج
 فرمایند و باشد که بعد از التیام این جراحت ثقبه نامودی در آن موضع باقی مانده و تا چند
 روز از این ثقبه خروج و دخول یابد و این را نواصیر قصبه الریه نامند و هرگاه جراحتی
 با آلتی غلظه بر مجز وارد آید قاعده آنست که هوا از ثقبه او خارج ننماید و باید که
 جلد افتد و اعراضی که بر میانی انفرم نامند یعنی مستغی کردن عارض شود در این صورت
 باید آن موضع را شکافت تا هوا خارج تواند شد و اما جراحت وارد بر مری در قاعده
 است و است با مجروح کردن عروق عظیمی از دم و لهذا ممکنست بر مری آنکه گاهی جراحت
 مذکور میشود مگر در وقت التیام باید اما معبر مری صفتی خواهد گردید و جراحت غائر که
 بر غلاف قنق وارد آید اغلب مورت فلج و هزال بفتتین و سقوط قوه باه خواهد شد
فصل ثالث در جراحت و آلات واقع در او و جراحت یا بر جلد و عضلات
 و یا بر اوعیه دم و عصبان یا بر مجز و مری و نخاع وارد می آید اما جراحت جلد عموماً
 با عانت شمع داخلون باید التیام داد و مواظب بشند که لته نماند و وقتی متیتر
 و منکوس گردد و اما جراحت و داج ظهرا نیز بشمع یا پنبه و از فشار رسیده

باید از استعمال دویه دافع ورم و فصد و جامت اجمال نوزند و بدانکه در جراحت
غائر صدري خوف از اين بابت است که دم بفضای جنب منقب و ریه را منقبط
و از کار بسیندازد یا آنکه جراحت بر جرم ریه وارد آید و بدین واسطه ملتب گردد و جراحت
غائر صدري را با عانت میل یا اصبع یا از شاخه هوائی متنفصل از موضع مجروح و انقباض
اطراف او از تنفس و نفث الدم باید استنطاق نمود و هرگاه نفس الدم نباشد
دلیل است بر آنکه غشاء جنب تنهائی مجروح شده نه جرم ریه و این جراحت بر جراحت
قسمت قسمی جراحت غائر بسیط ثانی غائر با وجود شئی خارجی در او ثالث جراحت
غائر با سیلان دم رابع جراحت غائر با فتن ریه و اما جراحت قسم اول در الوجود است
و باید او را از تورم باز دارند به استعمال دویه دافع ورم و فصد و باید با الفعل و بند
ز و فصد و نوشیدن کلل یا شوره آنگاه جراحت را بشوید و اخیل و سینه و بدنی قدی
پنبه نهاده و با نوزیکه اگر کف استاده اند سینده را به پنبه و قسم ثانی از جراحت
صدر در آنکه شئی خارجی از گلوله و اشال او و براده از ضلع مکتور فرو نشسته باشد
و بدین واسطه علیل دائم متالم و از موضع مجروح مده کثیر منفع گردد و لازمست که
بایستی منعی موضع ممکن آنها را فحشیده آنگاه شکافته و با انبری گرفته و پنبه آرد
و قسم ثالث که سیلان دم همراه است سیلان او یا از مجروح که بدین شیران
اوسط اضلاع یا شریان داخل صدر و یا از جرم ریه و یا از عروق عظیم صدر است
و از جراحت آنها دم یا بفضای صدر و یا بخارج سیلان نماید و از علائق است
که لون بشره باخته نفس صغیر بسیار باسد و طنین در گوش و عرق بارد باشد
که بواسطه انقباض ریه ضیق النفس عارض و باشد که علیل را حقه نماید و اغلب
تیز عرق مجروح سیال و شواهد است در صورتی که دم از شریان اوسط ضلعی سیال
باشد و شکافته میشود و بدینکه مجروح و هواد او مخلوط نباشد و زبده سبزند که حقه
سد او لازمست که بکینند مرهم کشی و سبر و نونه پیچیده و فرو برد بواسطه ضلع مجروح
نحویکه مرهم کشی برومی شریکند از کنار اسفل ضلع واقع است قرار گیرد

در جراحت

و سر و کمر هم کشته با نوزاری بکمره بنزند و چون دم از شریان داخلی صدر که در خلف عظم
قصر واقع است یا از عرق عظیم مانند او رطوبتی غیره سیال باشد ظاهر است که علیل زنده
خواهد شد و سگای که نفث الدمی بواسطه جراحت واده بر جرم ریه رسیده باشد لازمست
که معالج با جرئت دویه دافع ورم بکار دارد از فصد مکرر و غیره و باید آرام مانده و مبررات
فرمایند و هرگاه در آن جراحت مورب باشد که هوای متنفصل خارج گردد و بدین جهت جلد آمده و
منقبط سازد و این حالت را بیونانی انقباض نامند و باشد که هوا از ریه خارج و بفضای
جنب رفته و او را منقبط سازد اینرا استقای طلی جنب نامند و بدانکه بعد از جراحت
وارد ریه و آمدن هوا بفضای جنب ممکنی ساختن او را ریه بواسطه انقباض هوا از غل
خود باز مانده و بدین واسطه تنفس عسرت بر سر آید و بنض صغیر گردد و با بر اطراف چون
این حالت بمنتهی رسد علیل را هلاک سازد و تشخیص استقای طلی صدر از بر آمده شدن
یک طرف صدر است بقتی و صدای طبل دادن او است در حالت زن با انگشت که این
دو سبب استقای طلی صدر شناخته شود و هرگاه هوا بفضای کم ریخته و بمنتهی رسیده باشد
باعانت محلات تحلیل دهند و چون نهایت رسیده باشد جراحت را از دست که بدین
چند شرط نموده تا هوا خارج نشود و در بعضی اوقات لازم میشود که جراحت را به استقامت
بکشایند تا هوا خارج گردد و بدین جهت و فرج کم رفته و در وقت انتفاخ او گردد و پنبه این انقباض
بالا از همیشه دفع است چون مده است تنفس را و ورم ریه و جنب در صورتی که پیشتر صدای
مذکوره باشد بجهت علاج لازمست که دویه و تدابیر دافع ورم از فصد و جامت و زوایا
دشته و آرام مانده و مبررات میل فرمایند و تنها در این نوع ذوات الریه جایز است
طلای آب سرد بصد و باشد که از دم مذکور ریخی حاصل و بفضای جنب منقب گردد
و این بمرطوبت در کینه جمع و نگاهدارد یا آنکه منفرجه ساخته و منفعش نمایند و بدانکه
جراحت واده بر قلب بواسطه سیلان دم و تورم او و ملکیت لیکن بنا بر دید
جراحت ظاهره قلب که انسیام یافته اند و سپین جراحتی که بر حجاب عاجز وارد
آید با دخی عظیم و دحضت همراه و بزودی هلاک سازد

در جراحت

فصل ناسخ بر تالیف در ذکر جراحات وارده بر بطن و آلات واقع در او و این
 جراحت با طاهر و با غائر است غائر و نیز بر دو گونه است یا سطح بطن یا تهائی مجروح
 گردیده و یا آنکه جراحت با عمق رسیده و اما جراحات ظاهر و سنگامی که با و تار
 بطن وارد آمده باشند محقق است که در می عظیم با و می شدید و فی مفرط عللیل را عارض
 شود در این حال بجهت علاج باید بود و تدبیر دافعه و دم بکار داشت و اگر تمدد عضو
 مجروح قوی باشد جراحت را بکشاید و جراحات منقبضه که بطن را واقع شود و نیز
 سازد کبد و کلیه یا یکی از اجزای او را زایل و خوف عظیم دارد و در سیم که ضرب بطن او را
 وارد آید و با وجود بر آنکه از ظاهر جراحت روی نماند لیکن از شدت ضرب که با کلیه
 منقبض و غشوق گردیده و فی الفور صاحب خود را بملاکت رساند و در جمیع جراحات
 بطن اگر چه از ظاهر جزئی باشد باید در احتمال ادویه دافعه و دم افعال نورزید
 از خوف آنکه مبادا در دم صفای سرایت نموده و صورت فساد شود و آنجا که
 جراحت ظاهر نایل باشد یعنی دریم حدود مجرای منادی بود بر معالج است
 که موضع مجروح را کشوده و وسیع سازد و از نتایج مجروحی جراحات بطن است عین
 شدن بر بطن و اما جراحات غائر که بشمار موضع از جدار امعاء را وارد آید
 کا عده چنانکه در می تمام صفای جشاء عارض شود و بعضی منقبضند با صلا
 و کشیده کی صورت و بر دو طرف و تمدد و صلابت بطن با فواق بجهت علاج لازم
 که در صورت منفر جراحات اندر المبتلع و اخلیون آلوده و بدان موضع بناده
 و بطن را از آن جدا نموده و ادویه دافعه و دم بکار دارند از فصد و احوال حق و سبب
 کمال و نیز در این مسیاب و اما آنجا که جراحت کبیر و معانی از موضع مجروح فتن
 نموده باشد باید معالجه و موقوفه را بموضع خود رجعت داده که رگهای جراحت را بجهت
 کشیدی یا تکیه بکند و بکند و عمل سازند و بگویم که از سوزن آسیمی صفای فرسده آنجا
 بالته آلوده بکشید و اخلیون جراحت را بسته و بروی او پنبه نهاده و با نوادیم
 پیچیده و ادویه دافعه و دم بکار دارند و هرگاه از موضع مجروح جزئی از غریب

یا طحال

یا طحال یا یکی از امعاء فتن نموده بجهت رجوع آنها به بطن باید عللیل را بجوی خوابانید که
 جدار بطن مسترخ می شوند و دم باید عللیل را حکم فرمود که نفس خود را خارج سازد و آنجا
 معالجه با شرب موقوفه را بموضع خود رجوع دهند و چون معالجه مفرق از نقل یا ریم کجی متملی باشد
 که رجعت به بطن نتواند نمود باید جراحی را حتی الامکان وسیع ساخته معالجه را فرستند
 زیرا که این جزو از امعاء بسرعت غافلر یا خواهد گرفت و در حین وسیع ساختن جراحت
 خوب باید وقت نمود که مبادا از مشروط جراحی بر امعاء وارد آمده و صاحب خود را بملاکت
 سازد و اما جراحی که واقع شود بجزیم یکی از امعاء بجهت التسیام باید بجهت نمود ولی نه
 که در قبل ذکر آنها رفته چونکه هر یک از امعاء را سه طبقه است طبقه داخلی غشاء و غاط
 و او وسط عضلانی و خارج صفای بنا بر علی بن ابی طالب بجهت نمایند که بردارند و سوزن
 رسیان کشیده و قدری دور از کنار جراحت فرو برده و از جانب دیگر خارج ساخته
 و طرفین رسیان را بکشند و بجهت غشاء و مخاطی و عضلانی و صفای کنار می از جراحت
 محاذی و تماس کرد و با غشاء و مخاطی و عضلانی و صفای جانب مقابل آنجا رسیان را
 که نموده و موضع مجروح را رفا نمایند تا التسیام پذیرد و رسیانیکه با او بجهت زده اند
 بعد از چندی با باز دفع خواهد کردید و در همین قسم بجهت نمایند آنجا که معانی بالبره قطع
 گردیده باشد و در بعضی اوقات پیشود که یک جانب از امعاء و مقطوع بپایان گردد و در این صورت
 باید که جانب فوقی معالجه و مقطوع را با کنار جراحت از ظاهر بجهت نمود تا آنکه معالجه
 با فراق التسیام باید و موقوفه غیر طبیعی بوجود آید و جراحت وارد معده را شخیص
 میاید و او از وقوع او بموضع معده باقی الدم و فواق و خروج کمی پس با علامت و اعراض
 لازم و دم صفای و این جراحت را خطری عظیم است سیما در وقتی که جراحت عین
 است و معده از غذا وارد آمد و باشد اما با وجود بر این دیده شد که التسیام یافته است
 اما علاج بجوی باید نمود که در جراحات امعاء بیان نموده ایم از بجهت دار سال علی و استیصال
 ادویه دافعه و دم و گذشته از اینها باید عللیل از شرب آب و اکل غذا امساک کرد
 بکند و در وقت از شرب و اعمایه حقه نمایند و اگر اعراض تشنجی مجروح را عارض شود باید

شود باید قدری افزون در خفته او ضافه نمود و در بعضی اوقات مشاهده شده که موضع
مخروج از معدة با جدار الطن ملحق گردیده و در موضع فم معدة از ظاهر ثقبه غیر طبیعی بوجود
آمده است و اما جراحات وارده بر کبد را تشخیص باید داد از وقوع جراحت بموضع او
و آرایش صفرا با دم سیال از جراحت و از عروض و جوی صعب در کتف ایمن بواسطه نسبت
مجمولی که با این نهاد است و باید که کسی با سفتی و از قوت مقطعه کبد او ملحق گردد
و از آنجا که جراحات کبدی در رویت و خطری عظمت باید معالجه هر چه در استعمال آرد
و تدبیر دافعه درم تعافل نورزیده و تسبی نماید که دردم یا صفر البضای بطن نصب است
نیاید و لهذا باید مخروج را بخوبی خوابانید که مایه دفع از جراحت بهرولت بتواند خارج
و اما جراحات وارده بر کلیه قالی از آن نیست که سطح خارج کلیه مخروج نشود یا سطح داخلی
او اما در صورتی که جراحی بجزم داخلی کلیه رسیده باشد علاوه بر دم بول نیز از موضع مخروج دفع
خواهد شد با عروض و جوی صعب و قطن که تجاوز نماید تا خطر و جویین و هم بول آنجسته
با خون دفع شود از مخروی اما علاج او این است که در استعمال آرد و تدبیر دافعه درم
و ارسال علی اهل نورزیده و غلبه را بکشی بکشد که از جراحت بول دردم بهرولت
بخواند جاری شد اما سایر معالجاتی که در آنها گفته و اما از علاج باید چشمپوش نمود
و باید که جراحت التیام باید و لیکن در موضع از آن سوزی موجب گردیده و بول از آن
ثقبه دفع شود و اما گمانه اغلب مخروج میگرد و مسکامی که محتمل و از فضای حوزه تجاوز
نموده باشد و اگر با این جراحت صفای را با تسبی یا جراحی و تدبیر دافعه درم باشد و در آنجا
ندارد و آنکه جراحات سایر اجزاء و بجهت علاج و التیام او باید آرد و تدافعه درم بجا
داشته و کشته تری از جوی مشاهده فرود برده و باقی گذاردن بول حبس نکند و در علم واقع
در اطراف مشاهده نفوذ نماید و متعجبش سازد و آنجائی که علاوه بر جراحت کتفی
قاعی بهرولت و در او باقی ماند در برون آوردن او تعافل نماید و در زید از مخروج
آنکه مبادا از جوی غلیظه بول و اطراف او متعجب و متعجب گردیده و حصه مثانی
بوجود آورد و اما جراحات قضیب و این جراحت هرگاه یکی از دو جرم لغوی و

نزدیک

شده باشد باید تسبی نماید که یکجانب از جراحت یا جانب مقابل مساوی و متصل باشد و لهذا
باید کشته تری بخوابی بول و دایره و البته آلوده شمع و اخیرون قضیب را بچسباند التیام باید
و اگر از ضرب و آلت قناعی با لرم قضیب قطع گردیده باشد باید بواسطه بستن عروق و سینه
نموده و جراحت را شمع بپوشاند و در بعضی باشد که بهر نکام لغوی قضیب را بقوت کشنی
سازند و بدین واسطه عرق منصفه گردد و دم سیال از بول کینه مخرنی برای خود بنام
در او متوقف گردید و آنکه این خون بجمد و صلابت بهر سینه لبان آنکه ششی خارجی علی
ای تقدیر غلیظ را مابعد لغوی نام دست بخوابد و اما علاج باید که بدون تل کشته تری
بخوابی بول و دایره و از ظاهر هر ورقه سری بد آن موضع نهاده و محکم به بندند تا تحلیلش برود
و باید دانست که در بعضی اوقات ملاحظه که از افادن از درخت و غیره شایعان و جراحت
بول بر خورد و مخروشان سازد و بدین واسطه بول بجم جان نفوذ نموده و مرث قرصه باغی
گردد و در این صورت بر معالجه لازمست که علی نماید تا بول بجم منصف نکند و فساد وی حاصل
نمونه و لهذا باید کشته تری بخوابی بول بدوانند تا از جوف او در برون آید و از استعمال
آرد و تدبیر دافعه درم اهل نورزیده التیام پذیرد و آنجا که بول بجم منصف شده
باشد باید آنرا مخروشان طری قوی نموده و خوب بشویند و باید که بعد از التیام جراحت
نامودی در موضع مخروج باقی ماند و اما جراحات وارده بر بینه همیشه خطر در رویت دارد
چون از مرین التیام میباشند و بیم آنست که از کثرت سیلان مده جرم بینه تحلیل رود
و بجهت علاج و التیام باید آنکه او تدبیر دافعه درم بجا دارند و باید دانست که از این
مده کثرتی جاری شود بخوبی که جرم بینه از آن به تحلیل رود و در صورتی که جراحی بر او
منی یا عصب واقع شده باشد عمل بینه با لرمه فانی خواهد شد

فصل عاشر در جراحات و آلات و ادویه جراحت
بکینه مفصل واقع شده و با عظام او علی ای حال از جراین بطوبی بقوام و لون باطن
تشخیص باید نمود و وقوع جراحت مفصل بدین نوع که اگر بطوبی زرد و لزج مانند مایه غسل
از مفصل جاری شود دلیل است بر ورود جراحت بخوف و داخل مفصل و نباید آنکه

همسج با یکی کجته اتقان بجوف این جراحت فرود بر مکرر شکامی که شئی خارجی در او فرو رفته باشد چون در می عظیم از او حاصل خواهد کردید و بجهت زاله او لا بدند که با عانت آتی او را بیرون آرند و اگر شئی خارجی بمفصل فرو رود یا بجوف او داخل شود و متورمش باشد زیاد خطرناکست و اگر چه وجع از ابتدا خفیف است لیکن بیروت شدت بر سر آید باید زود داده و آرام مانند در صورتی که جراحت جزئی و معده باشد از بستن بالته آلوده بمشع و اخیلون با قرب طرق التیام پذیرد و چون جراحت منصفه واقع بمفصل ارزد و علاج مصعبیت باید آنکه عضو مفصل مجروح را مالیده آرام داشته و کنار نماند جراحت را بیکدیگر متصل و بالته آلوده بمشع و اخیلون عضو را بدارد تا نماند و بر یک پنبه نهاده و به بندند و باطراف آن موضع زلوفت کنند بدین تدبیر باشد که این جراحت لبان جراحت سایر اعضا التیام یابد و اما اگر بواسطه ضربه آتی از آلات مفصل منصفه گردیده باشد چون از روزه اول و درود جراحت وجع خفیف است و علیل هیچ وجه طغیفت نکرده و از حرکات باز نماند تا آنکه بعد از چند یوم در می عظیم با وجعی شدید در مفصل مجروح موجود شود با حرارت طمس و کنار جراحت برآید و در طبقی پنج از او جاری و اطرافش متشنج و متشنج گردیده و علیل با وجعی عارض شود و بالاخره چند موضع مفصل متورم و صمدی است و از او منصفه گردد و قاعده چنانست که باین علت جمای دق علیل با عارض شود و بهترین انهای این جراحت آنستکه در عظم مفصل با یکدیگر طعنی و متحد گردند و از این قسم درم علاج بدین نحو باشد که عضو متورم را مالیده آرام داشته و بدون مائل ادویه و اضمه درم استعمال نموده و با طرف مفصل متورم زلوفت کنند و از دهن زریق کشیمانی خون نخرج و نموده و بطرفین مفصل شمع زاریک اندازند تا ماده بخارج منصرف شود و از طلا و ما و بار بوجوه تغافل نورزند مکرر شکامی که علامات و اعراض انفعال بطور رسیده اضمه بر اثر از بزرگ و نان خشک و کل خطمی و اشغال آنها بکار باید داشت و بعد از انفعال باید عملی نموده که مکرر در نشود و از کثرت سیلان او قوای علیل فانی و کما

دقیق

دقی عارض گردد و قسم نورس نمودن تمام عضو علیل را تدبیری نیکوست و هرگاه بواسطه جراحت مفصل فاسد و آلات او از یکدیگر متفرق گردیده باشند جرفطع عضو علاج و بر نیست
فصل هجدهم در جراحات زبانی و در شکم
 عروق یعنی الضراع او دایم علت واقع میشود از ورود ضربه عظیم یا حرکتی عنیف با سقعه و بیافقادن چنانیکه باشد از جستن و ترند کردن منصفه گردد و صدائی از او مسیوع شود بان آنکه از شکستن فذوق علامات او این است که علیل نتواند با سیتا و وفاصله باین دو قطعه از در منصفه بواسطه تقلص عضله خوبش آید شود و در بعضی اوقات عمدتاً در قطع می نمایند بجهت دفع فلج یا هرگاه با همک این در جراحتی بجلد آن موضع وارد شده باشد با آرام دارند تا خوابه باین دو قطعه و تر منصفه منشرش و منصفه گردیده و بدین واسطه التیام پذیرد و اما بجهت علاج باید تنسی نمود که طرفین در منصفه متصل و بجهت این مطلب ملاحظه باید مرعی داشت اول آنکه رکیه را منحنی سازند ثانی آنکه قدم را منحنی نمایند ثالث آنکه قدم و ساق را نواری پیچ نموده بدین طریق که بر دارند نواری و تمام قدم را پیچیده و تحت رکیه شکافی نهاده سر نواری را از کف و خلف کشیده و از زیر رکیه به فخذ به بندند از این عمل در جندی و تر مذکور التیام خواهد یافت و باید دانستکه در بعضی اوقات از حرکت عنیف تشنج عضله عضوی منصفه گردد و بدین واسطه عضله مذکوره از حرکت باز مانده و در موضع او تعقیری موجود شود یا وجعی شدید علاج او این است که عضوا آرام و بوضعی بدارند که عضله مذکوره منصفه شود و علی الاتصال آید که در آن قسم در تر نموده اند با آن موضع میسند از آن طریق قرب التیام پذیرد
ایات از مقال ثانی در جراحات درده
 بر جرم عظام که عبارت از عظمی است عظام نامیده اند با اقسام و سباب علامات و علاج آنها و شملت بر پنج فصل
فصل اول در تقسیم انقسام عظم و عاقبت و علاج آنها کلیه
 بیاید دانستکه عظم را منقسم نموده اند بچند قسم اول بدینکه عظمی از یک موضع با دو موضع منقسم گردیده ثانی آنکه در بعضی یک در دو استخوان واقعند یکی از اعضا

شده یا هر دو موضع کسور گردیده باشد آنکه این کسر طولاً واقع شده یا عرضاً یا در با رابع آنکه
از ضرب به بالمره استخوانی خود شده یا نه علی ای قسم گان این علت با مفرد است و یا مرکب
مفرد آنست که جز کسر عظم استخوانی دیگر وارد نماید یا مرکب آنست که علاوه بر کسر عظم یک
یا عرق مجروح شده و واضح است که هر یک از عظام بدن از ضرب به کسور میسر شوند
یکی عظامی که ظاهر برآمده اند استعداد ایشان بکسر بیشتر از غائر و فرو رفته آنها
مانند ترقوه و چون در این جرم از ضربه عظام بر عرض و فیت آنها غالب است لهذا ترقوه
و شکستنی تر است بکسر از بقیه که بی آنکه ضربه کسور تواند شد و همچنین بواسطه
بعضی امراض مانند آنکه از داء افرنجیه و تقرنس و خوارید و اسکرید و که مرضی است
در بلدان قریب بجهار و ملاعان و مغرطین در اهل مایه مشهور عارض شود و همیشه از
لته صاحب او خون جاریست با تقصیر دمان اگر چه در ایران نادر است اما در
و ما نذران بسیار دیده میشود و از سرطان عظام نیز این حالت دست دهد که
از ضربه غلبه نماید و بدن واسطه استعداد نامی بر سر انداخته و لازم نگردد است
که عظم مضروب کسور گردد بلکه باشد که ضربه بعضی وارد آید و عظم متقبل نشکند
چنانچه اغلب دیده شده که کسی بجف دست افتاده و عظم ترقوه او شکسته است و بعضی
دادن کسر عظام تب بواسطه چند علامات میشود اول از تغییر نسبت بدن قسم که باین
اجزای عضو نقصانی برسد یا آنکه طرفین کسور از عظم چپ در دست بایستد یا آنکه
قطعه تحتانی مرکوب گردد و قطعه فوقانی از حصار و نقصان عمل عضو کسور عظم
تأثرت از سماع صوتی از عضو در حین حرکت کمال بشن مورت و در جراحی که بیکدیگر
لباس بند و بکن در بعضی اوقات سنگامی که درم عارض شده باشد عضورا با وجود این
علامات تشخیص صعب خواهد بود و اما انداز کسر عظام مختلف است با حلال است
و شکل عظام و سود کسر در کتب او باختلاف سنان و مزاج و علل و سبب علاج
در رفتار مریض و معالجه و در صورتی که یک قطعه از عظم کسور از موضع خود بیرون رفته
باشد التیام صعب و همچنین کسر در برابر دانت بیشتر است که کسر عظمی و سبب

هنگامیکه بکسر است از عظم کسور زایل یا عرق عظیم منصف گردیده باشد خطیر و انداد او کسور
نیست و در اطفال و از جمله عظم کسور اسهل از غیران التیام مایه که در اکثر جراحی
و ابدان ضعیف است و در حوامل و در التیام خواهد پذیرفت و آنجا سبب دوستی عظم
کسور مقابل و عارضی با یکدیگر باشد مانند جراحت نسجی باین محتمل است که با قریب
التیام مایه بدین طریق که اولاً رطوبتی مانند نشاسته بچته در فاصله مابین دو
عظم کسور میریزند و منقعه و بر و غرض و فیت و عظمت است و تا روز دهم و روز دهم
نفی در آلات لطیفه و اطراف موضع کسور موجود و ما بعد از این پنج روز همان موضع کسور
باقی ماند و با بقی تشکیل رود و قسم در این سنگام حرکت میسر است و او قطعه کسور
از عظم را بیک تاسیم روز التیام یافته و علم گردیده اگر چه در این حالت موضع التیام
یافته منحنی و منطفق تواند شد اما بر در اجزای ارضیه در او غالب شکست ساز و بطوریکه
در فاصله مابین سی تانصفت از او از غلبه اجزای ارضیه بر نسج منحنی و منطفق گردد و این
حلقه از عظم لطیفه لایق کالو مسلح حکم نماید و در بعضی اوقات باشد که این کالو مسلح حکم
نکرد و این نیست مگر بواسطه آنکه طرفین عظم کسور با یکدیگر تقابل ندارند و یا آنکه عللیل
عضور را تمام ندشته و طبیعت فرصت نیافته بجهت التیام و استحکام و یا آنکه از ضعف
و دانت مزاج طبیعت عاجز است از التیام موضع کسور در این حالت مابین دو قطعه
کسور ماده و باطنی ترشح گردیده و مفصلی جدید در این موضع موجود شود و همچنین در
صورتیکه دو طرف عظم بقاعده طبیعی مقابل یکدیگر نکرده بعد از التیام علاوه بر
هلیت باشد که در حین حرکت جلد متلاطم گردیده و بدین واسطه عللیل عاجز باشد از حرکت
و راه فرست و اما احلاج بیاید نه است که معالجه در این علت سه شارت باید مری
و است اول آنکه عظم کسور را موضع خود جبر و در نمایند تا آنکه بواسطه رفاندی بیکو و لایق
در جرح خود نکاشان دارند ثالث آنکه نیاز کسر را زایل سازند و اما جبر و التیام عملی است
حاصل نموده بیکه نایب از مافوق آن موضع گرفته و بمافوق کشند عضو کسور از عظم را
تا آنکه نایب دیگر مافوق آن عضو گرفته و مافوق او بکشد و در او از ملس و کک بعد از ادراک

نمودن بر آنکه دو قطعه عظم که یکی یکدیگر دیده است بقوت بشارت و استخوان را بوضع
خود در نماید و اما بجهت اشارت ثانی لازمست که بعد از رد قبل از آنکه بایبان دست از
کار خود بکشند بار فاندی تمام عضوا بمساوات به بچند و آلائیکه در اینجا بکار آید از آن
است دستمالی ۳۴ زبانه یا نوار و تخته و نی و چرم و مقوی و غیره و طریق استعمال او
که عضوا را بدستمال مذکور یا نوار بمشامه محکم چیده آنکه چهار تخته مرتب از مقوی باطنی
با طراف عضوها به نوعی که سر تخته با از مفصل آنضو تجاوز نماید و عضو مجاور از حر
بازماند و بروی او ایضا نوار به بچند و این قسم از زفاند در کسر عرضی کفایت مینماید لیکن
در کسر وادی کفایت نخواهد نمود و لهذا از خوف آنکه مبادا عضو کوتاه بماند باید علاوه
بر این تدبیر به عظم استسکام علی الاتصال عضوا بخلاف جهت مغز ساخت و هم باید
عضو مکتور العظم را بوضع بداند که عضلاتش مسترخیم باشند و ممتد و عظمی را که در صورت
که عظمی از وسط شکسته شده باشد باید عضوا را بطنط داشت و چون قریب بمفصل مکتور
گردیده باشد باید قدری منحنی نمایند و آنجا یکدیگر را محکم بکشد از آنیکه عضو مکتور
بماند باید او را بوضع نگاه دارند که مابعد از کار بقیته و اما بعد از زفاند یا کاندانند
و یا آنکه از مابعد و سفیداج رصاص طلا فرمایند عضوا را و هرگاه بعد از چند روز زفاند
او نیست که در قدری محکم سازند او را و دلیل سبکی او برین است که اگر عضوا
حرکت دهند متعالم نموده و باید بجا نماند مگر استسکامی که ماله عظم مکتور
السیام یافته باشد و این حالت در جوانان اقل از بزرگسالان است و در اطفال
تا چهار هفته طول کشد و چون مدت زمانی طول کشد و کالوس حاصل نشود باید
وقت نموده و به عظم استسکام متوقف افاده باشد لازمست که از مقویات
و مسخات طبیبقر اعات نمایند در تقویت بدن و التیام و از زفاند نمودن نباید
بهموجه تعافل ورزید زیرا که اگر بسرعت زفاند بکارند عضو مکتور متورم خواهد گردید
در صورتیکه در عضو مکتور العظم ورمی شدید عارض شده باشد و باید او را با ریال علق
و طلای ماه بار و در سفیداج رصاص صورت منگنه نموده و عضوا را ماله آرام داشته

و کسب با بافته زایل سازند
برای تقویت بدن و التیام
زبان استعمال نموده

آنکه

آنکه عظم مکتور را جبر و فاد نمایند و می شود که علاوه بر کسر عظمی از ضرب جرحت و زخم عظمی در جرح
عضو واقع شود و بدین واسطه التهابی عظیم روی دهد در این هنگام باید ادویه دفعه دوم
استعمال نموده و علاوه بر عظم تدارک بپسینند لیسام جراحات و آسیبی را که با
عظم مرکب گردیده و هرگاه وجع شدید عضوا باشد باید قدری عین عسل میل فرماید
و جراحات آلات واقع در اطراف عظم مکتور یا از نفس ضرب بوجود آید و بکشد و باید
که از ترش عظم مکتور حاصل شده باشد علی ای تقدیر عظم مکتور را بوضع خود باید
نمود و جراحات را با لته آلوده بشوید و عظمی را فاد نموده به بندند و اگر یکقطعه از عظم از سطح
جلد برآمده باشد باید با دکی ملایم او را پس فرستاد و اگر ممکن نشد لازمست جلد را
منشق نموده و او را بجای خود در نماید و اگر با وجود این ترمیمی مترتب نگردد باید جلد را
شق نموده و ماله یا کازمی زانده عظم را بیل ساخت و آنجا یکدیگر را ترش عظم مکتور
باشد باشد اگر ماله مفصل است باید شکافت و بپوشش آورد اما اگر بعضی از او
مفصل و بعضی متصل باشد لازمست که بوضع خود قرارش دهند و به بندند شاید که
بطریق بعید به عظم ریم لیسام پذیرد و هرگاه از جرحات واقع بوضع مکتور العظم
مده کثیری سیلان یابد بهستمال مقویات قوای بد بپرا حفظ فرموده و ملاحظه نمایند
مده در عضو مکتولیس مانند سباده شده که در عین سیلان مده براده از عظم
مکتور ریم و بایم خارج شده و در انزله رویه و این ضعیفه اگر ضرب عظمی بر عضو
وارد آید و عظم مکتور بسیار از التهابی عظیم روی دهد باشد که ورم او منتهی
بفانقرا یا حواما در استخوان کی احسن بشکارد بدن فرو و در سن شجوخیه بعد از کسر عظمی
که علیل بزمیان کفایت آغا کند یا قلق و اضطراب و صفر منضم بر سر است او
در این حالت لازمست که علیل را قدری ایمن یا مریون بخوراند تا خواب
و اعراض مذکور تسکین یابند بواسطه آنکه خواب بجران دست و اما بجهت اشارت
ثالث لازمست که مگر بعضی علیل ماله با و صعب نموده و با نوری محکم او را بچند
و قطع عضو مکتور العظم استسکامی و جوب استسکامی که کسر مرکب باشد نهایت حدت

و شدت بسیار با فانی شدن جلد مجاور و تضاد عصب شریان و خوردن
 عظم و غیره و در این صورت یا آنکه غاظر یا بر آنضو و عارض شده باشد یا آنکه جلد
 از عضو جدا جاری شود که قوامی بدن ضعیف و کمی بر سریده باشد و بعد از آن
 اگر عملاتی در فصل بر سر قاعده است که از تریج بعضی ادمان و دکت با عرق
 قوت گیرد و اصلاح آید

فصل ثانی از باب ثالث

در کسر عظام قلیق و اوسط بدن اما کسر عظم الف با طول و یا عرض و یا در واقع شود
 علی ای قسم که تشخیص سهل است و باشد که با این علت زمانی شدید است
 یا از قوت مزید دماغ منزعج و عراض لازمه او بظهور رسیده و علیل هلاک شود
 و باشد که با این کسر قطعه از عظم مکتور بریم گردد و استیام او متعوق افتد بحدیکه
 سالهای سال ماده از موضع ریم آن عظم خارج شود و بعد از خروج او بوسیله فرود
 و اما علاج در صورتی که عظام مکتوره در موضع خود باقی بمانند استعمال دویه
 و تدبیر ضد ورم کفایت نماید اما اگر عظم مکتور فرود رفته باشد باید میل فقره مخفی
 فرود رفته و او را بر تفع ساخته و با دو انگشت از ریس مخفی یکدیگر بدارند تا آنکه
 پذیرد و آنجا بیکه با این علت عاف شدیدی عارض شود و بهیچ وجه مسدود نگردد و بیم
 باشد باید آنکه با عانت آتی مخصوص مخزین را مسدود ساخت یعنی من پونات نمود
 و از نتیجه این کسر است که گاه عظم مصفات ریم شده و سالهای سال ماده فتن
 جاری شود و اما کسر عظم و جبهه در وقوع است و تشخیص او سهل است بجهت جبر و لا
 که در هیچ بدن فرود رفته و بموضع خود در دشت نموده و تدبیر ضد ورم بکار داشته
 آنجا واری از تحت رنج انداخته و در فوق ریس به بند تا مانع شود کشیدن و اما
 و استیام باید و از اغذیه رقیقه مانند حریره و آب گوشت میل فرمایند و در بعضی
 باشد که در عین دندان کشیدن قطعه از عظم فک اعلی مکتور گردد و در این صورت اگر
 قطعه مکتوره صغیر و ممکن باشد بر ریش آرد و الا بموضع خود قرار داده و به بند بدارند
 دیده شده که این قطعه از عظم ریم گردیده خارج شده است اما کسر عظم فک سفلی

در عظم

این عظم با طول یا عرض و یا در باب کشند و قاعده است که اغلب با این علت عضله از عظم
 و بهر یا عرق منقطع گردیده باشد در این حالت اعراض عصبانی با وجی شدید و سیلان
 علیل اعراض خواهد شد و اگر عضله منگ شده باشد لهیته قطعات عظم مکتور را ریم
 متفرق سازد و تشخیص باید داد و او را از تقدم ضربه وارده بر فک سفلی و وجی شدید و از
 تغییر هیئت رده دندان و سماع صوت که پدید آید در حرکت او و اما جبر این عظم
 آسانست بدین طریق که رد او فرو برد و به این خود را بکوف دان و چهار صبع دیگر تحت
 رنج استوار ساخته و بر تفع نمایند تا آنکه رده دندان بمقر خود قرار گیرد به استقامت آنجا
 و رقه معقولاتی نقل شکل برداشته و در تحت رنج انداخته و بر ریس تبه و دستمالی از زیر لب
 فرو برده و بخلف ریس تبه علاوه بانواری محکم فک و را سربسته بچپه که کالت خود باقی
 و در بعضی اوقات قطعه اوسط این عظم شکند و فرو نشیند در این حالت باید پاره خوب
 پنبه که در وسط طول نادر دارد باین دو قطعه از رده دندان نهاده که یکی دیگر را بکینه
 و نواری از تحت رنج بر ریس محکم بسته تا بقوت او قطعه مکتور از فک سفلی مرتفع گردد
 و بموضع خود قرار گیرد و بعد از رده یا در او زده روزی با دوا تبدیل نمایند و این کسر بدست
 بهیچت استیام خواهد پذیرفت و واضح است که در این مدت علیل از اکل اغذیه غلیظه
 و سخت و تحمل باید احتراز جوید و اما کسر قفاریا چنان است که منکسر گردد زوای فقره یا چرا
 او و کسر زوای را از تغییر هیئت و حرکات آنها و از سماع صوت که پدید آید باید
 تشخیص نمود و اما کسر حرم قفاریا در وقوع است چون غائر و با ربط محکم بسته اند
 و در صورت وقوع منقطع سازد رنج واقع در جوف خود را بدین واسطه بعضی اعراض
 دنیا کج اراو حاصل خواهد گردید مانند آنکه بعد از ضربه ارتفاع بطول بسیار چنانکه در
 استقامت طبل و عسرت تنفس نیز بسیار و چون عظامی مادن موضع مضروب
 و منکسر فقره مغلوب کسری شوند لهذا علیل بر عضوی که بخوابد غاظر یا کسر علیل
 هلاک سازد و هرگاه بواسطه ضربه فقره اول ثانی از قفاریا منکسر شوند عمل تنفس
 باطل و فی الفور صاحب خود را هلاک نماید و اگر با کسر فقره الترابی در کاع و غشیه

او بر سر علیل را بدان عارض گردد با قلع و مضطرب و فرسوس مراد عارض و هلاک
 مسافرو و اما در کسر زوائد قفار باید آنکه معالج از مس و دنگ زائده مکتوبه را بموضع خود
 در نموده و بطرفین او لانتکت نهاده و با نوار محکم به چینه و لانتکت عبارت از لنت
 که او را اوله می نمایند و در بعضی مواضع بخار می برند و آنجا بیکه جرم فقره مکتوبه گردیده باشد
 بر معالج کاری نیست مگر آنکه عارض از لنته او را تخفیف دهد و ضربه نماید و باطل
 آن موضع زوالت نمایند و از دهن بقی سنجی بی اللون ترنج فرمایند و بواسطه جفت
 اعضاء را از قبول خالی سازد و اگر استرغانی در شانیه برسد باید بول بکشد
 خارج نمواند کردید باید با عانت میل مثانه را از بول خالی نموده و اما کسر عظم غمز
 در بعضی اوقات می شود که قطعه مکتوبه از عظم مذکوره فرود و بموضع مستقیم و از فرود
 مسیعی بموضع مذکوره استنداد گردد و هم موضع خود در دست توان نمود و اما عظم
 خاصه بواسطه تعدد بیکه دارد سهیل انگار خواهد بود از عظم و رک و عان و تشخیص
 کسر او مستقیم است چون از جمله عظم غائر بدن می باشد مگر آنکه در بعضی اوقات
 از حرکت غیر طبیعی او دارن سماع صوت کرده بدینا سیون بدین توان پی برد اینک
 این استخوان شکسته شده و اما علاج در او بدین قسم باید نمود که فخذ را بواسطه
 جلد که عضلات استرخی شوند آنجا با طرف کناری محکم پیچیده و بالمره از آن
 تا التیام نماید و در بعضی باشد که از فرود بردن مسیعی بموضع مستقیم و مسیعی یک
 سهیل توان قطعه مکتوبه از این عظم را بموضع خود در نموده و التیام دهد و اما کسر
 قصه بدانکه این عظم بنا بر مکتوبه می گردد و بدو وجه یکی بواسطه رفاهت و تسخیر جرم
 دیگر بواسطه رطوبت بدن که او را با املا است مگر آنکه در بعضی اوقات از ضربه بلاد
 عظم قصه شکسته و قطعه مکتوبه از او منصفه سازد و ریه و جنبه را آنکه از حد که ضرر
 متاثر گردیده و بدین واسطه نفث الدم و ذات الحجب و ذات الریه و امثال آنها
 علیل را عارض شود و اما علاج در او بدین قسم می نماید که اگر قطعات او از یکدیگر
 متفرق باشند معض را از پیچیدن کافیه التیام او را و چون قطعه از او برگردد

اما کسر عظم حوز و در کین
 بواسطه ضمنت و غلطت عمل
 نه در الوقع است صحیح

فهم

قطعه دیگر را لازم است آنکه علیل را به پشت خوابانده و به بالا قوس نماید تا قطعه متاثر یکدیگر
 و بموضع خود قرار گیرند و در صورتی که قطعه از این عظم مکتوبه و بریه یا غشاء صدر جنب فرود
 مورث نفث الدم و معال شدید و عسر النفس گردیده باشد باید موضع مکتوبه را مکتوبه نموده و
 تحت او استوار و بر قشر ساخته و با نوارهای تمام صدر را به پیچید و اگر در خلف عظم قصه ده یا
 گرد آمده باشد از خوف آنکه مبادا بریه انقباض و انتقال نماید باید با رتبه مدور الراس
 عظم مکتوبه را مشقوبه یا بوجه به را دفع نمایند و اما کسر اضلاع و طریق حیرتها و از اضلاع
 اکثر اضلاع صدر مکتوبه گردند چون ضلعین اول و ثانی بواسطه عظم ترقوه محفوظ و ضلع آخر
 بواسطه ندینه و رفاهت جرم مکتوبه می شود و سبب این علت یا ضربه وارده بر طرفین دیا بر
 یکجانب از ضلع است اگر قطعه مکتوبه در ریه یا غشاء جنب فرود و مورث ذات الحجب
 و ذات الریه و غیره می شود خواهد گردید و این لفظی است یونانی و عبارت است از آنکه بر
 تحت جلد افتاده و منتفش سازد و از علامات این علت است ادراک و جوی شدیدی
 در موضع مکتوبه ضلع سیمای که تنفس و چون موضع او را لمس نمایند یا گوش فرا دارند
 صوت کرده بدینا سیون خواهد شد اما بعد از نفع جلد از هوا در تشخیص شکمی باقی می ماند
 و اما علاج باید آنکه با نوارهای موضع مکتوبه را به بندند تا حرکت اضلاع محدود ماند و اگر که
 یکقطعه از او فرود رفته باشد بطرف مقابل لازم است لانتکت نهاده و با بعد از با نظر
 به بندند بجهت اینکه قطعه مذکوره از این عجز فرزند و با قطعه مکتوبه التیام یابد و
 بمنابت مرتفع سازد و هم بر معالج واجب است حسیط کامل مرعی دارد و عملی نماید باقی
 بدین واسطه در غشاء جنب و جرم ریه عارض نشود بجهت این مطلب باید علیل را بالمره آرام بخوابانند
 و از قصد و ارسال علی موضع مکتوبه و از شرب کمال دشوره و امثال آنها به وجه احوال نوز
 و آنجا بیکه علیل را سرفه شدید باشد بجدی که اجزای صدر را متحرک نموده و مانع التیام
 شود بجهت تسکین معال باید شیر یا دام و شوره و افیون یا شیر یا دام و شوره و صفا
 بزرگ بهیچ میسر فرمود و اگر آنفیزم حاضر شده باشد یعنی همراه تحت جلد نفوذ نموده و
 مورث تنفخ او گردیده باشد علاج بخور باید نمود که فیه ذکر رفته است

فصل ثالث از باب ثالث در کسر عظم کتف و ترقوه و عضد اما کسر کتف را مضاعف نموده اند و کسر اخرم
 و عظم الکف و زائده منقار الغراب و جرم کتف بحسب این انکسار ضرر عظیمه وارده بر دست
 غلب اخرم کسر شود و قطعه اخرم از او بوطه ثقل بدی جانب اخرم رود و کتف نیز فرو نشسته و بجا
 ایستد میل نماید و در این حرکت اگر دست بروی شانه نهاده صوت گریه پنداسیون سمع شود
 بجهت زود باید بالشی ترتیب داده بر زیر بغل گذارده و عضد را مرتفع نموده آنگاه بازاری که از شانه
 گذرانیده اند عضد را بروی فملاع خوابانیده و به بندند و اما کسر عظم الکف نادر الوقوع است
 مروای آنکه در بعضی باشد که از ضرر عظیمی یا خالت دست دهد و از علامات او این است که قطعه
 مکتوره بفلج جدی نزول نماید که شایسته است تا می برسد بحد بلع این مفصل و بخوبی که در کسر
 اخرم ذکر نموده ایم هم این را فاد بکار دارند و اما کسر زائده منقار الغراب نیز نادر است
 و بعد از آنکه زائده مذکوره نازل میشود و این کسر با طول و یا عرض واقع میشود حال ای حال از شانه
 جین حرکت صوت گریه پنداسیون مکرر و سمع خواهد شد و بجهت التیسام اولاد است
 که بموضع مکتور نشسته را که چند لوبت نه کرده اند گذارده و بروی او نواری پلی بسته بجهت دست
 بکینه قرار گذارند و اما کسر ترقوه و این عظم یا در موضع اتصال و یا حال عظم قوس کشند
 و یا دیگر مواضع او اما اغلب قریب بعض کسر شود و سبب دفرجه است که بکف یا مرفق
 باید وارد آید و سبب از ضرر بدون و بطه که خود ترقوه برخورد و کسورش سازد و تشخیص
 هر دو از علامات ادست ادر اک و جعی در موضع مکتور با عدم قدرت برفع بد میل اد بجانب
 ایستد بدن و نزول کتف و بکینه دادن علیل و دست سالم مرفق جانب علت چون لمس
 و امتحان نمایند فاصله مابین دو قطعه از عظم مکتور مفهوم گردد و بخوبی که قطعه ایستد بفرق
 و قدام مایل قطعه جوشی اذ نازل است و هم هنگام حرکت بد صد گریه پنداسیون سمع خواهد
 شد و با کسر ترقوه قاعده چنان است که اعراض خلیه و نیاج روی سبب نباشد مگر هنگامی که یک
 قطعه از عظم مکتور فرو نشسته و عرق اذ دم را جروج ساخته باشد و اگر چه جبر این عظم را
 بیک لب بن اول روز التیسام نخواهد پذیرفت بلکه فی الحقیقه آنجا که او باقی ماند و یا خالت
 سهل و دانی ندارد مگر مودنی که یاد با حالت آنجا التیسام پذیرد و بن جوشی شود

و این

و مانع نماید حرکت بد را و اما بجهت جبر این عظم باید آنکه با یک دست مرفق و با دیگری عضد گرفته
 و بجانب خلف جوشی بدن کی حرکتش دهند تا بموضع خود قرار گیرد آنگاه بجهت نگاه داشتن که دوباره
 از جای خود بریدن نرود و با یک دستی خود طی ترتیب دهند قاعده او را بر زیر بغل نهاده و از طرفین او
 دو بند استوار نموده و بر دوشانه به بندند آنگاه دست را بگردن بیاورند و بکشی که انا مل بد کسر
 بتر قوه سمت جانب سالم قرار داشته باشد و بطه دو سمتال بدین موضع مستقر دارند بخوبی که
 یکی از عضد و دیگری از مرفق بکینه باشد و ما بعد از بردارند نواری و دست با هم میسند و بکینه
 به بدن به چپین و بدین حال گذارده تا التیسام پذیرد و از ابتدا ر فاد او باید محکم باشد و علیل
 باید آرام ماند تا آنکه اعراض التهاب و کین یابد آنوقت مستحکم سازند و این کسر کجی است
 رفع شده که در طفلان است تا جرح مفتوح بپایه موضع کسر از ترقوه التیسام پذیرفته باشد و اما
 کسر عظم و این عظم با قریب مفصل و یا از وسط مکتور گردد و اما کسر قریب مفصل کتف یا
 تشخیص صحبت سیماسکامی که درم و تسمی در موضع مکتور موجود گردیده باشد و از علامات
 او این است که علیل هنگام درود ضربت صد انکسار بشنود و عضد را مرتفع نموده و بکین حرکت
 بجواب ممکن است با جوشی شده و اگر یک دست بجوش نهاده و با دست دیگر عضد را گرفته
 دهند صد گریه پنداسیون سمع خواهد شد و غلبت شده شود کسر این موضع با فلع مفصل
 از التیسام داده میشود و با یک کسر این عظم با جوشی که حرکت بجواب موم است اما ممکن است
 حرکت ادولی بکسر در فلع مفصل همه جهات امکان حرکت ندارد و صد گریه پنداسیون
 و بیک کسر است اما کلی نیست چون در فلع مفصل هنگام تدریم او نیز صد اشتیاقین صوت
 سمع شود و اما سبب این کسر ضربه بدون و بطه باشد که بمفصل عضد وارد آمده باشد و از این باب
 است که همیشه کسر کوفته کی مگر بکسر و اما طریق جبر او این است که با یکی بجهت خود را بروی
 کتف علیل نهاده و محکم نگاه دارد و با یک عضد را گرفته نزول دهد و عامل حضورا بموضع خود
 رد نموده و با نواری از مفصل مرفق عضد را احاطه کند تا فوق و بعد از گذراندن از کتف دیگر
 به تحت الطحنا بر دارد و چهار تخته جوین باطنی یا قوی و با طرف عضد نهاده که عضد را احاطه
 احاطه کند و بیک تخته بیرونی معنی باشد و کتف را محاط نموده و بهتر کتف بندد چهار تخته

د بعد جانب علی در سفل وسط آنها را با ریسک حکم بسته و در نقره است نه بیا و زیند و بسته بعد
از کسر از دستمال او و به ضد ورم قفا بر نیاید و زیند از خوف آنکه مباد از شدت ورم مفصل
خشک ماند و بعد از آنکه عظم مکتور شروع نماید با تسکین بهر تسکین که نوار را نشانه
یا در کس ترین آلوده و بعضی به بند زیند که بعد از خشک شدن نشانه مانند نخه حکم که
دارد و عضوا طریق منفعت دکتس ترین بکیرند نشانه و او را قدری بوی داده تا برون شک
سرخ شود آنگاه در آب حل نموده و بنوازل آلوده و بعضی مکتور العظم به بندند صفت نشانه دیگر
نشانه است بعد از آنکه آب خالص و از هر جهر شور و سی و قطره مخلوط و در دهان خشک نموده
و در کوزه ریخته در تنوری نهان تا بولش منقرض گردد و در همین ضرورت قدری از او را در
آب حل نموده و بکوبد و یا نوار می حکم کشته و بعضی به بند و اما کسر وسط عضد را قاف
چنان است که از حرکت و تمدد عضلات واقعه در این موضع قطع از عظم مکتور مرکب گردد
و بکیرد و شخص او بهر دست بدین قسم که چنان مس نمایند تقیری در موضع مکتور بیا بند با
صوت کوه پیتا سیرن اما در صورتی که همین عظم از قریب بمقتضی مرفق مکتور گردیده باشد
چون محل مقتضی نگردد می تواند مشتبه شود لهذا شخص صعب است و از علامات او این است که بوی
تند عضله دو شانه را پس مرفق مرتفع و برآید و در فلف او تقیری حاصل شود و چون تکرش
نمایند صوت کوه پیتا سیرن مسمی شود و جبر این عظم سهل بدین تسکین می یابد الا
آنکه مس نیست که به فی الحقیقه قصوری در علاج و تدبیر طبیعت مفصلی جدید بنماید و آنجا نیکه
این عظم از قریب بمقتضی انکسار یافته باشد بهر صورت می تواند خشک نموده مفصل را و اما این
رواد این است که دو نایب عضد و کتف را بکیرند پس آنکه قدری کمرش نموده ایم و او را
با نوار به چید و چهار نخه بروی او نهاده و بهر تسکین بسته و در هر مرتبه نوار پیچ نموده و بکیرد
بیا و زیند و هرگاه مغل عضد قریب مرفق مکتور گردیده باشد باید بخوبی ماکر جبر و مجروح خود
نموده آنگاه از مقوی یا جلی دو نیم تاو ترتیب داده یکی از آنها را با سطح نسی عضد و ماعد
و دیگری را با سطح و حتی آنها نهاده و با نوار می حکم بسته و بکیرد بیا و زیند تا تسکین یابد
و او را غواض کسر مرفق نیست که یکی از آنها را بین عضد با لکه مکتور متفرق گردیده

این امر را خبر بر و آنها
نوار به چید و عضد را بیا
بند

بند در این حالت باید از حرکت بودن او منع صورت کرده پیتا سیرن شخص نموده او را قاف چید
که باین حالت ورمی عظیم در بعضی برسد و اما حرکت او را مانع نیاید بنابر علی و لک باید همیشه
مساعدا قفیده نگه دارند که اگر خشک شود با لکه در لکه زینت و اما اگر مساعدا منقسم نموده اند
بکسر زیند اعلی و زیند مغل بکسر زیند میا اما کسر زیند اعلی اکثر تسکین اخیر و واقع میشود از ضرب
وارد و بر او با از افلاکن بکف دست و شخص او بهر دست بجهت آنکه میان دو دران حد صورت
کرده پیتا سیرن مسمی شود و از مس موضع مکتور معلوم گردد و اگر قطعه از عظم مکتور مرکب گردد
و دیگر را دست در حالت انحناء بقدام بماند و در موضع مکتور تقیری بوجود آید و چون باین حالت
جبر نمایند بعد از تسکین دست از نیت طبیعتی خود بیرون رود و حرکت مقتضی بدین
که حرکت ورمی به بند ممنوع گردد و اما زیند بهر اظرف لایق بهر بیطه و آرد و بر او تسکین شود
و از مس مساحت صورت کرده پیتا سیرن هنگام تحریک او شخص توان نمود و از اتفاقات کسر مساحت
تسکین قطعه از عظم مکتور بفضا و فرج مابین زیند قرار گیرد و اما کسر زیند میا غلب
مرفق بیطه و آرد و بر آنها و از افلاکن برسد و در مرفق و حرکت غیر طبیعتی در مساحت
کرده پیتا سیرن باید سنبه بماند این علت را قاف عده چنانست که ماکر زیند با لایق بهر تسکین
و سرعت تسکین باید بجهت جبر و باید نایب از مافوق موضع مکتور و نایب دیگر از مافوق او گرفته
و بخلاف یکدیگر کشیده و اما از ملس و لک رد نماید قطعات متکسر و با موضع خود از خوف
آنکه مباد از زیند بایکدیگر ملحق شوند لازم است که بعد از جبر و لایق بهر تسکین و زیند
بکیرد بقدام و دیگر را بخلاف او در مابین زیند گذارد و آنگاه تحت طویل را بلایق بهر تسکین
و دیگر را بخلاف او زیند بطوری که تا مرفق رسد و با بعد از تسکین مافوق و مافوق
تحت حکم بسته و مساعدا را و نایب از مقوی ترتیب نموده اند که گذشته و بهر تسکین
بکیرد بیا و زیند و در صورتیکه از زیند متکسر شد باشد نیز همین طریق باید عمل نمود
آنکه چون قاعد این است که در کسر زیند اعلی یا مرفق یا مغل شخص در کسر زیند اعلی
یا علی شود علی و لک باید بعد از انکسار بکسر جهت انحراف عدا را نگاه دارند یعنی در کسر زیند اعلی
بیا و زیند و در کسر زیند مغل ازل سازند و منظور از زیند در این مقام از عظام مساحت

باین است و اما اگر زانده مرفق اغلب از ضرب با حرکت عظیمه عضلات واقع در این موضع
 صیرور شود و از علامات او این است که مرفق مرتفع شده و باین زانده منکسر مرفق تغییر
 بوجود آید و حرکت مرفق و مقرب ساعد ناقص با فانی گردیده و در مقصود می شود عارض شود
 و از انقباض عروق دم قوت بلند تر می نماید و این حالت را اکثر بفریبی شمرده که خون مردود
 نامند و بیاید و بسنگ این قطعه مکرر از عظم هرگز از ماله عظمی التیام نیابد بلکه طبیعت
 لیفی بموضع علت منقبض نموده و در باط مبدلش ساخته و بدین واسطه زانده منکسر مقرر شود
 و اگر رباط مذکور طویل باشد حرکت ساعد قریب باشد با حرکت حالت طبیعی بخلاف از طول
 او حرکت منبسط و متعسر خواهد بود و چون چنان می نماید که هر شتر راست بخاک اشتن دست آن
 غنای عظم یکدیگر متصل گردیده و التیام پذیرد اما از این جهت همیشه خوف است که دست
 خشک شود لهذا تکلیف می آید که دست را در صورت خشکیدن مضمحل
 از عجز خود باز نماند و به بنا علی دنگ بدین طریق رفاند باید بکار داشت که یکدیگر دراز
 و در دست چپ و کف مرفق لته چپ می نهاده و درازا بشکل است فربگی بسته و از مرفق گذرا
 و بعضی چپ تا قوت عضلات ناقص شود آنگاه بدین عقیده و با بستن بگردن بیاورند و اگر
 عظم رسوخ از وارد شدن ضرب بدون واسطه بر آنها دارد می شود و از این جهت است که باین
 که عضلات واقع در این موضع منقبض گردند بکدی که در بعضی اوقات فافرا یا بر سر
 و همچنین منکسر گردند از ضرب عظیم بلا واسطه اما بجهت علاج لازم است که اول عظم مکرر
 جبر نموده و باین سبب کف تخت نهاده و با توار محکم بچند و نیز اگر یکی از سلاکت اصابع مکرر
 گردیده باشد بعد از جبر تخت کو یک بطول صمیم گردد و بالنته آلوده بشمع و اخیلون صمیم
 بنامه به چید
 فصل ربع کرانالت در کسر رطوبت و طریق
 جبر آنها اگر کسر قد و این عظم یا از قریب جگر درک از غنی بشکند و یا از سایر مواضع و اما
 عنی قد اغلب عرضا مکرر شود و با بی در با و بعضی قطعه مفرد این موضع از عظم مکرر
 گردد قطعه فوقی او را و سبب این علت ضرب غلیظی است که به تریا می شود و در آید و به
 و هم از مسقطه و جودین به با باشد که عنی قد منکسر شود و این کسر در تریا و سبب غلیظی مفر

لذنه

واقع شود که در کور و کشاب بجهت آنکه در توان بر واسطه عرض و دلت حوزة عنق قد عارض
 کسرت و در سبب شخوفه از غلبه اجزای از ضربه عظم تر و شکننده اند بحدیکه به بجهت
 سببی منکسر گردند و از علامات این علت است عرض جوی صعب و جگر بعد از ورود ضرب
 با عسرت حرکت و کوتاهی پا و تقرب تر و کانتر بزاند فوقی خاصه و اگر پای علیل را
 بجهت طولانی بکشند شباهت بیای صبح بر سرند و قدم بجانب جوی میل نماید و از
 حرکت صوت گریه پیدا می شود و چون این علت مشتبه شود بکوفه که اعصاب
 با عانت بعضی علامات تمیز دهند نشان از یکدیگر از آنجمله در کوفه کی پا کالت طبیعی خود
 برقرار و کوتاه نگیرد و صوت گریه پیدا می شود و چون حرکت مسموع نشود بخلاف آنکه اگر کسر
 و همچنین تمیز باین کسر عنق قد و فلع مفرد را و اعلایا تنکه عنق فرب مکرر تشخص باید
 نمود و اگر مکرر فلع مفرد استقرار رس قد بخلف خاصه پای علیل را قصیر مکرر لیکن در
 اینجا قدم بجانب پسای است و در کسر بجانب جوی در کسر جبر کالت طبیعی که اند
 مهر در فلع مفرد را و صعب است و قوت زیاد لازم دارد تا در کسر قد بموضع خود قرار
 و از آنجا تنکه کسر این موضع قد از ماله عظمی التیام نیابد ادا بلکه همیشه بواسطه رباطی مفرد
 التیام پذیرد و بنا علی دنگ قوت با عظم ناقص و از رشی بلکه و اما علاج باید بود
 جبر و هر است که لیکن نگاه داشتن او بموضع خود زیاد صعبیت دارد و طریق جبر او این
 نایبی باد است حوزة را محکم گرفته و بفضا در و بایب دیگر پا را بجانب قدم کشیده و در آید
 از سلس دنگ زانده موموم به تر و کانتر قطعه مکرر را در نماید بموضع خود آنگاه لازم است
 قوی بود که قد و پای سالم بیکه باشد پای علیل را دهند باید چند لته برداشته و بکسرین
 آورد و موضع مکرر حوزة را با آنها محکم بچید و با بعد از تخت طویلی بجانب جوی پای سالم
 نهاده و بدین که ابتدا او از تریا باشد و چون بعد رسیده منحنی نموده او را و کفین قدم
 بدو بجهت داده و از مافوق تخت که بندی بسته آرد پای علیل را و سلم را از ابتدا
 تا انتها با سیم نوار می نمایند که کیه باشد و اگر چه استالان این فن و این کسر تمام مختلفه
 از فایده جگر داشته اند لیکن قسم مذکور که حکمی موموم به دیت دن اختراع نموده است مکرر

در تمام است و اما اگر قند از تحت زائده تر گذرد غلبه طبع قند واقع می شود و سبب او
ضربه عظیم با جهیدنست بپا و از علامات او است عرض و جوی شده در موضع مکرر و حرکت
فی طبیعی و فانی حرکت طبیعی قند و گوناومی با وسایل موت که بدین سیر و غلبه
در مصلحت تشنج عضلات قطع و از عظم مکرر مرکب گردد و دیگر را در کسر این عظم از اعلا عظمیه
است و باشد که با وجود مراعات هیچ تدبیر لایقه بای طویل قری قشر نماند و اما علاج او
این است که بعد از جبر و قطع مکرر بر زان و کشا صاحب بجهت زان و با او قند را محکم بسته و
بجای جانب او تخته نهاده و با سه رسیان به بندند و از خوف آنکه مباد از حرکت ساق قطع مکرر
از مفرود خارج شود باید آنکه قند و ساق را در لای تخته داده و با نوار محکم او را به چیده و
موردیکه موضعی از عظم قند را با مسکس شده باشد باید آنکه قند قوی و دائمی باشد تا آنکه در
بلایت او غلی راه نیاید و جهت این مطلب جراحتان ترتیب نموده اند تا وی که در موضع منجمی
یکی بجهت استخوان قند ثانی بجهت ساق ثالث بجهت کف قدم بعد از آن پانزده روز بگذرد و سه روزه
نموده و بجهت رگبه استخوان رفته آنگاه طایفی بر وی ایستاده و قریب بپای یکوب لمبندی بگذرد
که در سر او غره نصب نموده باشند آنگاه طایف را از غره گذرانیده و بر طایفی نشانی نقل الود
بیاورند تا بر مصلحت نقل و کثرت او قند قوی و دائم باشد و مانع آید خروج قطع مکرر از موضع
و هرگاه قند از قریب بموضع رگبه مکرر گردیده باشد چون بعد از التیام قند خشک خواهد گردید
آنکه غرضی در غلبه اوقات در عین التیام ساق را گرفته و حرکت دهند و از کار فروری
موضع علت را نکند فرمایند و اما اگر رضعه اغلب عرض و بنا در طلاق نشود و سبب او
حرکت عنیفه عضلات و تمدد او تا رانها است و تشنج او در و علامات او این است که بعد
از و در ضربه و جوی شده در رگبه عارض شود و از حرکت او موت که بدین سیر و غلبه
شد و بسیار است و طویع نمودن ساق ممنوع است و چون موضع علت را التیام نماید و مصلحت
بقدر پنج انگشت مضوم در این قطع مکرر از رضعه بیاورد و این کسر از ماله عظمی است
نخواهد یافت باید آنکه بر مصلحت غرض فی لینی طبیعت التیامش دهد و چون قضای این
قطع مکرر از عظم صغیر است علل بعد از التیام در حرکت و ممنوع نخواهد بود اما

بجای

بجس چون فاصله میان استخوان عظم مکرر بزرگ می نماید شش و حرکت مخصوص حرکت استخوان منجمی
شد اما علاج هر دو جوی جراح این است که فتهای عظم مکرر نزدیک محلی یکدیگر باشند که
فاصله را با صغیر باشد از این باب جراح پارافین می نماید بعد جراح عظم مکرر را با صانع
تشت نماید و یکدیگر نزدیک سازد پس آن بجهت ازنی بدور رضعه نصب نماید پس از آن
با نوار بطور منجم فرماید بدور رگبه به چپ که حلقه از جای خود حرکت نماید و معلوم است چون نیم
منصهر رگبه است و از عظم خطر است باید ادویه دفعه درم از قشر قند و زولو و کلینا شوره
و طلائی آب سرد متوالی با طلائی شکر سرب اجمال نوزند
فصل خامس از باب
در عظم ساق یا عظم حاق قشرستین هر دو منقسم شوند یا یکی درون دیگری است و استخوان است
بعث اول در کسر قشرستین معامیست و نیم در کسر قشرستین که بری بعث دوم در کسر قشرستین صغیر است
کسر هر قسم یا ضربه بی و مصلحت و یا افتادن بجای است اما بعث اول در کسر قشرستین و او بطور
سطحی و یا بطور و راب یا در وسط عظمین و یا در استخوان بالا و یا در استخوان پائین یکجا یا بدو شخص
علامات عمومی سهل است و منتهای عظم مکرر اکثر در سطحی منحرف میزند و به ندرت در طولانی
که بعد یا قشر از پای سالم میزند و در کسر در پای میزند که منتهای عظم مکرر بجهت فروری
دیرون بیاورد و علاج او مختلف است که سطحی یا در پای یا در نزدیکی رگبه عظم مکرر منقسم شود
یا آنکه اجزای سینه اطراف نیز منقسم شوند اما در کسر سطحی عظم در او سهل است که نایب یا
از بالای زان بگذرد و نایب دیگر عقب پشت یا پارافین بگذرد و یکی کشیدن نایب را در عظم مکرر را
در نموده و پارافین نماید آنجا بگردند سه تخته با رضعه عارض نموده و بعد یکبار بجای
النی دیگر بر ایجاب حتی گذارند و محافظت نمایند که تخته را در روی قورک و پاشنه قشا
چون در این آلات زود عارض عارض شود آنجا با قشرستین این تخته را محکم به بندند و اول
قشرستین و طایفه بندند آنجا سی و کوشش جراح این باشد که با و دران حرکت نماید و مصلحت آنکه
بمشا رکت آنها موضع مکرر نیز حرکت نماید از این باب و تخته طویل بگرد که در آنها یک تخته
طایف اتصال دارند که در اصطلاح رگلب نامند و این رگلب را با و ساق روان به بندند
آنجا زیر پا یا با لشی پرازشم ممتلی سازند که با مرقع باشد و نشان زان و لامل است که

با حرکت دهند علیل منفرجه گردد و در کسر مریب همان رفا و باید استیلا نمود مگر آنکه میل عظم
 کسور این است که بر روی یکدیگر مرکب شوند از این باب اضافه لازم است که تمدد دائمی بواسطه
 غرضه و خوب مثل آنکه پیش برکت کسور را بی فحشه مذکور شد استعمال نمایند و حاجی غضب
 طناب مفصل قدم است و چون پا از تریک یکبار بکسر شود در دستها آسان است و حتی که
 رگبر را منحنی بدارند و بسمین وضع بواسطه بالشی که تحت رگبر میگذازند او را در دست
 استیام منحنی نگاه دارند اما کسر ساق خیلی با جراحت جلد و فرو رفتن عظم ساق همراه است
 در این وقت جراح باید ملاحظه نماید که عظم فرو رفته را در نماید حتی الامکان و چون
 تیر بشد بهتر آنکه اول او را در نموده بعد از آن رد نماید بسیار دیده شده که بعد از
 انکسار این عظم خورده و تراشه عظمی فائز آید گرفته که او را در ساقی مگر زین کفتم
 و استیام عظم در این وقت بسیار طول میکشد و مدت نشستن یا یکسال تا خوش خواهد
 و بفاصله بدنی عظم بریزد از جراحت خارج میزند و چون زخم این البته بر می نشیند و بیم
 میرد و در شغل خود مختاری بناماید از این باب تکلیف جراح است که بیم را هر روز
 و دفعه بترید و محافظت کند که انبار نکند و چون با وجود کسی خودش و یا بواسطه احوال
 بیم نزل نماید باید از موضع مجاری جراحتی باز نموده تا بیم آبکی دفع شود و در
 فرگشتان بجهت متحرک شدن پای منکسر و خستیدار تحتی ترتیب داده مانند کسور
 که از طرف تخته میبایست و بواسطه نوزاد باین تخته بکشد یکدیگر مقصود و پای علیل را با
 متحرک دارند و چون بخواهند آن موضع را بشویند یکی از نواری را بر پشت پاره بشوند
 بعد نواری را بجای خود گذارند و بچسب نمایند و چون از کثرت ماده بیم هلاکت مریض باشد جز
 کردن علاج دیگر نیست و بیم در کسور قصبه کمر معلوم است که چون قصبه منفرجه
 مانده است غنای عظم کسور از یکدیگر منفرجه نشوند و تخفیف آسان است و اکثر از سطح
 استیاق موضع کسور فسید میزند و علاج آن قسمی است که هر چه عظم کسور شده چنانکه
 در این ذکر آن شده است و بجهت بیم در کسور قصبه منفرجه و کسر این عظم یا بواسطه ضرب
 بر یا طلع یا بجهت التواء یا عارض شود و در مقامات مخصوصه آنکه قدم علمای کسور

وجوه و فاعله
 و عرض و تفرع

باجز

بجانب خوشی و پای علیل سادی با پای است و قاعده چنان است که دو استیام عظم
 کسور یک بن قصبه کسری فرد میروند و در صورتیکه حکیم رفا نماید علیل بعد از استیام یک خواهد
 اما علاج سعی جراح آنست که قدم پای خوشی را بر استیای ساد و بواسطه این دو استیام
 دو استیام عظم کسور که بجانب قصبه کسری فرد رفته اند موضع خود قرار خواهند گرفت
 از این جهت جراح بزرگ فراموشد و پی تون اینها در استیام نموده که یک تخته چوبی
 بگرداند در دستها بالای و پشی ضخیم نصب کرده بعد تخته و پشی را با از جانب داخلی
 پاید بندد و چون این تخته از جانب پشی قدم تجاوز می نماید بنا بر این قسم را که اکنون
 بگردن است بواسطه نوار بجانب تخته کشند و بسمین قسم نگاه دارند تا استیام یابد
مقاله ششم در تفرق اتصال مرن و تفرق و نامور قطع مفصل فوق
 و خروج و فرج و در زیر و دوالی باب اول در تفرق اتصال مرن که بدون بیم باشند و مثل
 است بر چهار مفصل اول از باب طار مقاله ششم در بیان مفصل غیر طبیعی
 و چون دو استیام عظم کسور بواسطه جرم یکدیگر متصل می شوند طبیعی سطح نامور را
 اسرار نموده و غرضه و فایده که پیش از آنکه ششی مفصل مانند بطور
 که او را مفصل غیر طبیعی نامند و بدین است که بواسطه او حرکت عمرت استیام چون
 تخته باین عضو بیشتر ممکن نیست و سبب او بدو کردن عضو کسور است و استعمال رفا و تخته
 و حرکت متصل او را عضو و خوشی مزاج و کولت و رسم دیده میزد که بعد از استیام
 لامل بواسطه زب و سیلان دم و حرکات عنیفه و استیکر و ت او عظم تازه جاذب
 میزد و مفصل غیر طبیعی بوجود آید و البته هنگام استیام عظم کسور متین نیست چون ماه
 لایه ماهی کشد اما این یعنی است چون بعد از انقضای شش ماه حرکت در موضع کسور
 ممکن است شک نیست که مفصل غیر طبیعی عارض شده است اما علاج با حکیم است
 که این غرضه و فایده را بیل نماید و در موضع کسور در می پاید آرد که باعث تولید
 عظم جدید شود از این باب لازم است سایندن عظم کسور و خوش کشیدن آن و این
 تیر است که در عظم کسور را بیکدیگر محکم بایند و بعد از آن رفا و نوار و تخته

نماید اما بدین که اکثر این عمل کافی نیست و حکیم لابد میگوید که وسط مفصل جدید بخونش
 بخشد که بواسطه او دم حاصل شود بطوریکه حکیم هشی کلر که یک شخص طایفه را
 این عمل نمود و رفع مرضش کرد و به طریق عمل این است که دو نایب یکی از جانب
 دیگر از مفصل و حکیم موضع مفصل جدید را خوب میبیند نمائید آنکه بیکه درین
 ضخیم مخصوص فستیکه که در سوراخ او رفته گمان باشد و از طرفی فرو برده از جانب
 دیگر خارج سازد و معلوم است که حکیم باید کمال اطلاع از علم تشريح داشته باشد
 که مبادا بشیر این رسد و چون خاطر جمع نیست بهتر است که از دو طرف ممانعت
 از بالا و پایین بکوشد تا از انصداع ایمن گردد چنانکه حکیم هشی مذکور بعمل
 آورد و بعد از اتمام عمل رفاد با تدریج و باطنی بطوریکه در سابق مذکور شد موصول
 دارند بعد از دو یا سه هفته فستیکه را بیرون کشند و مجدداً عضو را رفاد نمایند البته
 آنوقت براسطه ماده عطسی ملتئم خواهد شد

فصل در
 در لبشکری و او تفرق اتصالی است که اکثر خلق بود که سه غلیظ از موضع خود جدا
 نموده و در جانب بالا رود و موضع او همیشه در لب علی بود بطوریکه گاهی تمام لب از
 یکدیگر متفرقند و گاهی جزئی و گاهی بی ثبات که شق تا بحدی بعد او را حنک کرکی نامند
 و جمیع پیش که لب اعلی و دو شکاف بسیارند از دو طرف که باین این روش کاف
 آنچه ماند جزیره جلدی نیست و اکثر میگویند که از فاصله میان یک یا دو دندان نمایان
 میرود و سبب این مرض اکثر خلق بود چون در بین اجزای لب مفصل مستند بود
 که از دو جزء طرفی و یک جزء وسطی موجود میشوند و در صورتیکه یکچیز از طرفین بجز وسط
 متفصل نشود متفرق نمائند و بعد از آنکه ضربه که استیام نیافته باشد بوجود آید و
 ضربه این مرض از جهت زیاده ای صورت و تخم کمال بداهت دارد اما علاج بجز از عمل
 نیکو معالجه دیگر نیست و این عمل باید اکثر نافع و مفید بسیار است و نمائید که عیب کلی رفع
 و لبشکری و اشتقاق بماند ولی بسیار مشکل است و کمال دقت را مقتضی و در اطفال
 شیرخوار اکثر بایه بعد از گذشتن کمال تمام عمل نموده بکن اگر از شش شش منع باشد در آن
 (بکشد)

زبان

زبان لابد از عمل به طریق عمل این است که بعد از نگاه داشتن و درست جلد و دندان کجرا
 بمشده آنکه جراح ملاحظه نماید که موضع متفرق نموده باینه اما در صورتیکه تمده باشد جلد را
 از لثه لف نماید در صورت رفع تمده جراح بکشد تحت موضع متفرق که آمده با دست چپ
 لب را بکشد تا که فته آنکه با دست راست دستش را مستقیم شد پیش را از بالای تفرق عضو
 فرو برده بعد از آن که لای پوست لب با ششک باین کشد باین طرز رفته کنار بریده میزد و لازم
 است که جمیع سخی غیر طبیعی را بر داشته بکشد که لب برود و بهین نوع در جانب محاذی
 او عمل نماید بعد از این در رفته او بکشد را بر هبطه مفصل موصول کرده بر دارد و خون همیشه
 بر هبطه فشار دادن نمایان لب بخو که لب را بمیان دو انگشت گرفته شد شود آنکه جراح
 و لبشکری محاذی یکدیگر داشته و با ششک بخیه نماید و این بخیه را که کشیده است
 از جانب تشویه کل بسم جزء ششکری یا بخیه ششکری یا بکشد یا نموده و طریق
 جراح این است که خط سر مدی باین سه غلیظ او را با کمال دقت محاذی نماید
 آنکه بیکه جراح ششکری در این خط فرو رفته و از خط محاذی خارج سازد و چون خواطر ششکری
 که این دو خط به یکی مملو شده اند آنکه در میان کنند و بدی ششکری انداخته و بنای
 سه ده آنکه حکم دهد که بجانب سفلی کشند آنکه ششکری از جانب اعلی قریب بمخرج
 و ششکری دیگر از جانب وسط فرو برده بعد از آن بکشد در میان دو لایه موم زده
 و از ششکری بالائی ابتدا نموده بطور ششکری فزنی احاطه نماید بعد از آن بر وسط و چون
 باخبر رسید ریسمانیکه سر زده بنای بود برداشته بد و نیز به بچه و فاصله باین
 ششکری را در رفته نازک از مشیم بچسباند و نوک ششکری را با کار قطع
 نمایند در اطفال بعد از چهل و هشت ساعت و در بزرگان بعد از هشت و هشت ساعت
 ششکری را بیرون کشند که در این وقت استیام حاصل شده است و چون
 دو ششکری دارد جراح در عمل دو راه دارد بطوریکه جزیره جلدی بسیار
 باشد نه تنها که او را بالمره بردارند چون از بودن او ثمری حاصل نیست و از
 جهت رفع تمده قدری از دو طرف لب بکشد قطع نموده که دو طرف زخم بی ادیت

بسم مقبل شود اما بعضی در وقتی که جزیره بر یک بشه جمیع برداشتن لب مصلحت
 نیست آنگاه در عمل لب شکری نماید و طرفین مشتق را با جزیره جلدی مقبل نماید
 و بعد از اتمام عمل طفل را به پهلوی پائینده و اغذیه رقیقه بدو بخوراند و بجهت
 آنکه از گریه منعش نموده و آرام دارندش قدری شربت کوکب را بدو دهند
 و هرگاه بعد از عمل التهایی شدید در موضع مجروح بر سر و آل است بر آنکه ریاضی
 نخیه محکم کشیده شده در این حال باید قندی مست نشان نمود
فصل ثالث از باب اول در تنجک و او نیز از امراض خلقی و غلبه شقی
 شفه است و بجهت این علت عدم قدرت بر من پشیا و یا منیا که در بدن ازاد
 و نقصان در تکمیل اعضا علاج او این است که موضع منقه را از آلتی مرهم به پلاست
 مرثب از منج کوبه بر جای ممتلی و مسدود ساخت لیکن هرگاه کبیر و عاقل باشد
 بهتر است که بواسطه عمل به رفع علة او نموده و طریق عمل این است که علیل را در مکان
 روشن نشاند و بمابین دندانهای طوطی از چوب پنبه نخیه قرار دهد که آرد و دمایا با
 عویض زبان را بخواباند و عامل انبری طویل کوف و دکان فرو برده و کنار غلغله
 گرفته با مشرطی مستقیم بکوشه بشافه تا بالا و همین قسم نماید طرف مقابل را آنکه سر
 شته را از پائین هم بریده و بیرون آورده و بجهت نماید و طریق نخیه او این است که بر
 سوزنی و بمیان کبیر نصب نموده و بدکان داخل و از یکجانب موضع منقش فرو برده و بعد
 از خروج از جانب دیگر فرو برده و بیرون آورد و در میان را از خارج دکان کره
 نموده و با عانت دو اصبع ابراهیم پیش برود تا موضع علت و همین کو نخیه نمایند
 بعدی که کفایت نماید او را و بعد از اتمام عمل بجا بر روز نخیه را بردارند و از اغذیه
 رقیقه میل فرمایند و از تکلم احتراز جویند
فصل رابع از باب اول
 در تنجک و این علة واقع شود اغلب زنان را هنگام وضع حمل در بعضی اوقات قطعه
 صغیری و در بعضی بابلر همان تا بمجا مستقیم منقش گردد و در صورتی که شقی او منقبض
 خود بنفسه التیام نپذیرد از خوابیدن بپهلوی و مقبل نمودن فموزین را بیکدیگر و لیکن

چون بالمره همان از انقطاع رگس چنین منقش شده باشد و از دم نفاس سیالاید التیام نخیزد
 پذیرفت سیما اگر عضله شرح قسم شقاق یافته باشد جلد همان فاسد گردد و جمل خارج
 در جسم از موضع خود نازل و برار بدن را راده دفع شود و آنجا که شقی همان قدیم باشد
 عمل به صعب است لیکن با وجود بر این باید عمل نمود بدین قسم که اولاً بواسطه طبیع اسعاف
 از انفول فاسد ساخته و عیسید را بروی کرسی مانند آنکه در غسل حصاة مثانه خوابانیده
 و نایکی کسین را از هم کشوده و عامل با انبر کنار موضع منقش را گرفته و با مشرطی دور شده
 هم کشوده و دو جانب موضع علة بریده و خون را بسته و با سوزنی منخی نخیه نمایند و برود
 او قدری کتان آلوده بر وزن بادام نهاده و بآله پوشیده آنگاه نزاری بر داشته از کمر
 بسته و از پائین در بشکلت یونانی بدین گونه ————— گذرانیده و به بند نهاده
 از اتمام غسل علیل را به پهلوی پائینده و با ابراج منج نموده و هر چند روز باستعمال طبیع
 اسعاف را خالی سازند و هم باید دقت نمود که موضع مجروح ببول نیالاید و پشت یوم بعد
 عمل نخیه را بردارند و از اسفنداج رصاص لته آلوده و بموضع علة نهند و بهین نحو عمل نمایند
 نمود همگامی که از جماع شقی در همان واقع شده باشد
باب ثانی از مفاصله ثانی در ذکر قروح و اقسام و سبب و علامات و معالجات
 آنها و شتمل است بر هفت فصل **فصل اول** در تعریف قروح و تقسیم و سبب
 و علاج آنها بطور کلی و اما قرحه عبارت از تفرق القالی است از من که مستعدا بآلتیام
 ندارد و از او صدید حاد پالاید و بر موضع که برخورد متفرحش سازد و بدین تعریف
 استیاری باید از جروح و دما میل و واضح است که هیچ قرحه بنفسه رفع نگردد الا
 در صورتی که بواسطه تداویر و معالجات لایقه بجا آید سالم بمبدل سازند او را و احکام
 سبب این علة یا سببانی است خارجی مانند قرحی که از ضرب و سقوط و حرکات عنیفه
 و استعمال مشعات عنیفه حاکم الکاله در عضوی حادث نموند و یا سببانی است داخلی مانند
 قرحی که سبب دایم افرخیه یا خنازیر و تقرس و حصیه و استسقاء باشد و هم در بعضی
 اوقات از سوء مزاج و ضعف بدن قوی باشد که در عضوی قرحه عارض شود علی ای حال

کل قروح یا مفرد یا مرکب منفرده است که جز قروح ظاهر است و دیگر صاحب خود را بر
 نداده باشد و مرکب او را نامند که از مرض مزاجی یا بواسطه مرض مزاجی عارض شده باشد
 و هم بنا بر شکل و کیفیت قروح را منقسم نموده اند در قروح نامرئی و غشوی و قروح در
 و سفنجی و غشوی و قروح که با ریم بدن عظیم همراه باشد و همچنین قروح سالک و بنا
 بر ترکیب مرض دیگر قروح را منقسم نموده بقرصه سترخی که عضو متفرج ضعیف و جزو
 او قلیل و بقرصه خناری و تشکی و سرطان و اما سبب که از قروح است از همه و اما بدن
 بروز می نماید مختلف است مانند آنکه هرگاه قروح عظیم باشد از درایت صدمه و در سبب
 دائمی او مزاج فاسد و حیاتی عارض خواهد شد و لیکن بعد از آنکه طبیعت بدن تر
 عادت نمود اگر بمعالجات منع نمایند او را از انتقال ماده بموضع دیگر مرضی دیگر بروز
 شود در صورتی که علل را بدان مرض استعدادی باشد مانند آنکه در مستعدین از علاج قروح
 راجع مرض سریع و از لوازمیر معقد مرض سل مقلد خواهند شد و اما انداز قروح مختلف است
 با خلاف حساب و عضو متفرج لب آنکه قروح اسافل را علاج اصعب است از قروح
 اعلی و همچنین موافق دوام و بهیت قروح و مزاج علل و حسن او انداز قروح خللا
 بر سبب مانند آنکه قروح بدو شکل و بر من را علاج اصعب است از قروح جدید
 که طول واقع شده باشد و اما احاطه به آنکه در معالجه قروح علاوه بر ازاله سبب
 بر اعانت چند چیز لازم است من جمله آنکه لحم نابت در قروح نه زیاد و نه کم باشد تا فی
 آنکه علی نمایند تا قروح بوجاحت سالم تبدیل گردد ثالث آنکه عین استیقام از موضع
 لامل و کافی باشد و باید دانست که کل قروح بنا بر طبیعت و رفتار خود یا الهی است
 و یا عصبی و یا بلغمی اما قروح الهی همگانی است که اطراف موضع متفرج زیاد تر
 و عمق داشته باشد و یا ترشح غده قلیل و یا معیشت در این حالت کجبه علاج لازم
 استعمال ادویه دافعه ورم و ارسال علی و طلای از سفیداج رصاص و سیم باید
 عضو متفرج را آرام داشته و از مشروبات شوره و طریح میل فرمایند و اما قروح
 عصبی است که عضو متفرج زکی محسوس شدیدی که از طبع جزئی الم شایع است و صاحب

خود را عارض شود در این صورت باید از داخل و خارج ادویه مخدره بکار داشت مانند شرکاب
 و پوست که کنگر و شرباقون و امثال آنها همان این قسم قروح را مفعول است و قروح
 بلغمی او را نامند که طبعش با رطوبت و با خون و با حبه و حش و قلیل باشد در این قسم باید
 مقویات استعمال نمود تا قوی بدن و عضو را تحریک نماید و از جبهه رفع این قروح عموماً
 معدنی و جوهر فلادیل نموده و بموضع متفرج قطیر زریح و سنگ چشم و گات کبود نمایند
 و اما قروح غشوی یا تشکی میزد از بدن او که خاکستری یا سیاه است و از او صدمه
 متعفن پدید و بر عظم فاسد و زایل شود و سبب تبدیل قروح غشوی یا تشکی و تشکی
 و تشکیات بالایی و تشکیات دکان عارض و هوای متعفن و اکل اغذیه روتیه و امثال
 نموده و در دانت مزاج و امثال آنها است و علاج این قسم از قروح بعد از ازاله سبب
 ادویه است که بواسطه آنها غشوی یا تشکی و تشکیات عارضه از سر گیرد و لهذا باید مطبوخ بود
 که کینه و ادویه فلادیه و کافور و مریم غائی و لغت و عموماً متعفن میل فرموده و موضع
 قطر مطبوخ پرست ماردون و آب آهک و پوست سبز کرده و استقر و یون و کرد و زغال و روغن
 سقر و سرکی و کافور و زرد ارمنی و فلفل و روغن بکار داشت و بعد از قطع فاسد از
 عضو به بدن تا قروح بر دانه و هرگاه بدین قروح دیدن متولد شوند باید قروح را تشکی
 دروغن سقر و قطیر صبر نهد و آب دار اشکنه و کلاب بقرصه بمالند که تا بدین حال
 شوند با سایر معالجات که در معالجه اول در علاج غشوی یا تشکی یا تشکیات عارضه
 است که کنگرهای قروح عظیم و مانند غشوی و تشکی است و اما قروح سترخی اغلب تشکی
 عارض شود که قروح عظیم تشکی و تشکیات این قسم از قروح زیاد از سایر عارضه میباشند
 و کجبه علاج لازم است که اولاً صلابت اطراف او را آداب نمایند بهستعال صلبه عطسه
 و در هم ترش از تشکی و تشکی که دالین سبک چشم و سایر ادویه عاده و چون از سبب
 اینها نفع حاصل نگردد باید آنکه با شریط صلابت اطراف قروح را بریده و بدانه و اما قروح
 سفنجی او را نامند که لحم نابت از موضع متفرج زیاد تر است و تشکی است در این حالت
 باید لحم مذکور را فاسد ساخت بمالیدن سنگ چشم و گات کبود و امثال آنها در سبب

لازم می شود که قره را با این تافتی که نمودن بعد از این عمل قره بر سره رفع شود و رسم باید که از باز و خشک و شنی عضو متفرج را رها نموده و با قره دوا لی اغلب از اسافل اعضا و شود و با دهر است و دوا لی ساق یعنی در در و استحکام آورده ظاهره او و سطح موضع متفرج کرده و لن جلد اطراف فاکت و این قسم از قره را از مزه دهری و صابون سکه و سپر و دهری و جوشن مستعد و اما علاج باید آورده عضو متفرج را وقت داد و بچ نمودن و قره را با تفنگ پوشیده و از خوف آنکه مبادا از علاج او علی و یکی از اعضا ریشه دهری باید بر وضعی از موضع بدن را کی نموده و دقتی ماده از او بکشند و فصل تالی که و با تالی در قره که کجا با دهری شده باشد و سبب مرض این قسم قره در پالیت برای لیس است و او از قلب و اغلب شش می را بر سر که بپا دهری یا کما می کنند و سبب دهری خارجی و یا بنف از ماده داخل عارض شود بدین طریق که در یکی از موضع رمل شتره جستی ظاهر شده و بر قره و متفرج شود و اغلب با این قره دوا لی یا تالی در با بر سر اگر چه قاعده است که این قروح بطور نرطیت بدون دهری و التهاب باشد لیکن می شود که بواسطه سبب هذت و التهاب بر سر نه و انفع جمیع معالجات است که در صورت التهاب او طلای سفید اج رها من مبار و بکشته و عضو را آرام دهنده و بعد از تسکین التهاب با و بقای تالی باید دوری دو نوبت با دوا با آب سرد شسته و قره را با پنبه پوشیده و با دوا بشین با پنبه بدین تدبیر بسته در دقتی قره را بپوشانند و اما چون مستعد گشت باید بعد از دفع عله تا چندی از دوا پنبه بپوشانند و بعد از آن با یکبار اغلب با این قره سده کندی یا سپر می باشد باید منضات جاریه است و باید است که این قره در فصل خریف بشتاء مایل بود است و هر گاه قطعه عطشی متفرج گردید و سکه که جلد ساق از عله و شفقت بر سر آید باشد التیام محال است بلکه بد و واسطه در بعضی قطع عضو از فوق موضع متفرج و جوب بهر ساند و فصل تالی که از باب تالی در قره خا زیری و چون این قره است که عارض شود

لا ناده

از ماده خا زیری و با دهری است نفخ عروق را وضع لهذا لازم است ذکر مرض خا زیری با سبب و علامات و علاج آنها اما خا زیری علی است مزاجی که اغلب در کس طفولیه از دست مزاج و سوء تهیر و غذا و شراب و نمک در آنکه تاریک در طبعی عارض شود و بد و هیئت برور نماید یکی خا زیری است که در مویین را بر سر اما اطفال مستعد بدین قسم خا زیری رفتار و نموده بی بختی آنها سرخ و جلد آنها سفید و بدن لطیف با جمره رخساره و جلاء مقفه و موی آنها سفید و خا باشد باز کادت حساسه و دیگر خا زیری است که بلغمی مزاجان را عارض شود و این اطفال را بعضا مسترخی و شنج با عظم شفه و نموده بی بختی آنها سرخ باشد با بزرگی شکم و اغلب متلا شند و بر چشم و بثورات جلد و از نتایج این مرض است که غشاء مخاطی حسیع اعضا را ترشح بیش کرد و عدد بدن متنفخ و متفرج شوند با هزال بدن و با لاخره علل برهن سل یا فح عظام متلا که دیده و بلاك رسد و اما قره خا زیری را دنج خفیف و کنار صلب و منقب یعنی جلد اطراف از لحم منفضل باشند و کنار کای او را حرقی است تنفسی و شش غشای کاذب پوشیده و دریم مد فوع از او رقیق و یقوام دوج است اما علاج و رفع این قره منوط است بر سلامتی مزاج و اصلاح او در بعضی اطفال است که در این نوع مرض خا زیری بالذات رفع شود و هم باشد که ماده خا زیری بر میشتعل گردید و مودث مرض سل گردد و چون سبب این قره مرض خا زیری است لهذا باید اول مرض مذکور را رفع نمود تا قره که عرضی است بالذات التیام یابد و بر صحن این عله واجب است مراعات سته ضروریه من جلد باید از غذا لطیف و سیرج الا انصام میل فرمود و با هر یک معکول و سیلا قات نقل نموده و روزی یک نوبت بدوا بشیند و از جلد او به نافع در این مرض مقویات است مانند دوج و مطبوخ پوست سید و بلوط بریان و علاج جدیدیه و غیره و هم بعضی ادویه مخصوصه بدین عله حکما یا فقهرا اند مانند انیمون قی و کوکرا انیمون و در ای موم

برایت درید و شوکان و نظردن ش می دانند برشته وید و روغن مله
 موسوم بایل و دود که استعمال آنها صاحبان این علة را نفی کلی حاصل شود و هم
 بجهة اعانت طبیعت بر تحلیل ماده این مرض لازم است که بعضی اوقات سبیل
 مرتب از کل و جلب و درین چینه میل فرماید و سبیل تمام بماده فروغ یا مطبوخ
 خالص عطره و شراب و آب که در یک طعام نیز معیده است و باید آنکه بعد
 از استعمال بدن را دلی قوی نمود و اما بجهة تحلیل سبیل و تنفیع غده جذبه بعضی از اوقات
 موضعی باید کار داشت مانند هر هم آب و لک و شمع مرتب از شمع شوکان
 و اشق و کافور و ایون و مراره کافور و انفع جمع آنها تریج وین بدست و هم مالید
 سنگ جهم بسط قرص خازیر به بسیار نیکو است صفت دوائی نافع بکیرید
 دو پوتاس یک تاسه شود در چهار مثقال کلاب حل نمایند و در یکروز به نوبت
 در شامی قریب بسن و وارده الی معده بنوشانند صفت دینی که زیاد آزموده است
 بکیرید و دو پوتاس است که در غلص یک کوزه که چهار مثقال بطریق معمول
 چینی ترتیب داده روزی یک کوزه صبح و یک کوزه شام بموضع متفرج یا غده متفرج
 بمالند و این دایمی موسوم بایل و دود که انفع و اقیی است از سایر ادویه
 باید از ابتدا روزی دو قاشق بدو نوبت میل فرمود و بعد از روزی او بهر اندازه
 تا روزی شش قاشق بدو نوبت بنوشند و اگر چه در ابتدا از شراب و تنفر و توبه
 دست میدهد و لکن بعد از چند روز که طبیعت ملامت نمود مرض این حالت خواهد بود
 و هرگاه قرص خازیر به در شقه و انف یا جبهه عارض شده باشد استعمال او
 مذکوره نافع لکن از خوف آنکه مبادا قبل از بروز اثر دوا قرص اعصابی مذکوره
 فاسد سازد باید اول قرص آنها را با سنگ کلاب خشم آلود تا قبل از ظهور اثر دوا
 فساد از او موجود نکند و مرض خازیر را با معالجات چون تفصیل در کتاب
 امراض بلطنه و کمالی ذکر نموده ایم اینجا مختصرا ذکر کنیم و باینکه
 از بعضی ثورات جلوی مانده جدی و جوب دردد ریش و غیره را در بدن فرو

نانی

عارض شوند مختلف که تفصیل هر یک را در کتابی جداگانه در باب امراض جلوی ذکر
 خواهیم نمود و اینها لکن در اینجا بیان می نمایم که این قروح بهر علت علاج پذیرند از یک
 نگاه داشتن و استعمال اضمه مرتبه از باب حشره از می و نفع و کل بود و در آن
 شمع و امثال آنها و هم آلودن سنگ جهم بسط موضع متفرج نیز اینها است صفت
 دینی نافع در جیسیم قروح بکیرید زینت احمد بکیرید که کاد و دو مثقال مخلوط کرده و
 به دالود بموضع متفرج کنند

فصل دایع از آب

در قروح خبیثه که باعث داء افرنجیه بوده باشد و چون این قروح عرضند از مرض مذکور
 و بعد از علاج او بالذات قرص التیام پذیرد بناء علی ذلک ذکر می نمایم مرض مذکور را با
 درجات و علامات و معالجات آنها اجمالا اما آنگاه فرنگ که هم آشک نامند عارض
 از مرضی است مزاجی و مسری که از مجاورت و ملاسته با اشخاصی که بدین علة مبتلا باشند
 عارض میشود بدین قسم که بعد از ورود ماده مذکوره در عضو قرصه عارض شود و ماده او
 بر سطح عروق جذبه تمام بدن رسیده و مزاج فاسد گردیده مورت مدت و بروز
 علة خواهد گردید و قریب به سیصد سال است که حکما با حال این مرض بی پرده اند و در
 ابتدا مانند سایر امراض و افده از قبیل داء طاعون از مجاورت و تکلم با صاحبان
 آشک سرایت می نمود و در چند روز صاحب خود را بر لاکت میرساند و یکن قریب بعد
 سال است که قرص مسریه او ناقص گردیده و عارض میشود مکرر با سطح رسیدن ریم او
 بموضع از اعضا و در طبعان عارض سرایت این علت اقل و علاج اسهل از آشک در بدن
 بوده و دوام او کمتر از پنج هفته خواهد بود و هم باشد که در هفته ثالث بواسطه
 تقویت طبیعت رفع شود سیما در صورتیکه صلاحی در موضع متفرج از او یا نفی
 در بعضی از غدد بدن باقی نمانده باشد و قاعده آشک بعد از رفع قروح آشک اثری
 زشت در موضع متفرج بهر سبب یا ماده او بخاین مستقل و مورت و درم خیارک شود
 و چون این مرض با مسه در بدن باشد و هر یک مقتضی علاج علیحده اند لهذا بیان آنها تفصیل
 لازم است اما درجه اول را مسه از آلات تسلسل است که چهار یا پنج روز بعد از جماع

بشخص مبتلای مرض کوفت در قصبه مخصوص قریب کشفه بتره به بزرگی سر سحاق
 مبتلای اندر طوبت شفاف بروز نماید و این بتره از اصطکاک لباس برودی بتره
 و بعد از تر قیدین لیسام نیاید بلکه اطراف را بسطی میوزد و تفرج کوفتی درجه اول
 حاصل میزود و کنار این تفرج کلب اومی مانند گاهی سرخ و گاهی ملب و غشرونی
 و گاهی با تریل یکیشند و سطح تفرج همیشه پوشیده است از غشاء سفیدی که اودا
 غشاء کاذب نامند و نشان آنکه این غشاء کاذب است نه ریم آن بود که آب شسته
 و زایل نشود و زمانیکه با اینر بقوت بر دارند برودی بهین غشاء متولد گشته و جدا
 بپوشاند اودا در نیمه هفته چهارم یا پنجم لم سالم از نه دهم میزود و لیسام باید
 و این باید دلیل نیست که کوفت درجه ثانی عارض نشود بخصوص حکیم حد شار عرض
 کوفت ثانی بستن باید نماید که چون بعد از دفع مرض کنار گای آن صلب می مانند بنا
 علی دنگ باید غیر دهند باین قروح و بثورات ماده آتشکی با سایر بثور و زشایا
 در موضع مذکور عارض شده باشند مانند آنکه بعضی اوقات که در قصبه ثانی
 بیت عدد بتره یا تا ایل میروارند رنگ یا اندریشی عارض شود بدون آنکه سبب
 واد افزنجیه است **سوال** ای همیشه معالج می تواند علی نمود که تشنگ
 درجه ثانی نرسد یا نه **جواب** اختیار بدست او نیست بلکه میزود با و بود
 تا ابر در دلالت نافه تشنگ درجه ثانی برسد و اما احلاج از تقدمه
 المعرفه است که هرگاه با زنی جنسی مباشرت نماید بتره قصبه و بعد از
 جماع با بول بشویند اما چون بتره و قره عارض شود و بدرجه اولی رسد بتره
 ساقی بکنوب آلت را با آب گرم بشویند و بموضع ریش زین امر یا کمال
 صحت با قند پاشند و اولی تشنگ نه را با آب غلظ آلوده قره و ریش را
 با دوشیده و بلور آرام دانه و بعضی حکما در این درجه نیز بدون مایه سیمیا
 واد و سیمیا به استعمال نموده اند لکن خط است بلکه باید اولاً تا ابر مذکور
 مراحت فرمود اگر مرض رفع شد فبا دلا بعد از آنکه معلوم شود رفع نخواهد شد

درم

در دره ثانی از او عارض خواهد شد می توان دوشیده سیمیا به میل فرمود و دسم تفرج
 دین زین سیمیا الی لون و کمال اطراف این قروح نافع است و هرگاه در اطراف
 قره درمی بین فلغو نیا عارض شود باید علیل عضوا آرام داشته و از با و نه مطبوخ
 بالین ضماد اندازند و در صورتی که قره مذکور روی باشد فلغو نیا با نقرا یک
 شود یا مستعد آن باشد که غا نقرا یا کیرد باید از مطبوخ مازو و بوره از منی طلا
 نموده و بموضع متفرج سحق مازو پاشند و چون تا ایل غیر سالم از او برود باید
 سنک جنم بمالند و حتی المقدور در این درجه از شرب سیمیا احتراز
 جویند تا آنکه به بینند که بهیچ وجه معالج نشود آنکالا باید سیمیا میل فرمود
 و از خوف آنکه مباد آتشک در درجه ثانی بروز نماید لازم است که علیل را یک
 از این عشب و چینی و شایند و در بعضی اوقات در او اخرا این درجه علیل را خارک
 عارض شود و اما اخبارک عبارت است از تورم فته از غده واقع در میان است
 اگر قره در جانب این از بینه و قصبه باشد خارک در جانب این واقع شود و بالعکس
 و علامت ادین است که سیمیا بچند هفته بعد از وجود قره تشنگ در قصبه علیل
 حساس نماید نفلی در جانب دور می در یکی از غده واقع در او و بعد از چند
 روز جلد آن موضع حس و تنفسی گردیده و وجعی ضربانی عارض شده و بمرد وسط
 موضع متورم لین و متورم گردد و کنار گای موضع متورم غده برسد و بهیچ وجه لیسام
 نپذیرد بلکه از حرکت زیاد باشد که غا نقرا یا بر او را عارض شود در این صورت
 خوف عظیم است بواسطه مجادرت با عروق عظیمی که غا بر انداز این موضع و اما اندا
 این مرض چنان بیک نیست چون زیاد طول می کشد و هم در بعضی اوقات
 بعد از انفجار چند ثقبه ماسوری بوجود آید و هم در صورت عارض غا نقرا یا خطم
 عظیم است و اما سبب او نیست مگر انتقال ماده آتشک سیمیا هنگامیکه صاحب
 آید و تشنگ حرکت زیاد نماید یا سنک جنم زیاد بموضع متفرج از او بالیده باشد
 از غده او ماده مبرایت کند یکی از غده مبرایت نموده و خارک برسد و اما

علاج باید آنکه بعد از ظهور دم بدون تأمل زانو نشاند بموضع منورم و چند نوبت بسط
 رتبه از کل و جلب میل فرموده و بالمره آرام مانند و بجهت تحلیل غده مذکوره مشمع زاری
 بنده از نه و نقل مکان و نمایند بموضع دیگر که با اصطلاح بر نه نامند یا ورقه سرب بدان
 موضع ببنند و اگر در جلد حسسه هر سه باید زانو نشاند و یا ورقه سرب محکم
 بست تا بسرت تحلیلش دهد و هرگاه با وجود براین تحلیل نرود و ماده در او حاصل شود
 لازم است بجهت نفیج او اضمه حاره بالفعل بکار داشت و بعد از نفیج باقیاب المال
 یا غیره وینه که نسخه او در خانه کتاب بیان شده است و در سر منفر ساخته و بعد از
 دفع ماده قدری گمان بکات کبوده و کجوف او فرو برده و مبادرت نمایند به
 استعمال اضمه تا مصلابت اطراف او لین و یاریم خارج شود و اینجا یک با وجود براین
 تا بر مصلابت اطراف ملین منحل نکرده و قرصه التیخام نیاید لابد باید ادویه
 میل نمود که از آنها عله زایل خواهد شد و اگر عضو مذکور را غایب یا عارض شود قسمی نمایند
 که محدود کرد در این صورت باید لته را به ورق محلول در آب الوده و با طرف عضو
 انداخت و از مشروبات معنای مانند کنه کنه و شراب و لغز و امثال آنها میل
 فرمود و جوف موضع مستلای بجا نقره یا از خلوص اردو شتر متس ساخت و باشد
 که در اطراف دم نالیسه لحانی موسوم بکنه ببرد و در این حالت باید آنها را
 با مرقاضی چید و هرگاه کنار قرصه صلب و سیاه باشد و بدین واسطه التیخام نیاید
 لازم است که با مشرطی کنارهای او را قطع نمود و اما آبله فرنگ در درجه ثانی و
 قاعده خلفش که بعد از آتشک درجه اولی در شش با ممت معتبره بروز نماید
 و هم باشد که دوس سال تا ممت سال عوض او لغوی افتد و در فرنگستان این
 درجه در جلد بروز نماید با شکالی مختلف و بنا در در حلقوم و جوف دمان غرض
 شود و بالعکس در ایران که اکثر در حلقوم بروز نماید و قسمی از او پشت که در
 بعضی از مواضع بدن بخصوص جبهه و خلف اذن بکلهای می که یکی از حمر لکون
 بروز نماید و یا آنکه یک لکه بر سر کلید شکل و باشد که بنوعی لب لبان سلک

می

می رنگ بر سر و منفر کرده و در تحت آنها قرصه بود آید و این قرصه را اطراف بدن
 مس و کنارهایش نازل و فرو نشسته و یک شکل دهنده مد فوعه از او برقه بجهت بیان
 غشاء کاذبی بر پشت و از شش زایل نکرده و هم باشد که قرصه خسته در سلامت اصابع
 بروز نماید و در این ماده مذکوره اغلب در جلد باطن سیم در خلف حلق و لوزین بصورت
 درمی خفیف ظاهر شود که صد اگر فته شود که با وجود درم حلقوم از در او را منع قلیل نماید
 باین طریقه که از یکجاده تمیز داده شود و چون علیل لفظ آج ممتد اکو نه و دمان در شکله
 نمایند حمرت و تباهی در حنک رخو ظاهر باشد که سطح او را غشاء سبزی پوشیده و این
 غشاء کاذبی است که بعد از زایل شدن در مدت چند روزی در تحتش قرصه بود آید
 لبان فرو می که در جلد ظاهر بیان رفته و هم در جوف دمان و اطراف زبان و
 کنارهای لب بعضی کلهای ظاهر شود لبان قلاع و متفرج شوند و هم باشد قرصه خسته
 که در حنک بروز نموده و فرو نشیند و عظم را فاسد سازد در این صورت علیل از بلقی می
 نماید و هم باشد که در غشاء مخاطی انف درم آتشک بر سر و بمافوق خود سرایت
 نموده عظم مصفا تراریم و فاسد سازد در این حالت نفی کریم از او مشموم و انف
 فرو نشیند و هم میشود که قرصه مذکوره اکل نماید غشاء رقیف شکل انف را و هم باشد
 که قرصه از فضای دمان و حلق نزول نماید بحلقوم و غشاء رقیف او را فاسد نماید و
 بدین واسطه حلقوم منطقی شده و معبر هوا مسدود گردیده و علیل را ضیق النفس
 عارض و هلاکت رسد و قسم دیگر از آبله فرنگ در درجه ثانی است که شکل نالیسه
 لحانی موسوم بکنه ببرد و کنار لب یا سفید و قشیر و مقعد و یا در تمام بدن عارض شود
 و قسم دیگر از این درجه است که ماده آتشک در طبقه عنسیه چشم بروز نماید و اگر
 در علاج غفلت در زنده در چند روز صاحب خود را عمی گرداند و تفصیل این قسم را
 چون در کتاب کمالی ذکر نموده ایم بگزارانده پیوستیم و باید دانست که اگر این
 ماده در بدن بماند و مزاج را فاسد سازد و دمانت او بظلام سرایت نماید او را
 آتشک در مرتبه ثالث نامند و در این حالت ماده این مرض یا بکلید و شیکه است

جذاب سرایت نماید و مستحقان سازد و صورت خا زیر گردد و یا آنکه بمغصه و غشاء ضریح
محیط بر عظم و استخوان عظمی که برهنه و محض از جلد پوشیده شده اند مانند برقی و قصبه
کبری و از غضب این ماده و جی در عظم هر سه لبان آنکه وجع مغصه و دکن
این وجع را حالت مخصوصی است که در لبانی است از آنکه در نهار و بعد از دخول
بستر وجع تا نصف شب شدت کلی میسراند و بعد از چند یک بدین منوال که شدت
رطوبتی مانند لعاب صمغ عربی باین جرم عظم و غشاء ضریح او مترشح گردد و این رطوبت
غالی از چند قسم نیست یا بالمره تحلیل رود و یا آنکه صلابت بهم رساند و مانند دکه
سطح عظم برآید و یا آنکه رطوبت مذکور بر بی الحال مبدل و منجمد گردد و عظم متفرج
و بت سازد این حالت را نکروز گفته نامند و یا آنکه عظم متفرج را جرم منجمد
و کشک کرده و را کاری گفته نامند و مسام باشد که ماده این مرض بعضی
از غضب غضب یافته و مغلوب یا مسترخی گردد و در بعضی میشود که این ماده
بجرم سفید بریزد و صلابت و تجر به رساند و اگر ذی در این حالت محل بردارد طفل
متولد از او هلاک گردد و چون بواسطه این مرض مزاج در دانت بهم میرساند پس
صاحب او را استعداد نامی است با مزاجی مختلفه را و اما حلاج در حیثاتی از
آنکه بهین طریق است که اولاً بر صاحبان این مرض واجب است تغذیه و غذای
لباسهای گرم بحدیکه همیشه در عرق باشند و با استعمال مایعات طبع را نرم و آوند
از جال و حرکات عصبیه به پرهنند و حکما در این مرض سه صنف از دواهاست
نموده و مایع دیده اند اول بعضی از مسهلات مانند نمک و نمک و سنا و یکی و کلل
و جلب در دیند چینی و امثال آنها ثانی بعضی از نباتات مانند عشب و مارچوبه
و چینی و کوباک و مساس فراسس و ریش بابا آدم و ما زربون و ریش
و پوست سبز کرده و این ادویه را بعد از استعمال زیتنی باید کار داشت بمقتضی
که در کتاب ادویه ذکر شده است ثالث از ادویه استقله در این مرض زیت
دالاح و وادکن است مانند کلل و وادشکه و زیتنی انجروید با جویه و سیم

فلس

خالص داد و دید در این مرض زیاد نافع اند و سابق بر این در آنکههای نرس
که ماده او بجرم عظم سرایت نموده و قرصه او بر عت عظم بهم میرساند و این
زیتنی سبجانی استعمال می نمودند و از آنجا که مدت سی سال است که معروف است
به بهر رسانیده و منافع او را بیش دیده اند این عمل را ترک فرموده اند و اما
طریق استعمال این زیتنی این است که اول از علیل فصد نموده و بواسطه سبجانی
امعاء را از فضولی منجمد غالی ساخته و چند نوبت بحمام رفته و چند روز در بستر
گرم بخوابد آنگاه بکمرند و این زیتنی بمقتال و بر ساقین مالیده و یکروز را داده
روز سیم بمقتال دیگر گرفته و بطح داخل فصد مالیده و هم یکروز را داده و بعد
بمقتال دیگر برداشته و سطحی السی فصد مالیده و بعد از یکروز بطریق سابق یک
مقتال دیگر بقا رطوبت بماند اگر از این عمل نشه متفرج و از دمان رطوبت زیاد
سیلان یابد و در شکم نفخی بهر سه و در قاروره رسوبی سرخ موجود و برادر
سواد برساند دست از عمل کشیده و علیل را بحمام فرستاده و لباس را
تبدیل نموده و چند عشب یا چینی میل فرماید تا سمیت زیتنی را برسد و اگر
بکمزیت کفایت نمود مگر فرماید تا اعراض مذکوره بظهور رسد و اگر چه این
عمل صاحبان آنکه در درجه ثانی و ثالث را زیاد نفع می نماید لکن چون
بعضی دیده شده که در بین این عمل علیل را تشنجی حاد یا سکه عارض شد
و هلاکت رسیده اند که حکما ترک او را اولی دانسته و سایر ترکیب از
زیتنی را بکار میسازند در آنکههای نرس که بهیچ وجه علاج پذیرند و خوف
هلاک باشد و از جمله املاح جویه است داراشکنه که بکمرند داراشکنه
یک گندم کلاب چهارده مثقال مخلوط نموده و روزی دو مثقال از او را
بدون نوبت بنوشند و اگر از شراب این دوا غشیان عارض شود اضافه نمایند
براد قطیر افیون چهارده قطره و بدستور سابق میل فرماید و بعد از چند
روز بوزن او میفرمایند تا علت زایل شود و در صورتیکه این علت عبور نماید

از درجه ثانی تا ثانی یا دومی در مفاصل عارض شده باشد باید دوائی موسوم به پربت یه
 در در کور استعمال نمود بدین قسم که بگردانند از او صفت کندم و باریک سوسن خمیر شود
 و چهارده حب ساخته روزی دو حب از او را بدو نوبت میل فرمایند و اگر بدین در
 چهارده کندم شکران بفرمایند انفع و اقوی خواهد گردید و اما در درجه ثالث از آنکه
 و سنگا میکه باخا زیر استاده باشد انفع ادویه به روپوت است بدین قسم که روز
 سه خود از او را در کلاب حل نموده و یا باریک سوسن چهار ساخته بدو نوبت میل
 فرمایند و در استعمال هر یک از ادویه به احتیاطی کامل باید نمود چون که افراط
 در آنها مضرسینه و محلل معینه و ثدی است و در صاحبان سوء المزاج و در طبعین
 چون استعمال زینت مضرت است باید دوائی موسوم به یه ادد و حشید بکار داشت از
 یک کندم تا یک نخود برای روز بدو نوبت و هم بعد از آنکه مرض در صورت امکان
 استقام میاید کردی و در یاد شرب حبیب و غشبه و مطبوخ پوست بزرگدزد زیاد
 نافع خواهد بود و عین استعمال دواء اسماک در غذا و احتیاط از آن است و جمود
 و بقولات و فوکه واجب است و در اغیاض چون زینت صنعت نجش حای او
 کلور در طلاء باطرون که یکی از اطلاق طلا است باید استعمال نمود طریق صنعتی مذکور
 بگردانند طلاء خالص شش جزء در تیر آب حل نموده و اضافت نمایند بر آن یک طعام ده
 جزء و با آن شش طایم خشک نموده طلی از او باقی ماند که یک کندم او را باقی در آورده
 قسمت نموده روزی یک و بعد از چند روزی دو قسمت از او را بدو نوبت بزرگان
 روز نمایند و چون این مرض از علل عظیمه و منقبت است با مرض باطنی و مزاجی و در
 اشغال و معالجاتی مختلف است و این کتاب را پیش کشش نمود با خضار کوشیده
 و لیکن در کتاب امراض باطنی بتفصیل ذکر خواهد شد و نشانی است

فصل خاص در بیان فرجه سالک اما سالک عبارتست
 از فرجه مخصوصی که در بعضی بلاد بهر سه روز بعضی و نوزده کسی که بعد از چند
 بلالات رفع میشود و دیگر شخصی را عارض نموده است ابدان سالک به نوبت

شود اول سالک دکه که در یک موضع بدن بخصوص قریب بمقعد و وجه و بنار
 در سایر مواضع دکه صلب بزرگی نمود تا با قلا عارض میشود که مدت سه چهار ماه بدین
 حالت بماند مگر آنکه جلد را باره صغری پوشد و بعد از این مدت از وسط لیستنج
 برساند و بگذارد و فرجه خبیث الشکل بر او عارض گردد و بعد از یکسال تا لیل حید
 در موضع او رویه و رفع شود و در موضع او اثری باقی ماند قسم دیگر سالک مغز
 که بدین قسم میباشد که یک قطعه جلد بزرگی یک پل تا یک کف دست طفل یکسال
 صلب میشود بطور سطحی و رنگ مسن پوشد و بعد از چند وقت بالمره بگذارد و فرجه
 عطشی عارض شود و بعد از یکسال رفع شود بقیع سبب که کپه از منی نامند در یکجا
 و در چند دکه بقدر عذس و شادانه بطور حلقه عارض شود و در وسط این دایره
 جلد سالم است که هم بعد از چند مدت متعرج شده رفع شود و در دایره او حلقه
 دیگر همیشه و بعد از رفع او دایره دیگر بعل آید تا آنکه بالمره صورت را خراب
 میکند و آنجا که سالک در وجه و جفین و پری بینی عارض شده باشد میشود
 که آنجا را بخورد و اعضا مذکوره را زایل سازد و سالک سسته است ببلاد بطوریکه
 در بغداد و عجم دارد و در ایران در بعضی بلاد است و در بعضی نیست و بدین واسطه
 مسبب از مجول و بنا در شده که کسی در مدت عمر در نوبت سالک مبتلا گردد
 و اما علاج چون ریائی صورت کاهی بدین واسطه خراب میشود و بر میکم و آب
 است که زود رفع نماید و بجهت علاج بعضی ادویه که بخورده نموده ام و انفع آنها چهار
 شوره است که در هر حالت و هر نوع که باشد حکما زود رفع میکند و طریق استعمال
 چهار شوره این است که بواسطه میل شیشه قدری جهر شود بروی سالک
 بمالند تا محو شود و بعد از آن چند روز را داده اگر رفع نشد چند آلاکیده با
 گوار نمایند که البته زود رفع خواهد شد و چون جهر شود جلد را فاسد
 میماند لازم است که در اطراف او چوبه از شمع داغیون بیندازند و
 که بجلد اطراف بر بخورد سیما در صورتی که دوائی مذکوره و اقرب چشم استعمال نمایند

چندین سالک در این کتاب
 از چندین سالک در این کتاب
 که در این کتاب
 چندین سالک در این کتاب
 که در این کتاب

فصل سادس از انبساط و انقباض در جرم عظمی از عظام
 بدن که بعلت لایتن کاری مسند با استخوان و علامات و علامات او به آنکه در
 بعضی باشد که فرجه برسد در موضع از عظمی و بدین واسطه تغییر می در آن عضو
 یافت شود که شباهت تامی داشته باشد بفرجه اجزای لیسنه مانند آنکه بعد
 از متفرج کردن عظم رخاوتی در جرم برسد به یکدیگر میل بتواند و فرجه
 و از موضع متفرج صمدیه گریه النقی با اجزاء لون بالایی و هم باشد که در اطراف
 فرجه لحم رخاوتی بسان استغیر برود و چون قبل از حدوث فرجه الهی در جرم
 عظم یا ضریع او برسد بنا به علی ذلک بعضی اعراض بر او تقدم جویند و از آن
 جمله اولاً وجعی صعب و میمادی در عظم برسد و بعد از چندی جلد موقوف او
 متوهم و متغیر گردد و در تحت جلد مده کرده و متغیر شود و مده سیاه ازاد
 متغیر و الحال و از کثرت او حی دق عارض شود و اگر میل بفرجه خود برسد باستان
 نشیند و سیاه گردد و از لوازم این فرجه است بخت کمی زانند و در خوا در اطراف
 موضع متفرج و سبب این علة میمادی و یا مادی است اما سبب مادی ضربه عظمی
 است که ضریع را منقطع سازد و یا بواسطه او الهیاتی در او و جرم عظم برسد
 و متغیر شود که زانند مانند آنکه سنگ عظمی بر دست وارد آمده و مرث انضاط
 او گردد و اما سبب مادی مورت این مرض مادی خناری و آبله و زکری و حصه
 و سبب جنین باشد که از مرض توسل و ریاح افرس و فحج و از جرم سبب
 از ترشحات معده طبیعی فرجه در عظم واقع شود و چون فرجه مده کرده مایل
 بقطعات رخاوت عظم بندد علی هذا الغلب قریب بمفصل فرجه عارض میشود و
 اما انداز این حلقه مختلف است و بسته است سیاه او و عضو مده و هرگاه
 سبب از مزاجی و مادی باشد یا فرجه در اطراف مفصل و از کثرت سیاه
 مده حی دق عارض شده باشد بسیار دمی و جز قطع عضو برقی نیست
 مزاود و لکن در بعضی افرجه میمادی و اندان قریب سیاه در سن بلوغ باشد که بقوت

طبیعی

طبیعی فرجه استیام یا بدین طریق که ریم سیال ازاد عظم و سالم و لحم اطراف آن موضع
 قلب و ستم شود و در طوطی موضع متفرج متفرج و یا منقبض عنه را بدل شده و علیل
 شغایا به و اما علاج باید رفع سبب او نمود مانند آنکه اگر سبب مادی خناری و آبله
 و زکری باشد بعلل آنها که کشند و ادویه مناسبه به آنها بکار دارند علی ای تقدیر
 باید قوای علیل را با استعمال ادویه و اغذیه مقویه حفظ فرمود و در صورت امکان
 به بیلاق نقل نموده و فرجه را از کشافت پاک داشت و با نفیگ پوشیده که بواسطه
 بر خورد و از استعمال صناد با بونه اجمال نوزند و روزی دو نوبت موضع متفرج
 از مایه قاتر کشند و آنجا نیک در اطراف آن موضع الهیاتی حاصل شود و از سال
 و تریج دهن زینق سنجی اللون نافع است و هرگاه سبب فرجه مادی باشد
 نه مزاجی میتوان موضع علة را مکتوف نموده و قطعه عظم متفرج را از ایل است
 و آنجا نیک سبب مادی خناری باشد سادرت بدین مایه نفعی کلی دارد صاحبان
 خود را و چنانکه ذکر نمودیم اگر بواسطه فرجه یا از کثرت سیلان مادی و ظهور حی
 دق خوف هلاک باشد میتوان عضو موقوف را قطع نمود چون حکما گفته اند که وجود
 ناقص بهتر از عدم صرف است

فصل سابع از انبساط و انقباض
 در مرث قطع عظمی از عظام بدن بواسطه افشاء قوه غاذیه او این علت را که باین
 مکرر سیس نامند مانند خناری است در آلات لیسنه و اغلب عارض شود در قطعه
 او وسط عظام مانند آنکه توسط ساقین و عظم فخذ و عضله و زدن و تر قوه و
 اسفل و محل وقوع او یا در ظاهر عظم است او را مکرر سیس ظاهر می و یا در جوف او
 برسد او را مکرر سیس باطنی نامند و اما سبب این مرض عموماً بطلان قوه غاذیه
 عظم است بواسطه صمدیه وارده بر او و آن مودی یا امری است مادی و یا مادی
 اما سبب مادی ضربه و سقوط و ضعف است که بواسطه آنها غش و ضریع محیط
 بعظم منقطع یا فاسد گردیده باشد و اما سبب مادی که مرث این علت تواند
 شده و خناری و آبله و زکری و ریاح افرس و امثال آنها است چون مادی این

در مرض استسقاء نامی دارند چنانکه با این غشای ضریح و جرم عظام به هم میسازند و استسقاء
 کبریه و باشت که بواسطه یکی از سببها بادیه و بادیه متا این علت موجود شود و اما استسقاء
 مقدمه این مرض با عاده و یا مزمن است و از آنجا نیکه این التهاب در قعر و جوف عظم
 به هم میرسد بواسطه تعدد و جمع شدن غشای عظم عارض شود با عراض حسی دقی
 و بجز در جلد محیط آن موضع متورم و متورم می شود و بدون حرکت او و بعد بثورات
 چندی در جلد ظاهر و متورم گردیده و صدیدی گریه را نیکه از آنجا دفع شود و فاعله
 چنان است که این ماده مجاری متادیه یکشاید و از موضع خارج شود که عظم سالم
 باشد و باشت که یکی از ثقب مدفع بود و التیام پذیرد و مانند فیض فرو نشیند و
 ریم از دیگر موضع مدفعی بنا نماید و باید تمیز داد با این عله و قرحه عظم بدین علامات
 در قرحه عظم که در کله می شود از آن جمله

در مواضع رخه استغیبه قریب بمحصل در قطعه اوسط عظام واقع گردد عارض شود

در اطراف ریش لمی رخه متورم و جلد موضع علت بسیار قوی فرو رفته بآن چسبیده برود

اگر سبب موضع متورم از عظم بود بواسطه صلابت جرم عظم از فرو بردن و بر خوردن بواسطه رخوت عظم در درون آنکه در پیچیدگی میل عظم صحتی ادا نکند شود مانند آنکه از

از طول از علیل راجعی دقی عارض شود بخلاف آنکه صاحبان این علت راجعی دقی دست نخواهند داد

و باید دانست که چون این حالت در عظمی بر سبب طبیعت علی نماید که قطعه هیزه از عظم خارج سازد و لهذا لمی در سر مد موضع حینه و هیئت عظم بر رویه و از غشای استخوان جای نماید و بطا هر میل نماید تا آنکه نزدیک جویه موضع متورم جلد و در از نمانی طویل بیرون آید و علیل نجات یابد و همچنین آنجا نیکه یک قطعه از وسط عظمی طیت شود محاذی بدو در ظاهر جلد ثقبه و قرحه بر سبب و لم نماید در غلظت عظم طیت صلابت

در قرحه

و غلظت بر سبب از از صفتی مکان قطعه طیت از عظم را منصفط سازد تا آنکه در
 عظم را منصفط سازد تا آنکه از ظاهر جلد مقابل خارج شود و اما انداز این مرض بواسطه
 ردات مختلف است بنا بر سببها مورثه و محل وقوع او چنانچه هر گاه قطعه صغیری
 از طبقه ظاهر عظمی طیت شود و بواسطه یکی از سببها بادیه مبتلا بدین مرض گردیده باشد
 سیمما اگر قریب بمحصل واقع یا علیل ضعیف البدن و القوی باشد علاج زیاد صعب
 خواهد بود و اما علاج باید قسمی نمود که قطعه طیت از عظم بر عت خارج شود
 هر گاه عضو متورم را التهابی عظیم باشد باید با رسال علق و استعمال ضماد مسورت او را
 منکسر ساخت و از مقویات قوی او را تقویت فرمود در صورتی که قطعه طیت از عظم
 متورک باشد و ال است بر میل و بخرج در این وقت باید موضع متورم متورج را کشود و
 با استعمال فیتله طبیعتا دفع او اعانت نمایند یا آنکه بعد از کشودن با انبری کف
 و بر نش آرد و اگر سافت بدین قرحه و عظم ریم زیاد باشد و از بعد مسافت
 ممکن نکند در خارج او لازم است موضعی قریب بدو را شکافه و عظم طیت را بیرون آورد
 و در صورتی که عظم ریم در موضعی از عظم سالم مرکوز باشد و سالیها طول کشد و بیرون
 نیاید در این حال بر معالجات واجب است که با عانت آرد یا مته آن موضع را مشور است
 و عظم را بیرون آرد و رخس را با تعلیلی پوشیده و بواسطه اضمده اعانت نماید طبیعتا
 در بنت لحم و متملی ساختن موضعی که از عظم خالی گردیده است و هر گاه قطعه میسته
 از عظم بمفصل فرو نشسته باشد یا علیل راجعی دقی عارض شده باشد جز قطع عضو
 برائی مراد نیست

فصل در علاج زایات
 در ریم شدن قطعه عظمی از عظم مجسمه میاید و استسقاء عظام را ممکن است
 ابتلائی بدین عله لکن مانند ابریه و قرحه و قطعه عظمی عظم از عظم صدمه یا استسقاء
 پیش از سایر عظام عظمی است و سبب او ضرب و سقوط و آرد و بر عظم است
 و هم اکثر از ماده آله فرنگ نیز عارض شود و بهرث موت او خواهد گردید و غلب
 این عله با مرض سل همراه است و چون عظم عظمی ریم و متورج شود علیل راجعی

اسهل علاج است و با لکسر
 در صورتیکه قطعه عظمی را رسا
 بادیه صح

شده در گوش بر سر با کرانی او باشد که صماخ نیز متفرج گردد و بالاخره دوار و سنجی
 عظیم صاحب او را خارض و برلاکت رساند و اما علاج بخوی باید نمود که عسل
 ذکر رفته الا اینکه در اینجا باید مده را سرعت منفع سازند از خوف آنکه مبادا بغضا
 ریس منصب گردیده و دماغ را منقبض ساخته و جلیل از سکه بمبرد و بجهت این
 مطلب باید آنکه قطعه قیته از عظم را با آرد و قورال اسس بریده بردارند و همین نحو
 عمل باید نمود در صورتی که زائده اگرچه ریم بیاورد در او جمع شده باشد
 و هرگاه قطعه از عظام مجبیه ریم شود و بالمجاوره موضعی از غشاء اسم العیظ
 متفرج گردد باید بآرد مذکوره قطعه قیته از عظم را برداشته و لته را با آب
 آبله آلوده و با آرد قرحه را رافا نموده و از مشروب آب مطبوخ پوست بید میل فرمایند
 تا بدین واسطه دم بسجای آید و قرحه بر شش سالم متبدل و لیسیم پذیرد

فصل ناسع فی علاج دندان که در ریم شدن اضر اسس که در عرف
 عامه دندان کم خورده نامند و طوحن را مستعد و لغضا و بیش از سایرین است
 و این اردو حال خارج نیست یا چنان است که اولاً در ریم شدن دندان شغافیه بر سر
 و در ریم شدن دندان و برود جرم دندان متاثر شود تا باطن و چون فساد بعصب واقع
 در جوف او رسیده و جمع شده عارض شود و یا آنکه باطن دندان فاسد گردد و با جفا
 صعب که از مشرب ماء همیشه بارده و بر خوردن هوا و هشته آید و ما بعد
 از ظاهر دندان مسس که بکودی ظاهر منشق گردد و فساد باطن را بطریق متعین
 سازد علی ای قسم گمان بعد از آنکه اصل دندان فاسد گردید ضریح او متورم
 شود و ریم او را ببالاید این حالت را بیهوشی و بولیس نامند و باشد که این
 ماده از یکجانب دندان لغبه نامرئی کشاید و از آنجانب خارج شود و میشود
 که در لثه حمادی موضع ریم شده از اصل دندان لثی زاید برود و او را پولیس
 نامند و اما سبب ریم شدن دندان و فساد او یا امری است خارجی مانند آنکه
 الزام در اکل غذای فاسد و کثیف و نامیزه نماید یا شستن و ضرب که از شدت

ادب

او سیانند آن طفق شود مورث فساد او گردد و اما اغلب بطور ارثی یا از غلبه ضمه
 معده دندان ریم شود و اما علاج باید آنکه بعد از ظهور فسادی در دندان قیته
 که زیاد نشود بجهت این معنی لازم است که با آلتی مخصوص شبیه بغاشق دندان را پاک
 نموده و آنچسبیه و فاسد شده است تراشیده و خشک نموده آنگاه ورقه طلا
 بدان موضع نهند یا آنکه بادوائی موسوم بار ثن تن که مرکب است از قلع و سرس
 و بسم و یا با ملحه فقره موضع فاسد را تمتع سازند تا بدین واسطه هوا یا غذا
 بجوف دندان داخل نشود و مورث وجع او نگردد فساد را مانع آید از ازیاد
 و همچنین باید تشخیص کرد که دندان گرم خورده دارند دمان و دندان را پاک نماید
 و بعد از هر غذا با آب منقبضه نموده و روزی دو نوبت با مسواکی دندان و لثه را پاکیزد
 بشویند تا لثه قوت بگیرد و کثافت دندان زایل شود صفت سستی مانع بگیرد و
 کند که زبد البحر صدف مرکبی اجزا را نرم کوفته و روزی دو نوبت با او لثه و دندان
 را بشویند و مسس خون با نان سوخته و پوست بادام در نقوب لثه نفی عظیم دارد
 و آنجا که با این علت بجز بر سر است باید از مطبوخ زوفای مصری یا تقطیر کافور
 هندی و مرکبی روزی چند نوبت منقبضه فرمایند و اگر دندان بدر آید بجهت تسکین
 وجع او باید سبب او را بیابند و بروقی او معالجه نمایند آنجا که سبب او ماده
 زکام و چایندن باشد بعلاوه در یک شتی از اسس دوج و نیز وجع عارض شود
 و در این صورت باید عللیل خود را گرم بپوشد و پارچه صوفی گرم کرده با او
 نصفه سر را بپزند و هر سه متعال مشع زرا ریح و اسس علق بجان علت
 نفی کل دارد و اگر ششی خارجی از غذا و غیره بجوف دندان داخل شود و
 بدین واسطه بدرد آید باید او را خارج سازند اگر وجع تسکین یافت نهاده و الا
 بجوف دندان یک دو قطره تقطیر افیون بچکاند یا قدری از او را بلعه بمالند و
 بعضی از قطور دین قرنفل و گرازد و مطبوخ عاقر قرقا و تر در تسکین وجع
 نفی عظیم دارد و هرگاه بهیچ وجه وجع تسکین نیابد و دائم از جوف او بدرد آید

باید آنکه با کلین دندان را بکشند و بعد از آنکه در دندان نواصیری بوجود آید
از خوف آنکه مبادا افساد دندان بکشد سرایت نموده همیشه سازد باید بزودی دندان
بکشند و لحظ زمانیکه در لثه روئیده باشد موسوم با پولیس باید با آلت قطعی
بریده بر دارند و اگر در تحت او قطعه از تنگ ریم گردیده باشد بروقی او علاج باید نمود
باب ثالث از مفالک ثالث در بیان نواصیر با اقسام
و سببها و علامات و معالجات آنها و مثل است برشش فصل اول
در تعریف ناصور و سببها و علاج او بطور کلی اما ناصور عبارت از مجری غیر طبیعی
است که یکی از ترشحات فضلیه بدن مانند لعاب دندان و صفرا و بول و امثال
آنها از اودفع شود و اما سبب وجود این علة جسم و انسداد مجری طبیعی است
بواسطه ضرب یا سقطه یا قرعه یا غافرا یا مانند آنکه اگر جراحی بر مجری بول وارد آید
و التیام پذیرد و بول از او بیاید بواسطه مدت بول متراکم شده و صورت نواصیر
کرده و اغلب چنان باشد که اولاد طی در جلد ظاهر شود و بعد از آنجا رطوبت بسیار
از او که یکی از ترشحات فضلیه بدن باشد مانند براز و بول و دمه و امثال آنها از او
من دفع شود و از آنجا نیکه این ترشح مانع میاید التیام را بنائ علی ذلک در لثه
قلبی طبیعی غشاء لابی لبان جلد ظاهر در جوف ثقبه ناصوری متکون
تا از عبور و مدت اوف دی بطور نرسد و در بعضی این غشاء سجدی غلیظ و
متراکم گردد و لبان غضروفی در این صورت جز بعمل نیند بخود دیگر علاج ممکن نخواهد کرد
و اما علاج آنکه اول مجری طبیعی منسد این ترشح را مفتوح سازند زیرا که بعد
از انفتاح او باشد که ناصور بالذات التیام پذیرد مانند آنکه اگر بواسطه مرض
سوزنک مجرای بول ضعیف گردد و بول ثقبه ناصوری بناماید بجهت علاج لازم است
که اول مجری بول را بشود اگر ناصور التیام پذیرفت و الا عمل باید نمایند و هرگاه
مجری طبیعی را انفتاح ممکن نباشد باید مجری مصنوعی مجرای او بکشند و بعد
از مراحات این امور باید آنکه غشاء لابی متکون در جوف ناصور از ازاله سازند

التیام

فصل ثانی از باب ثالث
التیام باید
در ناصور علة براق و اوثقه و مجری غیر طبیعی است که هنگام مضغ و تخم رطوبت دندان
از او بیاید و سبب این علة ضرب است که بجای براق واقع در خلف اثر پس
دارد آمده باشد یا آنکه سده در مجری مذکور پس و لعاب جسم گردیده و از
موضع دیگر منفرشته ناصور جسم آید و اما علاج او را بدو قسم میتوان نمود
یکی آنکه مجری طبیعی منسد براق را مفتوح سازند یا آنکه مجرای جدیدی برای او
ترتیب دهند در صورتی که تفرق اتصال جدید باشد باید کناری ناصور را بریزند
و بخیه نمایند یا آنکه چند نوبت سنگ جهم بدو بمالند تا التیام پذیرد و اما چون
این ناصور نرسد باشد اعمال مذکوره در التیام او کفایت نخواهند نمود بلکه باید
مجرای مصنوعی برای براق علاوه ترتیب داد و پرداختن این عمل بجهت قسم
جایز است یکی آنکه طرفین ناصور را بریده و تروکار منحنی از کناری ناصوری او فرو برد
بدان آنگاه از ثقبه تروکار زهی داخل و از جوف دندان خارج نموده و علیل را
اثر فرمایند بجهت حرکت دندان و مضغ و در این حرکت ملاحظه فرمایند که لعاب از چه
موضع دندان خارج میشود و بعد از آن به ثقبه اتصال این مجری بقدریک
عرض ابرام فرو برد و ناصور را از ظاهر بخیه نمایند قسم دیگر آنکه بخو
سابق بعد از فرو بردن تروکار مفتولی سیمی از لوله اوبه دندان داخل ساخته
و لوله تروکار را بیرون آورده و طرفین مفتول را در دندان برسم به بجهت و مدت
منش منقبه را داده آنگاه طرفین ناصور را از ظاهر بریده و بخیه نمایند تا التیام
پذیرد و در عین التیام باید علیل دندان را کم حرکت دهد و پس باشد که در یک
موضع از مجری لعاب سستی برسد و رطوبت در آنجا جمع شود یا آنکه حصاتی از
لعاب متکون و مجری را مسدود ساخته و عبور لعاب را مانع آید و بدین واسطه
ناصوری برسد علی ای تقصیر باید آن موضع را کشته حصات یا رطوبت
مجبور را دفع نموده آنگاه طرفین ناصور را بخیه نمایند تا التیام پذیرد

۱۵۷
فصل ثالث از باب ثالث در نامور صفراء و او عبارت
 از ثقبه ایست که موجود شود از التصاق برادره براق و انفجار او که بعد از انفجار صفراء
 از این مجرای نظیر دفع گردد و در صورتی که این علت نرسد عمل بر هضم غذا ناقص
 بدن ضعیف و لاغر خواهد شد و سبب او گویین و حصول حصاتی است در برادره بدن
 قسم که چون در برادره حصاتی موجود شود و سستی در اجزای او برسد و ملتهب گردد
 و صفای قیظ بخود را منضبط و متعادل سازد و بعد از التهاب برادره با صفای مله
 شود و چون حصات مذکوره مانع آید عبور صفراء را لایه از حسیب و اجتماع او اجزای
 مراره دقیق و متعادل گردیده و بطور منفرجه شود تا آنچه در او است منفع
 و لهذا در موضع مراره ناموری عارض شود که صفراء از او پالاید و این نامور التیام
 نیز در الا بخود حصات بناء علی ذلک باید معالج بعد از آنکه میل فرد برده و یقین
 حاصل نمود بر وجود حصات برادره زهی و در ثقبه نامور فرد برده و چندی نماید
 تا از جسم زده و سستی در اجزای مجرای برسد آنگاه انبری فرد برده و حصات را گرفته
 بیرون آرد و اگر بدین قسم خروج او ممکن نگردد لایه باید حصات را منکسر سازد و اجزای
 او را خارج نماید بخوبی که در کتاب مخزن الغویله در باب کسر حصات مشای فیفصل
 ذکر شده است
فصل رابع از باب ثالث
 در نامور نکاستیم و این علت عارض شود از التصاق معاء مذکور براق و انفجار
 که هرگاه علیل وقت بخود در قدری برادره از این ثقبه منفع شود و در صورتیکه
 قطعه اسفل از این معاء بلرزد و کاردیده و از کار افتاده باشد و برادره تمامه از ثقبه
 ناموری خارج شود او را مقعد غیر طبیعی نامند و چون بواسطه این علت کیموسه بخود
 علی یا یمنی نتواند شد در تغذیه اعضاء ظلی روی داده و بدن ضعیف گردد و بعد از
 از آلودن برادره و حدت او جلد بطن منقبض شود و اما سبب این نامور اغلب قس
 بدین قسم که میشود معانی از مرق قن نماید و جزه محبس از معاء مقتوق عاقر با
 کبره و در صورتی که علیل را پلاک کند منقرضه و نامور برسد و برادره از او

منفع

۱۵۸
 منفع شود و از انفجار جانبی از معاء نامور و از قطع او تمامه مقعد غیر طبیعی برسد
 و باشد که طبیعت نامور و مقعد غیر طبیعی را علاج نموده التیام دهد بدین قسم
 که بعد از جانبی از معاء را سالمه بجای از معاء مقعد العمل به پیوند و دو جزه را بدین
 دو قطعه معاء را تحلیل برده فانی سازد آنگاه موضع التیام یافته را پس کشد
 در این حال مجرای از معاء اعلی اسفل موجود و برادره از او عبور میسازد و بدین
 واسطه مقعد غیر طبیعی مسدود و دفع گردیده علیل نجات یابد و اما علاج باید آنکه
 علی نماید تا برادره بهرولت دفع شود و کان نامور را با قیستیک بپوشند و از اغذیه
 قویه و لطیفه میل فرمایند و اگر ثقبه ناموریه ضعیف باشد و برادره بصیرت خارج
 شود و علیل را متعادل سازد باید قدری سفوف خشک بدان موضع نهند تا از حد
 رطوبت تخم گردد و در کان نامور را وسیع سازد و هرگاه قطعه از معاء نتواند
 از این موضع خارج شود مانند آنکه در خروج مقعد باید بعد از رجعت او کل
 از پنبه ترتیب نموده و بدان موضع نهند تا خروج او را مانع آید و هرگاه بعد
 از چندی قدری از برادره خارج شود از مقعد طبیعی دال است بر آنکه دو
 قطعه معاء با یکدیگر متصل و ملحق گردیده اما هنوز نباید علی نمود که نامور از ظاهر
 التیام پذیرد الا هنگامی که برادره تمامه از مقعد طبیعی بدون وجع قولنجی و غیر
 بتواند دفع گردید آنگاه بقاعده که ذکر نموده ایم در علاج نواسیر التیام دهند
 نامور و مقعد غیر طبیعی را و بسیار است که بعد از حاجب مابین معاء مقطوع
 سجده عظیم باشد که طبیعت نتواند او را فانی ساخت در این صورت باید
 بقاعده که جراحی فرانسوی موسوم به دوپلث آن اختراع نموده است عمل نمود
 و جراح مذکور مقراضی ترتیب داده اند که بروی کاه میخوابد و بنام خود
 نامیده است و طریق عمل این است که او را با میله نقره قطعه اعلی و اسفل
 معاء مقطوع را بیا بند آنگاه مقراض مذکور را داخل نموده و یک تیغه از او را
 بجاء علیا و تیغه دیگر او را بجاء اسفل فرو برده و میله که به و منقرض است

روز بروز به چنانچه تا در مدت شش روز ساقط نماید جدار اعلیٰ و سفلی معمارا و در
 این مدت باید از غذا بشورهای رقیق کتفا نموده و مسسه روزه از استعمال حقن
 لیسنه لعابیه امعاء را از فضول خالی ساخت و همچنین بعد از خروج مقراض تا
 یقین حاصل نشود که معده بالمره التیام یافته است دست از مبادرت بکفنه
 بر ندارد
فصل خاصه من از باب ثانی
 در نواصیه مقعده و این نقطه شش است هر مجری متاخر که در اطراف معده
 مستقیم و شرج واقع باشند و این عله یا نام است یا ناقص نام او را نامند که
 یک جانب ثقبه در ظاهر و جانب دیگر از مستقیم باشد و ناقص هنگامی است
 که معده مذکور در غلیظ باشد او را میگویند که در دمان این قسم ناسور لخمی زاید
 بر وید یا آنکه زیاد صلابت و سختی میسرند و اما سبب این عله اغلب بتر
 بواسیر است که بعد از آنجا ناسور از او برسد و هم از ضرب و فرورفتن
 خارجی با طرف مقعده می شود که نواصیه عارض شود و در بعضی باشد که این عله
 بطور بجران در امراض کبد و صدر موجود شود و اما تشخیص او را از تقدم سباب
 مذکوره و سیما از فرو بردن میل باید صبیح بروغنی آلوده و بمقدف فرو برد
 و از خارج میل بدوانند اگر نوک میل را با اصبع لمس نمودند دلیل بر
 بر آنکه ناسور نام است و الا ناقص اگر چه می شود سر میل بموضع دیگر برخورد و بنوع
 اصبع نرسد و با وجود بر این ناسور نام باشد علی ای حال علاج او این است
 که مسافت و فاصله مابین ناسور و مقعده را قطع نمایند مگر در ناسور بجران
 سیما در صورتیکه صاحب او مستعد مرض میل باشد و هرگاه در شکم باشد
 بهین که این ناسور بجرانی است یا نه لازم است آنکه اول موضعی از بدن را
 کی نموده و ماده را به آن موضع مایل ساخت آنگاه علاج نواصیه فرمود و اما
 طریق عمل این است که میل نقره ثقبه ناسوری فرو برند تا مستوی و بهدایت این
 میل شیار داری داخل سازند و یک پارچه چوب نادی شکل برداشته و بر نو

میخروج برادر و صبح میباید نمود
 و قاعده چنانست که ثقبه
 ناسور که عرض اصبع در فوق
 عضله شرج واقع باشد
 در زمین فرو بردن میل
 ح

آلوده

آلوده و بمقدف فرو برده بعد شش طه رقیق بهدایت میل شیار دار از ثقبه ناسور فرو
 برند تا آنکه نوکش برخورد بچوبی که در مستقیم واقع است آنگاه یک دفعه مشروط و چوب
 پائین کشند تا فاصله مذکوره بریده شود و همین قسم عمل باید نمود در ناسور ناقص
 و بعد از اتمام عمل فسیله بموضع شقی نهاده و با پنبه و لته او را بسته و در مابین
 دهشت تا شقاق و با لخم محبت که دیده و التیام پذیرد و اگر بعد از این عمل سیکل
 شدید برسد بجهت سدا و باید چوب معده مستقیم را با ثقبه یک تن پونان نمود
 و هرگاه التیابی عظیم موضع خروج را عارض شود باید با رسال علی و شرب
 لیسنه لعابیه سورت او را منکسر ساخت و بعضی از استادان این فن معالجه
 این عله بدین طریق نموده که مفتولی از ثقبه ناسور داخل و از مقعده خارج ساخته
 و بتدریج او را کشیده تا فاصله مابین بریده شود لکن از آنجا سیکل این عمل صحت
 خود را زیاد متالم و متاذی میسازد و طول میکشد ترک نمودن و اولی است
فصل سادس از باب ثانی در نواصیه مجری بول
 و نواصیه مابین مثانه و جهل و چون نواصیه مجری بول را در مثانه آلودگی بمقتضی
 ذکر نموده ایم تکرار او لازم نبود اما ناسور مابین مثانه و جهل بدانکه از نفضاط
 اسس چنین هنگام تولد یا از ضرب که جهل را وارد آید بواسطه فرو بردن سباب
 بجهت اخراج طفل باشد که جهل و مثانه متورم و متفقر گردد بدین واسطه ناسور
 مابین آنها موجود شود و چون علی الاقبال بول جاریست و از حدت میخراشد و ریش
 میسازد آلات تناسل و فحزین را با عکس شدید و لباس دائم ملوث و متعفن است
 لهذا صاحب خود را بکدی متالم و متاذی میسازد که از حیوة خود بگذرد و زنده کی تواند
 و اما تشخیص باید نمود این عله را از تقدم سباب مذکوره و هرگاه اصبع به جهل فرو
 برند ثقبه با اندازه عدس تا پسته محسوس خواهد شد و لکن از آنکه موسوم بآینه
 رجم خوشباده توان نمود او را و اما انداز و ردی است چون از حدت بول التیام
 متعسر بکند از عمل بدیم علاج صعب است و اما بجهت علاج دو قسم باید نمود یکی آنکه بردا

فصل اول از باب ثانی در نواصیه مجری بول

آلتی موسوم بآئینه رحم و بهیسل داخل سازند بطوریکه بخود او میانی ثقبه ناسور و
شود آنگاه بواسطه میسل که در آتش تا بنده شده باشد اطراف او را بسوزانند
اگر بکینوت کفایت ننمود عمل را تکرار نمایند و در صورتی که ناسور جدید و صغیر باشد
ممکن است که از مالیدن سنگ جنم بجهت نوبت التیام پذیرد بدون آنکه کی نماید
و قسم دیگر آنکه بعد از دخول آئینه رحم با مشرطی دقیق اطراف ناسور را برید
و بجهت نمایند تا التیام پذیرد اما آنفوس که این اعمال زیاده خطر و در صورت
نرمی و عظم ناسور بهیچ وجه کفایت نخواهد نمود و اگر با وجود بر این معالجات
ثمری مترتب نگردد لابد باید قطعه اسفنج بهیسل فرو برده و رها دهند و بعد از آن
ظرفی که در وی شکل ترتیب داده و بمابین فخذین به بندند و دمان او را بفرج متصل
سازند تا بول در آنجا جمع شود و با سافل و لباس نیالاید

باب داغ از مفاله ثالث در قطع عظام و مفاصل و
مستعمل است بر دو فصل **فصل اول** در تعریف قطع و سباب
و علامات و علاج او بطوریکه و اما قطع مفصل عبارت از آنستکه حره مفصل از
مفاکش خارج و بموضع دیگر قرار گیرد و این حالت را منقسم نموده اند در
قطع تام و ناقص اما قطع تام هنگامی است که حره مفصلی بالمره از مفاکش خارج
شده باشد و ناقص آنستکه او را نماند که حره مفصل مخوف شده باشد از
مقر خود بعضی خارج و بعضی دیگر در مفصل باقی باشد و هم از این قبیل است چنان
مفصل که لونا غلیظتک نیز نماند و او عبارت از آنستکه کلیه محیط مفصل
منقطع نگردیده باشد بلکه تمددی در ارتباط اطراف مفصل برسد و باشد و هم
منقسم نموده اند در قطع مفرد و مرکب مفرد آنستکه جز قطع مفصل آسیبی
روی نداده باشد و مرکب آنستکه علاوه بر قطع عظم کمبود یا عرقی مجروح گردیده
باشد و اما تشخیص این علة را از چند چیز می باید نمود یکی از اضطراب عمل که حرکت
او یا بالمره باطل و یا ناقص گردد دیگر از تغییر طبیعت و محروم او که بعد از قطع عضو

یا اقصا از آنچه بوده بشود و چون لمس نمایند نقره مفصل خالی و جره او را در موضع دیگر
بیابند و بکن در مفصل عمیق که بالحم پوشیده اند و در صورتی که در می بدان مفصل
عارض شده باشد البته تشخیص صعب خواهد داشت و هم باشد که قطع مفصل
شود با کسر عظم و اما سبب این علة ضرب و سقوط یا تمدد عضلات است و اگر ضرب با
مفصل را وارد آید منکسرش سازد و اگر سایر مواضع عظم بر خورد از مفصل قطع
شود و در قطع تام لابد کلیه محیط مفصل منقطع خواهد شد و در صورتی که حره مفصل
مقطع را بر علة بموضع خود رها نمایند به نیکوئی علاج پذیرد بدون آسیب و بالعکس اگر
مدتی خارج از موضع خود بماند مفاک مفصل از لحم متراکم گردد و در مقر حره طبیعت
بر و در مفاکی بنا نماید و مفصل غیر طبیعی بوجود آرد و بعد از چندی فی الجمله حرکتی بهم
در او برسد و اما انداز قطع مختلف است قطع مفرد و جدید و دانی چندان ندارد
و بعد از رد صلاح پذیرد بخلاف آنکه اگر علاوه قطع عظم منکسر یا عرقی مجروح شده
باشد یا صاحب ادلیل و برضی مزاجی مبتلا بوده باشد انداز او را دردی خواهد بود
و قطع مفصل کبره مانند مرقی و اشال او را انداز سایر مفصل چون از آنکه
و تغییراتی که بر آنها راست بعبرت از موضع خود منقطع شوند و بعد از قطع صورت
مفادی عظیم گردند و هر چه در رد آنها تا مل نمایند بهتر است و بعد از آنکه التهاب
در مفصل منقطع برسد باید صبر نمود تا التهاب کین یابد و آنجا نیک
عضف و ضعیف و ارتباط مفصل مستقری باشد و در سبیل اما بعضی الجمله حرکت
دو باره از موضع خود منقطع شوند و بجهت علاج لازم است مراعات دو امر یکی رد
نمودن ثانی از ازاله نیایج و تراکیب او و اما بجهت رد او سه عمل باید بکار داشت
یکی آنکه نایبی از مافوق مفصل و دیگری از مادون او گرفته و بخلاف یکدیگر
کشیده و عامل از لمس و دنگ رد نماید و باید آنکه عضورا در همان محوریکه
قطع شده بکشند و در بین عمل باید عضورا بقسمی نگاه داشت که عضلات
مستقری باشند چون بخود دیگر رد او ممکن نخواهد شد و بجهت بهتر فاعضلات

لازم است که علیل را در جای گرم بگذارد که ضعیف او را عارض شود یا آنکه دوا
 قوی بدو بنوشاند اما اسلم و النفع تشنگی با استعمال دوائی بهوشی علیل را بدو پیش
 نمایند که بهتر است بر سرخی و جگره عضلات است و قاعده چنانست که مفصل مطاوعه
 پسند جوانب حرکت نمایند نمود محتمل است که تا دو ماه بعد از قطع بموضع خود رود
 و لکن بکره را یکماه بعد در صحت است و اما بعد از در مفصل لازم است که علیل چند روز
 آرام ماند و بهیچ وجه عضو متورم را حرکت ندهد و بهر سبب که عضو را تحته بند یا نوا
 بچ نموده که بکینه باشد او را و هرگاه بعد از در دستر خا و وجعی در مفصل باقی ماند بجهت
 تقویت او باید چند نوبت او را در بدن عضو صا به نمود و هر سه روز سال علی و تبریک
 دهن برین تسبیح اللّٰه سکن و جع در افغ استر فاهست و اگر با وجود بر این
 معالجات گرمی تری مرتب نگذرد باید به استعمال مشمع یا کی چندی ماده از مفصل علیل
 جذب نموده و دفع نمود و در صورتیکه مفصل متخلع منکسر گردیده باشد از خوف
 غافرا یا و کزاز و حب است قطع نمودن عضو

فصل ثانی از باب راجع در قطع مفصل اعضا و فراد اعضاء
 در این امان قطع در اسفل از فقره واقع در عظم جری سبب او ضرب و
 سقط یا تشاوب عظیمی است که در آن بین خبر ناگهان و خوفناک سر او را رسد
 و بواسطه او مهره مذکوره را از فقره خود خارج سازد اما قاعده چنان است که
 فک اسفل از دو جانب مفصل متخلع گردد علامات او این است که دهان کشود
 مانده و منطبق نکود و تحکم نتواند نمود و رطوبت دهان را نتواند نگاه داشت
 و زائده الحلیه فک اسفل بکدی بر آید که مشاهده شود و هرگاه از یک جانب
 متخلع شده باشد علامت او بر عراض مذکوره دهان منحنی باشد اگر مفصل مذکور
 به نیکویی بموضع خود رد نمایند نیک خواهد بود ولی مستعد تشنگی که نفی
 البعد ضرب و غمیازه از موضع خود متخلع شود و اگر در رد او تغافل ورزید طبقه
 مفصل جدید در مکرر حره مذکور بناماید و طریق مرد این است که علیل

بای

بر سر نشاند و بای سر او را محکم بدارد و در آود و مسجع ابرام خود را بلته بچیده و بد
 فرو برده و با ضرب اس طواحن کیده و دنگ را نازل سازد و با باقی اصابع از تحت
 فک اسفل را گرفته بقدام بر تفع بر روتا بموضع خود قرار گیرد آنگاه نواری از تحت
 زنج بر اس استوار ساخته و چند روز اغذیه ندهد رقیقه میل فرموده و از حرکات
 عسيفه و تحکم اجتناب درزند و در بعضی اشخاص قطع این مفصل عله مزمینی شود
 بخو یک از عده جزی مخاک از موضع خود حرکت نموده و بهسوله بموضع خود در
 گردد و اما قطع تر قوه و این عله واقع شود از ضرب و دارد براد و بعقب کشیدن
 کف بقبته بخو یکه رس تر قوه از فقره عظم قص خارج شود و در سطح فوقی
 او قرار گیرد دست را بر تفع نتواند نمود با وجع شدیدی بجهت رد او باید نایب
 باد و دستی که بر زیر بغل استوار ساخته است بدن علیل را محکم بگیرد و نایب دیگر
 بیدار گرفته بجانب وحشی و خلف بکشد و رد او تر قوه را دنگ و منضبط سازد
 تا بموضع خود قرار گیرد و من بعد نوار بچ نمایند

اما قطع مفصل یمن جمله است مفصل عضد و این عظم یا سنج
 انقل یا بقدام و یا خلف متخلع گردد و بفقو قطع نتوان کردید چون کتف مانع
 است از ارتقاع و انخلاع او را در صورتیکه بجانب اسفل خارج شده باشد
 علامات او این است که رس عضد در تحت ابط قرار گیرد و مقرر طبعی او خا
 مانده و بد از بدن بعدی برسدند و از آنجا بیکه منضبط میسازد عصب واقع در تحت
 ابط را وجعی شده عارض شود و از حرکت زیاد متالم و تمادی گردد و باشد که
 این حالت مشتبه شود بکسر تر قوه و لکن از لمس تمیز مابین آنها به نیکویی توان
 داد و اسسم اگر مشتبه شود قطع مفصل عضد بکسر او باید از سماع صوت کره
 بنیاسیون نیز مابین قطع و کسر نمود و معتبر ترین نشانه این است که چون
 علیل با کتف سالم دست دوم را برابر کنند ظاهر شود که در زیر اهرم دست
 سالم تحدی نمایان است از سر عضد بعکس در انخلاع سر عضد تدبیر اهرم

سطحی شود یا متعرج و قسم ثانی آنست که ریس عضد بجانب انسی متخلع گردد در این حال
ریس عضد در تحت زائده منعقد و انقباض ممکن شود علامات او این است که بدقتیر
و از بدن بعدی برسد و ریس عضد در تحت عضله عظیم صدر قرار گیرد و قسم
ثالث آنست که ریس عضد بجانب خلف متخلع و بروی کتف استقرار یابد و تحت
ترقوه سطح شود علامات او این است که بد از بدن بعید و فقیر گردد و بجانب قدام
نیاید علی ای قسم که سبب او ضرب وارد بر عضد و کتف افتادن است سیم
در حالتیکه دست از بدن دور نبوده باشد و اما انداز او میگو است در انقباض
ضعیف آنست که بهوله است و او بش توان نمود ولی در صورتیکه جدید باشد
و اما طریق رد او این است که علیل یا بروی کرش نشیند و نایمی بردارد و دست
طویل و وسط او را بروی کتف انداخته و از زیر بغل دست سالم گذرانیده
و محکم نگاه دارد و بعد لته را بآب آلوده و بمرفق پیچیده و دورشته خفت نموده
و بروی او بسته و بد و نایب پس نه آنگاه نمایان اولابکشند بمحوریکه دست
واقع است و ثانیاً بتانی بد را بر تفع سازند تا آنکه دست محاذی محراب بدن
گردد و ما بعد از رد او بگیرد چوبی و به لته پیچیده بر زیر بغل نهاده آنگاه حکم فرماید
تا نمایان دست را بقدام نزول دهند و در بین این عمل جراح باید صبیح
سر عضد را لمس نماید تا بمتر خود قرار گیرد و اگر بدین طریق رد او ممکن نشد لازم است
که بعد از مراجعات اعمال مذکور لوله را بلبته پیچیده و بر زیر بغل نهاده و حکم فرماید
بنزول بد و در آن بین لوله را از طرفین گرفته بر تفع سازد تا بموضع خود قرارش
دهد هرگاه وجع تخفیف یابد و بد را بجمع جوانب حرکت توان داد دال است بر آنکه
بموضع خود رست داده یافته است و بعد از اتمام عمل چند روز لته را بماء بارده
و بعضند پیچید و با نواری محکم او را ببندد که حرکت نکند و هرگاه بعد از رد دست
در این مفصل باقی مانده بواسطه اصابه ماء باره قوت گیرد و اگر کفایت ننمود
لازم است که مفصل را کی نمایند و اما خلع مفصل مرفق بجهت استحکام این مفصل

خلع

خلع نام دارد است الایکامی که با او فساد عظیم همراه است و این مفصل از مفا
بکره است که و غالی از دو قسم نیست یا زدن متخلع گردند معا یا زدن اعلی به تنها
و از انخلع این مفصل چهار حالت مشهوره شود اول بخلع فقط دویم بخلع و
سیم بخلع و انسی چهارم خلع زدن اعلی به تنها و حالت دیگر که انخلع زدن معا
بقدام باشد محال است مگر هنگامی که زائده مرفق بشکند اما حالت اول که خلع
بخلع باشد اکثر همیشه تام است بطوریکه زائده اکیس زدن بغل در خلف
بکوه عضد قرار گیرد و سطح مفصل بقدام زدن بغل استقرار یابد و با طات
طرفین منضوع و شریان مرفق نیز باشد که منضوع گردد و معلوم است
زائده مرفق در این صورت از خلف زیاد برجسته و از فوق او
و تر عضله ذو اسین سترخی شود و در
ریس عضد متعرج برسد
حالت دوم که خلع
بجانب حشی باشد
اکثر از جانب انسی
و علامات او این است که مهر انسی مفصل عضد برآمده و سطح مفصل زدن
بجارج و منتهی مرفق در سطح خلفی عضد قرار گیرد اما حالت سیم که خلع بجا
انسی باشد سطح مفصل زدن بغل بجانب داخلی برآمده و مهره خارجی عضد
بسمت خارج برآمده و بد زیاد انقباض برسد و این قسم از خلع سوازی است
رابطه طرفی محال و میشود که در بعضی علاوه بر او شریان و عصب نیز منضوع
شوند اما حالت چهارم که زدن اعلی به تنها بقدام متخلع شود و او این است
که سر این عظم بقدام مهره بروی عضد قرار گیرد و

د دست در مرفی قدری منحنی گردد در این صورت حرکت ذوری او باطل و حرکت بکره نای
در باطن در راس زنده اعلی منقذع شود علی ای قسم کان سبب و ضربه وارد مرفی
یا افتادن بکف دست است اما علاج و طریق رد او این است که نایبی دود دست
بگردن و زیر بغل انداخته وسط عضد را محکم بگیرد و از پیش رفتن مانع آید و یا
دیگر ساعد را گرفته و بخلاف او بکشد و عامل ید را بگذارد بجانب پس مرفی
بحریر که منقلع شده کشیده و خم دهد چون بدون خم شدن رد او ممکن نیست پس
از آن موضع خود را نشانی نماید و اگر از دست داد او تعاقب در زنده دست خشک
و بی ثمر ماند و بجهت رد او باید نایبی وسط عضد را بگیرد و نایب دیگر وسط ساعد
و عامل از دگ رد نماید عظم مذکور را بمقتضی طبیع خود این در اکثر آسان است
و اما فلج مفصل مشط این مفصل یا بقدام
و یا بخلف منقلع شود و زنده نسبت بمشط پله
فلا و به نود درجه یا بقدام یا بخلف تشکل شود
دار کشیده کی موضع خود استردا و یا به جهت
قسم باید رد نمود در صورتیکه سلامیات یکی از
اصابع منقلع گردیده باشند و اما فلج راس فخذ
این عظم از مناک خود سه جانب میتوان
شد یکی آنکه بر مشط افتادن راس فخذ بخلف
و فوق عظم و در قرار گیرد علامات او این است
که پا قصیر و از محور طبیع خود بیرون رود و قدم بجانب پس مایل در راس فخذ
در خلف و فوق درک ادراک شود و زانده موسوم بترو کند راز حمل خود بر تفع
و زانده فوقی درک تقرب جوید و حرکت رجس باطل و در کینه منحنی گردد و قسم
آنکه راس فخذ بعد از فلج بجانب قدام مایل و در ثقبه لوزی شکل مسدود و یک
در تحت عظم عانه واقع است قرار گیرد علامات او این است که پا طویل و از

و از پای دیگر تاعه جوید و قدم بجانب
و حشی مایل نموده و رگبه کی منحنی گردد
و حرکت او باطل شود و بدین مایل
بقدام است قسم ثابت آنکه راس
فخذ از مناک خود منقلع و در فوق
فوس عانه قرار گیرد علامات
او این است که پا قصیر و بجانب
و حشی مایل در راس فخذ در مقابل
واقع و زانده موسوم بترو کند و زانده فوقی درک تقرب جوید علی ای قسم کان سبب
فلج این عظم ضربه وارد و افتادن بجانب
از جانب دیگر عظم منقلع شود و در این
عظم صعوبت دارد و در اشتغال قوی
و مکانی است در صورتیکه فوق و عقب
منقلع شده باشد و اگر در زانده او امانت
طبیع مفصل جدید در مرفی مذکور
بنایا به و جفزه و درک را از محم متکی سازد
و اما طریق رد او این است که علیل را در پای
جزئی خوابانیده و پای راست را به یوازیکه داده و نایبی بروی رگبه او به نشیند که حرکت
کنه آنگاه که طویل بر داشته از باین فخذین انداخته و از روی شانه گذرانیده
و بنایا به سپر نه و همچنین و ستالی دیگر از باین فخذین انداخته و از شانه دیگر گذرانیده
و محکم بگیرند و مانع آیند از آنکه علیل جنب کشیدن پیش نیاید و مانع آیند از آنکه علیل
کشیدن علیل پیش رود و نایب دیگر در کین او را با دود دست محکم نماید و مانع
نه برداشته و بر کبه بچسبند و دو کمر بند بروی او خفت انداخته و به نایب سپر نه

تا مجری که فتنه منقطع گردیده بکشند و عامل ملاحظه نماید بعد از اینکه بر سر فتنه از مقر
خود حرکت نموده بایک دست کف قدم را بگیرد و با دست دیگر رگه را بگیرد و بعد اگر بجانب
پسین بایل است یا را بجانب وحشی بچرخاند و بالعکس اگر بجانب وحشی بایل است
بجانب پسین بچرخاند تا موضع خود رد شود چون بدین قسم بواسطه بعد مسافت قوت
بر سر فتنه پیش و آرد می آید چنانکه در جروا ثقال هر چه قوت از رگه ماه دور تر است قوت
بجهت حرکت کمتر لازم است مانند آنکه در قیاس شده میشود و اما مفصل رگه بنا در
قطع گردد بواسطه استحکامیکه بر او راست و اگر برسم منقطع شود ناقص خواهد بود همیشه
باین علامه عضلات و او را منقطع میگردند و این باشد که بعضی در وقت عظیمه و همه
در این موضع آسیمی است اما تشخیص در او سهل و مهم باید بعد از آنکه با طرف رگه
زولش نمایند و او را با دبر است کشند و طایفه را باینکه که مبادا در می بر او را عارض شود
و قطع او موجب بر سر است و اما قطع مفصل که به جهت مرکب است با کبر کی از دو قوز
و چون عظام اصبع در اطراف او واقع اند باید ایستاد که عظام بد کرده از شدت ضرب
رسم و مورت فساد عظیم گردد علاج این است که مفصل منقطع و عظم شکسته را با
کشیده کی بموضع خود رد و جبر نموده آرد و باینکه دایره درم بکار داشت و باینکه
مانع شوند حرکت او را لازم است که از جلی بسان نصف چکه ترتیب داده و قدم
را در او بکنند یا تخمه بندش نمایند و اگر زشت از عظم کمور گردیده باشد باید آنکه
شکافه او را بیرون آورد و موضع مجروح را در فاقه نمود و بعضی گفته اند که ممکن است قطع
تحت بدون کسری از دو قوزک و باشد که قسمین قدری حرکت نموده و بروی
عظم کمی قرار گرفته تا نزدیک بزور قی رسد و صاق بعد از میل نماید و قطع قدم
عالی گردد و در این صورت از کشیدن موضع خود رو باید نمود و ساق را در چکه بست
از طلب نهاده و محکم بست

باب خاص از صفات ناله در بیان مرض فتنه باقسام و علامات و علاج آنها
و شمل است بر مقدمه و پنج فصل اما مقدمه در تعریف فتنه و تقسیم او بیکه

آن فتنه عبارت از تشنگی یکی از اعضاء از معده و خارج شود در کینه محیط صفای طبیعی خود
قرار گیرد و بدین تعریف معلوم گردد که فتنه که ام و اخراج محض که ام است چون فتنه نمیشد
در خریطه صفا قیه است اما اخراج کی یک بطور رسد باین نحو که میگویند اخراج محصل
در جم و مستقیم و فتنه میگویند بواسطه آنکه کی یک محیط با و نزول نماید و این علت را
بنابسته موضع عظیم بدین قسم نموده اند در فتنه دماغ و صدر و بطن و از آنجا که فتنه
باین اتم قسمین اولی است لهذا ذکر او را بر ما بقی مقدم داشتیم

فصل اول از باب خاص در فتنه فتنه و اسباب و علامات و معالجات او
بطور کلی بدانکه اعضاء فتنه نمایند یکی از سه موضع کی از مجرای مغایر دوم از مجرای دایره
در تحت مغایر فتنه قسمین قریب است از عراق و نادر است که از سایر مواضع اعضاء بخواهد
فتنه نمود و از اعضاء اغلب فتنه نمایند معده و دقاق و شرب و بنا در معده غلاظ و معده
و مثانه و غیره بنا بر این موافق آلات منقوده نامیده اند او را فتنه اعضاء و فتنه شرب
و فتنه معده و هرگاه معانی با شرب بالمشار که فتنه نمایند او را فتنه شرب و اعضاء نامیده
و در صورتیکه معانی از موضع خود خارج و فتنه نمایند قاعده چنان است که کی یک صفای
خود را بر سر آرد و در او قرار گیرد و او را کی یک فتنه نامند و واضح است که این
با صفای عظیم بطن منسوب و جزء او است و موضع اتصال این کی یک را با صفای عظیم
بواسطه ضیق بودن او فتنه نماید و این کی یک را قاعده آنست که با طرف ملحق و
لحم شده باشد بخوبی که بعد از رجوع معده مفتوق کی یک او در آن موضع باقی ماند و در تحت
نمایند و در جرم و اجزای او غلظتی برسد و مقدار عظم فتنه مختلف است در بعضی بعد
فتنه و در بعضی به بزرگی سیر طفلی گردد و هم ممکن است که یک شخص صاحب فتنه
باشد علی ای حال در صورتیکه معده مفتوق صاحب حرکت باشد و بهر حال بطن رجوع نماید
او را فتنه آزاد می نامند و اگر بدون حرکت باشد و بطن رجوع نماید او را فتنه ساکن
نامند و سبب حرکت و ساکن او یا از این است که معده مفتوق مدتی مدید در کی یک
خارج از بطن مانده و یا لحم ملحق گردیده و یا لحم شده و یا آنکه باب فتنه سخی ضیق است

که لبان حلقه معاء را منضبط می سازد و نمیکند ارد تا بطن رجوع نماید و این قسم رافق
مخوق نامیده اند و بنا به سبب منقسم گردانیده اند او را به فتن خلقی و عارضی اما فتن
خلقی کسی نامند که مجرای که در جنین مضیه از او عبور و از بطن خارج میشود و مسدود
نشده و یکی از امعاء نیز از همان مجرای فتن نموده باشد و اما سبب فتن یا استعداد است
و یا اتفاقی و از سبب استعدادی است ارث یا سترغائی سراق به سبب شحم یا تعدد
او است بواسطه استسقا و وضع حمل و قسم نزال مغرط و از سبب اتفاقی که مورث این
علت شوند ضربه و سقطه و ارده بر بطن و تعب عظیم و سعال شدید و قوی و فتن مغرط
و حمل شیاء ثقیله در بعضی بلدان فتن پیش از بعضی دیگر بر سر و در ذکور و جانب این
بیشتر فتن عارض میشود که در انات و جانب اسیم و اما علامات فتن متحرک که از آن
نامند آنست که تحدی در یکی از مواضع به کوره مجسم بدون ایلام و انداز و جسد کامل
و تغییریری رخ نماید و اگر علیل به پشت بخوابد یا آن موضع را دک نموده منضبط
باشد ای قراقرط بواسطه رجوع معاء مفتوق به بطن تحب بعد و م شود و بالعکس از بیاض
و سرف نمودن و جیس نفیس تحب سیرایه و چون چندی بدین منوال بگذرد آلات غذا
و مضغ را غلی روی نماید و طبع به سبب بهر سانه و در بطن ریج و قراقرطی بر سر با
حشا و امی و وجع قوسخ در اجزای بطن عارض شود و تشخیص آلات مفتوقه زیاد
است و اما فتن امعاء خود را تشخیص میدهد از تحدی بی لدنی و می که در حین رجوع
به بطن فسر او را و از قرع موضع او صوت طبلی سموع شود و هرگاه شرب فتن
نموده باشد در موضع مفتوق تحدی بی لین غیر مساوی باشد و حین رجوع فسر او را در
و افشع او صوت طبلی سماع نرسد و آنجا یک باب فتن ضیق و معاء مفتوقه را
نگ احاطه نموده باشد بخو یک معبر برآمده و در حرکت دم عسرت داشته باشد
البسته جزء مفتوق از معاء مفتوق خواهد شد و باشد که این حالت بطول نه انجام
و مورث عاقر ایا گردد و سبب این خاق حرکت عسیمی است که بواسطه او معاء
زیاد نازل و به چپ و یا از برازی غلیظ و سخت میسر گردد و بدین واسطه

افق

رجوع او معوبت بهر سانه و مفتوق شود و اما علامات خاق معاء این است که در حین شیب
در اجزای بطن و فتن عارض شود با تندی عظیم در موضع مفتوق و غشیان و قی به آنچه
در معده است و بعد فتن صفراوی دست دهد و این فتن بالذات و یا بعد از شرب سیر عارض
گردد و بنض از ابتدا صلب و سریع و بتدریج صغیر و مستعد شود با فتن بطن و جیس مطلق
و طبع و هرگاه این حالت طول کشد و علاج نماید علیل رافق و اضطرابی عظیم روی
دهد باقی متصل و فاق و بنض دودی و منفصل گردیده عسرت بارد عارض شود
و شمه بگردد با کشیدگی و غرور عینین بعد هلاکت رسد و در صورتیکه معاء مفتوق
رجوع نماید و در موضع خود باقی ماند غلظت را بکشد و در این حال وجع بدان شدت
تسکین باید و امس این و جلد بگردد و در جوف او هوای متعفن تولید میشود و بنض
ساقط شده و صاحب خود را بهلاکت رساند و لیکن بنا در میشود که معاء مفتوق به
جلد ملحق و بطا هر منفجر گردیده و در این موضع مقعدی غیر طبیعی بوجود آمده و علیل
برسد و اما علاج این مرض مختلف است باختلاف فتن از استعداد حرکت یا عدم
یا خناق و یا عاقر ایا و آنجا یک فتن صاحب حرکت باشد بجهت علاج او لازم است
که موضع علت را دک نماید تا معاء مفتوق به بطن رجوع نماید انگاه فتن سینه
بسته و مانع آید از نزول او و احواد قات بجهت این عمل صبح است در قاتی که
امعاء را به استعمال حق لیسند از فضول خالی ساخته باشند و علیل را بروی ستر
خوابانند و پاهای را خم دهد و بالشی بریزد و معال با یک یا دو دست
موضع علت را دک نموده و معاء مفتوق را بجانب باب مرتفع و منضبط سازد تا
به بطن رجوعش داده و برگردانده و بعد از رجوع باید با فتن چند قسمی به بندد که
فرد که او ثقیله و باب فتن را به سبب منضبط سازد که حین جیس نفیس بر روی
معاء خارج نتواند شد و باید حین استعمال فتن بند علیل را خوابانند و هرگاه علیل
از بستن این آلات جزئی از معاء بتواند از هر سیری دکه او خارج شد صا
خود را زیاد و متالم بسیار و در موضع راکه آلات مذکور منضبط سازد و مورث اید

۱۷۲
 گردد باید پند یا پارچه صوفی بسازد که مباد از صدمه او جلدش بشود و در صورتی
 که معده مفتوق بالکیم خود ملحق بشود و بدین واسطه سر جفت نماید یا آنکه جسته
 مفتوق بمقدار است که رجوع او محال است در این حال معالج را هیچ باقی نیست
 جز آنکه کیمه ترتیب دهد و موضع مفتوق را در او نفوذ و به بند تا کیمه بشود و در
 وقت عظیم اگر علیل چند ماه به پشت بخوابد و از دنگ بموضع مفتوق و اکل اعده
 لطیفه ممکن است که معده مفتوق به طبع رجوع نماید ولیکن از او باقی ماند که بتوان
 قوت بند بکار داشت و در صورتیکه قوت جدید و علیل طفل باشد از استعمال قوت بند
 لایق و دائمی باشد که باب قوت بند یک بر ملحق و مرض بکلی دفع و علیل نجات یابد و نباید
 دانست که چون چسب قوت بند استعمال نموده و باب قوت بند بدین واسطه ضعیف گردید که
 قوت بند را بردارند و حرکتی عظیم نمایند باشد که معده مفتوق مفتوق شود و متعذرین
 از عملی بجهت دفع و علاج این مرض بکلی بعضی اعمال خستراغ نموده اند که بواسطه آنها باب
 قوت متورم و از کرم ملحق میگردد و لکن از آنجا که اعمال مذکوره خطر و نفع آنها اقل از آنست
 که قوت بند متافین علم حسد اجماعی ترک نموده اند بالمره از آنجمله اعراض کی میسر نموده
 بدین قسم که بر میزد اشتند آبی نافه و محاذی قوس معان جلد را داغ نموده و کیمه
 قوت بدین واسطه قوس جمع و باب قوت مسدود میگردد اما واضح است که از قرب
 به صفاق و مجاورت او این عمل را خوفی عظیم است و انقسم دیگر از عمل آنست که به
 تحریک بل البیض و کیمه مفتوق چند سوزن فرو برده و با طرف آنها پنهان کشیده و در ما
 و بهند تا جلد غافرا و کیمه را در دو نقطه شود لکن آنجا که این عمل حاصلی بجهت پیچیده اذیه
 و معدوم خواهد بود و انقسم دیگر از عمل که بسبب عدم فهم مقام است که جلد پیچیده
 سیاه قوت بند بدین طریق که باغات است با پیچیده را با سب قوت بند فرو برده
 و بعد دو سوزن سیاه کشیده بر کیمه فرو برده و این را به سوزن فرو برده و از فوق
 موضع مفتوق خارج ساخته و بموضعی که مسیح نموده اند کلوله از گمان که از در پشت
 اینها را از فوق مراقب و چوب به پیچیده تا سه روز بعد از عمل که در می در اجتناب

لنف

۱۷۴
 موضع علت عارض شود و نقبه قوت را مسدود بسیار در در ششم تا دوازدهم سیاه
 بایکشید و اما علاج قوت مفتوق این است که معده مفتوق را به طبع رجعت دهند هر چو که
 باشد و بجهت این عمل باید قوتی نمود که تمدد عضلات طبع قلیل کرد و بهت نسبت که اولاً
 قصد نموده و با طرف موضع علت را زلزلش نیند و بهتعال حق لیسه امعاء را از نفوذ
 عالی باز نه صفت حقنه نافع بگیرند تا قوت نیم در ششم و در پنج سیر آب ملخ دادند
 و به دقت حقنه نمایند که با این تدبیر معده مفتوق به طبع رجوع نموده و الا باید
 تحلیل را در تمامی کرم فستاده و بعد از یک مکت نمایند که ضعیف عارض شود آنجا باید که
 این معده مفتوق را رجعت دهند و چون از دنگ قوی باشد که کیمه محیط معده پیچیده
 گردیده و صاحب خود را بهر اکت رساند لهذا باید دنگ با فضلال و دفعی باشد و باطله
 او تحلیل را بخوابانند و زیر کمر او بالشی نهاده مرتفع سازند و بموضع علت اضمه سرشته
 از بر رگ و کل خطی و کل سرخ و با بوننه و امثال آنها کار دارند و هرگاه با وجود اینها
 معده مفتوق به طبع رجوع ننماید و عضلات طبع تمدد و فواق عارض شود باقی مکرر و من
 صفر بر سر آن باید بدین نایل عمل بدین نمود اگر چه شش تا دوازده ساعت بعد از
 خنای ممکن است عمل بدین نمودن بکلی همیشه تحلیل او از برای عامل و مسهل اسلم از
 تا خیر است و این عمل را بکار بکار باید تمام نمود اول شق جلد تا فی کشف
 و کشون کیمه قوت ثالث و سیع نمودن با قوت قمر رابع رجوع دادن معده مفتوق
 به طبع و اما بجهت شق جلد لازم است که موی اطراف را زایل ساخته آنجا عامل و باید او
 از موی محاذی قوت یک خطی از جلد مرتفع نموده و بعد مشروط مجد فی این کجاست
 فرو برده و از جانب دیگر خارج ساخته و از داخل بخارج جلد را بشکافند مکرر
 بعضی اوقات از خوف آنکه مبادا آسیب عظیم رخ نماید لازم میشود که از ظاهر به طبع
 جلد شکافت و بجهت عمل ثانی باید برداشت اینر و سیل صاحب بیمار و مشروط
 دقیق به این قسم که اولی با اینر طبقه دقیق از آن موضع را گرفته مرتفع ساخته
 و سیل مذکور را تحت و فرو برده و با مشروط بشکافند و بدین قسم بتدریج و در عمل

نمانند تا رسیدن معاء و قاعده چنانکه از شکاف کبیسه محیط معاء رطوبت می
یاغیالی خارج شود که این رطوبت فنی نامند و معین خروج رطوبت فنی دلیل است
جراحی که با معاء رسیده است و اما در هنگام نالت بعد از شکاف کبیسه متوق
نمودن او باید صبح ابراهام فرورده و هدایت او مشروط و که در این سحر کبیسه
در فصل و عقبه مذکور را وسیع سازند آنکه در کشودن باب فنی احتیاط کامل
بجای آرند از خوف آنکه معاء در این کشودن جریسته بر معاء مفتوق و در آنجا
خود را فی الفور پلاک سازد و لهذا لازمست که نایب معاء را بیک جانب بکشد و حال
نوک صبح بیاورد و خود را فرود بر موضع ضیق بکشد تا آنکه معاء و معاء
فماهی باشد بموضع که باید کشود و هدایت او مشروط و که در آنجا نالت کرده و بشکاف
باب استعراجه که معین سهولت داخل بطن تواند شد و اما در هنگام رابع عمل این است
که عامل ملاحظه نماید که معاء مفتوق سالم است یا فاسد یا ملتوی است یا غیر ملتوی
اما در صورت سلامتی از یکدیگر قطعات را جدا نکند و بهر حال قسمیکه خارج شده
بطن رجوعش دهند تمامه که آنجا نیک معاء مفتوق با کبیسه خود ملحق یافان کرده
باشد جایز نیست رجوع او بلکه بعد از فسخ باب از غسل در کشیده و بنده
و اگر حوله قیسه از معاء ملحق باشد مستوان یا جنبه طمع او را از کبیسه جدا
نموده و به بطن رجوعش داد و هرگاه اجنه در محل مشاهده نماید که ترش فاسد
و سیاه شده رجوع او جایز نیست در این صورت باید قطعه فاسده از ترش
برید و سالم او را بطن داخل ساخت و چون معاء مفتوق بخش با کبیسه در کشیده
باید عامل را سیما فی برداشته و به در ترش کشیده و بطن رجوعش دهند
و اگر که ملحق است بعد از فسخ باب حیوة از سر کرد و بکسر آنجا نیک معاء مفتوق فنی
و حیوة تحریف یافته باشد تا حدیث لئون و بر دو موضع و شقاق حله دال است
بر این یعنی در این وقت عامل را هیچ باقی نیست چرا که موضع ها نفوذ یافته
قطع نموده و قسم نماید که در این موضع متعذر غیر طبیعی موجود شود و اما بعد از

فراغت عمل خون رفته و علیل را بخوابانند بخوبی که عضلات بطن مسترخ باشند و جراحی
با قیاسیک یا لته آلوده بروغن بادام پوشند و قاعده چنان است که یک ساعت بعد
از غسل طبیعی اجابت نماید و اگر اجابت نمود باید بشر کبیل و دهن بید بخیر طبع را
نرم دارند و چون جراحی بریم نشیند رفاندرا تجدید باید نمود و هرگاه بعد از غسل
علامات درم صفای عارض شود لازمست که بشر کبیل و روغن کرچک و تریخ
دهن زیتون سخا فی اللون و در سال علی سورت او را منکسر و ماده مورمه را تحویل
فصل ثانی از باخا ص در ذکر اقسام فنی و علامات
و معالجات او بقضیل و شل است بر سه جمله اولی در فنی بر بطن و این لفظ
شامل است خروج یکی از امعاء را از مجرای بیضیه و این از چند حال خارج نیست یا چنانست
که معاء از تمام مجرای عبور و از حلقه خارجی بطن فنی نماید و او را فنی خارجی نمید
و یا چنانست که معانی مجاورت جبل البیضیه بکبیسه بیضیه منصب شود و او را فنی صفی
و در امانت میگوید که معانی لبغزین داخل شود و او را فنی لبغزین نامند و هرگاه معانی
از تمام برج بکشد بیک از حلقه داخلی از خارج و در مجرای باقی ماند در این صورت او را
فنی داخلی برنج نامند و اما فنی خارجی برنج چون معاء مفتوق از تمام مجرای کشته
و واسطه شکل توری او مبر نماید و بعکس فنی داخلی قیصر و سقیم شکل است و چون
فنی خارجی مزمن شود غنی او فقیم و جسم بر سینه و دین واسطه مجرای سقیم گردد
بعکس که قیصر او از فنی داخلی برنج صعب و متعسر باشد و بعد از آنکه معانی فنی نمود
و کبیه بیضیه داخل گردید محاط است از چند طبقه اول ضیق ثانی محکم و شمم واقع
در تحت جلد ثالث غشاء عضلانی و غشاء جبل البیضیه رابع کبیسه فنی که متعلق
بصفاق و جزء او است و اما مستعدین بدین عله استخوانی باشند که بر بطن آنها
وسیع یا بالتره مسدود گردیده باشد بعکس که علاوه بر بیضیه یکی از امعاء از بطن
خارج و فنی نماید در این حال او را فنی خلق نامند و از آنجا نیک ملحق است شبها
این علت با قیل الماء و دوالی جبل البیضیه و بقای بیضیه در برنج و در غسل

در این صورت که در فنی لبغزین معانی فنی شود و در فنی داخلی برنج معانی فنی شود و در فنی خارجی برنج معانی فنی شود

او بعضی و خیارک و دل ریمیکه در این موضع موجود شده باشد لهذا از دست که این
علامات بسیار دهند فستقرا از امراض مذکوره منجس

فوق قیل الماء

از جانب اعلى به غسل مایى است	مخلاف نمواز غسل مینماید
ما حبتى است مقفل به بطن	مخلاف در شکل کلاسه است
از جنس و در میدان عظم بهر دست	مخلاف تفاوتی در او بهر دست
از قرع آواز طبل نماید و از دنگ	قرع او چنان باشد که شکر پر آب
بطن راجع شود چون بجانب کفر	شعاف و ضو و شعاع خلف او
او در شانی بآواز ضو و مری نشود	مرئی گردد
از فرو بردن صمغ به برنج داخل شود	چمنین است

و آب فوق فهمیده تواند شد

و اما آنچه مابین فوق و دوالی جبل البیضه را بدین علامات باید دانست

من جسل	دوالی جبل البیضه
بر بطن وسیع	مخلاف ضیق است
از لیس در و در او محسوس نمیشد	در و در او در و خوب محسوس شوند
چین خوانیدن معده مفتوح بطن راجع	از خوابیدن البسته ضعیف میباشد
ناید با فراغ و بدین مظهره اید و انکاس	دل بتدریج و بدون فراقه از بطن خلیل شود

و اما آنچه مابین فوق و خیارک را بدین علامات نماید که در فوق
برنج وسیع و اعراض الهامی مرا و از اینست الا در صورتیکه معده مفتوح و حقوق
گردیده باشد در قرب موت الهامی عارض شود با سایر اعراض رده از قی و الهام
و امثال آنها بخلاف آنکه در مرض خیارک برنج بحالت طبع و اعراض الهام
ظاهر و اغلب با قسه و قنیه میسر است

و اما آنچه مابین فوق و حصول دیم و اجتماع او در مغایرین بدین علامات

باید دانست

بدین بود که در قی علامات حی دق و وجع قطن و کسالت و ضعف بدن و قوی نیست
و بعد از آنکه قطن بریم نشینند و بریم حاصله و از آنها معاینه منصب و در آنجا مجتمع
شود و بدین واسطه علیل راجحی دق عارض شود با کسالت اعصاب و وجع قطن و ضعف
در صورتیکه بطنه در مجسمه باقی مانده باشد البسته ضغن انجانب عالی خواهد بود
از بطنه و با وجود براینکه علامات کثیره بجهت تمیز مابین فوق و سایر امراض بیان نموده
میشود که حکما و حاذق و ما بهر نیز در تشخیص شتاب نموده و بخطا سقیده و اما علاج این علت
آنست که معده نازل را بتدریج با دلی برقی بجان قسم که فوق نموده بطن رجوع داده آنجا
فوق بند که فزونی بدان موضع به بندند بخو یک از جنس نفیس و در میدان معانی تواند زد
نمود بدین تدریس ممکن است که بعد از دو سه سال آب فوق مسدود و مری بکلی زایل
و علیل نجات یابد و اما در صورتیکه معده مفتوح بهیچ وجه بطن رجوع نماید و اعراض
مخوفی بر او عارض شود باید بدون تأمل غسل یابد نموده بدین طریق که جلد بطن
موضع مفتوح را دو نایب غصنی عرض گرفته مرتفع سازند و عامل بر او در شکر
مستقیم و یکجانب او فرو برده و از دیگر طرف خارج ساخته و سیله با و دار بد فرو
دینکافد آنجا با بری طبقه طبقه گرفته مرتفع سازند و تحت آنجا سیل فرو برد
و طبقه طبقه باشد تا آنکه رطوبت دفع شود که دلالت نماید بر آنکه معده بهیچ
آنجا اصمیع فرو برده و بهیچ جهت و ثقبه را با شریطی دیکه دار وسیع ساخته و
با اصمیع استخوان نمایند که آب فوق وسیع با ضیق است و از آنجا یکدیگر ممکن است قطع
نمودن شرابان نانه بطن در جنس سبیل بناء علی ذلک حکما و قرار گذارد اند که در فوق
خارجی از جانب حشیش برنج بجانب نمانده حاضر بشکافند و در فوق در حلقه
از جانب سسی با علی باید شکافت و هرگاه یقین نداشته باشند در تشخیص بهیچ
باستقامت از جانب سسی حقوق بشکافند که شرابان مذکور را اصمیع و
نماید داد البسته و بعد از اتمام غسل و رجوع دادن معده بطن جراحت را
نموده و به بندند بطریق که در غسل سسکو ذکر رفته تا التیام بدین آگاه فوق

فوق بنده بکار دارند و این قسم از فوق ذکر را اکثر عارض شود و فوق فندانات را
جمله ثانی از فضل ثانی در بیان فوق فندانات و او عبارت است از خروج
 معانی از جگر و واقع در تحت رباط موسوم بفلانی و نزول او بقدر چنانکه در کتاب
 تفصیل او ذکر شده است و از آنجا که این قسم در انات بواسطه وسعت خواه او
 از انات که در ذکر انات اغلب انات را افتد و اما علامات او این است که در تحت
 معانی و رباط که در وقت دم او دیده می شود از آنجا که بر تندی عظم فندق ظاهر می شود
 تا آنکه عظم نارنجی شود و از جگر و در میدان و حرکات خفیه عظم از آنجا که موجود است
 گردد و نیز با این علت و فوق بر جگر چنان است که در فوق بر جگر معانی از فوق رباط
 فلانی و در اینجا از تحت او خارج می شود و در فوق بر جگر معانی منفوق بصفین مصب گردیده و در
 این حال محال است بصفین او بصفین او قسم باید بعلامه ای که سابق ذکر نموده ایم تفسیر و این
 علت را از مرض خیال و در دل بر می واقع در این موضع و طبقا یک معانی منفوقه از این
 محیط اند اول جلد و لحم واقع در تحت او و غده شحم و کلیه معنی است و غالباً معانی عظیم
 و بزرگ معانی است از این موضع فوق می نماید و اما علاج باید آنکه معانی منفوق را بطن رجوع
 داد بر فوق و ملائمت آنکه از بطن باقی بند یک قصیر الفتح باشد باقی آینه نزول او را و
 صورتی که رجوع او ممکن نگردد و اعراض خنای ظاهر شود چون خنای معانی در این موضع بزرگ
 صاحب خود را هلاک می سازد لازم است که بدون تأمل عمل به نمود بدین قسم که از جلد و لحم
 متحد موضع منفوق خفیه طول گرفته مرتفع سازند تا عرض شکافه شوند بخلاف آنکه
 در قسم سابق و بعد از آنکه در وقت کاملی شکافه تا دریدن معانی را وسیع تر شد و بعد
 از شکافه کبیه و وسیع نمودن او و بقیه شکافه چنانکه رباط موسوم به جیم بر
 سطوح گردد بجهت این معنی لازم است بردارند مشروطی و کیه دار و تمام قسم او را با تبه چیده
 و قدری از او باقی گذارند یا آنکه با مشروط مخصوصی که مر این عمل راست بجز کبیه داخل
 و با وسیع کند و نیز رباط مذکور را با شکافه مشروط بر روی او نهاده و وقت نمایند قطع
 شود و بعد از قطع او معانی منفوق را بر فوق بطن رجوع دهد با سایر اعالی که سابق در جگر

معانی ذکر

جمله ثالث از فضل ثانی معانی ذکر نموده ایم
 در فوق مرآت که هم قسم فوق سوره نامندش بواسطه قرب جوار و او عبارت است از خروج معانی از
 فضای مابین او تا عضلات بطن و بنا در می شود که از سوره فوق نماید معانی و این مرض با خلق
 و یا عارضی است اما خلقی هنگامی است که بعد از تولد ثقبه سوره سینه و معانی از فوق
 نماید و این حالت اغلب عارض می شود اطفالی که زیاد بکریند و قسم با یک چند نوبت حمل
 برشته و بدین واسطه فضای بطن آنها وسیع گردیده یا اشخاصی که لحاف بطن بوده و هر
 بهر سینه اند یا مبتلا به مرض استسقا بوده اند محتمل است که بدین قسم فوق مبتلا گردند و طبقا
 محیط معانی منفوق از این موضع جلد و لحم واقع در تحت او و غشاء عریض مرآت و صفای
 و اما علامات او این است که در وسط بطن متحد می موجود شود از ثقبه جگر عظم هر سینه
 و در صورتیکه فضای بطن ضیق باشد و معانی را جای نماند و بدین واسطه فوق موجود گردد
 علل را اعراض فوقی نرسن عارض خواهد شد و در این قسم فوق ما در است که معانی منفوق
 گردد و هرگاه این حالت بهر سینه زیاد شده و سرعت صاحب خود را هلاک می سازند
 و اما علاج میباید معانی منفوق را با دنگی لین بطن رجوع دهند آنکه بر دارند نصف جگر
 نو او موضع علت نهاده یا کم بندی او را محکم به بندند و اگر کفایت ننمورد رجوع معانی
 بکریند پاره چوبی خوف و موضع منفوق نیست چنانکه معانی در خوف او قرار گیرد و در
 انات میباید کم بندی ترتیب نمود از سمع بدن و بکمر بست تا از انقباض او معارج
 بطن نموده و خارج نتواند گردید و هرگاه با این حالت معانی فوق گردیده باشد لازم است
 که از جانب فوقانی بطن با استقامت شکافی داده و معانی را بر فوق بطن رجوع داد
 و بنا در می شود که معانی از ثقبه سوره و غرضه فوق نماید و بچسب است فوق معانی
 و از آنجا که فوق معانی به سبیل یا عجان نهایت ما در الوجود است و تشخیص متعسر
 و لهذا ذکر آنها را ترک نمودیم
فصل ثالث از باب خامس
 در فوق صدر و او بسیار را در الوقوع و سبب و یا خلقی و یا عارضی است اما خلقی
 هنگامی است که قوه مصوره در شکل ضلعی خطا نموده باشد و عارضی هنگامی است که

ضلعی ریم کرده و از سرفه عظیم فوق عارض شود علی ای حال علاج این است که قطعه مغنوق
از ریه را بموضع خود رجوع داده آنگاه پاره چوبی که در قیاس روخته باشد بدان موضع نهاده
و به بند لکن علاجی حقیقتی مرا ورا نیست

فصل دایع از باب خاص در فوق دماغ و او عبارتست از تندی که واقع
شود در موضعی از مجسمه بواسطه خروج دماغ و اغلب خلقی است که از مابین درو
یا ملاذه دماغ فوق نماید و بنا در می شود که قطعه از عظم مجسمه زایل و دماغ از آن موضع خارج
شود و علامات او این است که در روز از یکدیگر متفرق شده و در می ظاهر شود بافتن
و بسط و چون لمس نمایند حرکت دماغ ملموس گردد و در جلد آن موضع شعری فروید
اما اعراض این علت بنا بر عظم و صفر فوق مختلف است هرگاه صغیر باشد اعراض او
نباشد لکن در صورت عظم طفل را زیاد متالم و متادی سازد و دائم بگریه و بناله تا
هلاکت رسد و هم مشاهده شده که طفلی با این حالت نمرده است بواسطه آنکه خوب
محافظة نموده اند موضع علت را از ورود آفات و صدمات و عارضی این مرض را از تعذر
ضربه وارده به مجسمه و زوال عظم موضعی از او و حرکت دماغ باید تشخیص نمود و بسا
باشد که بعد از علل تیره یا مسیون قطعه لحمی سفید در غشاء ام الغلیظ بر وی و بر آید
چنانکه در معالجاتی ذکر اورد و مشتبه گردد بفتق دماغ در این حالت باید به قتل
و مراعات اعراض با سبب تمیز و داشتن از یکدیگر و هم اگر مشتبه شود باطل خوشنیک
بعد از تولد در راس طفل عارض شود و باید تمیز داد باین اهل علامات ماذکر اگر چه فوق
اغلب در وسط راس و دل مذکور از تنوع عظم مخفی واقع میشود و اما علاج در صورت
صفر فوق لازمست که نهایت دقت و رافت جزو مغنوق از دماغ را بجوف راس
رجوع داده و با بعد از پاره چوبی در شکل بدان موضع نهاده و محکم به بند لکن در
صورت عظم این عمل کفایت نخواهد نمود بلکه باید از چوب کلایی یا ورق فقره صغیر
مقعر شکل ترتیب شود و بموضع مغنوق نهاده و سبب و مواظب بود که صدمه
و آسیب بدان موضع وارد نیاید بهیچ وجه

باب سادس در فروجات احشای آن عبارتست از نزول نمودن حشای
از باطن ظاهر و تمیز داده شود از فوق بواسطه خارج شدن امعانی صفای خود بخلاف
فتق که با صفای همراه بود و این باب شش است بر سه فصل اول در فروج رحم فصل دوم
در فروج مهبل فصل سیم در فروج سقیم اما فصل اول در فروج رحم است و این فروج
یا تام است یا ناقص اما ناقص آنست که در مهبل نزول نماید چنانچه اگر انکشت را در فروج فرو
برند رحم را نزدیک آن احساس نمایند و از عوارضات این مرض است وجع شدید در
و تها که و احساس ثقل در مهبل و عسرت در ادرار و اطلاق و این علامات در هر کام حیض
و حرکات عصبیه نمودن زیاد گردد اما فروج تام آنست که رحم از فروج خارج شده و مهبل
نیست باین گشت و علامات مذکوره بتمامه در این وقت موجود و در نهایت شدت شبها
و بطلان غلظ و اضطراب و قی و علامات اختناق رحم ظاهر شود و چون رحم مجاور هوا
شود ملتهب گردیده و گاهی متقرح میگردد اما جهت این مرض استعداد زمانی است که مهبل
متقرح شده باشد بواسطه سوزنک مزمن و با وضع حمل نمودن متوالی و یا برداشتن
بسیار ثقیل بخصوص بعد از حمل و علاج این مرض آنست که رحم را بمحل خود برگردانند
پس از برگردانیدن بدین نحو که اولاً مثانه و سقیم را از ادرار و اطلاق پاک نموده
و بعد مرصعه را به پشت بخوابانند چنانکه در زیر کمر آن باشد که اگر نه که مرصعه بوده باشد
و بعد از آن با دو انگشت ابرام رحم را فشار داده تا بمحل خود مراجعت نماید و هرگاه
این عمل دشوار باشد مرصعه را باید چند روزی خوابانید که بهر وجه ممکن است
و بعد رحم را گرفته بمحل خود برگردانند و پس از برگردانیدن فرجه نمایند تا آنکه بخود
شود و رحم بدان گنبد نماید و بهترین فرجه حلقه است یعنی شکل که از چوب پنبه
پاک کن و یا صمغ کوه پر جاساخته باشند و از طرفی غنی و قوی داشته باشد و طرف
پستغال فرجه هم بدین نحو است که بعد از تنقیه مثانه و سقیم از ادرار و براز
مرصعه را به پشت خوابانید و بخوبی که مرصعه و قندین مرتفع بوده باشد و پس از آن فرجه
با دو انگشت فرو برد چنانچه فمیده شود که غنی رحم در مداخل حلقه مذکوره قرار گرفته

و بعد فرجه را بقدر القیاس داخل نمایند که رحم را بالا برده در تحت عانة قرار گیرد و چند ساعت آرام بماند هرگاه مورت ایلام شده که در معلومت که فرجه مذکور عظیم میباشد باید اورا خارج نموده فرجه که چکتر بکار برند و هرگاه فرجه بدین سبب خارج شود دلیل بر آنست که مقدار او که چک است لهذا تبدیل او نموده بزرگتر از او بکار برند و باید فرجه را بر لیسنه هر سه روز یکنوبت خارج نموده پاک کند بعد از آن مجدداً عمل نماید و چون لایمی میشود که فرج اثری نمی بخشد و مر لیسنه نیز فخل آن نتواند شد لهذا جراحان عمل دیگری اختراع نموده اند برین نحو که بعد از بریدن کنار شفرین کبیر دو کنار او را از جانب اسفل بجهت نموده تا نزدیک تنابلا قدری باز کنند بجهت خارج شدن او در او خون حیض و یا آنکه دو علقه در شفرین کبیرین انداخته که منطبق بر یکدیگر گردیده تا دامنه بوده باشد مر رحم را کفک در انقلاب رحم شود که گاه لایمی بندرت رحم خارج شده و منقبض گردد و این نیز بایام یا ناقص است و یا دفعی و یا تدریجی اما وقتی عارض شود بواسطه زایندن زن در حال قیام یا در صورتیکه جفت در رحم بوده باشد و قابل بندناف را بکشد اما تدریجی ببرد بواسطه مرض و بواسطه کس که در رحم عارض شده باشد و رحم را بشکل خود خود آورد و عوارضات این مرض در صورتیکه دفعه عارض شود شدید میباشد مانند غشیان و قی و التهاب و غشی سیلان دم و باشد که رحم منقبض شده بجز نبالکت گردد اما علاج او را باید در محل خود برگرداند و این در موردیکه مرض جدید باشد سهل العلاج است اما هنگامیکه مزمن و التهاب شدید و دو دم نیز عارض شده باشد در این صورت چون رجعت بمحل خود متعسر است لهذا گاه دفع دردم نمایند و بعد از آن بمحل خود رجعت دهند

فصل ثانی در بیان فرج و جمل و این مرض نیز بایام یا ناقص است اما ناقص آنست که قدری از جمل خارج شود و تمام ششک غشاء مخاطی جمل که پوشیده است اندرون مهبل را بتمامه خارج نشود و ششکته میشود این مرض بواسطه طهر کم رخو که از فرج خارج شده و سبب قیام و دمیدن زیاد میشود و چون مرض بطول انجامد جمل متغیر میگردد و از علامات لازمه این مرض بقاعده بودن او در او و اطلاق و حیض و سبب این

استعداد

استعداد او را می است که غشاء مخاطی مهبل ایشان مسترخ شده باشد بواسطه وضع عمل نمودن متوالی و افراط در جماع و سوزش مزمن و گرم در معده مستقیم و مرض چکه و سنگ مثانه و تعب زیاد و غیره اما علاج بزرگتر دانستن جمل را بمحل خود رجعت دهند و بعد پارچه از اسفنج بقا بوضات مثل راج سفید و غیره آلوده کرده در جمل گذارند که منخ نزول آن نماید و اگر بدین نحو علاج نشود بطریق مذکور در انقلاب رحم عمل نمایند که حلقه از چوب پنبه و غیره ساخته و بعد از بزرگتر دانستن جمل در فرج گذارند و اگر بدین طریق هم علاج نشود باید عمل دیگری بدین نحو که چند حصص از غشاء مخاطی جمل را با مقراض حیدر و یکجمله نمایند پس از آن مر لیسنه را آرام داشته تا صحت یابد

فصل ثالث در خروج مقعد اما خروج مقعد عبارتست از خارج شدن مستقیم و بندرت میشود که کل طبقات مستقیم خارج شوند بلکه اکثر مثله که غشاء اندونی بتنهائی خارج گردد و از علامات او است که در ابتدا در عین اجابت و بعد از او در مقعد کوشش سرخی سرخی نمود که بتدریج عظم بزرگترند که از وسط او برافروغ شود و بندرت دیده میشود که یک طرف مستقیم بتنهائی خارج شود و سطح قطعه که در خارج شده منقبض است بواسطه خارج شدن مستقیم از حیث جدید و در طبیعت آن که در حالت اول رنگ شبیه بگل سرخ یا گل آتشی اما در حالت مزمنیت رنگ کبود گردد و پوشیده نشود از بلغم لزج آبیخته با دم و عوارضات خروج مقعد اکثر خفیف و بندرت شود که قطعه خارج شده متورم یا متعرج گردد و جهت این مرض عموماً اسباب است که عضله شرجی مسترخ گردد و چون لحم اطراف بسیار خواست میل کلی بزرگترند که بعد از معده شدن یکجمله شرجی مستقیم نزول نماید از این قیاس است بویست مزاج و دفع گردیدن براری که با قیاس شده باشد و کس اسهال مزمن و در دستار یا نیکه با معض همراه باشد استعمال حقن و شیاف و اما دلو و اطو و دیان و کوبه و بویست سنگ مثانه و ضیق مجرای بول و صیحه دائمی اطفال و این عمل کشته اطفال را عارض شود و بواسطه بیرون آوردن دندان و اسهالیکه لازمه است و اندر این مرض در اطفال نیکوست زیرا که بعد از دفع سبب خود بخود دفع شود و در سایر پنهان عسر العلاج است بواسطه عود دائمی او و بواسطه کسب بلغم و اما مردم لذا و متادی کشته داین غوام میور

مهبل است بمحل خود بدین نحو که
مریضه را پشت خوابانیده
و با دست
خ

بعضی مشتمل بر اندام علاج و در این اندام نمودن است تا نفع سبب تا نفع حفظه است
در مکان خود اندام و نمودن اکثر سبب است بدین قسم که بعضی اندام نمایند تا قوت نماید بعد از آن
اینها را جرب نموده بمالایند باندون فرو برند و در انتها بندرت لازم میشود که جنادات عا
بالفعل قبل از اندام نمودن استعمال نمایند و اکثری از استعمال آب سرد یا آب بدن و یا آب سکر سب
نفع شود بسیار بندرت دیده شده است که میگویم لابد عضله بخرج را شکافه که با بخرج را در دنیا
و از جبهه عدم نمود باید میگویم ملاحظه سبب نموده از این بابت معالجه میباید با اسهال یا اسهال
مشانه یا انطباع فحاشی بول یا دیدن و بوی سبب حتی الامکان نمایند و بجهت رفع سبب فحاشی
در مایه بارد یا در شراب یا در مطبوخ پوست بلوط یا نارون و یا بید و یا زرد امثال آنها نمایند
و از برای نگاه داشتن مستقیم خصوصا در عین سوزش صلیب بند بی بین شکل
که بند سطحی مانند کمر بند بکمر استوار نماید در مقعده کوئی از پنبه ترتیب داده بگذارد و از جبهه
حتیقا در شراب سبب سبب کرده یا در روغن بدین صفت بیالایند اما صفت او بجزند و
سفید کشتال با دو سفیده تخم مرغ به هم زده تا کفی شود و بنده نمودی او را از میان پاکد را
بواسطه نمک بکوب بند و ادوی آنکه بند نمودی از مکان رسیدن او بر در فستقه نموده و در
او را بکمر استوار سازند و گاهی از استعمال کوب که مرکب با سبب بسیار منفعت دید
میشود لکن بجز این کوب که هشت نخود سبب سه دو شغال صندجب نموده یکی صبح و یکی
شام میل نمایند و چون این مرض مزمن شود اکثر علاج اصلی متعسر است و بجز هیچ باقی
نماند الا عمل به اما طریق عمل به آنکه بعضی را مانند در عمل سنگ مشانه خوابانیده و حکم
دهند که زور نمایند تا آنکه خارج گردد آنگاه جراح بکیر و انبری را که موسوم با نبر عصاب
در عمل کاه اکثر الاستعمال و با این انبر و فضاغن یا سه غرضی گرفته با مقراض برد
پس از آن هر یک فضاغن را بواسطه بجهت بیکدیگر متصل کرده بعد مستقیم را رد نمایند که بعد
از چند روز رسیان بجهت با بر باز و بریم دفع شده و مستقیم صلیب گردیده من بعد نمود
نموده نمودن است و در دنیا
بام سابع از عقالمه
در اعوجاج عضوی از اعضا و مشتمل است بر پنج فصل فصل اول در تعریف اعوجاج

بکیر

با سبب و علامات و علاج او بطور کلی و اما اعوجاج عبارتست از خروج عضوی از موضعی
خود و این از دو حال خارج نیست یا بواسطه تشنگی عظمی عضو معوج گردد یا آنکه عضو از مفصل
خارج شود و بدین واسطه اعوجاج بهر سبب و اما سبب اعوجاج یا از قوه عضلانی و یا از تغییر
جرم عظام است و اما قسم اولای او چون هر یک عضو را لازم است که عضلات از جمیع جوا
مساوات بخوابد تا عضو بحور طبیعی و طبیعت جلی خود بایستد لهذا اگر از یک جانب
عضلات بقوت جذب نمایند و از جانب دیگر عضلات مقابل او ضعیف و سست گردند
عضو معوج خواهد گردید بناء علی ذلک این علت عارض میشود از استرخای عضلات بواسطه
جراحات وارده بر آنها یا از آرام داشتن بیهوشا و یا از التهاب جرم و یا از حرکات ضعیفه
غیر سادی عضلات و یا حرکت بعضی عضلات دون بعضی که وجود هر یک از این سببها
استرخای عضلات گردیده و بدین واسطه اعوجاج بهر سبب و همچنین در بعضی امراض مانند
نقرس و آبله و فک و ریاح افسه و امثال آنها عضلات را در لیس تغییر میسرند و عضو را معوج
سازند و اما بواسطه بعضی امراض میشود که در جرم عظام تغییر میسرند و استعداد با اعوجاج
بهر سبب مانند آنکه از مرض نقرس و آبله و فک و خازیر و مرض موسوم با راجی تیس که
عبارتست از زخامت و لیس جرم عظام و هم بواسطه ریم شدن عظمی عضو معوج گردد
و اما انداز این علت مختلف است باختلاف دوام و سن علیل و اسباب آن و در بعضی
انحاص کفایت یلایند نموده بیکه مرض بفرایند و اما علاج باید آنکه اول اسباب او را از آنکه
آنکه بواسطه استعمال بعضی آلات اعوجاج عضوا یا استقامت تبدیل ساخت من حیل
هر گاه سبب اعوجاج تغییر قوای عضلانی عضو است یعنی چند عضله عضو معوج اقوی از
از بعضی دیگر باشند لازم است که عضلات ضعیفه را از آنکه با عرق و کافور یا عرق
و جوهر نعناع و سایر خالص عطره تقویت نمود و در صورتیکه اعوجاج قدیم و مزمن باشد
از آنجا بیکه او را عضلات بکدی شمد میگردند که عضوا از حرکت مانع میشوند باید او را
متشج را در تحت جلد قطع نمود فصل ثانی از باب علاج
در اعوجاج عظم که بومانی تو زیکو لیس نامند علامات او این است که راس نخ

باشد و در بعضی بجای نمون شود که بروی کتف بخوابد در صورتیکه این حالت بطول انجام
اختلافی در جانب سیمای این و ایسر وجه بهر سبب و اما سبب این علت یا شیخ عضله
و جمله اینست در این حالت ظهور در عضله مذکور و تمدد او ظاهر باشد و یا سبب ترقی جلد
یکجا غش است بواسطه ناز که بعد از التیام قرحه او اثر موضع قرحه از تمدد عضله
موج سازد و بنا برین شود که قمار غش رخاوت و لیکن بهر سبب و بدین واسطه اعوجاج
بهر سبب و اما علاج باید بروی سبب او نمود مانند آنکه اگر سبب اعوجاج ریم شدن و
قمار باشد ادویه خا زریه استعمال نماید و اگر سبب شیخ عضلات باشد باید از تریخ
بید اکبر رفع شیخ نمود و بعد از آن پاره معواتی محکم بر داشته و بدور کردن بند نهایی
از جانب موج طویل و از جانب سالم قصیر باشد تا بدین واسطه غش به استقامت یابد
و اما در صورتیکه شیخ قوی باشد معالجات و تدابیر مذکوره کفایت نخواهند نمود و تریخ
بخشید بلکه باید در عضله قشخ را قطع نمایند بدین طریق که علیل را بروی گرمی نشاند
و با پی اکس بجانب سالم منطف نماید تا عضله خوب در دور بهر سبب و عامل موازی
عرض اهام از فوق مبد و تر مشرطی دقیق از جانب و تر فرو برد تا درک نماید نوک ارد
در کتف هله جانب دیگر و تر آنجا دم مشرط را مرتفع نماید و بوتر حمای ساخته و از ظاهر
صمغ نهاده و وقت نماید تا و تر مذکور قطع گردیده و صدای قرحه مسموع شود بعد از تمام
شدن این صدای معلوم است که و تر تمامه قطع شده است مشرط را از جهان موضع که فرو
برده خارج ساخته و بالنه آلوده بمشع و اخیلون بپوشند و تا دو هفته آرام مانند
که موضع مقتوع از لحم التیام یابد و بعد از این غسل دستمالی از مقوی تر قیاب نمود
و بکرون پیچیده و شش نماید تا غش به استقامت بهر سبب و آنجا سبب اعوجاج تدر
جلد غش باشد از اثر عرق ناز البسته علاج زیاد مستحضر است و لهذا را نمودن اول
است که در چنانکه میگویند اثر صغیر باشد باید او را با آبی قطع بر ایل سازند و در حین التیام
مراغب باشند که غش موج نکود تا اثر آن موضع قدی و شیخ تو شود

فصل ثالث از باب علاج در اعوجاج قمار بدانکه قمار با موج شوند بجا

در این

از این یا ایسر او را بویانی اسکولایزین نامند یا بخلف اعوجاج بهر سبب و او را بفرایس
نامند یعنی حد و یا لغت نام موج شوند او را بفرایس نامند و واضح است که از
اعوجاج قمار حشا و امعاء از وضع طبیعی خود منحرف خواهند شد و در صورتیکه
قمار یک جانب موج شوند کتفین یکی فرو نشیند و دیگری برآید و برور اضلاع نیز موج
شوند یعنی از یکجا بکعب و از دیگر جانب فقیر بهر سبب و هرگاه این علت بدست
کمال رسد متعسر و دوازش نام متعیر خواهد گردید و اما آنجا یک قمار بخلف حد و
اعوجاج بهر سبب و زوائد شود که آنها را بکعب بش و اندام قمار مقرر شوند و در بعضی
اوقات بجای حد به رسد که چند زائده از قمار مانند زاید برآید و هرگاه این قسم از
اعوجاج غلیم شود و دوازش دم و تنفس نیز عسرت بهر سبب و اما اعوجاج قدام دارد
مکرر بعضی اوقات در قمار قطن این حالت بهر سبب و اما سبب این علت عموما بر مرض خیار
و حرکات عینیه است که با یک دست نمایند یا آنکه اطفال را همواره یک دست نگاهدارند
و سبب ثقل طفل اعوجاج بهر سبب و هم از مرض ذات الحجب بواسطه تمدد عضلات
جانبی و استرخای عضلات جانب دیگر باشد که اعوجاجی در وقت حاصل آید و اما سبب
سیفاریس لیسه تجرم قمار یا ریم شدن آنها است و از این است که اطفال را در
خنازیر اغلب بدو مبتلا گردند و هم از ضرب و سقطه وارده بر قمار و التهاب آنها باشد
که عده عارض شود و اما انداز این علت مختلف است باختلاف استیا و جدت مرض و
روام نمودن او و سن علیل و بدینکه التهاب در قمار باقی است یا نه و وجود التهاب
بدین قسم باید مستلزم نمود که اگر از لیس قمار موضع موج موج شوند دال است بر
التهاب مستحضر باقی است و الا فلا و اما علاج باید بروی سبب موروته او نمود من جسد
اگر سبب اعوجاج التهاب قمار باشد باید ادویه و تدابیر دفع ورم بکار داشت از آن
علی و وضع محجمه و تریخ دهن ریمی سخی الی اللون و تدبیر دهن و امثال آنها و آنجا
لیسه و رخاوت جرم قمار باشد لازمست که علیل را به سیاق در ستاد و از اغذیه
مقوی میل فرمود و از ادویه و پودست سبب کرد و ادویه بیدیه و فوادیه استعمال

نمود و سبب تمام بآب دریا و آبی که در رود پوناس در او حل نموده باشد صاحبان این
 علم را فایده و هرگاه سبب این علت ریم و ریم شدن فکار باشد چنانچه اغلب کپول
 را این علت افند باید بدین مایه موسوم بآبل دو مورد مهارت نمود علی ای حال بعد از آنکه
 سبب اگر عوج عاج باقی باشد لازم است که در شق و شق نمود مستقیم و شستن بدن و هم
 از آن و همچنین بدن بکاف عسل و دکن عضلات بجهت تقویت آنها در اطفال باشد که رفع عوج عاج
 کرده لکن در پیران بسببین قدر از علاج باید کفایت نمود بدینکه علت منفرایه
 فصل رابع از باب علاج در عوج عاج بر عین و یا با بکاف نسی موج شود
 و در این مایه و در کس نامند و یا بکاف نسی موج عاج بهر ساد او را و الی کس نامند و یا بکاف
 کت و با نوک بجهت حرکت نماید او را و یا بکاف نسی موج عاج بهر ساد او را و الی کس نامند و یا بکاف
 موج میسج خود چنانکه بکاف نسی موج عاج که کفایت میسج مرفوع و کفایت میسج مرفوع و کفایت میسج مرفوع
 و عسل در فتن بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 بیشتر از آنچه باید کرد و در عین حرکت بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 که با با استقامت داشت اما بعد از آنکه نمودن عوج عاج خود نماید بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 مستقیم و شستن با محال است عود عوج عاج و این عوج عاج اگر چه اغلب خلقی است بکاف نسی موج عاج
 بعد از آنکه از سببهای عضلات منتهی و از خرب و جراحت و از دود و بر آنها و از دود
 بعد از این علت عارض شود و اما انداز او مختلف است بنا بر این و سبب عود او و تغییر رنگ
 در جرم عظام و جمل بهر سبب است و اما علاج باید بعد از آنکه سبب قوی شود که عضلات
 منتهی میسج و عضلات منتهی قوت گیرند آنگاه عظام و عضلات منتهی قوت گیرند
 بعضی سببها که برای استقامت آنها ترتیب نموده اند بجهت صبیحی و یا در هرگاه سبب
 عوج عاج مرفوعی باشد بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 بجهت در صورتیکه در عوج عاج منتهی باشد از بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 در مدت چند روز عوج عاج خواهد شد و لکن آنگاه که در عوج عاج و در عوج عاج و در عوج عاج
 منتهی باشد بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج

نماید

نماید چنانکه در عوج عاج منتهی باشد آنگاه شرط مخصوصی که برای سبب است برداشته و
 و موازی یک صبیح و نیم فوق عقب فرو برده و از خط هر فشارند تا در قطع شود و بعد
 از قطع و عوج منتهی را بمسج و اخیون آلوده و بموضع مجروح نهاده و با نوار بکاف
 و بعد از پنج روز باید با راحته بند نمایند با عانت چرخ که بجهت این کار ترتیب نموده اند و اگر
 بجهت صبیح آورد و چون اطفال را چند ماه نمیشناسند متخل چرخ گردیده آرام مانند بند آید
 کفایت میسج را ترتیب نموده با بخای قدم و برای وسیع قرار گذارد که روز بروز از
 میل کفایت استقامت آید و بمسج او قدم مستقیم شود و هرگاه سبب عوج عاج منتهی
 عارض واقع در کف باشد لازم است هم او را در تحت جلد قطع نمایند چنانکه در عوج عاج
 و چون این قسم از امراض را دوام زیاد و مدت مدیدی بجهت علاج اولاد است پس باید
 معالج و بر عین بهر سبب و دستک کردند و اما قسم ثانی را که بیونانی و الی کس نامند و یا بکاف
 و این است که بکاف نسی موج عاج باشد بعضی که قورک نسی را بکاف نسی موج عاج
 و حتی نازل و قورک کف قدم با لمره معدوم شود و در عین حرکت تمام کف کفایت میسج
 و بکاف نسی موج عاج و در دار می دود خسته شده و بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 کرده و اگر چه اغلب این علت خلقی باشد لکن بعضی که سببها و یا با ریاضه میسج
 باشد که به این قسم عوج عاج بستلا شوند و اما علاج در صورتیکه عود نماید از راحت
 و دکن با دمان عظمه و اصابع با و با در ممکن العلاج است بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 بسبب عوج عاج مرفوعی است بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 با از صدمات محوطه دارند تا مجروح و متفرج نکود و اما عوج عاج بعضی است که با بکاف
 سبی نامند چنان باشد که قدم بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 زرد و در عوج عاج منتهی باشد که لبان سبی ملوس شود و سببها و سببها
 عضلات و در بعضی خلقی باشد و اما علاج باید آنکه در عوج عاج را بکاف نسی موج عاج
 و قدر با دمان عظمه و دکن و بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج و یا با بکاف نسی موج عاج
 استقامت باید

فصل خامس از باب علاج در عوج اجید و قبض اصابع بدانکه در بعضی باشد که ید منقبض شود
 بجهت کف و بر روی زمین قرار گیرد و از رعل خود بازماند علاج مانند آنستکه در عوج اجید قدم
 ذکر نموده ایم و لب باشد که اصابع منقبض گردند بالمره بواسطه ضرب و سقطه وارده بر مفاصل
 آنها یا از تمدد جلد بواسطه جراحت کنی اغلب سبب قبض آنها تمدد و او تار و تشنج و ترعریض
 واقع در کف است و بهم شش می که عادی باشند بر آنکه دست را در هوای سرد باتش بد
 باشد که اصابع آنها منقبض گردد و اما علاج باید آنکه اولاً اصابع را منبسط نموده بخیل بند
 بند نمایند اگر صلاح پذیرفت فیه و الا لا رست که مشرطی دقیق تحت جلد فرو برده و او
 آنها را قطع نموده آنگاه از تریج و دکل با امان عطره و نخته بند نمودن بقامت باز شدن
باب ششم در امراض تفرق اتصال
 در میان البوریزم و دوالی و خیالان و بواسیر و مشتعل برده فصل اول در بیان مرض البوریزم
 و مویانی انور لیمانانند و او عبارتست از در و شرانی که بواسطه حجم شدن کل طبقات
 آن عارض شود بدون تفرق اتصال و یا از الفصد اع طبقه اندرون شرانی که بعد از الفصد
 خون بجهت خود کلسه و سیسی بناماید و حجم گردد و جنس اول را که محض زبایدی حجم باشد البوریزم
 محض است و جنس ثانی که کلسه بدور خود ساخته باشد او را البوریزم غیر محض میگویند و
 همچنین گاهی میشود که بواسطه الفصد در مرفق شران آن موضع مجموع شده خون از ورید
 شران ریزد و باعث نوعی از البوریزم گردد که او را البوریزم دوالی نامند و اما علامات
 البوریزم آنستکه در موضعی که مجاری مسیر شران است عارض شود و در می صغیر ولدن
 باضربان که بواسطه ضغطه و فشار معدوم و بعد از رفع مانع کالت اولی عود نماید و
 چنین هرگاه شران واقع در فوق ورم فشار دهند ورم معدوم شود و هرگاه شران در
 تحت ورم فشار نمایند از زیاد و کثرت بر سر ساند و هرگاه مستقیم در محل ورم شوند موت
 صریح و شکی نیست که این ورم در قاعده بدون وجع تفسیر لون جلد میباشد و بند
 نموده هر چند نموده تا جسم اغلا و ضربان تسل کرد و چون نموده تا رسد بواسطه فشار
 باطراف خود از دست رسد و عضو منفل از تغذیه بازماند و عوارض و نقصان پذیرد

بذل

در تریل در او بهر سه امتلاء و در و در آورده آن محصل بالونی منقبضی نیز بهر سه اتفاق میشود که کلسه
 مذکور منبسط و خیالان دم و جگه بداید و بواسطه عدم تغذیه غافقرا یا در آن عضو پیدا شود
 و اما تشخیص این مرض بر عوج لازمست که از سایر دماسیل و اورام تمیز دهد که این مرض را کتب
 و لاهل سالها طول کشیده و همچنین ضربان و معدوم شدن ورم از فشار و عود بحالت خود بعد از
 رفع مانع و سماع صوت طنین از موضع متورم بخلاف سایر اورام که علامات مذکوره در ایشان
 نمیشد اگر چه بعضی از دماسیل و اورام واقع در ردی شران را نیز حرکت انبساط و انقباض
 و ضربان میباشند ولی بواسطه سایر علامات تمیز داده میشود و اما جهت این مرض گاهی چو
 ل و لاهی بواسطه ضرب و سقطه یافت میشود و مستعدین بدین مرض شش می هستند که مبتلا بر ضرب
 و گرفت بوده حیوه و عرق شراب کثیر صرف نموده باشند بجهت آنکه در این امراض بجهت مذکور
 شران صلب شده حریت بهر ساند و مانده که ضرب و سقطه و از حرکات عنیفه مثل قی
 و سعال شدید غش و باطن شران کسته و طسیع گردد و جهت دیگر است رسیدن حریت
 بر شران از آلات برنده و خنجر و غیره بجهت آنکه بعد از شران در تسیام پذیرد و ام
 چنین بهمان غنیمت مانده که این مرض در شرانی بهر سه مخصوص در شران واقع در حوا
 قلب که ادیت حرکت و ضرب خون در شران اکثر میباشند مثل آنکه غالباً دیده میشود که این مرض
 در سبب لگان او بر تری و در شران موضع در تحت رگبه و در شران معاین وابط و در شران
 مساتین تیر یافت شود اما متهای این مرض چنانچه مذکور شد غالباً بخیالان دم و جگه
 یا غافقرا یا مشتعل گردد و بسیار نادر است که بدون سبب شفا طبعی شود بدینگونه که
 دم در موضع البوریزم متوقف گردیده و مجذوب شود و شران از بالا مسدود گردد یا آنکه کلسه
 البوریزم ملتبس و متعرج گردید شران از جانب علی مسدود گردد و شفا حاصل آید ولی بسیار
 نادر و اعتساری است و اما علاج آنستکه چون این سبب السداد نادر از طبیعت
 صادر میشود لهذا علاج را هدایت می نماید که قبل از وقت شران را از جانب علی بعمل
 مسدود نماید و دیده شده است که این عضو از تغذیه بازمانده بعد از السداد شران ریش
 شران نمی صفار بسرعه نفخ شده و قائم مقام شران ریش شده و عامل دم غذائی شده اند

و نیز دیده شده است که شرابان مسدود بعد از چند ساعت دیگر از جانب اسفل نیز حرکت اول
 خود نمود نمایند بواسطه انقباض فوگات سایر شرابان موضع در آن عضو بیکدیگر و بدین
 دسته و علم در این بهر سه و این است که شرابان بحدی جمع میگردند که بواسطه ضغط و دیگر
 بواسطه قوتی که عبارتست از قوتی معطوف است اما استداد بطریق مضطرب و در آن علاج گاهی
 شود ولی در ابوریزم و دالی که در شرابان مرفی بهر سه بواسطه فضا این عمل نموده شود اما
 عمل مضطرب در فوگات در جهت فضا مذکور شده اما بهترین معالجه در رفع این مرض کشف
 شرابان و شدادست و این بدو قسم ممکن است یکی بطریق حکیم آن تلیس که از حکمای یونان
 بوده و عمل نموده بدین قسم که خود درم ابوریزم را کثوف و منقعه و بعد از آن اسفل
 کلبه را بجهت پس از آن کلبه را کشوده و تفصیل در او که دارد و التیام یافته صحت بدین
 است و چون گاهی میشود که کلبه ابوریزم خاثر باشد و کثوف نمودن آن مستحسن و با آنکه
 شرابان از اعلی و اسفل کلبه ابوریزم رنج و محنت باشد که شداد و غیر ممکن باشد لهذا
 حکیم الکلیس که بهتر نام بود بدین نحو مسدود کرده که شرابان را با لایزال کشیده ابوریزم از
 هم جدا کرد آن اسهل و امن بوده باشد کشف و نموده و مسدود و چون علاج بدین
 قسم اولی بود لهذا امتداد اول گردیده حال بدین طریق عمل نمایند و طریق آن این است که
 چون از استنق علم تشریح و تشریح و محل و موضع شرابان خاطر جمیع شوند جلد از اتحاد
 شرابان بعد از چهار انگشت معصوم شق نموده بعد از میل نادر را بر گرفته بجزیم لایزال اندازند و لایزال
 برده بر پرده منقطع سازند در این حال باید که در قلاب کند و طرف جلد را از یکدیگر منقطع
 نموده و نایب دیگر خون با سفوف خشک نماید که جراح بر بیدار و چیزی نامناسب بودی موقع
 بریده شود و هرگاه و درید یا عصب مری می آید احتیاط نمایند که بریده نشود و کم و جل
 در عضو شوند تا بکس انگشت سبابه معلوم نمایند شرابان را و بعد عروق او عید که در شرابان
 دورید و عصب میباشد بقدر قلیس شکافند و بعد با سوزن نفوذ کج و بریشم در تحت شرابان
 فرو برند و احتیاط کامل بعمل آید که مبادا درید یا عصب بهر شرابان گرفته شود و بعد
 سوزن را بر و کشیده شرابان را با بریشم محکم شده نمایند بخوبی غشا و اعلی شرابان

بواسطه کشف نمودن شرابان و دیگر

پاره شود و اما دو طرف بریشم را یک طرف را دورا بریده و طرف دیگر را از خشم بریدن گذارد
 و صبر نمایند تا آنکه بریشم مذکور بعد از گذشتن چند روز بواسطه انقباض شرابان در میان
 خارج شود چنانچه تجربه دیده شده است در شرابان حیوان که هرگاه محکم بسته شود برده و
 آن پاره میگردد و چند روز بعد از بستن عظامی محلی که در سابق بسته شده بود شرابان بواسطه
 لحم مسدود و در رفع مرض گردد و محصل مسدود شده بریشم خارج شود و مدت آن از شش تا یک
 پانزده روزه میباشند و اما مسدود ساختن بطریق قوتی که آن است که چون تجربه رسیده است
 که هرگاه چند صغیر از مس و روی مختلفا بروی یکدیگر که آورده و در میان هر یک از دو
 پاره مسمول باب ترشی گذاشته و پس از آن دو مغفول برداشته یکی را بصغیر اعلی
 که روی میباشد مضمحل نموده و دیگری را بصغیر تحتی که مس باشد وصل کرده و طرفین دیگر دو
 مغفول را در طرفی از شیر که داشته شیر را بقوه و کیفیت موجوده در خود مسدود ساخته است
 و چون دیده شده است که در دم نیز چنین تاثیر مییابد لهذا این عمل را در این مرض نموده
 و در دم مغفول را در موضع درم ابوریزم که دارند تا خون محبوسه در او را محبوس نموده شرابان
 مسدود نماید و این عمل را چون چند مرتبه مکرر کنند مالمه رفع مرض نماید اما آسیب که
 در این عمل میگویند است بطوریکه واداسیلان دم است تا بیا عرض خانقرا است
 در عضو مایه واداسیلان دم در قاعه بعد از گذشتن چهار روز و بعد از بستن شرابان بدین
 سبب آنکه بریشم مذکور پیش از مسدود شدن شرابان منقبض نماید و او را وسیلان دم خارج
 گردد و اما عرض خانقرا را در عضو مایه واداسیلان همگامی باشد که بعد از شد شرابان مذکور
 فوگات شرابان بیکدیگر مضمحل نگردد و بدین جهت تغذیه آن عضو فانی شده خانقرا را
 کرده و تا آنجا موجود شدن عصب یا درید مجاور شرابان از بی احتیاط جراح که اگر نتیجه او گراز
 با سیلان حرکت است
 در بیان ابوریزم اعضا فردا اما ابوریزم شرابان سبب بدین خواست که وقوع آن
 در محل انقباض سبب بدو شقیه موسوم بظهور و غائر میباشد و تشخیص این مرض بواسطه
 مذکور در فصل سابق داده میشود و علاوه از علائم این مرض است صداع شقیه شرابان

و در عرض غشی مذره و در انتهای ضیق النفس نیز عارض گردد بواسطه منقبض نمودن درم
 حیزه و آلات تنفس را اما علاج در این مرض بدون شد شرابین سبب غیر ممکن و چون فواید
 شرابین و دوا مینماید یکدیگر متصل میگردد لهذا دماغ بلا تشویش تغذیه نموده و خوشی مراد است
 اما شد شرابین از دو موضع ممکن است یکی از بالای ترقوه در محل ظهور سبب و دیگری از
 پس حلقوم و عالم بر علم تشریح میداند که عروق غنی بدین نحو منبسطند که از جانبی استی قری
 بخبره شرابین شاقی و از جانب وحشی و رید و واج واقع است و در مابین این دو رک قدر
 مایل خلف عصب مجده و رید میباشد و چون شرابین سبب غیر مستقیم است اما محاذی
 فتهای حلقوم فلذا هرگاه شرابین سبب را از اعلاای ترقوه بخواهند نمود بدین نحو عمل
 نمایند که از طرف انسی عضله قس و ابریه جلدر بقدره انکشت منبسط شکافه انکب عضله
 عریقه و اقعه در آن محل را تا رسیدن انسی عضله قس و ابریه پس آنان را با قلاب بکباب
 و حتی کشیده و با قلاب دیگر عضله قس و لای را گرفته نسبت انسی کشند بعد در آن فضا قوی
 و داجی محسوس گردد آنگاه این ورید را با نی با انکشت بطرف وحشی کشیده و خود جراح قلاب
 شرابین را بکشود و بواسطه سوزن ابریزم و ابریزم شرابین را محکم به بند و هرگاه بخواهند که
 از اعلاای محل شش شرابین نمایند بدین نحو باید عمل نمود که در محاذی سر حلقوم جلدر را
 از طرف انسی عضله مذکوره بقدره انکشت منبسط شکافه عضله قس و ابریه با بطرف
 وحشی و عضله قس و لای را بکباب انسی کشند پس آنان در این فضا ظاهر گردد عضله سیاه
 و قوی که بود آبی از روی طرف و مویه غنی گذشته است او را با ورید و داجی نیز گرفته
 بکباب و حتی کشند و بعد شرابین را بطریق مذکور گرفته شد نمایند و این عمل را جمیع
 از جراحن نموده و بسلم همیشه اگر چه عالی از خطر نیست و جهات کامل لازم دارد

فصل ثانی در بیان ابریزم

شرابین ابل و ابریزم در این محل بواسطه رخاوت اطراف بسر قوه نموده و عضله عظیم
 صدار مرتفع نمایند بلکه بسبب زیادتی درم عظم ترقوه را نیز مرتفع سازند از طریق عمل
 این است که جراح ملاحظه نماید فضای مشقت مابین عضله مرتفعه عضله که عضله دال نیز

اندر

نماید و عضله عظیم صدر را که از بیرون در تحت ترقوه مشاهده میشود آنگاه محاذی این مشقت
 جلدر را بواب شکافه و بواسطه اصابع این دو عضله را از یکدیگر دور نموده پس از آن انکشت
 زائده منقار الغراب را که در او عضله منفر صدر پیوسته است احساس خواهد نمود و این
 عضله را با کارو شکافه بعد مشاهده نماید شرابین ابطی را که در جانب وحشی او غلط عضله
 مسدوده و در انسی او ورید ابطی واقع است آنگاه عصب و ورید را بکمال دقت از یکدیگر جدا
 نمایند که شرابین و سطحی را با سوزن ابریزم گرفته بطور حید شدنی نمایند و این عمل را در
 بیش از سایر اعمال جراحی لازم و واجب از جمیع اعمال جراحی است و چون هرگاه ابریزم
 در موضع مایل تر از موضع مذکور بوده باشد بطریق سابق شده و غیر ممکن است لهذا باید
 از بالای ترقوه شد شرابین ساعد نمایند و از باب آنکه این عمل بسیار متعسر است و ظفر
 میباشد بدین نحو عمل نمایند که از جانب وحشی عضله قس و ابریه از محاذی ترقوه جلدر را
 شکافه تا بطرف انسی عضله منقبضه پس که در این دو عضله تقییری ملاحظه میشود
 رسند و بعد با قلاب کده جلدر را بکشود و داج را بریدن کشیده و با احتیاط مایل ناودا
 یعنی روند تا شرابین را احساس نمایند و محل این شرابین روی ضلع اول از اضلاع
 و از طرف انسی او یک برآمده کی کوچی که از ضلع میباشد احساس شود و بدین شرابین
 سوزن و ابریزم را بکباب شرابین فرو برند و بعد شرابین را بریدن کشیده و ملاحظه نمایند
 هرگاه محسوس از عصب و رید میباشد اقدام نموده شد نمایند

فصل ثالث در بیان ابریزم شرابین عضله و زنده اعلی و زنده اسفل اما عرض این

ابریزم اکثر نتیجه ضربه و سقوطه و در سرفه بواسطه رداوت فصد بهر سبب و در این نوع
 از ابریزم اکثر بطریق حکیم یونان انقباض عسل نمایند ولی هرگاه بخواهند بطریق
 دیگر که بهر سرفه عمل میسود عمل نمایند بدین نحو باید معمول شود که شرابین قریب بکسیه
 ابریزم را با دلا شد نمایند که مبادا بواسطه اجتماع شرابین مرض مذکور مجدداً عود
 نماید و چون شرابین عضله در طرف انسی عضله دوا سین واقع است لهذا هرگاه
 بخواهند از نزدیک با بطریقی او نمایند باید از طرف انسی این عضله که احساس شد

بیشد بعد چهار انگشت مفنوم جلد را شکافه و بواسطه قلب عضله دور پس را بجانب
 وحشی بکشند تا رسند به عضله که اصابع موسوم بعصب میان بد او را نیز سمت وحشی
 کشیده و شریان را با احتیاط تمام گرفته محکم نمایند ولی باید بداند که از طرفین این
 شریان درید واقع است و هرگاه بخواهند شریان واقع در وسط عضله را بکشند باید نیز
 مانند مذکور محصل بد نمایند لکن جراح باید آگاه باشد که در این محصل نیز از دو
 طرف شریان درید واقع است و هرگاه بخواهند که شریان مذکور از موضع مرفق تا
 باید دست را منبسط نمایند و از طرف انسی و تر عضله دور پس که شریان نامی در آن
 واقع است جلد را شکافه و حسیط نمایند که او را در ظاهر در این محصل بریده نشود
 و پس از آن با میل ناودار لقم را لف نموده تا بشریان رسند و شریان واقع در این محصل
 نیز تا بین دو درید ظاهر واقع و عصب موسوم بعصب میان بد از شریان دور افتاده
 بجانب انسی بیاشد و بعد شریان را با احتیاط از درید جدا نموده محکم نمایند و اما
 شریان زنده اعلی چونکه حرکت او ظاهر است لهذا شریان سهیل لکن باید بسکته در مرفق
 این شریان درید واقع و از جانب وحشی او عصب زنده اعلی بیاشد و طریق شده اند
 سابق است اما شریان زنده اسفل نیز مانند شریان سابق سهیل است اما طریق شده
 او آنستکه جلد را از فوق عظم جمجمی عظام راسخ بد از طرف وحشی و تر که بدین عظم متصل
 شکافه و از تقعر که در آن موضع است یعنی روند تا بشریان رسیده و با احتیاط کامل اخذ
 نموده شده و نمایند و باید عامل بداند که این شریان را نیز از طرفین درید و در جانب انسی
 او عصب بیاشد

فصل خامس
 در بیان لکزه زدن شریان فخذ و شعب آن در صورتیکه قریب بمیان عظم فخذ شود و محصل
 بجهت شریان بیاشد باید جراح شریان فاصره وحشی را از محصل عمود بر مرفق اخذ نموده
 محکم بکشد و چون صفای مجرای قریب بدین موضع است لهذا توشیح کلی در این محصل
 بکشد اما طریق عمل بدینگونه است که جلد را از نزدیک بشوک اعلاهی فاصره در مجاز
 و جانب بالای رباط قلاب شکافه و عضله حقوق را بکشند تا بصفاق رسند بعد

با حریص

با احتیاط کامل با اصابع صفاق را بردارند آنگاه شریان را اخذ نموده محکم نمایند و این شریان
 نیز از طرفین درید و طرف وحشی او عصب واقع است و بهترین محصل بجهت شریان فخذ
 چهار انگشت مفنوم از میان است بجهت آنکه اخذ شریان در این محصل اسهل و شیب غائی آن
 نیز مفصل و بیم عدم تغذیه و عروض ظاهر یا نخواهد بود اما طریق عمل آنستکه اولاً با صمغ حر
 شریان را احاطه نمایند پس از آن با صمغ سه انگشت مفنوم از تحت رباط قلاب شروع
 بشکافش جلد نمایند تا بطرف انسی عضله حیاط رسند بعد او را با قلاب گرفته قدری سمت وحشی
 کشیده و شریان ظاهر کشته پس از آن کشند و این شریان را از جانب وحشی عصب و از
 جانب انسی درید واقع است و باید دانست که چون اخذ شریان تحت رگه بسیار متعسر است و نحو
 الصلع در بد پیش لهذا ترجیح میدهند در صورت وقوع ابو زرم در تحت رگه یا فخرج شدن
 شریان اینگونه وضع که شریان فخذ را کشند و باید بواسطه آنکه شریان در این محصل بسیار غائی و
 قریب عظم و محصل بد اولاً درید و عصب واقع اند پس ترک عمل بد این موضع را اولی دانسته
 و اما شریان وحشی فخذ کبری و عضله منبسطه انجام واقع است لهذا از فضای مابین
 این دو عضله جلد و تر عریض موضع در این محصل با شکافه و با صمغ این دو عضله را از یکدیگر
 جدا نمایند و در عمق این فضای شریان فیما بین عصب و درید ظاهر گردد پس از آن اخذ نموده
 شد محکم نمایند و اما شریان واقع در پشت قدم چون حرکت او مخصوص بشبه هرگاه
 از فمادی صمغ سبابه جلد را شکافه و این شریان مری گردد در رگه که فیما بین عصب
 و درید واقع بیاشد بعد اخذ و نموده شد محکم نمایند و اما شریان سه فصب کبری از جانب
 اعلی چونکه فاضل است بشد و متعسر دلی از قریب فمورک انسی چون حرکت او نیز مخصوص بود
 لهذا شد او در این موضع سهیل و آسان خواهد بود و اما شریان وحشی فصب مغزی چون فخذ
 و شد و نیز متعسر است لهذا در مین لکزه محصل در شد شریان فخذ رجوع نماید و باید دانست که
 آنچه در مرض ابو زرم از عمل بد و طریق شده او بدکود شد گاهی لازم میشود سیلان رگه
 سد او در محصل موضع مجبور غیر ممکن باشد معمول دارند مثلاً هرگاه جراحی از غیره است
 یا دارد آید سیلان دم بواسطه جراحت شریان عارض گردد در این هنگام بر جراح لازم

چون در این عضله وحشی فصب کبری

که شریان خنده از جانب علی افتاده باشد شش محکم نمایند و بدین گونه عمل نمودن بجهت تسکین ممکن نیست در خود شریان افتاده باشد او نمایند و بدینگونه عمل مخصوص در جریحه که خون مایه سیلان نماید و دلیل بر قروح شریان باشد ابتدا مکان خسته و شسته شریان بخوابد و به غلظت باید از اعلائی خفیه بطریق مذکور افتاده شریان نموده و شسته او نمایند و این عمل را حکیم کولاک و خود این جانب بسبب آورده بخاطر خواهر بزرگوارم

فصل سادس در بیان ابریزم دوالی و نامیدن این مرض بدین اسم بجهت تسکین
چون شریان دورید محاور یکدیگرند هرگاه جراحت هر دو وارد آید یعنی که در شریان بود و اصل کرد باعث هم شدن و از دایه مقدار او کرده اند بدین جهت او را موسوم باین اسم نموده اند و تشخیص داده میشود بواسطه ابریزم و در بعضی بون که بواسطه زیادتی عرق و آب دریه حاصل شده باشد و چون دست بر آن موضع گذارند حرکتی از تعاشش مانند ابراز و حساسی و چون گوش فرا دارند صدای طنین از آن موضع سمع شود و هرگاه فشار دم باین شریان باقی آن ابریزم بالمره فانی و بعد از رفع بجهت او عود نماید اما علاج این مرض در هر کام مرطبت آن از فاد بدی نیست و لازم است که شریان عصبه بطوریکه ذکر گردیده شد نمایند اما در عین تأدیک آن با خوف عرض ابریزم از فاد اکثر معالجه حاصل نمیشود اما طریق رفاد در جلد دوم در صفحه صمد و چهل و هفت مذکور شده است

فصل سابع در خیالان و این مرض عارض میشود بواسطه انقباض عروق شریه در لحم رخ و در سنج شباهت بجای فروس دارد و این قسم از او نام را مخصوص در جلد و در لحم تحت آن پیدا آید و نیز منقسم بدو قسمه شوند یا ذاتی یا عارضی بدین نحو که در اندام اکثر قوت یا بغض دیده میشود گویا وی است با جلد سالم و بعد متدرجا از جلد تجاوز نموده شکل مختلف تر میشود مانند کپلاسی و قوت و غیره و در کل حرکات عصبیه که بسبب آن خون بهین آید این ابرام عظیم تر گردند و گاهی بسبب امتداد دم میشود که غش که پدید خون زیادی از ایشان سیال شود اما اندام این مرض چون همیشه اوقات موصوفی میباشد لهذا مختلف میگردد با اختلاف مکان و سن و طبع و موضع ابریزم و همچنین در صورتیکه ذاتی باشد

در زمان بلوغ مغز و شش و عظیم تر میگردد و گاهی میشود که بدون حبه بالمره رفع شوند اما علاج این مرض میشود که بواسطه بریدن باشد و یا انفجار و یا بواسطه شد شریکه خیالان از او تغذیه نمایند علاج پذیر شوند و هرگاه بخوابند با مشروط درم مذکور را بردارند و الا از دو جانب تسکین در تر از درم جلد را شکافه درم را خارج نمایند بجهت آنکه هرگاه خود در برابر شکافه نشوین سیلان دم بسیار و کم می باشد و طریق دیگر آنکه چون این درم قشری مرتفع و برآمده است میشود که ریشه آن را با بریشی محکم بسته تا برور بالمره قطع شود و این قسم از علاج اسلم و اولی از علاج طریق اولی بجهت آنکه خوف سیون دم در آن نباشد و هرگاه بخوابند بادویه اگاه رفع مرض نمایند باید که قناب کال استعمال دارند بواسطه آنکه بهترین کال است بجهت این مرض و اگر چنانچه بخوابند منفر نمایند اولی تا ابر تسکین اگر در طفولیت بد طفل را نکوبیده باشند باید آله بعدی را که وضع درم بکنند و یا آنکه چند سحاقی در آن محل فرو برده بگذارند تا منفر نمایند او را غسل را مکرر نموده تا مرض را بالمره رفع نمایند

فصل ثامن

در دوالی است ندای که هرگاه آورده بسبب رفاة غشیه سیل با تساع بهر ساند و بسبب معاد ملوکی ظاهر گردد و او را دوالی نامند و این درام در آورده بتدریج بدون ازیت عارض شوند و برور نمونوده اعوجاج و انحناء و بر سبب اند چنانچه دید میشود در محل عبور و برید برآمد بغش نک که از فشار معدوم و برنفع مانع خود کالت اولی نماید و بتدریج در حرکت نمودن رخت بهر سیده تر بل جلد یافت شود بلکه میشود شقاق در جلد بهر سیده سیلان دم عارض گردد و گاهی میشود که دم در ورید مجبند شده باعث شکستگی آن شود اما بجهت این مرض از سبب است که مانع گردش دم و دوران دم بوده باشد در ورید از این سبب است فشردن دامیل و جسم در زمان حمل بوریه اخوف و دیگر سده کبد است که باعث عسرت دخول دم بباب الکبد شود و دیگر حالت مستقامت چنانچه میشود در ساقین اما علاج باید اول دفع حبه تا بید بدن که هرگاه سده در امعاء و یا در کبد بود باشد بمغضات و مملات تحلیل دهند و اگر بالمره ممکن نکرد باید بتدایر علیک تخفیف مرض دهند و این تخفیف حاصل میشود از شد و برید در حرکت جلد و یا فشار رساوی از همه جهت بدن که عضو مؤثر را با بوار بکش

نوارشین حکم بخیزد و بدانکه تباط و جاسوس و سلوس از جبهه رفع نمودن بجای درم دوالی
شکافه و بعد تفصیلت درم گذارده تا منقرض شود پس از آن التیام میدهد و چون تجدید این
مرض بدست حکم نیست و دیده شده است که بطریق غلطی تجا در نموده بالا میرود و عا
هلاکت میکرد لکن بدین نحو علاج نمودن را ترک ننموده و غسل اعراب را که باشد می نمود
نیز مژگن کردن چونکه عالی از تنویش بود و چون دایم جدید معلوم کردید که هرگاه جراح
آورده را هوا برسد خطر بسیار دارد لهذا بطریق بجهت و رید در تحت جلد خسترا نمود
بدین نحو که بر کمر بوزنی مخفی و آبش در ته او کشیده در جلد از تحت آورده فرو برده و از دست
دیگر خارج سازند و بعد در مرتبه ثانی بوزن داخل خروج داخل نموده لکن از روی آورده
که زانیده و از جلد داخل خارج سازند و بعد در مرتبه ابریشم را گرفته شد حکم نماید و باید
دانست که بدین نحو عمل نمودن در آورده حتی الامکان غسل نماید لکن در صورتیکه خوف افتاد
درید و سیلان دم شدید بوده باشد در این صورت نیز تا ممکن است بوی مطهر فضا را رفع
نمایند اگر چنانچه بفساد و سایر تدابیر رفع نشود آنوقت عمل بد مذکور را نمودن عیسینند

فصل ناسع در دوائیکه در جلد بخیستین میبرد
و بویانی که زوکیل نامند و این سهم شامل است از انواع و رید مذکور در بخیستین و ضمیه
از او ساخته میشود این مرض بوی مطهر و جمع و تمدد و یکدکه پراکنده در معاین شود و چون
بغیه را لمس نمایند مانند طمانی در تحت جلد احساس کرد که در کشتان نیستند مگر
آورده آن جلد که بدین نحو در آورده اند و چون زمان مرض طول شود خود بغیه نیز تنویر
گردد و وجع در کمر میسرمد و دیگر از علامات مخوفه این مرض است رفع شدن درم
و تمدد و وجع در هنگام استقامت و بعکس می باشد در عین قیام و حرکت نمودن و اما
جبهه این مرض گاهی غیر معلوم می باشد لکن اکثر از اطراف در جماع و طاعنه بازمان
و عین شدن بهر سرد و دیگر بوی مطهر پدید آمدن سده است در جلد و غالباً بغیه جاب
امیر زیاد تر طبعاً بدین مرض گردد از بغیه جانب ایمن و اما اندر این مرض هرگاه بدین
علاج باقی ماند آورده زیاد وسیع شده و ضغن مترمل شده و مانع از جامة آید و

ادیت نامه

ادیت نامه که بدین گذاردن بغیه در کسبه سریش قادر بر حرکت باشد و اما علاج باید اولاً رفع
جبهه بمضجات نمایند و چون مرض شدید نباشد بخیستین را بوی مطهر بکیه دهند و او را
که سبب او بخته شود و از اطراف هر مایلین بعضی از قاضیات از قبیل بغیه با قلع و جوسس را
بارد و غیره نیز مفید است و هرگاه مرض شدید شده باشد که مانع حرکت شود در این صورت
بجو غسل بدین نمودن علاج دیگر ندارد و اعمال بدیکه در این مرض خسترا نمودن اند مختلف است
از آنجمله حکم سکروس بدین نحو عمل میکرد که جلد را شکافه و آورده را افند نموده شد حکم
مینمود و بعضی دیگر از حکم جلد را معراض نموده بغیه را با بمره بر میداشتند و این عمل بد
خطره و تنویش عظیم داشت و حکم دیگر از آنست بر شیه نام بدین نحو عمل مینمود که اولاً جلد
لا منده آورده را از طرف منی جدا نموده و این از خارج ممکن است بوی مطهر آنکه جراحی منی
همیشه سطحی است مانند رشته و بعکس در آورده که همیشه مستدیر میباشند و بوی مطهر
در تحت جلد احساس شوند و بعد جلد را با آورده بمقتضای حکم گرفته و بوی مطهر بوی مطهر
بچیکه سر آورده است حکم تر نموده تا آنکه بالاخره بسبب غافرا یا شدن جلد آورده را بقطر
سازند اما چون این عمل هم عالی از تنویش بود لهذا در زمان جدید حکم ریکارد آورده
در تحت جلد بطریق مذکور در مطلق دوالی بوسیله یک یا دو ابریشم محکم بسته و بدین نحو
از عمل بد اکثری از ارضایان این مرض شفا یافته اند و در این عمل باید زیاد احتیاط نمود
که جراحی منی را از آورده بوی مطهری جدا نماید چون بطور دیگر عرض غارض شود

فصل عاشر در دوائیکه در جلد بخیستین میبرد
و بویانی که زوکیل نامند و این سهم شامل است از انواع و رید مذکور در بخیستین و ضمیه
از او ساخته میشود این مرض بوی مطهر و جمع و تمدد و یکدکه پراکنده در معاین شود و چون
بغیه را لمس نمایند مانند طمانی در تحت جلد احساس کرد که در کشتان نیستند مگر
آورده آن جلد که بدین نحو در آورده اند و چون زمان مرض طول شود خود بغیه نیز تنویر
گردد و وجع در کمر میسرمد و دیگر از علامات مخوفه این مرض است رفع شدن درم
و تمدد و وجع در هنگام استقامت و بعکس می باشد در عین قیام و حرکت نمودن و اما
جبهه این مرض گاهی غیر معلوم می باشد لکن اکثر از اطراف در جماع و طاعنه بازمان
و عین شدن بهر سرد و دیگر بوی مطهر پدید آمدن سده است در جلد و غالباً بغیه جاب
امیر زیاد تر طبعاً بدین مرض گردد از بغیه جانب ایمن و اما اندر این مرض هرگاه بدین
علاج باقی ماند آورده زیاد وسیع شده و ضغن مترمل شده و مانع از جامة آید و

BLANK PAGE

۲۰۴

میشود که موردی باشد لکن اکثر از سده احتشاد پیدا آیند و دیگر از یوست مزاج و افراط
در جماع و سواری زیاد و سسک منشا نه یافت شود اما علاج چون خوف زیاد ندارد بحالت
خود باز گذارند تا دم بواسیر خارج گردد و هرگاه این دما میل در تحت عضله مذکوره حس
شوند که باعث وجع شدید گردند باید دست را بر و غنی چرب نموده و دما میل را بالا
برده و در مستقیم نمایند و غسل بدمی نمودن در این مرض خالی از تشویش نیست بجهت آنکه
سده است بسیاری از بریدن این دما میل هلاک گردیده اند و همین طریق خالی نمودن
دما میل بواسطه بخور ادویه الکاله بطوریکه در تریز محسوس است خالی از تشویش نیست چونکه
چندی مردم از این غسل هلاک شده اند و هرگاه عمل بد بخور دهند نمود بدین نحو جایز است
بیکرند موزنی مستقیم و در تریز او و ابریشی کشیده و پس از آن موزن را در اصل دانه
بواسیر فرو برده و از طرف دیگر خارج نمایند و بعد ابریشیها را از تریز موزن در آرد و
در آکمال از هر طرف دانه دورشته ابریشم بلباشند و هر یک از دورشته را از دو
گرفته و بعضی از دانه بواسیر محکم بسته بطوریکه تمام دانه بواسیر از میان آهسته
بماند تا آنکه بمرد ایام دانه مذکور منقطع گردد و هرگاه دانه منقطع شود بطریق جراحت
مذکوره عمل نمایند و هرگاه سیلان دم شدید بمرسد در صورت عدم اذیت بحالت خود
باز گذارند و اگر چنانچه از شدت سیلان بیم فحش و هلاکت مرعی باشد حبس دم بخورند
بواسطه قلیات مثل آنکه تقیتیک را بزاج آلوده کرده غول نمایند و

هرگاه کفایت نماید فضای ستیم را با تقیتیک محتسب نموده

تا سبب دم کند و اگر چنانچه از این فایده

حاصل نشود علاجی نیست مگر

آنکه با این فایده

نمایند

تا سبب سیلان دم مایه شود

فد منر فلسف

فصل

با وجودی که در این کتاب تنها به نمودن از لغات اخصی ولی در بعضی جا که لابد بودیم آن را نیز خوانیم که بجهت آشنایی از لغات غیر مشهور را برترتیب و در وقت حاجی بیان نمودیم که مدتها بعدون سی رجوع خواهند کنند

ایو لیس گوشت رخو سفیدی است که از ته میوه ای کاکو آنها در وی قی نبات است
از تر کو کر دی در وی بهوشی است که افند میوه از تقطیر عرق دو آتش با جوهر کو کر د
اخیما ز لیس خون برده زیر پله اکسیر زیادتی است غیر طبیعی که در جرم عظم مانند دانه است
اکسیر از لیس کولاسیون قطع عضو از مفاصل الکتر سبب قوه جرح الکس است
امپونا سبون قطع عضو از وسط عظم امپل سنا فوس که از وی است که بدن
بقه نام منحنی شود امپینم نفوذ نمودن هوا بر جسد امونیاک جوهر نشتا
اخیلا ز لیس هم پیوستن سر هر مفصل با مفک خشک شدن آن نبات است
خیمیر مرکب از دوای کال گری موزیس لعقب رفق غلفه است از پشت حشفه
جس شدن در آنجا پرو لیس آمدن بیم از اصل دندان پینه هم حکم مشهور در
پلات کوی چینی که با جرم اعطه شده باشد از برای فشار روی شران نبات است
کازیت شدن اسم جراحی است مشهور که آب سرد خون را و اخراج نموده بسم
موسوم شد شر یا ناسیون بر پشت قطع از جبهه بواسطه اوده مدد از ترس
شر نو موس قفل شدن دمان در ابتدای کاز نو و کاز منشی است در لوله قوی بجهت زل
و غیره نقینک لفظی است و عبارت از کرک کنان میوس که نه است تمیونات
پانین پنه یا کن است در جوی بجهت سیلان نور فوس کلس فی کردن است
جیم نبات اسم علم معروف تشریح در باطنی که در خانه میباش موسوم بسم او است
خلر هو ای است باطن مخصوص که مایه میوه از رنگ طعام مقبل و جوهر کو کر د
خلر اود بوبت بخار رنگ طعام مرکب با بریت که فاک قلیل نیز مانند کیفیت فریب
با یک است خلر اود شوق ایک است مرکب با هوای ملک طعام خلر اود را در شوق
بخار رنگ طعام است مرکب با بلا و نظرون طست و جلی است قوی و در کیفیت و قوه قریب سیات

در بعضی نسخ
میکند

فلز

خلر فرم جوهر قوی است بجهت بهوشی د پلست در اسم جلی است معروف در فراس
د کسین نشاسته منوی است و سیکسین اوده نمودن دو طبعا عظم محاذی
د جیبلس فی عظم است بواسطه نرم شدن جرم ایشان ساسا فراس نبات است
که قوه او قریب بقوه چینی میباشد سیر پلنا و یا نباتی در قوه قریب بملک و کاور است
سیکور جوف در آوردن خون مرده است بالذات از زیر جسد بخصوص در ملاحان بدن
شود و در کیلان عمویت دارد سیکو لیس اسحاء صدر بقدام است سولفات در
ملی است از محلول دی در جوهر کو کر د شوق یا رت اسم جراح مشهور فراسی است
طور رنگ جراحی است بجهت فشار روی شران از جبهه سدم فسخ یعنی نشانی لکیر
عنبریت ما خود از استخوان و جوی است قوی و جزء کبریت فرکی است فلا فی اسم
تشریح ایتالیایی موزیس صلیق غلفه که لعقب زود کن پلنا سبون موزی است
که از سائیدن دوشی صلب یکدیگر بهر سه مخصوص عظم کسور کسیر ریم شدن عظم
گلکس عظم تازه است که در جزء عظم کسور بواسطه او یکدیگر پیوسته شود کمال
جیوه است با جوهر ملک کند بلام لحم زائد است که قریب بالات تناسل میروید از اثر
کوفت گوشت بر جلی صمغی است هندی و بجهت آرمسته نمودن سبب و آلات مختلفه سبب
نیک لکنت نشه است که در جبهه طول ته شده باشد نیک زولیس ریم شدن
عظم دبر مد رسیدن موت او است و اردوس فی قدست بجانب انشی و لکوس
فی قدست سمت دخی بل جوهری است مایه از خاکستر نباتات بحسب
بلد و د پلاس قیاب مرکب باید بلد و د فراسین مرکب باید بلد و د و د
جیوه مرتب باید است و این بر دو نوع بود یا اصفر و یا احمر و سمیت آخر قریب است
در راه شکنه است

BLANK PAGE

فهرست رساله کمال

مقدمه	فصل ششم در اورام طبعات عین کمال	۳۲
باب اول در تشریح عین	فصل ششم در اورام آلات دمع	۳۲
باب دوم در طریق امتحان عین	باب ششم در قروحات قرینه	۳۸
باب سیم در جراحات عین	باب ششم در تغییر هیات و شکل عین	۳۹
باب چهارم در اشیاء خارجیه و توقفه در عین	نزول آب مرواریدی	۴۳
باب پنجم در اورام عین	باب ششم در البصاقات عین	۵۰
فصل اول در اورام عین عموماً	باب ششم در تغییر فایق آلات عین	۵۴
فصل دوم در اورام حقیقین	باب ششم در انقطاع اشیا نازله در عین	۵۶
فصل سیم در اورام متحمسه	باب ششم در امراض عصبیه	۵۷
فصل چهارم در اورام قشریه	نزول آب سیاه	۲۵
فصل پنجم در اورام غشویه	تفتیح حیدقه	۲۸
فصل ششم در اورام شیشه		۳۰

در اورام مرکبه بصیرت با امر لغوی از آقای ۳۴

مرآة في الكماله ضياء العيون

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
و مثل است بر مقدمه و دوازده باب اما مقدمه چون قوه باصره از انساني
از جمیع حواس حس لازم واجب و بعرض است مراد الله الطبیعت طبع
خدی مانند خضره مقبله و حقیق و حاجین و غیره برای تعیین نمود تا از ورود
انکات غوطه باشد ولی با وجود این عین متعده بهم میرسد اعلم از آنکه سبب
ان عین طبعی و موضوعی باشد مانند ورود و ضرب و نقطه و رسیدن بخار و اشیا
موجوده دیگر بر بصر بلکه داخلی و خارجی بود مانند آفرین و خازر و مثال
انها و مخصوص امراض عین در بعضی بلاد زیاد و کاهی و فاده شود مانند آنکه در
مصر و شام باشد و بجهت آنکه امراض عین در بلاد ایران بان زیادتی نیست که
در غنیه که عمومیت تمام دارد و با وجودیکه امراض چشم در ایران کم است و لیکن
اعلی زبانه می باشد و جهت این اکثر از جد ری و با از استعمال اودنه و بوی
شیاف و غیره است قبل از وقت و جهت دیگر است نفوس مردم که در میان
عوام شهرت تمام دارد که نماید موسی زیاد کنند و باین سبب که شعرا را در حفظ
چشم میزند و انوی را نمی کنند چشم بواسطه سبل ضایع شود و سبب دیگر
آنست که اگر چه هزارا در عمل و عموما چشم و هم زیاد است ولی در برین
عروق و غشون متخیم می و جویز و دشمنان کلی ازین دیده شود و با انوا سله
اکثری در ظاهر چشم که عمل نمایند عروق و غشون متخیم را زیاد بریده و بجهت شدت

در اوج

درم و تشنگان حرکت و عمل بصر کوری بهر سده و کوری تشنگان اکثری حرکت
سبب حرارت و بجهان دم دانسته کاهی نهایت نبرد نماید بخصوص در برین
خازر در این صورت از کثرت تیریدن زال در چشم بهر سده و مورث کوری که در و در
و کورتودیم که برای آنکه سبب تشنگان این عمل لطیف عیوب مذکور شده و از روی
بصیرت عمل کرد و بزرگ انما نشود بجهت آنکه در مدت چند سال که در طهران
معاذ الله امراض چشم نمودم با اود و به سده و جرتی اعمال صعب و امراض مزمنه
بصر رخ کرد و با و آنچه را که قبل از سبب تشنگان بجا حکم علاج و صحت ان نموده
بودیم علاج مذکور و آنچه که حکم بر خلاف کرده بودیم علاج ناپذیر گشت و چون
در این ساله طریقه قیامی عمل میزور و برای زیاد و تشنگان بیان کرده ایم
امید داریم که منفعت زیاده بخشد
باب اولی در تشریح عین و عمل بصیر و تشنگان فصل اولی در تشنگان
آلات معین بصر و حافظ مقبله و متخیم چایان است بیان الی در تشریح مقبله
و اوجبارت از عروق است مخروطی مربع القاعده که نقطه ان بخلیف و فاعده و تشنگان
در جانب علای فلک بر سون واقع شده و متصل گشته است از اتصال عظام و عروق
اعلی باینکه حاصل شده است سطح فوقانی ان از جانب قدام بواسطه سطح عظمی عظم
جبهه و از خلف بواسطه جناح اصغر عظم قدامی و سطح تحتانی او از قدام بواسطه
توقانی عظم فلک اعلی عظم و جبهه و از خلف بواسطه عظم شک و جناح اکبر عظم
قدامی و سطح انسی عمل مقبله ساخته شده است توسط عظم مصفات و عظم ششم
و سطح وحشی ان از قدام بواسطه عظم جبهه و از خلف توسط عظم شک و جناح اکبر عظم قدامی
و چون غلام مذکور در کتاب تشریح نقطه کلا بیان شده اند پس این نمودیم اما
در خیره مذکور چند شش روز و اندک عروق اعصاب عروق و از بالا خلاصه
نقطه باشد است که معرقه انما کمال را لازم و واجب است از آنچه در جانب خیم
عمل نقطه از فوق ثقبه و عروق است بجهت عروق خاصه جبهه و در سطح تحتانی تشنگان

که شش دوم از رز و پنج ششم از عصب و دماغی از اینجا عبور و از ثقبه فوقانی ملک
خارج و عصبی است بر ملک اعلی نماید و در طرف محل متعلق از جانب فوق و در جمل صاحب
عظم و تری ثقبه مذکور است تحت عصب باصره و در تحت ثقبه مذکور از انقباض لسان
عظم و تری شکافی بر می رسد که در انقباض حرکت و در تحت ثقبه مذکور از رز و پنج ششم
نابیند و جسم شکافی دیگر در سطح تحتانی از جانب وحشی باشد است تحت ثقبه
در بر می در در طرف ثقبه عصب باصره و در رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم
متعلق و تحت وحشی محل متعلق تغییر است که در رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم
از غشاء و قستی موسوم بر صریح که تحت عظام بواسطه او است پوشیده شده و تحت رز و پنج ششم
متعلق و سهولت حرکت از غشی ملای که حال اندک و سستی است بر روی غشاء منبرج
کشیده شده تا که از حرکت متعلق اصل ملک دست نهد برستان ثانی که در شرح متعلق
محرکه متعلق اول از انقباض متعلق در تحت وحشی اعلی است که از قریب ثقبه باصره و رز و پنج ششم
و از فوق متعلق عبور نموده و در تحت وحشی اعلی است و تا از انقباض ان جنب بر سطح و رز و پنج ششم
کشوده شود و در عصب است مذکور که در در خارج محل متعلق واقع و از انقباض و
چشم بسته و متغیر گردد و ششم از انقباض متعلق که متعلق جاز محل متعلق که هر که از
قرب ثقبه باصره کشوده و از جاز جانب بواسطه و تری بنفید چشم در نزدیک
قرب ثقبه و متعلق که مذکور از انقباض هر یک از انقباض متعلق ملای با نیست که در رز و پنج ششم
متعلق است صورت اعلی که جسم از قرب ثقبه باصره و رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم
احداث نموده و بواسطه و رز و پنج ششم متعلق متعلق فوقانی و متعلق متعلق متعلق
بنفید و چشم متعلق شود تا از انقباض متعلق ملای به فوق و جانب انسی بدن
کرده و این فصل موسوم بر عصب مورب اعلی چشم است که بطور و راب واقع است
عصب است که از وسط سطح وحشی متعلق و در رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم
کشوده و این فصل مستقیم تحتانی و متعلق متعلق وحشی بواسطه و رز و پنج ششم
متعلق که در انقباض او متعلق است متعلق و متعلق و در رز و پنج ششم

نیم

این فصل موسوم بر عصب مورب اعلی چشم است
بنیان ششم در شرح عصب و تحت ان جانب عبارت از برآمدگی و تحت ثقبه
که در عصب چشم فوق محل متعلق برای ساید متعلق بر چشم و هم عصبه نمودن و
از انقباضات بر می رسیده و در او عصبی است قوسی شکل برای متحرک نمودن
ان و تحت ثقبه محل جانب بر روی او شعری زیاده و بنفید که انقباضات و وضع
در و در انجا بر چشم نماید و در اصل هر سویی غده صریحی واقع است تحت
بر روی سویی در فوق و تحت متعلق واقع و در کسبند از دو طبقه که سطح ظاهر انجا
از جلد می قستی و باطنشان از غشاء متعلق کشیده شده است و در موضع
اتصال جلد با متعلق غرضی مثلث و ملای شکل واقع است که در عصبه متعلق
چشم اعلی بدن متصل گشته و هم در کنار چشم مرکز کان روئیده تا از اتصالشان
بهم دیگر نافع آید و در در خارج از رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم کافی غده که بلغم قستی
از ان بالا بد واقع است برای مرطوب نگه داشتن چشم و در این مرکز کان و
در رز و پنج ششم موضع اتصال جلد با متعلق غده کثیری متعلق گشته و بلغم زیادی
از انجا ترشح گردد
بنیان ششم در شرح آلات و معده مذکور که در تغییر است وحشی محل متعلق که قبل
مذکور شد غده می با دانه های کثیر واقع است که در در در شریانی رسیده بعد از
تغییر آن در معده بواسطه و مجرای صغیر از رز و پنج ششم رز و پنج ششم و متعلق راست و شو
و در رز و پنج ششم و در رز و پنج ششم که انقباضی و مجرای مورب و در رز و پنج ششم که در رز و پنج ششم
در رز و پنج ششم واقع است که در تغییر تحت ثقبه که متعلق است متعلق شده و از انجا
مجرای طبیعی که شبیه عظم انف واقع است جاری و بلغم سیم می رسیده و در رز و پنج ششم
زیر لب آن و جلای چشم گردد و از این میان متعلق شود که اگر معده در این مجرای ش
شود و می شونت و پوست بسم رسانده و معده از ان کبر بصورت جاری گردد و در رز و پنج ششم
داشت که این مجرای حرکت از دو طبقه باشد طبقه خارج یعنی و عصبانی طبقه در رز و پنج ششم
مخاطی و این غشاء مخاطی از رز و پنج ششم است انقباض نموده و از رز و پنج ششم است و در رز و پنج ششم

موضع موسوم است به غشای غشایه و بواسطه اختلاف مکان منقسم به بخش گشته اول لغحه
 جن که سطح داخل غشای را پوشیده و در این مکان بواسطه کثرت عروق دم در او دمی
 حرمت هم رساند و دوم لغحه سفیده چشم که از جن بخار نوده و سطح مقدم مقدر
 پوشیده و چون در این موضع عروق دم در او قلیل بود لکن باطن اخذ نموده و قسم
 لغحه قرینه که از سطح که مشتمل بر قرینه را حاطه را نموده و در این موضع غشای مذکور از لونه
 شفاف تر ساخته تا آنکه حاجت را نکرده

فصل دوم از باب اول در تشریح مقدره که مقدره کباب است از سه غشایه
 عدسی شکل که موسوم بر طوبت جلیده شده و لایقین که کشان مانند یعنی عدسی کون
 و در طوبت اما غشایه مقدره اول غشایه یعنی و کردی شکل با ضخامت و صلابت
 موسوم بر صلبه که محط است بر جمع آلات مقدره و در خلف او نقیه است حد غشایه
 و هم این غشایه را از جانب قدام متحد بر با و بسان شیشه که بر روی عین نقیه
 گشته و شفاف حاصل نماید تا آنکه اشعه اجسام از او عبور نموده و این موضع از
 غشایه موسوم بر طوبت بقرینه

اما سطح ظاهر این غشایه که مقدره است از قدام بواسطه غشایه لغحه پوشیده شده و سطح
 باطنش که مقعر است محاذی بر طوبت یعنی غشایه دوم مقدره است
 و این از غشایه مقدره که مؤخر از اشعه و مقدره مشن و غشایه نامند غشایه است که از
 و اشعاع عروق دم با اعصاب بواسطه هم موجود گشته و از لونه ابودی نفوذ نموده
 تا اشعه را از اطراف خود جذب و باطن بطلان بخش کرد و در بین و اسطیقه است
 که از درون در بین را سیاه کند و هم در جانب مؤخر این غشایه که کردی و موسوم است
 نقیه است حد غشایه با سر و در قدام که محاذی بقرینه است با استقامت دارد
 و هم بر سطح مقدره و در وسط او نقیه دیگری که نقیه غشایه نامند میرسد که حد غشایه
 از او است و قریب به غشایه که مشتمل بر غشایه شده و غشایه موسوم بر با و بسان
 یا غشایه مشکی که بر روی غشایه از خلف آن چند تار از غشایه موجود گشته و غشایه را
 حد غشایه موسوم است از شبکیه چند تار از غشایه که یکبارگی میفرودش بر سر از شبکیه

نقده

مقلد شبکیه است و عبارت از غشایه ای است که حاصل گشته از مغز و شش شدن غشایه
 در سمت مقعر شبکیه که چون غشایه مشکیه بخار نماید مانند دایره در جوف آن
 بالونی یا ض مغز و شش گردد و این غشایه لایق با شبکیه زول نموده در غشایه او که
 موسوم بر برده غشایه است یعنی شش که در آن غشایه بواسطه این غشایه است غشایه
 اما عدس کون که موسوم است بجلیده جسمی عدسی شکل و شفاف که در یک طرف مخصوص
 طبقه غشایه واقع است و در فضای باطن جلیده و قرینه بر طوبت رقیق و شفاف واقع
 و موسوم است بر طوبت یعنی که طوبت اول مقلد عبارت از دست و جلای عین و متحد
 قرینه بسته باین طوبت است و فضای مزبور بواسطه غشایه مقرب که عبارت از
 برده غشایه باشد منقسم به دو بخش گشته که مقدم او را بابت مقدم و مؤخر مقدره را بابت
 مؤخر مقدره نامند و در خلف جلیده بر طوبت است بسان یکینه که حد غشایه عبارت از طوبت
 دوم مقدره و موسوم بر طوبت زجاجی است واقع و محاذی است از یکدیگر و فیت که
 بقشر زجاجی موسوم شده و این غشایه مانند آنکه در نا بر طوبت مذکور را منقسم بحد
 جمر نموده تا اگر ضربه با و وارید باید جمع طوبت خارج گردد اما عروق و اعصاب که
 مقدره در کتاب تشریح بیان شده اند

فصل سوم از باب اول در محل ابصار که چون شعاع جسم کثیف و صغیر
 وارد بطنی متکسر گردد که از شعاع وارد بر جسم و شعاع متکسر از زاویه خارج
 شود و بی چون باب با اجسام زجاجی وارد و بید متکسر از او نفوذ نماید بسان عری که نصف
 از او را بفرستند که دیده شود و هرگاه آن جسم زجاجی مانند بعدی متحد بود
 اشعه که از او نفوذ کنند در خلف آن نقطه معینی موسوم بر مجمع شعاع مجتمع گردند
 که اگر در این نقطه شبکیه یا چیزی که از او بواسطه حرارتی که از اجسام اشعه متکسر خارج
 آید بصورت محرق گردد و هر قدر که جسم مذکور را متحد پیش بود نقطه مجمع شعاع
 اقرب بود باشد و نیز چون اشعه شلیق بقرینه رسد که جسمی زجاجی و متحد است
 متکسر از او نفوذ نموده و در قدام غشایه شبکیه مجتمع شد و عکس آن شیئی در آن موضع

جسام

اول منتهای عروق از دم دوم کشت نمودن دم در عروق سیم شریط بخار
عروق چهارم شایع حاصل از آن اما سیم او را هم چشم از چند وجه است اول
بواسطه استعدا شخصی دوم استعدا و تراجمی سیم همچنان دم چشم چهارم است
با وی است مانند ضرب و آورده در سیدن صورت بد و شعله و دغان و شعله زاید
و التهاب جنین و قشر هوا و عینک و دیده و کرکین زیاد سبب بخرم تاثیر بوی
عینک و بوی و دوا خسته شدن مرض است اما علامات در او را هم عین حرارت بصر
و تشنگی آن با اشغال عمل با صره و حرمت لخته که کله سرخ کلی رنگ و کاه می آید
اعظم از آنکه حرمت غلیظه در جیمع اجزای لخته واقع گردد و باید عروق تحت آن
و علامت دیگر وجع است که کاه ناخشن و کاه ناقص و کاه ضربانی و با سوزش
و خارش بود و از علامات مخصوصه که است نمودن و سیلان و موع و باشد
که در شدت دم و در اشخاصی که از آن سخن حتی نیز عارض گردد اما اشخاصی که در دم
یا به تحلیل است و یا غلیظت و علامات آلت و کله بنسبتی بریم شده و منفر گردد
و آنجا که در دم و قریبه بود بسیار باطل است کشتن نمودن و منتهای شایع آن
و او را هم چشم منقسم گردد و لا واسطه آلت معلول چون درم قریبه و لخته و غیره و باید
بواسطه تراجم تحلیل که در دم و موی است یا لغمی یا صغری یا سوداوی یا مال از
ترکیب و تجزیه مرض را با واسطه حد و تر من مرض خاما بواسطه سبب که موضعی است
یا تراجمی اما علاج باید از این سبب نمود زیرا که اکثر اراض عین بعد از از این
سبب بدون استعمال دوا خود بخوابد و چون از این سبب نمودن مرض در محل
تا رگ نشاند تا زمانه در صورتی که در دو هم نجا که بالمره منع نمود از چشم
که زگی بخش کشیده بعد بواسطه رسیدن اندک صغری یا و علیل شود و او را در
دم چون وضع علق و کاه قسط و کاه بار و او را در مخطره مانند صمغ لاجی و چون
فرغون و در من آسیمون و خوش و دوا و سلا برقی برای انصراف داده از دوا
بکار و از دوا که علق و مضرت داده را نباید هرگز قریب چشم اندازند بل غالب بهتر

لخته بود یا اگر رقیق و شست
باشد در طرح

سند

و بهتر است که در عقب کوشش اندازند و با حامت داشت کردن نمایند و برای این
عمل دیگر اشخاصی که شمع زرا و بیخ و فرغون و یا آنکه خوش در جالی استعمال کنند
و هم خوب است که خوش و دوا و شمع را بجهت جذب داده در باز و بکار دارند و در
عین مخصوص در ارض حاد بواسطه سبب که جذب داده از دوا با معاد بسیار مفید است که
دوا و سایر جانوبات مذکور را نباید که در شقیقه و قریب چشم استعمال نمود بل باید
آنکه در علق ذکر شد و در تراجم چشم بکار دارند و در اکثر اراض عین دوا می موضعی نیز
لازم گردد و موافق دوام و سیر مرض و اختلاف کرد و بدین معنی که موافق مرض
دوا اختلاف باید و در موضع استعمال نماید لبعاب و مخدرات و قابضات
و منبجیات و محلات و اکالات و انصباب با بار و این ادویه را با محلول و دهنده
مانند و چون صغوف و اختلاف هر مرضی در محل خود مذکور خواهد شد
فصل دوم در دوا در من بدانکه در من بر دو نوع است یکی آنکه در دم در خود من
و دیگر آنکه در غده و لخته در تحت مرکز من اما در دم خود من را نیز قسام است اول
التهاب من بواسطه حرمت که اکثر سیم آه بود با صره صورت و از علامات آن
حرمت غیر محدود و تشنگی و خفین و جیمیری بود و آن و سیلان و موع و تعدد
و کله و حرمت لخته و باشد که طاول خند تر طرف جنین بر دوا باید و این درم با خود
مرض صغری باشد چون سبب لخته مانند زبور و غیره و با حرمت صورت بود و با
عرضی است چون علقی در تحت جلد ریم شود و با در قعر خفه منقله مرض عارض گردد
اما اشخاصی مرض با تحلیل و از این سبب است چون فلان می باشد آنکه در صره و یا با
آبی و دوا است که منفر شده و با غایق را بکیر دوا اما علاج مسهل برقی نوشانه
و کادوی از با غایق با بونه و غیره نمایند و هم استعمال شود محلول شکر سرب
با محلول سنگ جنم و با کلین که عبارت از محلول پخته بار و قوی و دوا است
و آنجا که منتهی با کس آبی که دکادات عطره و دهن از دهن بیاب سنجانی
نمایند و هم نافع است که چند شرط در جلد منورم نمایند تا دفع رطوبت منجمه گردد

پودی

نوشانه در موضع اوف از محل بوق طول نمایند و برای آنکه بعد از آن جرح
 طلقی در جفن باقی نماند و عین علاج باقی قسمی شود که جفن بحالت طبیعی خود باقی بماند
 قسم چهارم از جفن عروق جبهه ساکنی است در او چون این علت اکثر اطفال
 نمودن جفن است هرگاه قدری از جفن ناقص شود بواسطه اثر غبارت در چشم طبعی نمود
 و بصرف ضایع مانده لازم است که قبل از خواب شدن جفن بواسطه ترشی شوره با عین
 چوبه سرخ رفع سالت نموده این از خرابی بصیر که در چشم لازم است که درین
 استعمال ادویه مذکوره بقتت باشند تا جزی داخل نشود چشم را و اطهر آن
 که سال است نوزادند
 اما او را هم عین بر دو گونه است قسمی شیره که درم در یک باد و غده بود
 نوعی حرب جو تورم منبسط نموده جفن بهر سه انا شیره عبارت از تورم یک باد
 غده و غده ای از غده در جفن است اما علامت تبس او کی از ثقل جفن
 حکم و حرمتی تبس و غیره و با آنکه تفع و وجع عارض شده تبس جفن
 کشته و دلی صلب بوجود آید اما انماهای مرض تبس تحلیل و اکثر انجا است
 اما علاج باید از غده حلقه با انفعل از قبل مطبوخ بزرگ بشیر کا و غیره
 بکار و از نادر منفرجه درم دفع و جراحت انبساط بر دو لازم است که تا
 سله درم خارج نکشته است ترک استعمال صفا نماید زیرا که چون سله
 دفع نکشته جراحت انبساط باید برود می بجد و انفرجه گردد و با شد که خطرناک
 در جراحت بدید شود و سله درم صلب و صورت علامت دلی گردد که او را برده
 نامند در این صورت باید که با حانت موضع جلد موضع را منقش نموده ششی و که
 صلب شده خارج سازند اما جرح چشم عبارت است از تورم چشم
 جرحی تحت ثمرکان و سقوط موهای آن اما سبب اکثر یافت شود در اکثرا
 مربوط به و از اثر و خان که علی الاقصا چشم برسد و اکثر یافت شود
 در طرفین تاخیری اما علامت تبس در اطراف جفن بهر سبب

قسم دوم از تورم جفن درمی است که عارض شود بواسطه زردش در این
 باشد که از سبب رطوبت زردش چشم بواسطه حدت آن که در چشم
 شود و هم باشد که در قرینه روز نموده صورت تورم آن کرد اما علاج چشم
 با لطیف است تبس این سبب سرخ با بطلا سی محلول سنگ چشم رفع زرد
 نمایند و طرقتی خند و این در کولین است که یک بخود جود سرخ را در و درم
 روغن تبس خنوب سله نموده قدری بر روی جبهه نهند و دیگر کمره کلاب
 چاشنیال سنگ چشم نیم گرم حل نموده در جای تاریک نگاه داشته
 روزی دو نوبت با قطره چشم کشند و استعمال مسهل و مل و بخت اذن
 نیز نافع بود قسم سیم از تورم جفن التهاب و دست بواسطه قلعینی تخم تحت
 جلد که سبب جبهه و سله با اشتغال داده بود اما علامت تبس جفن و تبس
 ان با وجع و حرمتی تبس و حرمتی تبس از جندی رطوبت منفرجه تبس
 بریم شده منفرجه گردد و با شد که قطعه تخم تبس چون سله با بریم خارج و دفع
 کرد و انماهای مرض جفن قبل از تبس رطوبت نرم معالج الله نماید
 تحلیل رود و الا منفرجه گردد اما علاج در ابتدا باطله بارده از قبل شکر سرخ
 و بار بار استعمال داشته در تحلیل ان کوشند و چون از استعمال انما
 در تحلیل زرد و علامت انفجار در او باشد از غده حلقه با انفعل بکار و از
 انفرجه کشته و دفع درم گردد و لازم است تا صلابت در اطراف جراحت
 باقی است ترک انما منقش نماید و انجا که رخاوت و سستی در موضع
 اوف بهر سله طول از آب اسطوخودوس و نعناع و سایر حبش مطبوخ
 نافع و مستعمل است و با باشد که درم شدت با فیه حرمت ان بدل بپاشند
 شور چند در اطراف درم روز نموده و جای ضیق را با عارض و جراحت انما
 مبدل شود در این صورت چون نزع قوی باشد زوئی چند در اطراف جراحت
 نماند و در صورت ضیق نزع ادویه مقویه مانند وج و سبیل لقی و کنگنه

نسخه

نفوخ از کلل و فیکرند کلل ده کدم شد کشتال با هم مخلوط کرده و نرم سپایند
 روزی دوبار با نی یا با قلم در چشم نفوخ نمایند قطره از محلول زاج سفید و
 اینون صفت آن کبرند زاج سفید یک لی دو نخود درشت درم کلاب حل نموده
 دو دوازده قطره قطره اینون اضافه آن کرده روزی دوبار در چشم قطره نمایند
 و آنجا که استرخانی در قرینه بود قطره اینون زعفرانی انفع باشد و هم کشتال
 نفوخ از قدر و سی و شیشه و صدف و هرگاه عروق مذکور معده بود و بود
 بتوان شرط نمود ولی بهتر می نماید بود و در این مرض باید حکیم و ریاض هر دو را
 زیاد بود و در آنکه کاهی نفع دوا در معلوم شود و دیگر آنکه اگر از این مضر می باشد
 با کشتال قطرات بر داند و بکشد اما درم جرم قرینه را که بواسطه عروق
 در آن غشا تورم و تیرناور است و عارض شود از ضربات یا آفات کند و ایشان
 کدم با جود چشم و شتر زانده و التهاب جن و بشود در قرینه اما علامات مرض
 حرمت در چشم بهر سبب چند عرق دم مانند بجز قرینه را حاکم نموده و قرینه را شفا
 زایل و که درت او بسان آنکه غبار آلود شده که امت نمود و سکلان و موع
 بهر سبب و اکثر مکتب شود با درم غلبه که تو درم قرینه با نفود بسیار کم است
 اما ششای مرض با بخیل نام است چون از ری در چشم باقی نماند و با بخیل ناص
 چنانچه درم رفع ولی قرینه که شود و باشد که نمی بریم شده و در طرف قرینه که
 مانند اذن لالی شکل مجسم گردد که از حرکت اسس تغییر وضع از برای درم مذکور
 بهر سبب و باشد که عرقی از قرینه منفر کشته و کله زدی در او نماند و اگر قرینه منفر کشته
 رطوبت منفره و طبقه غلیظه از طبقه منفره خارج و صورت منفره که در آن علامت
 از آنجا که بواسطه قوت عروق در غشا مذکور درم کبر بهر سبب بدان واسطه چون
 منورم گردد بسیار عسر الظلاج باشد لهذا در ابتدا باید که وضع عروق درین کشتال شود
 و چند شرط در قرینه نمایند و سهلی چند نماند و منقحات از قبیل کلل و دیگر
 دارند اما در چشم منصرف شود و چون ریم حاصل گردد در تحلیل بردن آن می

در صورت

در وقت نزاج قصد و میرات بکار داشته و در صفتان مقویات چون خطا نادر
 با کلل بنوشانند و بعد از کسر حدت درم چنانچه قرینه است بود با بقیات چون زاج سفید
 و باز و در استعمال نمایند و برای که قرینه بقوا عده که بعد در مجسم خود ذکر می شود و
 فصل محمد در درم غلبه و او عبارت از همان دم است بر غشا غلبه و شتر لوی
 در رت مقدم یا در رت مؤخر چشم اعم از آنکه رطوبت مذکور نمی گردد و تحلیل اضافی
 و نقص بودن غلبه یا قرینه یا جلد به و با نادر بریم و دیگر آنکه درم غلبه یا جود
 اصل بود و با عرض بعضی از امراض مانند آفرنجی و غیره و هر یک از اینها نیز با
 یا منر اما درم حاد غلبه که خود مرض اصل بود چون خفیف باشد ابتدا خفیف
 دم از نفوذ در نموده و لون غلبه اندک متغیر شود چنانکه اگر برین بسیار چشم بود
 چشم منورم تیرا کرد و چون از رقی بود سبز کون شود و این تغییر لون اکثر لا خطه
 در اطراف حدقه و غلبه که کشته آن بطی بالمره فانی شده زاید در حدقه بهر سبب که
 حالت استنداره آن ساقط گردد و لی چون مرض شدید بود و جمعی شقی در جهه
 نر در و داند و اذن بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 سکت شده دوباره بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 بواسطه شدت و جمع که بعد از از آن ان دوباره و جمع عارض گردد و درم شدید شود
 از رسیدن باد و هوای بر چشم و که درت در صورت بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 مانند آنکه برای جال باشد و از غلبه غلبه بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 تقریب قرینه بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 عارض گردد و کاه و در غلبه مرکب گردد با درم قرینه با آنکه شفا او بود و بعد از
 یک هفته منتهی تا سه هفته با درم تحلیل رفته رفع مرض گردد و با آنکه رطوبتی قرینه بعد
 با الا نفع و شتر لوی او غلبه را با جلد بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب
 عینه حرکت مانده باشد که رطوبت مذکور طبقه را بالمره معده و سبب از و با آنکه
 از کثرت رطوبت شتر لوی اکثر طبقه بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب بهر سبب

فصلین

۲۸

۲۹
 قتی برپا شده و بان ناخنی طالی شکل در خلف قریه نمودار و متحرک باشد که
 مانند آنکه در درم قریه مذکور شد اما سبب مرض عارض گردد از ضرب و نقطه
 و از ضربید و زباد نگاه کردن برف و از مکان تاریک بروشنایی نظر
 نمودن و از جابجیدن و در گذر از انباشت بروز کنند و اکثرها جان داران
 و نفوس قتلای با و گردند اما اندام مرض در اندام جید است که چون معجب
 لایق شود تحلیل روده و اگر غلبه بواسطه رطوبت مذکور بعضی با بعضی از طبقات
 گردد در وی است اما علاج در این باید که مسکن ورم چون وضع ملق
 کوشش و گاهی هم صدمات مجامعت نموده و مسهلات ببرد و نشانه تحلیل در غذا
 و هم مریض را در محل تاریک نشاند و آنجا که سبب ضرب یا نقطه وارده
 بر چشم باشد تا بار در استعمال دارند و بعد از آنکه بکار برند که رطوبت کمتر
 نشر شده و هم آنچه شکر کشته تحلیل رود برای این مطلب در شدت ورم و خورد
 کلل را چار قیمت نموده در دور و قیتمی صبح و قیتمی شام نوشند و قدری
 سیاه راوی بر خفین بالند و آنجا که وجع شدید بود قدری مسهم عصاره
 البسج یا عصاره بلادانه داند و دل درین مذکور نموده قدری هم افیون بر جده بالند
 صفت نفع نافع برای دفع الطاق و انسداد غلبه و حدقه کبریه درین سیاه بنج
 دو مثقال عصاره البسج شش نخود در هم مخلوط نموده روزی یک نخود صبح
 و یک نخود شام با طرف چپین داند که از تده این دهن مذکور حدقه متع کشته
 و مندد و نه و آنجا که سبب جابجیدن بود نوشیدن روغن کاج با طهر
 بنقدت نیمه بکر در روغن کاج است درم در دهن نیم مرغ خوب مخلوط نموده
 دو سیر آب با دهن شیرین و یکسیر شربت نارنج و سه قطره عطر نعناع اضافه
 نموده روزی سه غاشق از آن سه وقت نوشند چنانچه ضرری ازین دوا
 نباشد رسد قدری کافور یا مطبوخ بزرگ نوشند و چون ریم حاصل آید
 با استعمال منقحات و محلات مانند کلل و طریق و نک فرنگی و نه این از

یا عصاره بلادانه مذکور

۳۰
 از دهن سیاه بنجایی بر اطراف چشم روغن کشند و چون به چگونگی تحلیل نزد و سیاه
 قریه را سوراخ نموده و دفع ریم کشند اما درم من غلبه عارض شود از آنجا
 در بیان حاد و مذکور شد و باشد که اینست احاد بوده بعد از من کردن یا اینکه از
 ابتدا بطور منمنی بروز نماید و علامتش نیز مانند علامات حدت است ولی با
 زیاد و باشد که در صورت منمنی بواسطه تشبیهی با وی مرض حاد شده صدراع
 و وجع همین و سایر علامات حدت بروز کنند اما تشخیص مرض از تعبیر لوبون
 و قای مدوری حدت و که درت ضور و سایر علامات مذکور نموده شود و انداز
 روی و فشارش طلی و اشایش مانند حاد است اما علاج کلل نوشانه خوش
 و در ریح و غیره از منقحات استعمال دارند و هم نافع است که دو باسه کندم
 بود و دلمو که عبارت از ترکیب کلل و تمون طلالی بساوت باشد بنوشند
 و محاطه نمودن چشم را از روشنایی و سایر تدابیر مذکور در صورت حدت را البته
 فراوش خواهند کرد و هم باید ملاحظه نمود که در ورم غلبه و قریه تا حدت ورم
 شکسته نشود و دواوی موضعی نمایند که ضرر کلی نخواهد نمود
 فصل سیست در ورم چشم و او عبارت تو زرم غشا و دویم چشم است و باید دانست
 تو زرم کل اجزای این غشا نام دارد ولی جزئی از و شایع و وافر است و عارض شود از اجزا
 دم در و باغ و مد و کشتن سیلانی مانند خون بوا سیر و طمشت و از ضرب و وارده را و
 مانند آنکه در میل زدن چشم گاهی بواسطه خوردن میل بشا مذکور تو زرم در او بمرسد
 همراه بود با نفوس و بعد از حرقه و باشد که سبب آن سو مزاج و ضعف قوی
 بدن بود و مستعدین مرض اشخاصی بودند که زیاد نظر در حشام صغیر نمایند مانند حکاکان
 و شاش زکران و قلم کیران و میسنا کاران و زنا بیکه در شب جنایاتی نمایند و
 سکه تر غلب مستعدین مذکور شوند اما علامات چون مرض حاد باشد امتلاء در
 منور شد و غشا مذکور غلبه به رسیده و عروق متورم در ورم نموده مانند آنکه در دلی
 برآمده شوند که است ضور و که درت آن با دیدن کس و اش که گاه علی الاتصال

سیاه بنج
 حدت

و کار با اتصال بود و ثقل سر و طین عارض و غلبه را حرکت فانی گشته شد
 باید از آنکه انچه در شرب شراب حاره و خفت باید از غرض عاف و بعد از آنکه
 منتشر شده مورث نزول آب سبز کردیده حدقه را لون متغیر و حرکت فانی
 و بصا ضایع ماند اما چون مرض مزمن باشد علامات مذکوره عارض شوند
 خفیف و هم طولی در فشار بهر ساند و قوی نزول آب سبز شود اما نزول آب سبز
 که نتیجه در غم آب سبز است بعد از خندی که علامات در غم عارض مذکور در شخصی
 خون بهر فانی و لون حدقه سبز فروزه بسان فروزه معدن جدید گردیده
 کا و طین و صداع غیر باقی مانده شدت یابند در برودت هوا و غلبه دم و کثرت
 حرکات نفسانی و بایستد که بعد از نزول و جمع و صداع فانی شوند و هم با
 که سمع خراب گردد و سبب سبز نبودن حدقه را می آید که رطوبت مترشح در
 مقابل جلیده بسان آنکه آب در مکانی جمع شود با سبب و سبز کردن فانی
 و این مرض اکثر عارض شود در سنین کهولت که نادرا قبل از چهل سال بروز کند
 و اکثر نزول آب سبز است اما تشخیص از نزول آب سبز و در واسطه فانی
 حرکت غلبه داده شود و در نزول آب سبز در حرکت غلبه ضایع نکرد و انداز
 مرض بعد از نشر رطوبت و غرض نزول آب سبز است که در کمال معالجه بزر
 نخواهد بود اما علاج در ابتدا باید رفع سبب نموده منحصرا از چشم گشته و
 سبز چشم زده انچه حاره و قوی خورد و از حرکات نفسانی و نزول آب سبز
 با شش جناب نموده همچنان در از راس منصرف سازند و برای این مطلب
 لازم است که سر را سرد نموده و وضع علق درین گوشه کرده مسکلی از کل
 و جلب یا از جلب و طرطیر یا از تک فرنگی بنوشند و در وقت ارسال علق
 درین تقوین با صبت لازم در جمل نمایند و برای انصراف ماده از داغ
 خوش و داغ و شمع زراچ استعمال دارند در صنف مزاج متوالت
 مانند وج و پوست کهنه نوبت کنند و استعمال عنبه نیز جایز است و

و در سوره ورم و وج و درین باده من سیاب افون در اطراف چشم منفعت کلی
 بخش و یا سم الفار بنفشه و هند با جوهر کهنه چون بنوبه عارض شود
 فصل پنجم در ادرام کل طبقات عین بدانکه کاهی بواسطه ضربه و قطعه شد و در
 بر چشم جمیع طبقات مختلور کم گردید اما علامات مرض و وج شدید در چشم و عین
 با حرمت و حرارت و تشنج و تشنج خا که در سوزنک چشم عارض و لون غلبه متغیر
 گشته که ایت و کدورت در چشم بهر سید آتش و کس نظر اند و هم حمی و درین
 با طلق و اضطراب استولی شده از کثرت رطوبت بهر جوی بهر ساند از وضعی بهر جوی
 ان خارج و بهر ساند از کثرت ضایع ماند و منتهی شود و افلا نزول آب سبز و در ان علاج
 لازم است استعمال مسکات ورم چون فصد و وضع علق و سبیل و کل و کل و کل
 میساده بارده و غیره خاکه ورم شدید و جمدی بود که امید شفا نباشد و کثرت وج
 مورث اندازی بر نفس گردد و ثقیه در چشم نمایند تا اینکه رطوبات دفع شده و وج عین
 باید فصل هشتم در آلات معین بصر و در او خد بایان است بیان اول در ادرام
 آلات دمه و او نیز دوات غده و کبه دمه که هر یک مرضی میباشند جدا
 اما ورم غده دمه بسیار نادر و عارض شود از ضربه وارده بر باقی اصغر
 اما علامات در آنکه حرمت و تشنج در باقی اصغر و سبیلان و منوع بدون
 التماسی در سایر آلات عارض و منتهی گردد و تحلیل و کاه منتهی بریم شده مورث
 نو اصیری در باقی اصغر شده بریم و بغیر از او خارج شود اما علاج وضع
 علق و کاهی فصد نموده سبیل مبروی بنوشند و بعد از کسر حدت ورم ظهور
 از تشنج که ذکر میشود در چشم نمایند صفت آن که نرزد نقطه افون مبت طره در
 کلاب و اهل نموده روزی سه بار چشم را بشویند و انفع آتنت که نیم کند م
 دارا شکنجه اضافی بر تشنج مذکوره نمایند اما ورم کبه دمه و او عبارت از
 تورم غشائیت که در تقعر تحت باقی اکبر از اجتماع مجاری صغیره و دمه حاصل
 گشته و عارض شود از نزول غرض من چشم و حمی حمزه و ضربه و قطعه وارده بر او

منقلا تانده خوش و داغ و مثال او کار دارند و برای سکن و ج افون
 با شاسته در جبهه ملا کنند و هم شعل است سار مجا جانیکه در و درم
 شیمه باین شد و بسیار نافع است نوشتن آن بود و کوفه که قیل مذکور کردید
 بود باید دانست که در این مرض قطرات استعمال نباید نمود که بسیار ضرر خواهد
 نمود اما در چشم و بواسطه آن فریجی و او عارض شود در غشاء غشیه و ملا
 او مانند است که در درم غشاء مذکور باین شد ولی در اینجا وجع شد بد شود و شب
 تر کرد و شبها و زودی رطوبات سهل الانفعاله مترشح گشته غشیه ملغص
 و حالت استنداره اش ساقط گردد و بطلاد این باشد که ثورات کوفی
 مانند کند بگون و قوای دیگر در جلد بروز نموده و صورت گرفته شود و یا آنکه
 ثورات مزبور قبیل بوده و بعد این علامات ظهور نمایند اما علاج بطریق
 در درم سبط غشاء مذکور باین شد و وضع ملق درین گوش و فصد و
 مسهل از کل و جلب نوشتانده منفعی از دار است که استعمال دارند و آنجا
 در جبهه سیم است که بود بعضی دار است که اطلاع بدیهه کار دارند و برای سکن
 و جع ملای از عصاره بذر اسبج با افیون باشد این از دهن سب سحابی
 بر چنین و اطراف چشم نمایند و باید که در این مرض معاینه شود و دانند که
 اگر تاخیری در علاج افتد بصرف زودی ضایع گردد اما در درم چشم از حدی
 باید دانست که هر چند در اکثر امراض ثوری چشم میزدند اما عصاره زردی
 هیچیک این زودی و دوفوری صورت نهال و خرابی بصرف نکردند و اگر که
 این مرض هم شیره در چشم بروز نموده صورت انفجار آن و حصول مور سرج
 با نهال بصرف گردد اما علاج باید قبیل از بروز شیره در چشم نهال از دهن
 سب سحابی با اطراف جن و چشم نموده چون شیره بروز نماید قطرات
 مخلول دار است که در چشم نمایند و برای خط بصرف قیل از بروز شیره و نیز قیل
 قطرات مذکور در چشم نمود و فصد بکبره ملاک است نزد مثال دار است که

سیر

نیم الی یک کند م صمغ عربی و دو خود آب چشم و قطرات فریج و شایع آن بدانکه تقریبات
 قرینه بر سه نوع بودند آن که تقریج در غشاء المتقرینه عارض شده و سربت مجرم
 آن کنند و دیگر آن که تقریج مجرم قرینه از نو و جزئی از او را منقلاشی ساخته و ثورت
 مور سرج گردد و سیم آنکه صمغ قرینه متفرج و منقلاشی گشته و رطوبات چشم خارج
 شده و بصرف نهال باید و هر یک از این تقریحات با در وسط و مرکز قرینه بودند و باید
 و اطراف آن اما سبب مرض عارض شود یا از او را میزد که شیره در قرینه پدید
 و ثورت تقریج آن شود یا از سوزن یک چشم که جمیع قرینه منقلاشی که دو و یا از او
 خا بری بصرف و از درم مجرم قرینه و هم حسن شدن فریج نیم از اعصاب غشی و ثورت
 با در و فریج و با و جمیع بعد از وضع ملق در سبطه درین مرض باید رطوبات مزاج
 و نقصان تغذیه بدن چنانچه زدن با نال مکرر مستلزم مرض مذکور گردد اما علامت
 مرض آنجا که غلبه دم و لیسابی در چشم بود که است صورت و در عروق و سیلان
 و موج با وجع و سوزش عارض شده قرینه شک و کدورت صورت بهر سبب متفرج
 شود و چون سبب قتل دم باشد بدن التیابی در چشم و قرینه بند رنج نرم
 متفرج گردد و با آنکه از عدم تغذیه خشک و شکن شده مانند پوست آهو اجزای
 از هم می افتد و کل فریج قرینه با در ظاهر آن بودند که اثری در قرینه بهم نرسد و با
 سربت مجرم و نموده و قرینه متاثر شود و با آنکه این اثر ثورت کدورت آن شود و با
 ثورت کدورت شود و با آنکه قرینه کلکی و منقلاشی شده و رطوبات چشم خارج
 و غشیه منقنوق و ثورت مور سرج گردد و از آنجا که این فریج غشیه شبیه بر آن
 انگور بود در خزان انگور چشم و بصرف که این حکا منقلاشی است مور سرج نامند
 و باید دانست که مور سرج با در جمیع اجزای قرینه بود و با در کمر و آن و در صورت
 اخضر تر با در مرکز قرینه باشد که کل بصرف و لیسابی خارج شود با در کف را که بصرف کلکی
 که مذکور و هر یک از این اقسام مسم با فرو بود یا منقلاشی و ثورت سیاه اما علامت
 چون قرینه نموده شود و ثورت حدت آن وضع ملق درین گوش و فصد و سسل

چشم باشد

چشم باید ملاحظه نمود که نقطه وسط و مرکز فک مجازی و مقابله نقطه مرکز
 و آنجا که چشمی از چشم دیگر متجاوز باشد و چشمه عینک هم باید متفاوت بود
 که هر چشمی موازی باقی خود عینک را نیز لازم است که ابتدا عینک ضعیف چشم
 زودتر از دیگری بماند و برای این مطلب در فکستان هر یک از این دو قسم عینک
 در حالت مختلف درست نمایند که از دو تا خود درجه عینک درست نموده اند که قوی ترین
 عینک در درجه دو و ضعیف ترین عینک در درجه خود وجود و باید دانست که دور بین
 تدریج عینک قوی تر و نزدیک بین را عینک ضعیف تر لازم آید و برای سنجیدن عینک
 باید در صبح وقتی که چشم خسته نشده امتحان آن کنند و یکبار پیش از خواب
 امتحان نمایند چنانکه چون چشم خسته شود گاه عینکی را قبول نمایند که سزاوار
 نباشد و بعد از آن وقت باید و آنجا که عینک چشم را خسته نکند و شبها را عینک
 از قدر طبیعی بنظر آورد و ترک آن کنند که مضرات آنرا که در وقت فرنیه عارض شود
 از منقرض و متفرج شدن ثورات فرنیه و سبیل و تورم جرم فرنیه و حصول آب
 در فرنیه و باشد که سبب آن نقصان تغذیه باشد که اطراف فرنیه بسان
 سفید گردد و در این صورت غالباً همسر آه رود با نزول آب مر و دردی و این
 که در وقت واقع شود با درد و ملال فرنیه و مرکز حلقه یا در اطراف آن و شایع عینک
 که در وقت خود و حول هرگاه که در وقت در چشم بود و آنجا که در امتحان بود همسر
 رود با شلج و تشنج چشم اما آنکه در مرض مختلف است از حیث قدرت و دوام
 و مکان و لون که مزاج و سبب علیل آنرا علاج برای از آنکه در وقت فرنیه چند
 طریق میباشد اول رفع نمودن اشتک بواسطه بعضی از اوان محله چون در بین
 و از دوا دمان معطره و روغن کافور و دین عطر و مراد کافور و دین از آنکه در وقت
 بواسطه قطره و دین و چون عصاره کاسنی و همیشه مار و عصاره صبر و قطره
 شامی و قلیاب قوی طریقه استعمال عصاره صبر که در عصاره صبر
 شش شش خود در دردم آب حل نموده در چشم قطره نمایند و سبب رفع کردن

نسخه دیگر که به نظر دانی
 یا قلیاب قوی نیم نخ در دردم
 آب حل کرده قطره نمایند

نمایند

نمایند بواسطه ادویه محله مانند قطره فوون و محلول دارا شکسته و پوره از منی و پوره
 و در وقت و در روز و پونیس و سیاب انیس و در بین آنجا که در وقت شود
 از آنکه استعمال ادویه که اثر آنها بواسطه کینت شایع مانند نفوخ از کل و قد و صد
 و شک باو شسته و فرغونی و طریقه و براده قلع
 احاطه زول آب مکرر و او عیارت است از آنکه جلیده یا از آنکه غشا
 و یا از آنکه با معیاد که چون زول آب در بعضی از اجزای جلیده بماند
 خطی مستقیم بود از آن زول آب سیمی و آنجا که نقطه از وسط او گذر شده و برآمده گردد
 زول آب مخروطی و چون که در وقت در همه اجزای او یافت شود زول آب بر روی
 خوانند و زول نجی مشکا میرا مانند که جلیده با غشا خود که در خشک مانند بالونی
 خشک شده گردد اما زول آب مر و دردی منقسم شود و نیز زول صلب که مصلحت آن
 چون نمک یا مسکه خشکیده بود و نیز زول بن که فوام جلیده بسان غیر یکسان
 و باشد که کینت جلیده زیاد و حرکت او در جوف کینه خود بسان ناسبت که در میان
 آب بریزند محسوس شود و گاه بواسطه ضرب جلیده متفرق و از مکان خود منحرف
 و در وقت مقدم چشم افتد

و در بعضی بود و در آن زول آب محلول
 و چون که در وقت در وسط جلیده م

و باد و طایفه بسیار و دمای دست دیگر که کان جنین را می راکند و محکم بنظم جبهه ملحق نماید و خود
 عامل باد و طایفه خود جنین را منقل از کان کان کرده و نعلت اعلی ملحق نماید و عیسکه قدری هم تحت
 مقله برای کان را بجز منقل نموده شود و با طایفه اهام و طایفه دست دیگر اسباب لازم
 در عمل را بطوریکه فرنگیان علم در دست بگیرند و طایفه خنجر را بر روی دهنه بسان معده برقرار
 گذارند و منقل را عمل نمود
 اما طایفه سلسله را که برای میل زدن در طریقت است اول آنکه قرینه را منقل نموده و جلیده را خارج
 کنند و دوم آنکه او را در خلف رطوبت زجاجی بدون بریدن قرینه پنهان سازند سیم آنکه
 جلیده را چند قطعه نموده بعضی از آنها را در پشت مقدم و بعضی دیگر را در پشت مؤخر چشم اندازند
 تا به ریح تحلیل رسد و تا قسم اولی معمول شود چون جلیده به صلب و از آداب است و آنکه
 در پشت مقدم چشم افتاده بود و متشایع باید در چین نرمی جلیده و انصاف آن عصبیه
 و در پیشین حدقه و کوکبی اعلی منقسم بین که در سبب قرینه اندک بود و در خط چین و ضعف از کاه
 قرینه و در عصبیه باز کاه است آن و هم در شش جوان و انفعال که نباید که یکسند و
 سر زدن من فرس صرع و نیز منقسم در صورتیکه هوای ملدی روی و در حاشای آن بود در
 التسیم باید بود اما اسباب لازم در عمل کار و مفروضی شکل دوم با میل مفروضی منحنی
 و گاهی نیز و فاشی هم لازم و برای انجام دادن عمل سه سنگام ظاهر شده است سنگام اول
 بریدن قرینه و در این را به شرط است یکی آنکه نصف قرینه بریده شود و دوم آنکه جراحت حاد
 الی شکل بود شرط اخیر است که جراحت در خود قرینه وارد نیاید یعنی آنکه قدری از قرینه در صلب
 مانده اما طایفه بریدن کار را در گذارند و اگر در دست گرفته و از جانب حق اصغر
 عودا بقرینه فرو کنند تا آنکه منقل کار در رطوبت منعی رسد و وقت او را عملی نموده و
 ناق بکسر حرکت دهند تا نصف قرینه بریده شود و قرین جلیده رسد که هنوز قدری از قرینه
 بریده شده است کار را بطوری که کامداشته و بعد از اندک تا می برودش کشند و جنین را
 را بکشند تا منقب چشم را بر روی هم گذاشته بماند و لازم است که در چین عمل کار در
 شب و یا بین و بعد از آنکه از قرینه تجاوز نموده جلیده رسد و در این وقت که جنین را را نموده

نیز

البته رطوبت منعی خارج خواهد شد اما سنگام دوم بعد از دقیقه که چشم آسوده اند نایب و
 جنین را بلند نموده و عامل میل مذکور را گرفته از منقلی که در قرینه از فرو نمودن کار و مفروضی
 آمد و بعضی که نشان دست میل بالا بود در چشم فرو برد تا رسیدش جلیده را وقت
 نشان دست را در خود نموده و در خط طولی و دو خط عرضی مورب را بر جلیده کشند تا آنکه
 شکل مربع مستطیل از غشاء مذکور بریده شود بعد نشان دست میل را باین برده و بر
 آورد و جنین را را بکشند تا منقب حرکت و فشار می چشم داده جلیده خارج شود و آنجا
 باین هم خارج نکرد و جنین را بالا نموده با عانت از غشاء منقل مذکور برودش کشند و هرگاه بواسطه
 البیاف ملحق بقرینه بود چشم را بسته بعد از التسیم قرینه خود بکسر رفع کرد و درت نمایند اما
 هنگام سیم بعد از آنکه جلیده دوباره چشم را باز نموده نظر نمایند تا چیزی در او باقی نباشد
 مانع شود که در هرگاه منعی در عمل دیده شود رفع آن نموده با شش و یا خلیون هر دو چشم را
 و منقب را در محل ظانی بجا بماند اما آسپهها بیک در چین عمل احتمال دارد و از اول
 منقل است که از گذاردن سطح کار در روی منقل رفع شود و هرگاه شوان منقب کرد
 ترک عمل کشند و دوم آنکه کار را بطور لایق فرو زود در این صورت باید بیرون آورد
 دوباره فرو کنند سیم آنکه از نصف حقیقی قرینه کار در فرو نمایند در این وقت هان منقل
 ابتدای دایره فرض نموده تا نصف دایره منقل قرینه نمایند چنانچه رخم شدن عصبیه است
 در چین بریدن قرینه در این صورت باید که نایب بر قرینه قرار دهد تا عصبیه عقب رفته
 بخرج نکند و پنجم بجهت شدن منقل است که گاه از کندی کار بریده شده باره شود و در وقت
 باید موضع منقل را بریده و با منقب منعی نمایند ششم خارج کشن جلیده است و این کار
 از صیق حدقه و بعد از انشاع آن خارج کرد و در هرگاه از انصاف باشد باید
 چشم را بسته بعد از التسیم منقب و دیگر عمل نموده در رفع کرد و درت نمایند ششم منقب
 شدن عصبیه است که از قراحت نماید ششم خارج شدن رطوبت زجاجی است
 که باید بر روی عمل کرده بر گرداندش و الا چشم منزال باید و این کار را
 اندازد بریده شدن غشاء جلیده

چنانچه از فشار خود بر منقب جلیده خارج گردد
 و دست میل را بر پشت چشم گذاشته
 قدری فشار بر منقب خارج
 شود
 ح

۴۷
 اعطاء طریقه درین میل زدن که استر واد جلیده است بخلف رطوبت زجاجی
 واد واد است یکی از صلبه دیگری از قرینه اما طریقه عمل از صلبه چنان است
 که میلی بسان نمره با انشا یکی در پیش او توسطه افکند که در فوق گرفته نم
 از تحت محور چشم و یکجا دور تر از قرینه صلبه فروماند بطوریکه نشان در صلبه او
 بخا ذی صورت جراح باشد نگاه چون جراح بفهمد که صلبه مشوش شده و
 کار در این جراح که نشان او بنوعی باشد و این جانب داند زدن بر دمانک سوز
 مسکه باشد از فوق و اندر دنی جلیده و بسته نم سوز از جراح از مردمک شود
 بنمای یعنی باید داشت که تا میل از صلبه بجای نماند و است غشی مانند سوز در او
 که بعد از رسیدن میل بزجاجی فانی کرد پس لازم است که تا این غشی فانی نشد
 میل را فرو برد و حرکت بفرم دهند تا از مردمک مرئی شود و اوقت بایش او فوق جلیده
 بقسمی که سمت جذب نشد و بجای طرف مغشوش معادی جلیده باشد که گرفته از جانب
 اعلی و پسی بایل با میل و وحشی خارج چشم نماید تا آنکه جلیده از مکان خود خارج شده
 و در خلف رطوبت زجاجی قرار یابد و بدین است که برای قرار دادن آن حرکت نکند
 باید که زدن و هم بعد از استقرار فانی میل را در چشم نگاه دارند تا که دوباره رود شود
 که از استر وادش نماید و پس از قرار دادن جلیده میل را از چشم خارج سازند
 بعضی رسیدن میل جلیده به جلیده به جلیده طریقه شود بعضی از آنها را در وقت مؤخر چشم
 اندازد تا بند ریج بخلیل رود چنانچه جلیده به ملحق بقسمت بود ابتدا با پیش میل را با
 قطع نموده استر واد آن نماید تا آنکه سببها بیکدیگر در این عمل پیوند دارند و آید یکی
 دم است در سینه چشم دیگر انصباب دم است در پت مقدم در این صورت باید
 ترک عمل نمود و دیگر روشدن میل است از جلیده مانند بیکان که مانع خروج میل گردد
 و برای این باید که چند حرکت دوری میل دهند تا که در اتفاق دیگر مجروح شدن
 غشیه است که باید بعد از عمل معالجات آن کنند دیگر افاد جلیده است در پت مقدم
 چشم در این صورت باید چشم را بسته بعد از چندی بقیه اولی از آن کنند و اتفاق

در پت مقدم
 بعضی

سیب

۴۸
 دیگر معاودت جلیده است بیکان خود پس از تمام عمل و برای این باید از چندی که
 چشم مسلح یافت دوباره عمل نمایند طریقه دوم که استر واد جلیده است از
 قرینه و این عمل چون بسیار خطرناک است و حکما در این عمل خطر عظمی حادث میشود
 لهذا ترک این عمل لازم است و بدینجهت هم طریقه این عمل را ذکر کردیم
 اما طریقه سیم که عبارت از طعه طعه نمودن جلیده است بدو قسم باشد
 اول آنکه از قرینه میل را فرو برده و جلیده را از قدم مقطع سازند و این عمل جایز است
 در صورتیکه جلیده نرم و ملحق بقصیه نباشد و عده را حرکت بوده و قرینه سالم باشد
 و یا آنکه جلیده در پت مقدم چشم افاده باشد و ممنوع است در ضیق حدقه و نگاه
 حسن قرینه و چون غشی مزاجی مانند آنکه گشاید در بدن بود اما طریقه عمل از طریقه سیم
 ابتدا یک گندم صبار به بذر السنج را در ده قطره آب حل نموده یک یا دو قطره از او را
 در چشم قطره نمایند تا حدقه تسخ شده از فرو بردن میل غشیه مجروح نکرد بعد بایل
 مذکور در فوق از وسط خطی که دایره قرینه را بهشت قسمت نماید بقرینه فرو نمایند تا رسیدن
 جلیده در اوقت جلیده را با غشا او چند قسمت نموده بعضی از آنها را در پت مقدم و بعضی
 دیگر را در پت مؤخر چشم اندازند تا آنکه جلیده زیاده از نرم باشد که مغرب کفایت نماید
 چنانچه جلیده را از وسط خطی نمایند مانند بیکان آب در رطوبات چشم را بکنند و شود و
 باید که چهار شش از عرض و چهار از طول در جلیده نه نموده در پت مقدم و مؤخر چشم
 را بکنند کرده چشم را بخوبی که ذکر یافت بسته تا آنکه بند ریج بخلیل رود تا آنکه
 در عمل اول مجروح کشتن غشیه است که از اندک نمودن روشنائی مکان از او
 این شوند دوم خارج شدن رطوبت پشی است قبل از نمودن که در این صورت عمل بعد
 فوقی اشد سیم صلابت جلیده است و در این صورت باید که عمل را تغییر داده و به
 قسم اول بخلف رطوبت زجاجی برند قسم دوم فرو بردن میل است از جلیده و
 نمودن جلیده از خلف و این عمل نموده شود در اتفاق جلیده با غشیه و ضیق قرینه
 و ضیق حدقه و ممنوع است چون مرض نفرس و ریاح افزوده و سایر امراض

۴۹
 نزاجی در مرض موجود بود اما طریقه عمل مانند آنست که در ستر واد جلیده مختلف
 زجاجیه مذکور شد که اگر در اینجا چون جلیده رسند او را قطعه قطعه نمایند و سوت
 چشم تقسیم کنند و هرگاه درین عمل معلوم شود که جلیده متلب است بطوریکه قبل مذکور
 او را بخلف رطوبت زجاجیه برده و شکش سازند و هم در عمل ستر واد جلیده اگر معلوم
 شود که جلیده نرم است منقطع بجز آنکه در پوت چشم تقسیم نمایند اما عاقلانکه بعد از
 عموم قیام میل زدن باید نمود از این نظر است که بعد از انعام هر دو چشم را با شمع
 و اعلیون و دینال بسته در اطاق تاریکی مرض را بخوابانند که در طریقه دوم که بعد
 از انعام عمل بهتر است تا چند ساعت مرض همان طور نشسته باشد و بعد از آن چرخ
 حرکت در مکان تاریک مانده و غذا امانی رقیق چون مریه و غیره نوشیده و روزی
 یک آب از لعاب خطمی و مثال او را نموده شمع را هر روز نیم کند تا خشک نگردد و در
 بعد عمل تاریک که روشنائی چشم را کثوره و شی را بماند بعد از چشم را بسته هر
 روز یک مرتبه دوباره چشم را کثوره و بخندد و کم که روشنائی منزل مرض را بماند کند تا
 بند چ چشم عادی بیدار شود پس از آن آب که فی ستر ابرشی چشم کشیده که زده کم کم
 حرکت نمایند و بعد از دو ماه برای غایت بصیرتک زنند اما عوارضات و عطلکه بعد از
 عمل نموانند و اگر عارض شوند کمی درم طبعات داخل چشم است خصوص در غم غمینه
 که بواسطه برخوردن میل و با اثر ضوئیه متورم گشته ببلان دموج و در و عروق و اگر
 ضعیف بلوج و سایر علل مذکوره در آن باب عارض شوند و برای رفع آن وضع علق
 درین گوش و ضد نموده کحل با افیون یا بذر لیسنج نوشند اتفاق دیگر آنست
 که جراحت قرنیه تمام نماید یا آنکه ناموری حاصل آید که از مایلون سنگ چشم
 رفع آن شود و بهنگام غمینه مستحق با حرکت آن ناقص گردد و در دیگر چشم که
 که ممتنع گردد و جلیده خارج شود در آنوقت قدری محلول عسل یا زنده در
 ریزند تا جلیده خارج گردد و بهنگام که از صفت مزاج ناخیری در عمل
 جلیده افتد در اینصورت باید معقوبات و عطلات استعمال نمایند و چون بعد از
 رونودن جلیده بخلف رطوبت زجاجی حکم شی خارج میسر باشد که مورت

نفس

تورم غمینه و جلیه چشم گردد و بهنگام قبل از حصول غشائی بدو جلیه را با حرکت دیگر
 بکمان خود نماید در اینصورت باید عمل نمود و بهنگام که درین عمل مرض رقیق عارض شده منبع
 عمل باید در اینصورت باید دوی خوش خصوص از نیک قلیا به روشنی بپوشاید و هم تلخ بوش
 تا بعد از آن باید با یک سم در التفات چشم و مثل فصل فصل اول در التفات حقیقی
 زد و کوبید است کی آنکه همان حقیق ملحق بهم شوند و دیگر آنکه حقیق ملحق با مصل که در او
 التفات حقیق با خلقی است با غرضی که خوشکی و جراحات جلد و قروح خرازی مورت آن شود و
 التفات با جمع حقیق بود و باید جزئی از در این مورت سم با درن چشم بود و آنکه حقیق از وسط
 ملحق شود اما علاج آنجا که التفات اطراف چشم بود و نگه داری در تحت موضع ملحق برده
 التفات آن کنند و چون التفات در وسط بود است اسل شیار دار از سمتی فرو رود
 خارج باشد با موضع مذکور التفات نمایند و کار التفات در سیم حقیق باشد غشائی از وسط آن
 مفر نهش که بعد از طوری که در التفات اطراف مذکور شد با موضع مذکور در ستر واد جلیده
 مفر را با جلد انداخته ترکی دوزی نمایند که کشند تا آنکه دیگر ملحق شود و التفات حقیق با مصل
 شود و در مصلی دوم شده و غلبه ستر واد بود و التفات حقیق هم و این التفات هم با در سیم مصل است
 و باید که جراحات اما علاج سوزنی نمی برداشته معقولی از سرب یا کوشند و سوزن از جای
 و از جانب دیگر خارج و سوزن را برداشته و معقول را در جوف التفات گذارند و بعد از گذشتن آن
 محکم گردد و هر روز معقول را قدری فوق حرکت دهند تا آنکه تدریج هم التفات تمام شود و جسم غشائی در
 دیگر گردد که دیگر ملحق شود فصل دوم در التفات حدقه تا آنکه التفات حدقه غشائی است که در حقیق
 آنکه قبل مذکور شد غشائی غمینه مقابل جلیه زده مورت قای حدقه گردد و با عارضی است که از نور غمینه
 و لیسق آن با جلیده با قرینه و از آنکه و بقیه غمینه بواسطه اثر شطایای لیسق در در غشائی مذکور شد
 گردد و چون که درت قرینه را عطلات و علاج مانند التفات غمینه است و حدقه است در این تمام مذکور شد
 اما علاج آنجا که رطوبت متر شمع رقیق و ابتدای مرض بود با استعمال مضجعات و عطلات مانند اسما
 و غیره در عمل آن کوشند و چون رطوبت متر شمع غلظت و مرض مزمن بود و در عمل به تحصیل حد
 مصنوعی جاری نباشد و در این عمل باید که چشم را بمره کور و قرینه از مویک با غمینه را مشوب نمود

که بسان پخته کوز کرد و بعد پخته شده و از آن صلب دهنه در موضع منفرجه و در وقت آن تفریح
 در آب سرد و چون خواهند که در این صورت میلی در مجرای فرو بردن مکن کرد و آن را علاج و اینست
 که هنوز مجرای منی مسدود گشته روزی سه بار فشار بر موضع درم نموده بغم غلیظه در آن داخل
 و بطور از علاج مسدود روی و سنگ بنم در مجرای خود بشوق از بار گذارند و چون مجرای مسدود
 باشد که از شکاف دفع بغم غلیظه نماید و برای این مطلب لازمست که اول بر بیض سفارش نمایند تا در
 فشار گشته تا یک مثلی گشته و شکاف منی آن کرد و بعد بعضی راست رود آشفته از فوق و سمت
 انشی که با اسفل سمت و حتی از شکاف بعد از دفع بغم قدری نفک در موضع که از آن تا آنکه بواسطه
 اندامی الیاف نفک بر جرح است زخم ناخدی استیام نماید و هرگاه بواسطه سوء تدبیر مجرای منی
 عارض شود مجرای مذکور را بشکافند تا آنکه غشا صلبه در او بواسطه جرح احتیاج تخلیل رفته
 برنج مجرای منی می شود و در او از آنجا که اندامی مذکور اکثر هم راه رود با اندام مجرای کپس و
 طبعیت لازم است که بعد از منفرجه بودن کینه لا خط مجرای کپس را نیز بشکافند تا اگر اوج مسدود
 مسدود بود در علایق کوشد و اندام این مجرای بواسطه فرو بردن میل مخصوص که از درون
 مایه اخذ نمایند در او معلوم کرد و در این رفع انسداد او و در طرفه است یکی که در ابتدا
 مجرای را از آنجا که با غایت آب در کشته و قدری نفک در موضع مجرای خروج کرده
 رفته و شش کنند و در دویم بعد از شستن مجرای مجرای را بسیار باید که برداشته
 و کپس را از آن مجرای فرو بردن و این را به سهولت فرو برد و هرگاه فرو بردن بدیج
 در فرو بردن او را می خاند چنانچه در اول زده فرو برد و روز بعد عمل را عاده کنند
 تا آنکه زده بیمنی فرو برد و بعد از این سه روز را بریده قدری شمع و یا خلون در موضع جرح
 گذارد و بعد از چند روز که مجرای قدری و بیشتر شود و دیگر که قدری ضخیم تر از زده اولی
 بود و مجرای فرو بردن را با دهنه و بعد از دو ساعت بر بیض دامن را بسته و بیمنی را از
 بیمنی که با سالت گرفته و بیمنی سمت طلق بقوت اخراج نفیس نماید تا سر زده بیمنی برآید
 آنوقت زده بیمنی که زده و در دهنه سر زده را مانند فیله با من کشیده و قطره از آن
 در مجرای نماید و بعد از آنکه در دهنه که مجرای قدری و بیشتر شده و آب قطره از بیمنی خارج

از زهر برداشته زده دیگر که کلفت تر از دست در مجرای فرو برد و این عمل را تا دو سه بار بدست نمایند
 تا آنکه مجرای منی وسیع گردد و بعد از وسیع شدن مجرای چون یکدفعه ترک گذارند و آن زده نمایند و بعد
 مجرای مسدود خواهد گشت لهذا بیمنی که از سرب درست نموده باشند تا مدت سه روز در مجرای بگذارند
 که پس از دشتن بیمنی مجرای دوباره مسدود خواهد شد و آنجا که از ابتدا وسیع و چون میل
 در مجرای نمود باید زده کار و نامزکی که سر و روم کم گرفته باشند برداشته در مجرای منی کشیده و
 که مسدود شده است پسندیش تر و کار در فرو بردن ثقیله نمایند بعدش تر و کار در خارج
 زهر از خلاف تر و کار در فرو نموده و اعمال مذکور را مانند جای آوردند و جراحی که در این عمل حاصل
 اکثر شعبه از دفع انسداد خود استیام باید و هرگاه در رفع نشود قدری سنگ جنم را بر او مالند
 آن کنند تا آنکه ثقیله دوم که در این عملی فرو شده است چنین بود که در ابتدا اول از طلا نقره
 خالص درست نموده زده در مجرای فرو کرد و مدت دو سه روز خارج نشد تا آنکه از آنجا که
 مجرای کرد و باب دهم در بعضی بافتن آلات جنم از سوی مجرای خود و شستن بر روی
 پان اول در انقلاب جن این دو گونه است یکی انقلاب خارج و دیگری داخل با انقلاب
 خارج رخن شود از زده و جلد بواسطه جرح و خشکی و از قیاسی حسن عضله مستعد بر مقلد از
 قضاوت غشای غلیظی جن این از ضخامت نفروفت آن را با علاج چون سبب قه و جلد بود باید
 از عمل دیگر که افریب و با جلد آورده با پیوسته کنند و چون سبب جراحی عضله باشد موقوف
 اعضا با جلد و اندام و جلد که ضخامت ممتد مورت آن بود در تحلیل او گشتند تا بایند کات بکند
 با سنگ جنم بر روی جن اینا ثقیله آوردن جلد از موضع دیگر چون انقلاب جنم علی بود
 جلد را که کشیده شده است با بیمنی شکل بریده بر بیض چشم را بر بند و لا خط مانده که جلد کم
 برداشته شد باشد و بعد جرح است جلد از جلد جنبه بریده و سطح نموده جلد طرف جرح
 بخیه نمایند و باید که این جلد برداشته شده از جلد است سمت اتمالی بود و نقد از این طرف اخذ
 نماید و هم لازمست که شکل این جلد را خود با شکل جرح است یکی با بیمنی جراحی بر کتر از آن است
 معلوم است که چون جلد را بکیمت اتصال دارد و در وقت انقطاع و غرضی در موضع هم خوا
 رسد که بعد از استیام پیوسته بافتن با این غصن را برید و با چون انقلاب در جن منی عمل بود

دفع او کنند و چون از درون دندان باشد جدا کنند تا دندان بر روی پروان آید و لازم است
که چشم را مشت دهند باین طوری که در وسط چشم را بسته و در مقابل چشم معلول بطرف خلاف او
چیزی نهند و نظر را بر او اندازند تا چشم نگاه کردن از طرف مخالف عادی گردد اگر بطریق
رفع نشود باید عضله معلول را برید تا عضله مقابل او چشم را بجانب خود جذب نماید اما طریقه عمل
باید با مشاکی قبیل یکدیگر در تر از قریه فخر کرده و سمت مخالف آن عضله بکشند و با منقبض
چاکلی در او داده بعد با قلابی از محل شش فرو رفته زیر تر عضله انداخته بالا کشیده و در همان
بمنقبض محذب و تر بر او قطع سازند و بعد از قطع چشم سالم را بسته و قلاب را از شر
سرب چشم علیل که از دره و سایر مجاری است و از بکار دارد تا رفع جراحت گردد و بعد از این عمل باید
که تا یک ماه چشم را مشت دهند تا دست و بدن را عادی کرد و الا که عمل بجا حاصل خواهد شد اما پیشتر
داین عمل هم میرسد اول باز نشاندن چشم است بواسطه تشنج و خلج دوم آنکه منافس از قلم
روگشته و از دیگر دو باید قلم را دوباره گرفت سیم آنکه در گرفتن در عضله عری هم رسد چهارم
آنکه بعد از تمام عمل مشا که در عضله بالمره بریده شده باشد در این صورت باید مجدداً قلاب انداخته
و در بالا کشیده درست بر بند و باشد بعد از عمل از محلی که قلم را بریده اند گوشت زیادی برود
در اینوقت باید سنگ جنم را انداخته تا رفع آن شود قسم دیگر از امراض اعصاب حرکت بصر لغوه است
که اگر عارض شود در عضله رانده جنم اعلی و نادر است که در عضله محرم که مقلد عضله سید چشم
هم رسد و اگر چه باشد بالقوه صورت و از علامات است که از طرف علت حاجب وجه را
نشان بالابره و بکمر پیش یا من افتد و گوشه اب علیل از سمت علت مانند حالتی که قلاب میکشد و
و منقبض شود و چشم را نشان بدهد و در طرف سالم بواسطه شلی و سستی طرف معلول
و از اینجا که قوه جذبه مجرای دیده نقصان بهم رساند انگ از چشم بوجبه پدید و برای آنکه چشم
هم بخورد تا شسته شود باشد که از ترغاب قریه منفرج گردد اما جده منقبض و اعصاب است
و باز قلاب را در مایل موجود کردن است اعظم از آنکه در قلاب خنثی باشد و در دیگر و منقبض
از اثر برودت است و علامات نموده و طایقی که باید دفع گردد در زیر جلد و عروق و عصبانیت
قالب بر عصب صورت لغوه شود و باشد که سبب عصب زوج سیم از اعصاب باغی که عصب

نیز اگر برودت

عصب

که عبارت از عصب محرم که مقلد است بود در این صورت جنم و مقلد حرکت فانی گردد و اگر از عصب
مورب فانی و مستقیم و شلی که حرکت آنها از این عصب پیش کشند اکثر لغوه است و شلی چشم بود و چون
حرکت فانی عصبیه هم بواسطه این عصب است در او هم شلی عارض شده عمل با صره بواسطه نقصان
حرکت عصبیه فانی و ناقص گردد و بندرت باشد که عضله مستقیم و شلی شل شده و لغوه جانب نمی بود
و نیز شود که عضله مورب فانی از حرکت افتد و اغلب این اقدام علت درد داغ بود و شلی عصبیه
معلوم گردد و از عدم حرکت آن و در شلی عصبیه پیچیده لا محاله شود یکی تشنج حده دوم تقصیر آن سیم حرکت
آن بقدم خلف و تشنج حده عارض شود از امراض عصبیه و سکت و بعضی امراض داغی و از
سوم ناتی و باشد که خلقی بود و شود که از بدین آن معوی هم رسد اما تقصیر حده کای خلقی
و کای عارض است که از امراض داغی و ناعی هم رسد و حده کای بمرض یا در بند و یا در عصب
و چون در تشنج عصب بود عارض شود از سر خوردگی و از ضرب و مقلد و از دره و اطراف چشم و از
و مایل در خانه بصر و چون سبب در عصب بود از سکت و امراض عصبیه از من و تر شدن
داغ و مایل باره در داغ عارض گردد اما سبب و فشار مرض بطور منفری است و چون سبب
عصب باشد کای معالجی بود اما علاج باید رفع سبب شود چنانچه بجهان دم غالب باشد
فقد و جانت و زو مقلد است و اگر سبب سر خوردگی بود باید قلاب بر عصب نهاده هر جا
وجع محسوس شود و لو انداخته اودیه معرقه مانند کل اطلی و سورخان و غیره داده و شمع زرا برنج
برنج کوشش انداخته و در محل دوجهر چله در و فایند و اگر سبب قلاب مایل بود استام در تحلیل
انها مایلین روغن بود و خوردن علاج بود فایند مخصوص چون سبب بود آمدن بریم از گوش
که دلیل بر بیم شدن عظم است پس در این صورت باید بود و روغن های سوخته دهند و از اودیه
دیگر که چله و جهر با عصاره او خوانند و مایلین اودیه معطره از قسطنطنیه بنیل الطیب از
سولفوریک و جهر اسطوخودوس و قطره زرا برنج نافع است و بهتر از همه است استعمال جرح لای
که در این مرض منفعت کلی دارد و چون در این کتاب محتاج بنسخه شوند که بتفصیل ذکر نشده است باید
کتاب قرآین فرنگی رجوع نمایند که در اینجا هر نسخه بتفصیل نوشته شده و این کتاب را چون
خواستیم که مقرر نوشته شود لکن از این کتاب هر نسخه که مقرر شده است کما نموده

نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب
نسخه از کتابی که در این کتاب

فصل اول در نقد و وضع علق ۷۲ باب سیم در قطع اطراف ۷۹
 فصل دوم در ادویه فدا کننده اربیل فروج ۷۵ فصل اول در قطع اطراف که او را امیر میگویند ۷۹
 فصل سیم در انقباض دم با ادویه ۷۸ فصل دوم در طریق قطع اعضا، از وسط عظم ۸۶
 فصل سیم در حسیع معامل ۸۹
 ضمیمه کتاب در نسخه جات متفرقه

فصل ثالث در صحت مشاغل ۴۲ جمله ثانی در غسل بدن و نکاتین مشاغل
 جمله اول در تغذیه و اجزای صحت کسرها ۴۲ فصل رابع در غسل خروج صحت از آلت ۴۲
 مقاله ثالث در تحریر حریم الی از آلت بدن و وجود الی غیر طبیعی ۴۲
 باب اول در تحریر حریم الی از آلت ۴۱ باب ثانی در بویوس که بپاری بویوس باشد ۵۱
 مقدمه در حید و روی بودن مردم الی از آلت ۴۱ فصل اول در بواسیر عموما ۵۱
 فصل اول در تقلص و غلط جرم سان ۴۱ فصل ثانی در بواسیر اف ۵۲
 فصل ثانی در عظم و غلط غده زائده ۴۲ فصل ثانی در بواسیر نابت از جوف کنگ ۵۵
 فصل ثانی در غلظت شکرین ۴۵ فصل رابع در بواسیر نابت از مصل در دم ۵۵
 باب ثانی در وجود آلتی بد غیر طبیعی ۴۵ فصل رابع در بواسیر نابت از مصل و سقیم ۵۶
 فصل اول در نایل و ملت قرن ۴۵ باب رابع در سرطان با اقسام و بک ۵۷
 فصل ثانی در تغذیه و غلط جوی از عظم ۴۶ فصل اول در اقسام سرطان در سر ۵۷
 فصل ثالث در سلسله شخی ۴۸ فصل ثانی در سرطان شفه و وجنه ۵۹
 فصل رابع در سلسله و نکلیان ۴۹ فصل ثانی در سرطان لسان ۶۰
 فصل رابع در عرق بدنه ۵۰ فصل رابع در سرطان نذی ۶۱
 فصل رابع در وجود آلتی غلط و در معضی ۵۱ فصل رابع در سرطان قنیه ۶۲
 فصل رابع در دمایل کانی ۵۱ فصل رابع در سرطان بنیه ۶۴
 مقاله رابع در امراض عدد از زایده و نقصان عضوی از اعضا ۶۵
 باب اول در نقصان الی و طریق املا ۶۵ باب ثانی در از زاید و عضوی از اعضا ۶۸
 فصل اول در املا عضو منقود ۶۵ فصل اول در امسج زاید ۶۸
 فصل ثانی در طریق نیکو بقای اعضا منقود ۶۶ فصل ثانی در پنهان و اف نازد ۶۸
 مقاله خامس در بیان بعضی از اعمال بد و طریق قطع هر یک از اعضا ۶۸
 باب اول در عمل بد و متعلقات آنها ۶۸ فصل ثانی در سببی اعمال بد ۷۱
 فصل اول در مریعات بعضی از اعضا ۶۸ باب دوم در عمل بد صغیر ۷۲

BLANK PAGES

142

143

BLANK PAGES

نشد و علاج با عانت عمل بدستوانه قدری از انصاف را در رفع نمود بسیار گاهی که بعضی ناقص بود
مفصل بواسطه رابط با هم وصل شده باشند و بجهت علاج لازم است که چندی مفصل را با بعضی اوان
فراخ نموده و گزافه استقام نمایند تا مسترخی گردد و بعد از این اعمال معالج باید دو قسم مری و منظره دار
یکی آنکه عیال را با هم ترازی ظهور و فورم پوشش نموده و بقوت مفصل را بجا نماند تا رفع انصاف او شود
و در چنین این عمل از کشتن اریله و رسته های عظیم صدای انگار متوجع خواهد کرد و این عمل از عیال
خطرناکست چون در بعضی دیده شد که از این عمل درم حادی مفصل میرسد و او را متفرج است
و هم باشد که عرق عظیم از شریان و غیره بواسطه تده و کجکد و ازین بابت است که اکثر جراحتان ترک
نموده و در بعضی مفصل را یکسری سبب شده اند یا تحت طریقی که در وسط او مسی منسوب است و در در
میل مذکور را چنانچه و ازین عمل شش پس در در و در وقت بعثت او با کجکاید و رفع ایجاد او شود
فصل رابع در بیان انصاف و انقباض و تخرین و این علت در قاعده ناقص و بواسطه خشکی
عارض شود و در صورتیکه انقباض و انصاف مری باشد و اگر اشتین اولی اند صورت شد
مرض و عظم انقباض و عسرت تنفس لازمست که با عانت مضع منفره انگشاید و بعد فسیل عظمی
و در تخرین منته که بقدره انت و وسیع نمایند و باید تا چندی دست از قبیل بنادون بر ندارند
نیز که مرض نکس باشد فصل چهارم در بیان بعضی سان و ازین علت عمل معص و نوشیدن
و تنفس ناقص عارض میشود از نگی و کوناهی چند نیز زبان یا از قرحه که زبان را پرچ و دامن
الاعلاج بجهت قطع بنید زبان بلیع با هم کشی که در او چاکلی است به نخت لسان که از اندنجوی که نید
لسان در چاکلی او قرار گیرد و انچه فچی بود آهسته او را قطع نمایند و لیکن شی الامکان بندار او را
باید برید که مسدود است و این نیز با هم منفره می سان و او را تیر و هرگاه قرحه در نخت لسان میرسد
باید مانع آیند از انصاف بنادون با و مانع و بعد از بعضی اینها چون مورث او پست شد به سیکر
باید با عانت مضع مدنی مضع بعضی را یکشاید و چون در این عمل سیلان دم شده به هم میرسد
باید که از قاضیات مانند آب نمون و غیره منفره نموده و او را قاعده مضع مخرج در در سخته
و از این سکنه جنم نه سیلان دم نمایند و بعد از عمل باید مواظب بود که مسدود مجدد
موضع علت معص شود و همچنین در بعضی اوقات بواسطه قرحه و دامن منته باشد تنفس شود و ازین بابت

عمل مضع

عمل مضع و معص و تنفس عسرت برساند و باید در هنگام قرحه مانع آیند از انصاف انما و بعد از بعضی باید
بواسطه انوضع را قطع نموده و در قرحه سربا بجا نماند که مانع انصاف او شود فصل سادس در بیان
انصاف و انقباض و دامن و انقباض این علت بجهت تخرین و منقطع قرحه است که بواسطه او کجکاید
مثال کرده باشد یا قرحه عارضه از استعمال بنیق زیاد در او افزاید با کجکاید و حرق نار و کجکاید
و بواسطه این علت زبانی و جرم تام و عمل معص و نوشیدن انصاف برساند و علاج مکن نیست مری
و شگافن مضع هم کفایت نمیدارد چون هر قسم که باشد فضای دامن تنفسیت خواهد کرد اگر چه کاپی متع
الاعلاج و در بعضی لابد می سازد معالجه را اینکه از موضع دیگر طلع عارید آورده و نشسته بپونند و چون
که در صورت نیستن که در بدن فضای بسیار کثیف است از جمله کوشه لب بر دانه تقسیم غشای غاطی را از آن
انچه غشای غاطی را از وسط قطع نموده نصف بر کر و دانه روی لب بر روی منته بجا می ماند نصف دیگر
بر روی لب فرو دین و بعد بخیه نمایند که بعد از ایام این غشای مانع خواهد بود از انصاف و ایجاد
فصل سابع در بیان انصاف و انقباض مری و این علت عارض میشود از نوشیدن جوهر کور
و شوره و از حرق انما و یا بواسطه درم مری و صلابت او و از دایس و سلبه و سایر سرطان
و یا از تشنج مری منطبق که در دوم هم باشد که در اطراف مری و ملی عارض و از انصاف او انقباض
در مری میرسد و از علامات اوست شاکم که در بدن علیل از بلعیدن و هنگام عبور قریه قد از موضع
منقبض و منطبق مری را احساس نمایند در این کثیفن و گاهی علت بحدیست که علیل انقباض است
عارض شود با سعال شدید و خشان و هرگاه مرض بحد کمال رسیده باشد بلعیدن چیزی ممکن
نمیشد اما مع و انهم با صدمه عظیم و جتن نوعی مضع ضیق عارض شود و در نوا سخته غذا نتواند خورد
تا از کرسکی لطف سازد و از چون معالج در تشخیص خاطر جمع نباشد کمر و ملی که در سر او کولر است
منصوب است و از آن فرو برد و اگر مری است میل معده خواهد رسید و الا در موضع منطبق از
میری کبر و انقباض و انصاف مری بواسطه تشنج اگر چه حقیقا انصاف نیست ولی چون باشد
مشبه شود بعضی حقیقی بنا علی الا لازمست ذکر بعضی علامات بجهت تمیز انما از انچه در این قسم
در بعضی اوقات بحدیست که بالمره مری مدد است و گاهی چنین نیست و بلعیدن عسرت
نماید و از انصاف اعراض مذکور باید بجهت و او که این علت اوی است با تشخیصی با سایر اعراض

کله و غره در موضعی از بدن و لکن چون در کتاب اول ذکر انهار شد در اینجا بیان نمودیم فصل اول
در ششی خارجی که بقضای نفثه رسیده و در اینجا باید دانست که باشد الطحال را در صحن بازی و غیره
چیزی مانند سدس و لوپا و امثال آنها بر نمی خورد و در اینجا باید دانست که در جهت است با سطل
چشم کردن است با سطل و سببش مکان شواخ خارج که در جهت علاج و خروج او باید دانست
از بی خودی و فراج باید انکار با انری او را که فیه مردن آید و اگر ممکن نشد خورد نمود و اجزای او را که
کشد و جهت این مطلب که لا با یسمل فیه و فرود نه کشش کند انکار با انری که کشیده است کله
کشش با انری بران گیری او را که نه نموده و خارج سازد فصل ثانی در مورد و قیاسی ششی خارجی
بجسم از قبیل غبار و رمل و قو قالی این و شراکت و در کان و شتر زاید و منقلب و امثال آنها
بر آنکه از امشیا و از ده چشم بعضی بواسطه کثیف صورت اند که زنده ماند و هر شوره و آنکه
و قو قون و سنگ هم و امثال آنها بعضی بواسطه کثیف مانند غبار و رمل و غیره و منقرض است
ذکر کرده با در مانی که است با و غصبت که طبعه از جن منقلب عبور نماید باشد که از انچه بگذرد و محرم
طبعه فریز نشیند و علامت این علت است وجع و کرامت صورت و انقباض جفین و سبلان
و نوع و انقباض جان و دم و انقباض با و چشم و اما شایع باقیه از این علت اغلب است که بعد از از
ششی خارجی چشم صحیح باشد و لکن در بعضی اوقات بعد از خروج او در می در طبعه باقی ماند و هرگاه
ششی مانند قو قالی این در فریزه فرود شده صورت تو دم او کرده باشد خوف است و اگر ششی که
برسد بفریزه و او را کشی و در قن سازد و بتواند او را به نمود و اینجا که ششی خارجی طبعه غصبت نشیند
باشد صورتش سازد و اگر جلده رسیده باشد اقل مراتب و نزول آب است و اگر ششی خارجی
بر طوط زجاجیه فرود شده باشد البته که خود را نموده و جهت تشخیص باید خوب ملاحظه و شاره
نماید که این ششی خارجی در چه موضع نکل باشد و اگر ممکن نشود با بر میلی به پشت چشم نهاده و جن را
مشطب ساخته و ملاحظه نمود و منقرض او را با بنده اگر چه در بعضی کب و عمل علیل است میساید بر اینکه چه
چیز چشم و آورده و هم باشد که طبعه از حرکت مقلد و طوط او ششی خارجی را منفع سازد
و اما علاج باید از انکه نماید از چشم تا فرود زده باغات انری و این عمل در صورتیکه ششی خارجی طبعه
از چشم مرکز گردیده باشد سهل است اما قدری تو قالی این یا فلز دیگر در طبعه فریزه مرکز شده باشد

نشد

البته خروج او صوبت خواهد داشت پس باید با میلی تمیز از جروح ساخته انکار نوک میل از ششی خارجی
مرغش سازد و هرگاه ششی خارجی بابت مقدم چشم رسد باشد باید با مضمضه مخصوصی فریزه را منقطع
پروان آورد و در صورتیکه با جلده رسیده باشد چون از لوازم است نزول و گذشت او را که
باید از خروج او جلده را نیز خارج سازد و اینجا که شک چشم با جهر شوره و آنکه و امثال آنها چشم
باشد باید بعد از شست و شو قدری روغن بام قطره نماید بعد از خروج امشیا خارجی باید ادویه
و در هر صند و درم را داشت مانند کله که در پشت گوش بندازد و قدری انقباض محلول در آب چشم
نموده و قطره را با بار و آلوده و بر پشت چشم نهد و تعصیل او را در کنگی کالی بیان نمود و این عمل
در روز و قیاسی که گوش و ازین قبل است که در دهن را پاک کند و دانه تسبیح و سنگ و با خود و سخت
که صلابت بهر ساینده و صورت اند که در و از اعراض است و درم صلیح و صلیح و سر مغرط و در عجم
و با لافره بریم نشیند و از و نه باید و اگر اجابا نایم خارج دفع نکرد و صلیح و مشطب به پشت او طلا
نصباب باید صم که دانه صاحب خود را و شخص این علت را از مقتضات و دیدن با چشم و پسند که ششی
اما علاج باید ششی باقیه از انچه خارج زنده بگذرد و جانی که گوش شده و زنده باشد باید قدری روغن کله که در
روغن کاج حل نموده گوشش قطره نموده و اگر کله انکار باقیه از انچه در شش ساخته و انری فرود شده
او را خارج سازد و این عمل در بعضی بواسطه صفت مجری صعب و نولت بنا علی ذلک بعضی از استادان
علم جراحی برین تدبیر از انکه انده ششی خارجی را که اول نقه گوش را چرب نموده انکار قدری کج
دفع آب کرده و گوشش را بچینه اند و بعد از منقح که با انری که شش در کشته و درین واسطه ششی خارجی که
کج چسبیده بود دفع شده است فصل ثالث در مورد و قیاسی ششی از امشیا خارجی در فضایی
دان و خلق و مری را که باشد طبعه استخوانی مانند ترابری و امثال او در موضعی از دانه و صورت
درم او شود و درین واسطه مضمضه و بلع عسرت بهر ساینده علاج باید بعد از باقیه منقرض باغات انری خارج
سازد اما در و قیاسی در خلق و مری باشد که سوزن و تیغ و استخوان غیره در خلق با مری با
برین قسم که مری و بطرفین خلق با مری فرود و در موسم بهم که کسی بفریزه زدگی با بول سبایی فرود
دند و سوزن و مری را خوا و دریندا و خواه در منتهای او یعنی در قن معده و از اعراض است
و بعضی صعب در موضع علت بان شنج او و صفتان و غشبان و باشد که از شدت و درم مری تقریباً

و اما شش نب نموده تا از آنجا صفر بگذرد و با آنکه مراره با مرانی متصل و متصل گردد و صفر
مجلس بخارج میل نموده و از ظاهر دلی هم رسیده و منجم کرده و صفر اندر دفع شود و نباید
جراح غشاء دل را کشد بلکه باید بطبیعت را نمود انقباض را و او را غایت نمایند شش در انقباض
و با آنکه بعد از انقباض دل در کار قوی نماند و بواسطه او امتحان نمایند که دل نه که ساده است صفر
و بعد از انقباض دفع صفر باید قدری گمان موضع او نموده و به بندند و از مشرب و آب و دانه منجمه
و مقویه بکار دارند فصل ناست در بیان جنس بول و قیام او با جنس بول عبارت از آن است
که بول از آن جنسی هم رسیده اند از قیام و خروج او را قیام است قسمی آن است که کلیه علیل گردد و شود
بول از خون متشکل و در این قسم را میگویند ناسیده اند یعنی جنس بول کلیه قسم دیگر ناسیده
بالبین بول با سینه در او هم رسیده از حصه کلیه و درین بول شوازه از کلیه مشایع نمود
او را جنس بول جالبی نامند قسم دیگر آنست که علت در مشایع باشد یعنی و من و وضعی در مشایع
او هم رسیده و شش غشاء منقبض شود و از این سبب جنس بول عارض شود و او را جنس بول مشایع میگویند
و قسم دیگر آنست که در مجرای بول هم رسیده با حصه فی دهری بماند و مورث جنس بول شود
او را جنس بول مجرای نامند و این علت یا نام با ناقص است نام ششگاهی است که بول با مره رسیده
باشد و ناقص آن است که بول چای غشاء با وجی عظیم که او را پس اوری نامند و با آنکه بول غشاء
میشاید و او را هم میگویند و نام جنس بول کلیه و جالبی عارض شود از مشرب و منقبض و از دانه
بر آن و با آنکه شش که غشای کلیه را قلی یا جالب را میدهد و سازه و آن ششی یا حصه فی است که کلیه
منقبض شود از مجرای و صلابت بعضی علاج نمود و بول و منقبض در آنکه می گویند که شش منقبض
و این علت دست دهد و هم باشد که در طرف کلیه یا جالب بعضی و مایسل عارض شوند و از آن
اما مجرای بول است و در این عرض نمود و شود و باید داشت که هرگاه علتی در یکی از کلیه تن عارض
گردد مدخل او از کلیه و جالب دیگر جدا شود و شش جنس بول و شوازه است که آنکه چون
حاصل این علت را در موضع کلیه و جی هر دو علیل گردد که سابق بعد از ظهور و نقیصای وجع
این موضع حساساتی در بول مشاهده نموده اند و وجع کلیه جالب باشد و غلبه غلبه است که
علت در کلیه است و جالب در حالت تحت غلظت غلی است اما چون حساساتی از کلیه آید

نیم

و موضع از جالب گیر نماید با فوق این موضع حجم و وسیع و غلظت معانی شود و بعد از کلیه جالب
علت نیز عظم هم رسیده و بیان گیر کرد و دوم باشد که کلیه یا جالب رسیده و در اسطه عظم منقبض
صلب متصل و متصل و منقبض گردد و به معبری از عظمه مذکور جهت اندفاع بول موجود شود و از صلب
بول باید و اما علاج باید موضع کلیه علیل جاست نموده و زلوشانیده و از مشرب و آب و دانه
و طبغات و مخدرات استعمال نموده و زلوشانیده و از دانه احتیاجات زنند انگاه او را
قیامی و مفتحت صلت بکار دارند و جوهر حسن بلبه از جمرات است در این مرض و هرگاه بول در
جس شده باشد اعراض مختلفه علیل را عارض شود از آنجا احاسی باید را متلاشانه با وجع
خنده و در تحت سر و در می کلانی شکل ظاهر شود و با باشد که از استلاشانه معاستقیم منقبض شود
خارج گردد و در صورتی که جنس بول شدید باشد و هیچ وجه بول منقبض نگردد و چند سبب از
بطور رسیدگی آنکه از شدت استلاشانه منقبض شود و دیگر آنکه مجرای شادی از شانه ظاهر شود
بعلاوه علیل را خلق و اضطراب خوف عارض دلون بشود و تیره و صورتش سید شود با سوزش
زبان و سرعت و غرض و زبان فی کله خیزد که به تن بول است و دیگر جنس را با من مشایع و
مجرای است موسوم باور کوس که بعد از تولد رسیده و دیگر در بول می در مشایع میگویند
باشد می شود که طبیعت مجرای مذکور را کشد و بول را از شانه منقبض و از سر خارج سازد و در بول
علیل نجات باید و در بران باشد که از ضعف شانه بول جنس در دستوف کرده و از این باب
در جوف شانه جرات موجود شوند و سبب جنس بول شانه چند خیرات کی استخر خای است
مانند آنکه در مرض حرده و مطبوعه از استخر خای بول جنس تواند شد ثانی آنکه ششایی در شانه هم رسیده
و بول جنس شود ثالث آنکه شانه را شخی عارض شود و بول جنس گردد و رابع آنکه غش مشایع مجرای
بول رسیده و مورث این علت شود قسم اخیر را نیز چهار وجه است یکی آنکه ششی خارجی در شرف فرود
مجرای بول با غش مشایع رسیده و ثانی آنکه غده و ذی تورم و صلب شده و در بول مجرای
رسد و در ثالث آنکه در نای غش مشایع باشد که از هم منقبض و مورث جنس بول و سبب این حالت
یا چنین بادا مایسل است که در جرم رحم هم رسیده و از عظم و منقبض بر غش مشایع که در قدام او واقع
دارد و در بول جنس بول هم رسیده و رابع حقیق و طبایق غش مشایع با مجرای بول عارض شود

شود و سبب بحالت صح

و غیره و اما جنس البول مثانه که سبب ستر خفا باشد این حالت بول می کشد و از ابتدا درین
 اندک و محسوس عارض و بول تلخی خارج شود و بعد بول بی اراده قطره قطره دفع و در مجرای
 غلیظی بهر سبب که باستغفار و در انات محل مشته که در چون بخوابد مثانه از بول خالی
 شود باید و از انقباض و در صورتی که سبب ستر خفا ضرب یا سخته و از در مثانه باشد اعراض
 با سستی در دور و عارض و بول تخمیس گردد و سبب این علت است و درم و غلظت و غلظت در مثانه
 و او تا عارضه ای او هم باشد که صاحبان مرض نفیس و شیوخ را بواسطه ضعف قوای حیوانی
 مثانه ستر می گردد و هم باشد از حرکات عسيفه مانند افراط در طاع یا از انقباض این علت
 هم رسد و انحصاری که بول از مجرای جنس و نگارند باشد که بدین واسطه مثانه ستر می شود
 جنس البول شود و اما علاج باید و اولی آنست که از بول خالی ساحت بعد از دستمال
 نمود که مثانه تشنج و قوت کم گردد بنا علی ذلک بخت تخلیه مثانه باید که ترانه را در و نوحی
 مثانه را فشرده بول دفع شود هرگاه مرض نهایت شدت نباشد محض از استعمال کشته تر
 باشد که دفع علت مثانه قوت کم گردد و اگر ازین عمل قوت کم نگردد از مرکب عسل این خواهد بود
 البته و بخت نفیوت مثانه باید روزی چند نوبت کم داشته و در آب کوکوی استخام
 و ایند عسل فرایند صفت و بکثرند که بگوید که در اینج سبب نبرد هم کوفه بارت الکوس
 خمیر نموده و صد و پست حبش که می صمغ و شام میل فرایند صفت و دوائی نافع بکثرند از اینج
 کا فور صمغ عربی که بگوید هم مخلوط و بالعاب بدانه خمیر و صد و پست حبش که می صمغ
 شام بخورند و از ترانه پخته درین مرض انداختن شمع در اینج است بقطر و این فمیدین
 و وضع علی در عجان و جلوس در خاک سرخ گرم کرده و بخاک استرخانی بقعه مثانه را عارض شود
 در صورتیکه سبب مرض نفیس باشد استخام یا آب کوکوی عسل یا مصنوعی نافع و حجامت
 و بالیدن روغن عربی یا این فمیدین نکوست و اما جنس البول که سبب التهاب مثانه باشد
 حاد و اعراض او شدت است بحدی که بعد از توهم او و جع غلیظی در نواحی مثانه و کم بهر سبب
 و در حین دفع بول زوری بعلیل نشیند و از فشار مثانه دفع گشته و باید باشد که درم از
 صفای سرات نموده و عسل را هلاک نماید و سبب التهاب و ضرب و سخته و از در مثانه است و هم

H

و سبب باشد که در سوزنک و در مجرای بول یا در بواسیر در غمضه شرح بشانه سرات نموده شود
 توهم او گردد و در حسم از حقنه باد و در مرض سوزنک باشد توهم سازه مثانه را و کاهی از فروتن
 بآب سرد و فقه همکام حرارت بدن این علت عارض شود و اما علاج باید ضد التهاب عمل نموده
 و بر عجان و اطراف مثانه زدن نشانه و از مشروبات لعاب بزرگ مصل فرموده هم استعمال
 بعضی از مخدرات مانند افیون و مرفون و نیز بسنج و بنکاب نافع و کلل نیکوست و در بعض
 و آنجا که سبب درم مذکور مرض بواسیر باشد باید باطراف مقعد را باده واده و در بعضی سبب سرات
 و در این قسم جنس البول انداختن کشته تر بسیار مصل است پس باید و اولی آنست که در مثانه و لبعه
 و کلل و سبب ترانه پخته درم بکار دارند مثانه بول بخشد و الا لا بدند در استعمال کشته تر
 که از صمغ الا سبتیک ترب نموده باشند و هرگاه کشته تر باشد و بول نکشاید و هم کشته
 باشد باید از بار موضع مثانه تر و کار مخصوصی فرود برده و با عانت او مثانه را از بول خالی
 سازند و اما جنس البول که سبب تشنج مثانه باشد عارض شود و انحصاری را که مرض بالینو یا در
 و زنان صاحب خستاق رحم را هم از افراط در شرب آحتیانه این علت هم رسد و هم باشد که از در
 معوی تشنجی در مثانه بهر سبب و موثر جنس البول شود و این قسم از جنس البول چنان است
 که بعضی اوقات بول بالمره جنس و کاهی خوبست و اما علاج باید ضدای مرتب از با بونه بر صمغ
 مثانه انداخته و در آنجا جلوس نموده و قدری افیون بار و غن با دام ساییده و زمار و طر
 شرح باید و از انقباض و فقه نموده و از مشروبات بود و او را با فمیدین و شیر با دام میل فراید
 و آنجا که سبب تشنج او چنان بدن باشد باید معرقی از کافور و امونیاک و غیره استعمال
 نمایند و چون سبب این علت گرم شد و در بناسب بد و باید بکار داشت و در این قسم جنس البول
 از معالجات ترانه پخته که در دفع مرض خواهد کرد و بدندرت حبش یا از انقباض کشته تر میشود و کار
 سبب جنس البول حاده مثانه یا انداختن حیوانی باشد و مجرای بول باید بقاعده ذکر خواهد
 عفر سبتک مثانه را برون کنند و چون در مجرای باشد در صورت امکان مجرای شکافته
 و برون آورند و الا مصلی فرود برده و حضا تر باشد و حجت داده انچه بواسطه عمل نک

از خالی شدن مثانه از بول با عانت زود کار و این عمل در صورتی باید کار داشت که بول در حین
 خوراک و عانت و صدمه و کشته تر باشد و متعجب نگردد و مثانه بخدی غشلی شده باشد که خوف
 او و هلاکت هر سه و در احاطه این عمل را به خود نموده اند که از معاینه مستقیم مثانه زود کار فرود
 ثانی از فوق عانت ناشی از عجان و لذت تجارب یافته اند که از فوق زار عمل نمودن اسلم و خوشی مراد
 و بیکوئی اصلاح باید بنا علی و تکلیف این قسم از شتاب و قسم اخیر را متروک نموده اند و طریق
 عمل را نیست که ببلد اگر کسی شنیده و نمانی از خلف او تجربه داده و با دوست می کارد
 گرفته و مثانه را بر فراز انداخته و زود کار می نموی موم غلظت را با هم می کارد و از اختراع
 بکره یقینی که حدش بوی علی باشد و موضع مثانه زود کار و بزرگ صبیح در فوق قاتا ادا
 نمایند در و در جوف مثانه و بعد شش و در پس کشیده و بول ادا باقی گذارند از جوف اول
 دفع و مثانه خالی گردد و بول بزرگ را با بید چند روز در مثانه باقی گذارند و در جوف اول بول بقی
 صفای منقب نگردد و دیگر آنکه فرصت باشد طبعی در کردن مجرای بول و بجهت این که از
 لوله مذکور صدمه در مثانه وارد نیاید لوله دیگری که در سر او که است اختراع نموده و جوف
 آن لوله نصب کرده و را در پند تا آنکه درین چند روز طبعیت مجری را وسیع سازد و با آنکه در
 موضع لوله مذکور سوری عمل آید و لیسیل را بر او است بریم آمدن اطراف لوله هم لازمست
 بندی بر بسته لوله بسته و بکر استوار سازند که با لوله از مثانه خارج و بول بصفاق
 منقب و علی الاکمال سازد و فصل آلت از آنست در طریق بیرون آوردن چنین از جوف مذکور
 و خواه مرده و این عمل را یک سیون بر او این نماید اندک آنکه چون زنی را حوضه بخدی متی
 باشد که جبین را بهیچ وجه از جوف خاندن و نه با آنبر توان بیرون آورد و در بواسطه از خوف
 هلاکت باید عمل بهیچ وجه دیگر آنکه هرگاه زنی بعد از آنکه ششم حش فوف شود در هماندم باید
 درین عمل مغلطه بیرون آرد و چون از اعمال با خطر در اغلب مملکت است لهذا نباید این عمل نمود
 که هنگام وجوب اگر چه در نایب حکما ثبت نموده اند که زنی را چند وقت این عمل نموده و در
 و چون وضع عمل را به هنگام است باید این عمل را نمایند که در هنگام سیم که ببلد را و صبی
 عارض شود بجهت توفیق چنین و الا فی که لازمست از آنکه اینها بجهت این عمل موضع مذکور

پی

و سیل بسیار وارد و آلات سده و خون و چند قطعه سفید و آب گرم و سرد و لنگ و چند لوله
 بار لسان بجهت بخیه زدن و هم نمانی باید که از ظاهر رحم انقباض را از شکاف موضع غلظه رود
 نگردد و این عمل را بجهت هم گام باید تمام نمود و لنگاشتن بر اقی ثانی شکاف رحم ثالث خارج
 ساقش و پنجم را بهیچ نمونند اما در مسکام اولی عامل بکره منقبی و در یکجانب خطافش
 که در وسط لطن واقع است محاذی بسره قدری منحرف بجانب منقبی و عضله را از یکجانب
 تا فوق زار انگاه اصبع خلیف موضع منقب مناد و فشار از باریق قطع شده و در رحم ظاهر شود با کوبی
 لون و بعد از آنکه بیرون رود زنده نمانی که در جوف دست خارج شود و نوقت اصبعی فرو برد
 و با موضع مقدار شش اصبع مضموم رحم را شکافه خن را خارج ساخته و بول السره را بسته
 و با انقباض خوراک و قدری تا بل نموده انگاه اگر گفت با سره خنم خارج سازند و الا دست
 و او را بیرون آورده و با انقباض آب بجهت جوف رحم شست و شوی نموده و از ظاهر موضع
 با لنگ تا جبهه که دیده و خون نیاید و بعد از این اعمال موضع مجروح از مراقب زنده نگردد و در
 زار انقباض کو چکی از بانی گذارند تا اگر ماده حاصل شود تواند دفع کرد و انگاه مشمع و اطلون
 مجروح را زار نموده و با طر افش زار نشاند و از مشربات کل مل فرمایند و در زنده نگذا
 حکمت بردشت اما اکثر زمان بعد از این عمل از تورم صفای پاک می شوند فصل ساس
 در بان جناس و اجتماع دم در این مجروح و محاق طلق که تازه شود که دیده باشد و این در این
 کشف و با هم نماند و اندک در بعضی اطفال بعد از تولد دلی لین و متموج و محدود و در کی تخفین
 و بنا در جبهه و نموده ظاهر کرد که بعد از شکاف می نمجد در جوف و جناس است و مستعد او
 شلخت نقد زنی تا خرم مرغ و اگر چه بعد از تولد کی از ظاهر است و لکن در اندک زمانی عظم بهر
 و در دل مذکور تحلیلی نمی شود که بنا در رحم در او حاصل و منفرج گردد و بعضی باشد که صلب شده بعد از
 چند تحلیلی رود و سبب این علت ظاهر است اگر چه بعضی از حکما گفته اند که هرگاه از مصوبت وضع عمل
 صدمه و مضطرب را اسفل طفل وارد آمد مرث حدوث این دل خواهد شد و لکن خلاف است و باید
 تیز و از این علت از رفق و باغ چون باشد که صلابتی و باغ بهر سبب بخدی از لمس ادرک نماید
 که نقیض است و باغ قوی نموده و لکن خلاف است نقیض نیست و باغ قوی نموده و بجهت تیز

بالله عظیمی در هم
 در صورتی که درم و حرمت ظاهر شود

که در صورت حدوث مده و مفصل علیل را حسی عارض شود و ما قشر بر و سه مفصل و دو جبهه باشد
 بخلاف آنکه در استقامت مفصل ثقلی عظیم در موضع علت برسد بدون هیچ و قشر بر و حسی و با
 بر اینست که سالها طول کشد منفر که در او سبب این مرض ضرب و منقطع و او در مفصل است
 و لکن اغلب اوقات تا شرب و دت خارج مفصل در راجع افرس و در موضع شربس صورت استقامی او
 و علاج او مانند است که در استقامی که سینه پیدا کرده اند ایم از اینست که مکرر در ابتدا از لو
 نش نده و عضو علیل را آرام داشته و از شرب و بات خند نوبت مسلی مرتب از کل جلیب است
 کلی و تک فرنی در چنین مسیل فرموده و انفع است که شمع زار ریح بقوق و اطراف مفصل
 علیل انداخته بدینوسیله مانی داده از و باید و بعضی از معالجه موضع علت را داغ نموده و نفی کلی
 حاصل شده و هم استعمال شمع مرتب از اشق و سر که عضل قوی عمل و استحکام باب
 معدن کو که بسیار نافع در دفع این مرض است و هرگاه با وجود معالجات و دهر نکرده و دفع
 مرض نکرده و باید از کار مفصل فرود نهد و رطوبت منجمه خوف او را خالی ساخته و قدری است
 در و بریزند بن قسم که بکشد و در و دو تا سس بکشد و هم آب چار و هم حل نموده و بخوبی مفصل
 بریزند و باید با مایه المهره عضو موف را آرام دارند و چون نسبتی عظیم او را عارض شود
 باید از لو نش نده و از شرب و بات او را منجمه مسیل فرمایند و لکن اگر از ابتدا ظهور مرض وقت
 نموده و از معالجات و دهر نکرده و انفع است که شمع زار ریح بقوق و اطراف مفصل
 در پان مرض اید و سفال و ام البصیان نیز مانند او عبارت از اجتماع رطوبتی در جو
 ام الرقیق و داغ که بدینوسیله در و از او از یکد که متفرق شوند و هم باشد که در غشای سرنی و حسی
 از جمیع باطنی که آمده و دفره از یکد که حد است از که او را بسپینگی فید نمایند یعنی انقباض
 و در بعضی اوقات از درم هم با و در و بر و بی بر سحاق باشد که در می مراد او را عارض شود شبیه با و در
 بعد از تفر او علاج چنانست که سابق در باب درم سحاق ذکر شده و باید که همگام املا سرنه و داغ
 از رطوبت جمیع و در و از او از یکد که متفرق بطون و جادیف او عظم شوند و این حالت در بعضی
 خلقی است و همگام اجتماع رطوبت در سرنه و حسی از جمیع باشد و دیگر که کان عارض موضع
 علت از یکد که متفرق و مفصل و غشای این جمعی از موضع فن نموده و در صورتیکه موضع

نخاع

اید و سفال صدمه و ضربه و آید علیل را غشی عارض شود و چون به موضع منجمه رطوبت
 سرنه جمعی صدمه و ضربه و آید اعضای با و در و مفلوج و از کار رسد و در اغلب
 لاکت شوند و اما علاج باید او را منجمه و محسسه میل فرموده و اگر چه نیکو می نماید که با غایت
 تر و کار رطوبت منجمه را دفع نمود و لکن از تجارب دیده شده که بعد از انقباض خند نو
 علیل را تشنج عارض و هلاک کرده است لهذا جایز نیست و همگامیکه بوسیله رطوبت
 کان عارض از یکد که متفرق و غشیه او شق نموده باشند باید از نقره التي خوف تر
 نموده و موضع منقبض را در و نهاده و چند ناز صحت محفوظ ماند فصل رابع
 در بیان جنس رطوبت با ریم در غشای جنب با یکد که محط قلب و این علت یا قیحه ذات است
 و با و درم که قلب است که بوسیله نورم انهار رطوبت بعدی نشتر نماید که قلب را به از غل غل
 باز دارد و در این حالت بعضی از احاطان بواسطه نزو کار رطوبت منجمه را خوا و در جنب و خوا
 در کینه قلب خارج ساخته و لکن جمیع هلاک کرده و بدینوسیله السلام آن است که او را منجمه
 و محله استعمال فرمایند شاید که تخلیل شود و هرگاه از درم غشیه ذکر کرده بی منفرج و شمع
 که در و در کینه جنب قلب از دو حال خارج خواهد بود یا آنکه در صورت امکان طبیعت از از
 موضع دفع سازد و یا آنکه در اطراف و منکون ساخته و در جوف او حبس نماید و در بعضی
 دیده شد که از ریم که کینه جنب می مانده بدون ادیتی و لکن بعد از این غشلات مستطیل
 طبیعت مجری بنا نموده و در خارج ساخته و علیل نجات یافته و بدینوسیله بعضی احاطان نزو
 از این منسلع فرود بر و دوسه او داده را خارج ساخته اند اما بهتر است که طبیعت
 که از ریم با خود بر مسیل بظا هر دو در این اصلاع در می ظاهر شود انگاه با مشرطی او را
 کتوده نماید و دفع شود فصل خامس در بیان استقامی زنی بطن و سببقتین اما
 استقامی زنی با چنان است که در جمیع اجزای بطن و یا در موضع مخصوصی از
 دارد و در انات باشد که یکی از قهقهه که در حالت طبیعتی بقدر زده باشد عظم سببقتین است که
 فضای بطن را منقبض سازد و باید دانست که عمل بدین مرض نفی صلا دارد و بلکه
 خندی پس از عمل نیکو و مجدد خود خواهد نمود لهذا چند ماه موت او را میتوان توجی

در سببقتین مح

از احوال و در احوال است که در بعضی وقتها باشد از عمل به عنوان آنجا است
 زنده نگاه داشت بر یک در سالی که در وقت رطوبت را خارج سازند و در استغفار بی
 استغفار است که از جمیع معالجات نریزید و در وقت رطوبت خفیه باشد که عمل
 شود و از آنرا زایل نمودن اما موضع عمل به غلطه و غلطه است که از سر بخاطر مرض خود
 باشد که موازی صبح مفهومی در تحت ناف و در این خط بعضی واقع در وسط بطن است
 فرو برد و آنرا نیکه و در آنجا بجهت عمل لازم است و دو سه سال طول و آنست که سومین روز کار
 و شمع و اخیون و آب سرد برای نوشیدن و مایه که برای نروکار با او کشاید
 شده و در هر سه و طریق عمل بین خواب است که دو سه سال طولی که از جانب اعلی و در کار
 از جانب اعلی بطن تقاطع نموده و از طرفین بدو ناپس برده و عامل نروکار را بعضی بخار
 که قبضه او کف و صبیح باید بروی او که داشته باشد نگاه موضع مذکور فرو برد
 و نشین او را پس کشیده و از رطوبت از جوف لوله خارج شود و در دو سه سال از طرفین
 کشند و اگر لوله نروکار از روده یا غیر او رسد و در شود و امیل کشاید و رطوبت را باید
 یکده خارج ساخت بلکه باید بر در و تانی و هم باید بالمره در کتوبت ابرافه و بلکه قدری
 باقی گذارده و میل را کشیده و در وقت آلوده شمع و اخیون صلب و از موضع او رسد
 و با دستمالی بطن را محکم بکشد که بعد از معالجتی فستق نماید و با آنکه در بطن نروکار رسد و آن
 در استغفار بیضت عمل نیز بخور است و رطوبت مذکور و غلطه و اثر القون و بعد از عمل
 بخور است با بطن را محکم است و هم باید دانست که چون این علت موضعی است سرعت بخور
 نخواهد نمود مثل استغفار زرقی و در بعضی اوقات مشاهده شد که تخمی در یکی از بیضتین
 عظمی برساند که میل را منقبض ساخته و در این صورت بخور از عمل نروکار فرو برده
 و رطوبت او را خارج ساخته نگاه میلی از صغیر لایحه بک زرب داده فرو برده و بعد از
 در می بیند عارض مرض اصلی علاج پذیر باشد و فصل ساس در بیان قله الماء و
 عبارت است از اجتماع رطوبت در فضای کیمه سوزی و بیاض و این علت را
 از درم صغیر آفتاب عرض است از مرض دیگر مانند استغفار و غیره باشد که از کزیدن جادوی

اما درم صغیر

بر وجهی

با درم صغیر صغیر مستح شود و هم بعضی بثورات مانند جرب و غیره بواسطه رطوبت
 باطلند که صغیر را مستح سازند و علاج این علت از الامراض اصلی است و در حکم دانا هرگز
 نشود فیصل الماء به صغیر و از علامات قبل الماء است عظمی صغیر که از جانب اعلی با غلیظ
 تا رسد به غلظه بطن و قاعه چنان است که وجع با او نباشد و در او رقیق متصل بطن
 مانند آنکه در مرض فستق و قاعه و بسته بکثرت و قلت رطوبت است و لون جلد فوق او اسج
 قشقرق می شود و چون پس نماید مسک و از دیدن عظمی برساند و در صورتی که در او غلیظ باشد
 به غلظت جات علت را از فوق و خلف میتوان پس نمود و از پس او وجع و حالت خاصی
 در دو موضع که یک باشد هرگاه خلف او روشنایی برانند از جانب دیگر شعاع او را
 کرد و لکن شود که این علت غلطه و صفاتی در عظمی صغیر هم رسد که باغ آید شعاع
 و باشد که از شدت مرض جلد قشقرق نماید بعدی که از و هیچ باقی و ظاهر نباشد
 که در لولی که چاک و سم شود که نقه با این صفات و بطن و سرز صغیر و در کزیده و در من
 ایستادن رطوبت صفات از بطن یک سوزی صغیر صغیر و او اعلی ساس و چون او را
 بخور باید موضع خود معالجت نماید این حالت را قبل الماء خلقی نماید و چون این علت شود
 که مشبه شود با بعضی از امراض مانند فستق و درم صغیر که بعضی علامات بخت نیز آنها را
 که در کزنده از غلظه این فستق و قبل الماء

فستق	قبل الماء
از جانب اعلی به اعلی نوسباید	بخلاف از اعلی با غلیظی است
صاحب قعی است متصل بطن	قعی ندارد
از قریع صدای طلی سمع میشود	از قریع صورت زرقی در
دفعی با این قبل الماء و سرطان صغیر با این علامات باید نمود از آنجمله	
سرطان	قبل الماء
لون صغیر شفاف ندارد	بخلاف شفاف است
در کزنده از باد	نسبت به واضح است

لین بشره کاسه و باخته
 و فرق این قیل الماء و دوم پخته را بجماعی که سابق در کتاب اول جراحی در باب دوم
 ذکر نموده ایم باید نمود اما سبب این علت غلبه جلول و لکن در غلظت و شیخ از غلبه و غلظت
 دارد در پخته و کانی شیخ القاب پخته قبل الماء است و اما علاج این مرض را بدو نحو می نمایند
 یکی آنکه چندی غلیظ از این مرض را بنده یکی آنکه معالجه اصلی می نماید قسم اولی را در بران
 و بعد از آن ضعیف را بخانی که که بعدی غلظت را بنده که عمل بر نمودن در خوف است و در شیخ
 جلا برض سل اند باید نمود که با تر و کار بعد از تر وادان موضع پخته را خارج سازد و اگر از
 پخته را باقی نماند و الا فاعده آن است در جانب مؤخر بقوف قرار داشته باشد بعد از آن
 تر و کار را فرو برند تا حس غلظت را بنده انگاه پیش او را پس کشیده و در طوبت را خارج ساخته و مل
 تر و کار را بر در بسته و موضع او قدری مشتق و غلیظ بنده اگر بعد از این عمل چندی مرض
 خود را حس نمود و لکن بنادریده شده که بعد از این گونه عمل التهابی در اجزای که بهر سبب در
 از اصل دفع کرده است و اما علاج اصلی این مرض از او به شیخ با عمل می باید نمود
 در افعال ضعیف که نادره به غلظت قبلا شده باشند باید مقی میل فرموده با سبب از لکن در
 نوشته و از عرق و نوشادر روزی چند نوبت موضع علت را در لک باید و با طرف پخته
 زار را از اندام داده دفع و در طوبت تکبیل شود و اگر نشاید در عمل بر نمودن و در این علت
 چند نخ عمل بر نمودن از چنانچه مقتضی که که رکوف و در طوبت را خارج می کنند دیگر است
 کشاف و غلظت از سر زایل قطع و از آن نمودن دیگر است حقه نمودن که در کار دیگر است
 خوشن نهادن اما عمل تقسیم اول باید غلیظ را خوبانند و ناپی از خلف پخته را گرفته و بنده سار
 و حال انوضع را از جانب مقدم بقدر نیم صبح ایهام چاک داده انگاه با مضع محذب بند است
 اصبع شگافه تا رسیدن به سر مستقی و بعد بعد است اصبع با مضع از فوق و با دو
 قدری شکاف و بعد از دفع در طوبت قدری فیه مخلوج آلوده بر و غنی موضع لوف و بر بند و نظر
 باشند از این عمل تا بلی کانی بر وید و کینه را بجرم پخته ملحق سازند و قضای او بعد
 شود و از انجا که سبب غلیظ را بجرم غلیظ شده باشد باید با مضع قدری از او را برداشته و

بنا

باشند تا به نشتن انعام پذیرد در مدت شش هفته و باید از روز دوم عمل الی بعد هفته جاری
 با الفعل بکار داشت تا طبعیت را در تولید نه لغات نموده باشند و در صورتیکه بعد از عمل التهاب
 و وجهی شد به عارض شود از خوف سرات او بعضی با واسطه مشارکت و غنیت لازم است
 که بدون آن عمل زلوشا بنده و کل چند نوبت میل فرموده و از دهن زین را وی تریخ نمایند
 انوضع را و اما عمل بدقیسم ثالث که بهترین اقسام و اسلم التهاب است انست که با عانت تر و
 در طوبت را خارج دزدک موضع او قدری شراب سرخ بریزند تا قلی سازد و عمل غلیظ
 شده از در طوبت را و پنج شش دقیقه را داده و بعد خالی ساخته و موضع او مشتق
 به بنده بعد از یک روز معلوم خواهد شد که کافی است یا نه اگر بعد کفایت سرز مستقی
 نمودم نکردید به شد باید قیانی شراب نوشیده و قدری حرکت نموده تا درم زیاد شود و
 زایل و هرگاه درم زیاد باشد بالمره باید از حرکات مانع آیند و آرام یابند و در بعضی از شدت
 در طوبت شراب کفایت نمی نماید و در این صورت باید این دو با خوف پخته بریزند و آن که بهر
 آب است درم هم برود و پو طاس یک درم به خالص ده کندم مخلوط نموده بعد از آن
 در طوبت با آب دزدک بخوف سرز مستقی بریزند و اما عمل رابع این است که اول تر و کار
 بر پخته فرو برده و در طوبت بنده در کینه را خارج سازند تا غنی در کینه مذکور بهر سبب نگاه
 سوزنی بر دهشتی بکاف از میل تر و کار فرو برده از دیگر طرف بیرون آورده و چند بار
 بد کشیده و میل را بر داشته و از ظاهر بیابانها گرفته نموده تا مدت هشت یا ده روز را داده
 و در بیابانها را بردارند که داده آمده و بدین واسطه رفع علت خواهد شد و در بعضی اوقات به شد که چنان
 مرض قیل الماء عارض شود در این صورت اعراض بالک که مستطاب که بعد از رجعت معاً مفتوق بطین علامت قیل الماء محسوس
 مفتوق بالمره بطین رجوع نموده است باب ثانی از منف الا ثانی در بیان حصاة مشائیه قیام
 و اسباب و علامات و علاج او مشتمل است بر پنج فصل فصل اول در بیان حصاة و علامت و قیام و اسباب
 و اسباب آنها باید دانست که چنانچه در کتاب شرح بیان نموده ایم بعضی علاج غلظت در بول
 غلیظ که اگر علاج مذکور زیاد شود چنانچه در حیات بابسی از سبب طوبت بول
 غلیظ شود و یا بهر دو سبب اصلی و آنکه علاج غلیظ را ب سبب غلیظ بر کینه بالمره از بول غلیظ

در این وقت با تر و کار و طوبت
 در کینه سرزی پخته را نباید
 نمود مگر چنانکه میکده خاطر جمع باشد
 که معاد ۳

اورا سبب نامند و آنکه اجزای این عسل یکدیگر ملحق شوند و احصای آنها در هر یک
 سنگ مغزی است که اغلب از یکدیگر بواسطه حالت بشت نباید و در اینجا علاج بروی او در وقت
 ملحق و مجرب بهر سبب نامند بیازی که او را طبقات است پس هر یک سنگ را اصلی است
 برزکی عدسی که از یکدیگر بشتانند و در اینجا علاج مجرای بول و از اینجا بشتانند داخل و خارج
 او از علاج محسوس در بول طبقات متصل و ملحق و منفرجه و سنگ شانه بوجود آمده و اصل
 این سنگ اغلب یکی و در بعضی دو باشد و آنه همیشه و ماده این سنگ شانه مختلف است
 به اختلاف بنابر این سنگ موجود در شانه یا از ترشی بول که در کتاب تشریح ذکر شد بر عمل میاید
 و یا از ترشی بول و نوشت در و یا از اکسالات و شوکه عبارت از ترشی است که در بعضی از آنها
 هم یافت میشود که در ترک در پوست با آنکه غلو ط و یا از ترشی فسفوری با آنکه و بناشیر
 و یا از علاج موم بکانت کسید حاصل میشود و آنرا شکل و هیات دلون اجازت مختلف است
 بعضی صلب و بعضی دان دادان و بعضی بسان ریگی و بعضی مانند کلوخ و بعضی شکسته
 و سطح ظاهر هر یک از آنها با صاف و یا تکه دار و بعضی توفی شکل و چون از وسط بزرگند
 و یا از صاحب قوری باشند بروی هم افتاده و بنا در حرم او مساوی است و در دلون
 اغلب با اینر با سود یا بنفشه یا بنجر میباشد اما منفر سنگ که منفر از ترشی بول وجود
 می آید اثر اللون و سطح خاخان مساوی و چون از وسط بزرگند صاحب قشر باشند و در
 تمام صلب و نه لقی است اما سنگی که از اکسالات ده شود بعل می آید همیشه ناسورا و
 قوت و آنون و در دلون بابل مباد است و سنگی که از آنکه و بناشیر بوجود آید اینر اللون
 و شکسته و در بعضی مجرای رفاوت دارد که با ده انگشت خود کردن شان مکن و لکن در
 اغلب جان است که ماده و اصلی اجازت مساوی ماده خارجی آنهاست و در شکل مختلف اند
 بعضی مدور و در بعضی منحنی شکل و بعضی از آنها وسط و قسیمی و طرفین ضخیم و درین آنها
 ازینها شش حال مکن و در عدد اغلب فرد و بنا در زوج یا سه و چهار است و در
 که چون چند سنگ در شانه باشد جانب مانی آنها یکدیگر بواسطه اصطکاک صاف خواهد بود
 بعد از عمل به و در زوج یکی از آنهاست به حیوان حکم نمود بر این که سنگی دیگر

وینچه

در شانه باقی است و بنا با اختلاف منفرجه شام یافته در صفا یکدیگر و حاسین و شانه و موی
 و سبب سنگ شانه این است که چون در کودیم در بول بعضی علاج غلو ط و علاج مکرر غلو ط
 حروفست و طبقات را بشتانند بنا علی ذلک از مدومت در استعمال این دو چیز سنگ شانه
 حاصل شود و ازین باب است که اشخاصی که ترشی زیاد می خورد سنگ شانه مستلک در موم
 بعضی غلو ط که خون ترش از آنها متولد میگردد و سنگ از آنها بوجود آید و همچنین است مدومت اصل
 اغذیه حیوانی که مورت از دواترشی بول می شود سنگ از آنها حاصل گردد و دوم باشد که بطورانی
 در کجا فواده این علت باشد چنانچه دیده شده که دوسه را در صاحب سنگ بوده اند و هم ازین
 شی خارجی بر شانه مورت که بون سنگ میشود و هم دیده شده که صاحبان مرض منفر سنگ
 بهر سبب اند و این علت در صفت ذکر میش از ان است که در انات و لند چون سنگی در آنها
 حاصل شود بواسطه صفت مجری بیرون آمده و می اند که ترک و مورت از آنکه در مکر بنا در صفتانی
 از باب تانی در تفرع ل و این غلط شانی است اجازت صغیر را که بسان سه و یک با بول خارج
 میشوند و لون ایشان و از ترشی بول موجود شوند و یا ایل بیواد و خضرت است و از آنکه درین
 بعل آمده و یا بعضی از علاج آنکه حاصل شده اما علامات و اعراض ل مختلف است در
 صدد او غری و کاهی بواسطه او جمعی صعب در کلیه بهر سبب با عسل بول و در اغلب سواد
 دارند و یا در حوضت صدد یا صاحبان این علت هم است و اما علاج چون وجع با عسل بول
 شود باید به طرف کلیه حامت و از شانس حازه بزن و در آه جاز جلوس نموده و از ادویه
 افیون میل فرمایند و در بعضی از خوش کشیدن با طرف صلب نفی کلی صاحبان ان مرض
 حاصل شده و از اینجا که رل از ترشی بول با از اکسالات و شو حاصل شده باشد استعمال
 ملح نظرون و آب معدن ترشی که نمک نظرون در او محلول است بسیار نافع و چون از شرب آنها
 ترشی بول نموده هم حوضه صدد رفع میگردد و بالعکس چون رل از آنکه بهر سبب باشد
 باید حوضات بکار داشت و هرگاه در علاج یقین نباشد قسم و ترک ل لازمست که معالجه
 یک قسم از آنها احتیاط نماید اگر نفی نموده و معالجه استام بجای آرد و اگر نفی حاصل نگردد
 ترک و معالجه قسم دیگر از رل پیش گیرند چنانچه اولاد و یا طبای استعمال نماید هرگاه بخواهد

بول

۲۲
 بول زیاد شود و لیست بر آنکه این قسم معاینه نافع نیست و چون غلبه دل از زنی حاصل
 کند اسلم است که در این آستانه و دودنه طبایعی کار دارند که نافع نباشد و گشتن فرمایند
 فصل اول از بابی در بیان حصاد و شکل است بر دو طرز اولی در تعریف و ماده و شکل
 حصاده مثانی و طریقی که در این اسلم این سنگ اغلب از یکدیگر باطله حاصل می شود و دارد
 و در اینجا علاج بول با طرف او قطع و منجر گردد و بسیار در خود مشاهده سنگی متکون شود و عوارض
 این غلبه بتاریفات گیت و وضع و حدود و سطح و خارج سنگ مختلف است و اغلب در مشاهده
 یک سنگ بعضی شکلی که طریقی او عرض باشد متکون میسر گردد و سطح خارجش صاف یا تراشیده باشد
 و چون در مشاهده پیش از یکی سنگ هم میسر باشد تراشیده است و اگر حصاده در مشاهده شش
 مستقر نیست و حرکت میسر نماید و لکن باشد که در موضعی قرار گیرد بدون آن حرکت تواند نمود و این
 حالت از دو قسم خارج نیست یا چنان است که یکجا از حصاده در عینی مشاهده قرار گیرد و جانب دیگر
 در خود مشاهده باشد و بدین طرز حرکت تواند نمود و با آنکه حصاده در گوشه از مشاهده مجرد و متفرقی از یک
 باشد و در اینجا ممکن گردد بدون حرکت و اگر علامات و عوارضات لازم حصاده بتاریفات خاص
 مختلف است و لکن در اغلب طریقی احساس ثقل و وضعی در موضع مشاهده نماید و باطله خفیه خود را چنان
 این علت به شش قبضه خود دارد و در آنکه در یک شش و وجه از بیماری و صفت او را از باطن میسر نماید و از هر
 بول یعنی خارج شود که بدین طرز مشاهده گردد و به سوزنک و از بول نمودن و وجه مشاهده به سوزنک و در وی
 به طریقی نشیند و باشد که در بین او از نمودن بول قطع شود و تا تعبیر در وضع مذکور بول نیاید و علاقه
 بر آنها زوری بعد نشیند و یکدیگر بدین و به طرز پیش و خروج مقدار اغلب با صاحبان این علت میسر
 باشد و همچنین احساس نماید که بعضی بر ترقع و بالا کشیده شده اند و در صورتی که علت بطول
 انجامیده باشد مشاهده نمودم و بول به طریقی غلبه دفع و خواب از طریقی منقطع و بلاخره در قسم نقصان
 روی داده و از حسی دقایق پاک شود و وضع است که حصاده مثانی هر چه غلبه و بیماری است عوارض
 او است خواهد بود و هرگاه در عینی مشاهده مستقر باشد عوارضات غلبه از او ظهور خواهد کرد و سبب تمام
 باشد که مشاهده متفرق و ناموسری را از او عارض شود و در انات بشود که سطح قوای میل متفرق گردد
 و حصاده مثانی از میل خارج شود و با وجود بر ظهور جمیع علامات و عوارضات مذکوره و تشخیص صحیح

بر وجهی

بر وجهی سنگ ثواب و ادوای آنکه با میل امتحان نمایند که از خوردن نوک و سنگ صدفی میسر شود
 و چون سنگی که چنان بعضی قوت و به طرز میل او را که میسر گردد لکن لازم است که اگر با قیام و بیات
 و اوضاع مختلف امتحان نمایند تا تشخیص تعیین حاصل شود و هم از این طریق میل مقدار غلبه سنگ را
 تخمین می توان استنباط نمود مانند آنکه هرگاه در مشاهده از جمیع جوان نوک میل حصاده را حرکت
 بتوان داد و لیست بر صغیر او و لکن از خوردن صمغی معالجه میسر می شود و بهر توان مقدار حصاده را
 نمود و اما علاج این علت بنا بر آنکه حکما در این عرض ادویه مختلفه از منضجات و منضجات و غیره بکار داشته
 و ادویه مذکور در داخل نموده و لکن در حصاده اثری نماند و بعضی حلقه و منضجاته از خارج مشاهده نماید
 بجهت حل نمودن سنگ و لکن خلاف است بجهت آنکه اگر ادویه مذکور ضعیف باشند قوت حل نمودن را دارند
 و اگر قوی باشند مشاهده اسرار و متفرج می سازند علی ذلک بعد از آنکه با قیام و جمیع معالجات
 هیچ باقی نیست مگر آنکه سنگ را از مشاهده به طرز سیاق و سبب و نموده و بدون آنکه از غلبه
 مشاهده از شکاف حصاده از خارج سازند اگر چه حکیم ابو القاسم در کتاب خود ذکر نموده و لکن از
 اعمالی است که تا به حکمی نماند می نمودم بهر که تیزن اختراع و سایر حکای فرایند تحصیل نموده اند و از وی
 حال در فوکه سنگان اغلب بدین قسم در صاحبان حصاده مثانی عمل می نمایند و بجهت عمل مذکور میلی
 منجمی میسوزند و سنگی که تریب داده اند و طرز مرتب و یکی دیگر را بر کوب است و در حین خوردن
 مشاهده می کنند و بعد از خوردن و در عین آنکه یکدیگر کشیده و حصاده از منشا خود گرفته و اعانت هر رخ
 با یک شش منکسرش می سازند و اما طریقی این عمل بدین خواست که به طرز بودی که می خواسته
 بقسمی که با ایشان خارج باشد و نیز که می نماید و عامل با این با پای او بسته اند و گشته
 تری مشاهده فرموده و اعانت از مشاهده از آب قلی ساخته و گشته از خارج و نوک قبضه
 گرفته که آب بیرون تواند آمد الحاحه میل سنگ شکن را بشانه داخل و با فشار و تمییز نموده و بعد
 با قیام حصاده بسیار کشیده و حرکت دهند تا او را که نمایند بدین که سنگ با این فشار میل آید
 و بعد از آنکه حکم کار دارند و هرگاه حصاده مذکور بدین باشد از فشار او منکسر خواهد گردید اما اگر
 صلابت و استحکام داشته باشد لازم است که بعد از استغفار حصاده با این فشار میل
 از خارج جایش بر نهند و میل منکسرش سازند و باید در حین جایش زدن میل را محکم نگاه دارند

بسیار از حد و اندازه و در آنجا که صفت در خواست این عمل منکر ساخت و بعد از این
 آوردن میل چند پاره که چک با سبب پروان آید و بعضی از و با بول منقطع شود و هرگاه
 صفا بعدی صلب باشد که شکسته نشود مانند صفا توفی شکل در این صورت لازم است که عمل
 بر شانه شکافه و پروان از نزد خود که غریب بان خود حسیم نمود و بعد از عمل مذکور ملل را بچند روز
 خوابانیده و از آن روز که هرگاه در می در شانه هم زبید فساد کرد و می هر او را فاض شود علاج
 او نموده و بعد از چند روز دیگر مجدداً ممکن است تکرار عمل و در هر صفا و مدت طول عمل بخت کسر
 صفا مختلف است بنا بر حسن ملل و باید پنج شش دقیقه زمان عمل پیش نباشد و در صورتیکه در
 فرو بردن اسباب بشانه آب بالمره پروان آمده باشد باید میل را خارج ساخت و مجدداً آب
 بشانه بریزد و کربس و از نوک میل و ضرر به چکش بشانه را با قوی عظیم رسد هرگاه این عمل را ملل
 شکافش بشانه موازنه نموده نیست و بهند اسلیم نماید و لیکن از تجارب دیده شده که با وجود در شانه
 تمام از این عمل پیش تلف شده اند که از عمل شکافش بجهت آنکه در شکستن بالمره صفا خارج نمی شود
 و در هر کجی هم از دور شانه باقی مانده و در علاج بول ملل افاده کرده و بجز که در عظیم
 بهر سانه صفا موجود شود و هم باشد که صفا ناموار در بین پروان آوردن و در بعضی از غیر
 بول فرو رود و پروان بسیار در این صورت هم لازم است که شکافه و پروان آورد و در عظیم
 که بعد از رفوت این عمل در شانه و در عظیم بهر سینه بعدی که ممکن نباشد که صفا شکاف
 باید شکافه پروان از نزد و ازین جهت است که اغلب شکاف عمل در شکافش را بر عمل شکستن ترجیح
 داده اند و عمل کسر صفا را نباید بکار داشت و در صورتیکه شانه بسیار رنگی احسن باشد و آنکه
 صفا بعدی صلب و سحکم باشد که قوت زیاد بخت کسر او بکار باید برد و دیگر در استقامتی که قوه
 ماسکه شانه مانده باشد تا آنکه قسمی که شوند آبی را که در ورجه اند کار لازم است که عمل را
 ترک نموده و شانه را شکافه صفا نش را خارج سازد و بعد از آن از فصل ثالث در بیان عمل
 و شکافش شانه و او عملی است که غده و ذی و عشق شانه را بعد از شکافه که در ملل از صفا
 خارج تواند نمود و خلاف هرگاه در یکدی و جی شده و او هم باشد از خوف که مبادا احداث دیگری
 در یکدی باقی یا آنکه منفر که در سبب این عمل نموده و دیگر آنکه اگر شانه متفرج باقی عمل بعدی ضعیف

برج

بعدی ضعیف باشد که قوی و کفایت عمل نمایند یا از تسبیح صفا جی و قوی عارض شده باشد چنانچه
 تامل نمود و بعد از آنکه پروان را شکافه عمل نمایند و چون قوی میل کافی و انسی مرل بر شانه باشد
 که یکدی و در ذی قلیل از غده نموده و در عمل بواسطه حسن بستنه امعاء را از فضول خالی سازند و آنکه
 در سبب که شانه را از موضع می توان شکافه و صفا را خارج ساخت اول از جان بسیار جانت ایراد
 از صفا است و قسم ثالث از فوق عظم فاعل هم اولی که اسلیم شوق و حاصل در بهر خوف او کمتر است
 او را عمل در طریقی مانند چون عشق شانه و در شکافه شود و آنانی که در این عمل مجروح میگردند اول جلد
 و کم واقع در تحت است ثانی چند عضله از جان ثالث قطعه عضلانی مجرای بول راجع غده و ذی
 خامس قطعه عشق از شانه و چون در کتاب تشریح مذکور شده ایم که صفاق باید موضع از شانه
 نیز سبب خوف نباید بود از مجروح گردیدن و از شتر این عظیم عا بر این موضع یکی شتر بان
 که در شتر عظم خا و ممکن است هرگاه بخت عمل نمایند البته اسلیمی بر و آورند و نباید و قطع کرد
 اما می شود که بعضی از شتر این در این محل خلاف عادت طبیعی عرضا ساکت باشند و این صورت
 البته با وجود احتیاط کامل مجروح و منقطع خواهند گردید و تا زمانی که مراعات باید نمود
 از عمل آنکه جان را از قوی و کفایت باک شانه و علیل بر روی کرسی مرتفع نشاند و بجز که در شانه
 قدری از کرسی شش آمده باشد و از عقب یکدیجه او قرار گرفته باشد و نگاه دوست و پای او را باند
 بسته و دو نایب که از بعد میل فرو برده و بنایب دیگر بسیار به قسمی که ختمای میل از خارج عمل
 این و نوک او در جوف شانه بجانب اسر واقع باشد و بین نایب پستین را مرتفع سازد تا آنکه
 جراحتی بر او وارو نیاید و اما هنگام ثانی از این عمل باید از او از وسط عاید شریح و هم از وسط قوس
 عاید بقضای ششین کما خلی و خلی دیگر از وسط شرح غنمای ششین فرض نموده و از این خط شلی حاصل می شود
 که از خط فوق او باید شکاف جلد را تا وسط سطح سطحی تحتانی شکافه نموده و چون از عظم خار
 بعدی هم بر شانه از خوف جراحت وارده بر شتر بان این خواهند بود و از حرکت اولی که با صفت
 شرط داده جلد و کم واقع در تحت او شکافه خواهد گردید و بعد هم چند تا از عضلات واقع در
 شکافه تا آنکه با ناخن اصبع بسیار میل را در آن نمایند آنکه از جانب دخی صبیح مذکور
 بشرط بعدی به استقامت قرب با نایل فرو برده و نایب میل را حکم نماید و در هر یک

لوق بشاد و از معارضه مستقیم بعدی هم رساند و بعد عامل شرط را از شیار میلادی بقدر امکان
 فرود برد و در مسکام راجع بایده و ذی و عشق مشانه را شکاف و بجهت این عمل حکای منظر و حکای
 فرزند طریقه دیگر از دندناوی بوضع از خارج بخل و فرزندوی با عانت میل پنهان از داخل غایت
 می کشاند اما حکای منبه با همان شرط بعد از شکافن قطعه عضلانی مجرای بول عمل متصل می
 آنکه جدای قریب سماج آید و قطع شدن غده و ذی انگاه عامل ملاحظه می نماید که ممکن است دخول
 صبیح بیاورد و اگر پیش از آنکه ممکن است حکم مبدی در خروج و از فرود بردن صبیح تعیین
 مجرای منضم می که در او است فرود و در حصاره اگر قریب پروان آید و اگر بقدر کفایت شکاف شده
 دخول صبیح ممکن نیست لازم است که با مشروط نموده و در وضع واده تا دخول منبر و خروج
 حصاره تسلل باشد و طریقه فرزندوی چنان است که بعد از شکافن قطعه عضلانی مجرای بول
 میل بسیار دارد خارج باشد و میل دیگر که در جوف او مشرعی پنهان است از موضع مجرای
 فرود برد و از حرکتی که خارج بدو می رسد مشروط پنهان از جوف میل پروان بسته غده و ذی
 و عشق مشانه را می کشاند و این آلت را بشکونی بران است که مراد در جانی است که در آنجا
 بنا بر سبب عیسی از صخره که در معین و جهان در جبهه قدرت می کشاند و لکن اگر میل مذکور را
 حکم گاه پیش از در جبهه مافوق آنچه لایق است استعمال ننوده باشد شریان جابجا باشد و این
 مستقیم منقطع و با آنکه قریب مشانه را مجرای زرد و خارج منضم مجرای مشانه در بعضی مصوبت دارد و باید
 ادلا صبیح بیاورد و اگر عامل فرود برد و بعد از آنکه در منبر مخصوص بوقف مشانه داخل باشد
 تا آنکه احساس نمایند بر خوردن انبر را بر انگاه صبیح را پروان آورده و انبر را کنده بجهت است
 هرگاه مجرای منظم عرضی خود با این انبر قرار گرفته باشد داده و چرخانیده در طرف دیگری که خروج او ممکن
 باشد گرفته و بعد از انبر را بدو زرد کرده اند تا برانند که مجرای از مشانه با حصاره گرفته شده باشد
 و بعد از آنکه در قی انبر را خلع می سازند و گاهی بعضی مواضع روی ده که پروان آوردن حصاره
 ممکن نباشد و در وضع غلظت خود حصاره دیگر متشنج گردیدن بلعقات مشانه و انجائی که مجرای منضم
 مستقر باشد که با انبر کشن او ممکن نگردد لازم است که ناپی از ظاهر موضع مشانه را بقیان
 با آنکه صبیحی بیاورد مستقیم فرود برد و حصاره را بر وضعی بار که بتوان افتد و در بعضی با انبر کش

میلادی صح

تبدیل

بنوان کثرت اگر چه وضع او نیکو نباشد و هرگاه وسعت پهن دو قطعه بسته انبر از خارج کثیر باشد و لکن
 در عظم مجرای منضم قطار در این صورت مجرای خروج و باید حرکت دهند که مجرای بتوانند پروان آورده و اگر مجرای منضم
 که هیچ در خروج او ممکن نگردد باید با عانت مشروط و سعی در موضع مجرای دهند تا مجرای بتوانند پروان آورده
 و هرگاه مشانه از تشنج اطراف مجرای حکم اعاده ننوده باشد بر عانت که قدری کثرت نموده و در موضع
 دلت نماید تا تشنج تسکین یابد و اگر حصاره در وضعی از تشنج مشانه مستقر باشد خواه جانب این و خواه آنبر این
 صورت خروج او صعب و متعسر است و چون کشودن انبر محال است لهذا باید ناپی از ظاهر انبر را بقیان
 و عامل با صبیح حصاره را از منفر خود حرکت دهد تا بتواند پروانش آورد و اگر حصاره حصاره در خونین باشد
 از بر خوردن اسباب منکسر گردد و در خروج او عامل را زحمت دهد و باید قطعات عظیم را از او با انبر و خورد
 او را با قاشق پروان آورده و هرگاه حصاره زیاد منکسر و خورد شده باشد مجرای خروج انبر را می صغارا و لازم است
 که با عانت آب زد و ک مشانه را شست و شوی نموده پاک سازد اسباب و علی که در این عمل ممکن است
 علیار روی و با سیلان دم و خروج متعده و تخلیج و غشی است و اما سیلان دم و طلب غایت
 می شود که بوی خوش مشانه ریخته شود و در صورتیکه شریان جابجا مجرای با منقطع گردیده باشد سیلان نشود
 و خبر هر سده و قاعده آن است که از قطع عروق بعد از عمل بلا فاصله سیلان دم عارض شود و لکن نبش
 شده است که ددالی شست بوم بعد از عمل سیلانی بهر سبب و اما بهترین علاج او اینست که نشانه را با
 سر آلوده و مبدوم موضع مجرای و اگر از تشنج سیلان خوف باشد می توان نشانه آلوده را با آب سرشته
 ز را زانداخت و هرگاه کفایت نماید از فرین علاج آنست که میل را که برانبر داشته و نشانه را با آب سرشته
 فرود برد که قوت باشد و بدینوسیله سیلان مسدود خواهد شد اما در اغلب این لازم خواهد بود که در و بیاید
 که از عمل جراحان نزرک باشد که بعضی از سیلان ملاک گردیده اند و اتفاق دیگر که در جن عمل شود
 بهر سبب جراحت داده بر معارضه مستقیم است و این حالت در صورتی بهر سبب که ناپی بلا پایان
 فشا داده و عامل با مشروط را از جبهه جانب معارضه که در شکاف نشانه و قی که عیسی زردی خود
 و این علت خود را ظاهر می سازد و بدینکه در جن اجابت صبیح بول از معده خارج با در مسکام بول
 نمودن ریح با آنکه باز از مجرای بول دفع شود و اغلب اوقات جراحت مذکوره با اندک استیام
 یا بر و نب در می شود که با سوری پهن مشانه و معارضه مستقیم عارض شود و در این صورت علاج او است

ان اما وضعی دارند

گرفته و از شیار بواصف مستقیم مانند اجزای جرح شده و باغات صبیح انبر انداخته صفا را گرفته
پردن آنند و بعد از اتمام عمل قیل و در موضع مجروح نهاده با قدری کنان او را پوشیده و در روز اول
عمل چند نوبت نماید و بعد تبدیل باید نمود بواسطه آلوده شدن او بر بول و چنانچه در بعضی از عمل
قبل از آنکه تبدیل نماید که بول نصف از مجری و نصف از جراحت خواهد آمد و در این وقت و درین
در چند روز جراحت مذکور تسکین پذیرد و از آنجایی که ممکن است ازین عمل بطور رسید جراحت
وارد و بر ضغای و تورم و پوستی کی از اسهال از موضع مجروح و قدری اطراف مشتانه بواسطه
انقباض بول و صحت او بنا علی ذالک چون این قسم عمل در آن خوف بیشتر است از قسم اولی
جراحان ممکن است بکاری دارند که حکام و جوب بلکه ترک او را اولی دانسته اند فصل رابع از باب
ثانی در بیان عمل خروج حصاة از انات چون از شرح مفهوم گردیده است که مجری بول اینها
تصغیر و بی انحنا دارد و در فوق سطح فوقانی بصل موازی نصف ابهام در تحت بطن و
و بسان حصاری است لهذا عمل و خروج حصاة و از آنها اسهل است که در ذکر و اما طریقه این
عمل آنست که علیل را خوبانیده و بصل شیار را بی از مجری بشانه فرو برده و بجز رسانیده و
لکه دارد دقیق در شیار بصل نهاده انحنا بجانب فوق قدری بابل یا نیز نام مسافت مجری را
و مسببی فرو برده و بجز رسانیده و صبیح و که در فوقی در شیار بصل نهاده انحنا بجانب فوق
قدری بابل یا نیز نام مسافت مجری را شکافه و صبیح فرو برده و هدایت او از عرف مشتانه
و اصل و مجری را نهاده خارج سازند و انحنا بلکه حصاة بخدی عظیم باشد که خروج او ثورت تألم پیدا
شد که در دو یا در خود و نمود قطعات او را پردن آورند و چون درین عمل از قطع شرابین شمرین بسلطان
عظیم روی خواهد داد بنا علی ذالک بخت است او باید که رسته را با مشوج آلوده و بر موضع مجروح
نهند و بعد از این چندی قطعه بول علیل را عارض شود و باید که جراحت را با سنگ جهم آلوده و
بعد از تسکین علت مذکور به بالذات از آن شود و بعضی از استادان علم جراحی که از عمل بدو اگر می دانند
در صاحبان این علت بدین نوع عمل میسازند که قدری استخوان حکم فشرده و فستق ازو ترنپ داده
و مجرای بول دوایند و چندی را داده که از رطوبت جهم اسفنجی زاده شده و مجری و صبیح گرد
و بدین واسطه حصاة بدون آلت و شکافن خارج گشته و لیکن این عمل را عیب است بکی که قول

و زمان بولی لازم ثانی آنکه قوه ماسکه مثانه علیلانی شود بحدی که ضرب بطور خود شود و ثبات آنکه در
 حیات عظیم باشد تا علم و صدمه او باشد از آن است که عمل بر او بعضی جز آن باشد که در صورت عظم
 از خوف آنکه بسا و اشکاف فوقی عمری کفایت خروج نماید لازم است که سطح تحتانی مجری را بر
 دلی این عمل قوت ضعیف عملی است بطوریکه اگر از عظم حیات فوقی مجری کفایت خروج
 از وراب و وسیع نمود تا مجری وسیع گردید و به سبب جبر خارج سازند و از طرف تحتانی
 عمل در شکاف مجاز نیست چون در حری سبب که بدین علت سبب بود و جانب فوق مجرای بول و در
 بدون ایلامی سبب عظمی از خارج با هم جسم باشد که از شکاف سطح تحتانی مجری با سبب
 میل و مجرای بول بر سبب بول بواسطه ثقبه که در آن است به سبب داخل و منقطع کرد و این از علی
 که ترک صاحب او را بر حیات مقدم است و لهذا اعتقاد بر این عمل احباب نموده اند فصل نهم در استقرا
 در استقرا یا فتن حیات مجری از استقرا یا فتن مجرای بول بدانکه هرگاه افتخار شیمی از او قصب مجرای
 بول فرود و با حیات مجری از استقرا در حین از دفع در موضعی از مواضع مجری استقرا و لیکن باید این
 غلات از بطن فرود از حیات مجری موضع علت باعث بول بلکه در بعضی حبس البول هم عارض شود و از
 عجان ادراک حیات یا شیمی خارج از بطن خود و از و ندن میل محسوس شود که در بعضی که از مجری
 میل بخارج شود و جهت علاج لازم است که حیات را برود و بواسطه انقباض و واکت مجری از استقرا
 اند و صورتیکه مستقر و لیکن گردیده باشد بحدی که بدین عمل خروج او ممکن نبود باید آنکه عمل بدین
 آرد و بواسطه پای از افوق مر حیات را بشارت که بالا نرود و بعد عامل سلی از مجری بداند تا در
 بنگاه از خارج مجری بواسطه مضع مستقیم ردی حیات و شکافه را بر بند مجر و بعد موضع مجر و
 وسیع باشد و با اینر حیات را اخذ و خارج سازند و بعد از اتمام عمل علیل را خواهند و از ام داشته و ذکر
 تا بار و علما نمایند مقاله ثالث از کتب ثانی در بیان تعبیر جرم الی از آلات بدن و وجود الی جدید
 غیر طبیعی و مثل است بر چهار باب باب اول در تعبیر نج و جرم الی از آلات و مثل است بر
 در فصل اما مقصد بدانکه تعبیر جرم الی از بدن با چند باروی است چند آن است که با وجود بر این حالت
 و این موضوع معتبر بحکم مزاج از حالت طبیعی خود منصرف گردد و حاصل در وی آن است که علما
 بدانکه موضع علت علیل را غنای می سازد مزاج را بر منصرف و فاسد گرداند فصل اول از باب

و اما انداز قسم اولی که از جنس سلیخه باشد ابتدا میستوان بر استعمال او بدین لایقه علاج نمود
و چون سلیخه را عظیم شده عمل بدلازم است قسم ثانی را علاج در بر بی نیست صلا و بجهت علاج قسم
که گوارا تر ازیزم باشد باید کمر طلای آما بار نمود و قطعه سربی بموضع علت بسته و از مشروبات
در تریال میل فرمایند و چون حقیقت بخاکل رسیده باشد آخرین علاج که عمل بر بی است عظیم و قطعه
که نمریان فوتی غده را که در کثوف نمود و در بندند و لکن اغلب از جراحان این عمل را نیکو نموده
و ترکیب نمی شوند و اما علاج قسم اولی که گوارا تر است فایک باشد باید بدو داد و بدینیه و اسفنج
و امثال آنها کار بندد و ابتدا باید در مشروبات استعمال نیز نمایند که دهنی از و تراب داده موضع
علت را و کمک و دهن نیز نمایند صفت دهنی نافع که نمرید خالص شش خود بدو بناس بمقتال کرد
کاوشش متعال مخلوط نموده بآلند و هرگاه دهن او کفایت ننمود بدو بناس از یک تا چهار خود
میل فرمایند و هرگاه از بسادت بدو عمل بر سر فاشک پای پی طش قلب و سهر و نزل اعضا و از این
غده و ضعف بدن و قوی تو زخم حاصل و عثه و از این بدین و غده و ظاهر شود دلیل است از
دو و از آنکه طبیعت دیگر متعل او شوند کردید صفت دوائی که قمراد این علت بکار برده اند که نمر
نک خرمی اسفنج بریان کرده قند که نمرید هم نوش در ریشه امیر اطو را که دوائی است از جنس
انقوزه سلیخه که نمرید هم بنمون طلای شش خود و فضل طویل کید همس اجزا را سخت و مخلوط نموده
صبح و شام یکقاشق از و را سفوف نمایند و هم در تحلیل این غده معین است ترنج دهن آب
و لک و دهن در تریال و دهن بدو بنجر مخلوط با عرق که هر یک از و ان مذکوره را البته صوفی
بر موضع علت بالنقد هم استعمال شمع مرتب از اشق با از اشق و شوکران پس از نافع است
و در صورتیکه علت بطول انجامیده و خوف فلک دست دهد از عظم غده مذکوره اسلم است
که در تحت او خوشی بکشد اول از یک جانب غده و بعد از علاج او از دیگر جانب اگر چه این عمل
بتر خوف است ولی جنبه اول و ثلثش چنان ندارد که شکاشن و پسر و آوردن غده و بعضی
از معاینین در صورت وجود سلیخه در جوف غده چنین نموده اند که شکافی بدو داده و بعد از
خروج رطوبت مجتمعه در جوف و قدری کتان بدین موضع نهاده تا بصلح آید است و لکن
از اعمال رویه است و هم از جراحان شکافته و بالمره غده را مقرر در دهشت اندا شود

۴۵
که جمع نهائلف شده اند فصل ثالث در باب اولی در بیان غلیم شفرین و بنظر بد آنکه باشد بنظر بدی
غلیم بهر آنکه مانند قیض طفلی و طایفه از زنان زکیان باشد که بنظر غلیم دارند بفراتر لکن باشد
که آن مذکور بعدی غلیم شود که سرطانی مواد و عارض صورت غلیم او شود و علاج او این است که غلیمش مانند
برین خاک که باقی شفرین را از آن کم کرده و اصل او را که شبه با مبضع قطع نموده و بموضع مقلوع او دویه قابضه درود
و قدری کنان بر وی او بدهد و بایندی بکمر استوار سازند و بهنگام شفرین غلیم شود بعدی که
ناوسط فحزین پا در نزد این علت با خلقی است با عارضی علی تقدیر علما حی عرض قطع نمودن مذکور در باب
ثانی از مقال ثالث در بیان وجود آلتی جدید غیر طبیعی و مثل است بر هفت فصل اول در ثانی
و شفرین در زنان و اویت سواهی غلیم غلطه ثانی که در بشره واقع در فوق جلد که بسان قیچی
باشد بهر دو این ثانی و قسمی که می عرض دیگر می طویل صاحب قیض و هر یک از آنها اغلب
در بدین دو وجه عرض شوند و در زبان من از آن بهر سده که در مردان و سبب او واضح
و باشد که بعضی اشخاص این علت عارض و بعد از خندی زایل شود و اما علاج هرگاه در جمیع این
عارض شده باید صفحات مانند اشق و طرکیر و مثال خفا میل فرموده و اگر بعضی اعضا باین
دون بعضی اسلام آنت که ادویه موضعی بکار دارند و دفع آنها آن است که اگر ثانیس واقع باشد
موی آسبی اصل و بنده تا آنکه ساقط شود و اگر عرض باشد قدری سنگ جنم با عصاره
فریون یا قطبیر زرایح بدو مالند و هم از طلاهی جوهر شوره در این باب نفع کلی حاصل شود
و لازم است که در استعمال آنها احتیاطی کامل بعمل آید و باید که ادویه مذکوره بعضی
الطراف بر خورد و صورت فساد می گردد و جسم باید آنکه بمضغی ثانیس را خراشیده و نگاه آید
اگر بموضع او مالند و باشد که ثانیس بعد از مدتی بدون علما حی رفع شود اما آنچه داو عیار
از آنت که بشره موضعی از جلد سخت و غلیظ گردیده و بد آن محل موضعی میل نموده صورت
ایلام و اندک در دو اغلب در بریل سیما و خلف ابهام و از مضطه متوالی که از پای پوشش
و آرد آید عارض شود و در فصل شاد آیت او باشد سایر فصول است و علاج باید اولاً با
الضفاط بدو موضع بدار که پای پوشی وسیع پوشیده و طلقه از صمغ الاسنک ترتیب داد
بموضع علت نهاده تا مضطه بر آن موضع وارد نیاید و بجهت اسقاط و از الایح چه مذکوره لازم است

که بر جهت کثرت او را با صابون شست و شوی نموده و بر روی موضع بریده و در اندود و در شویج
 باید احتیاطی کامل نمود از آنکه در حین قطع بخیه جراحی را بجا آورد و در نهایت باید با احتیاط
 کرد و صورت ملاکت نمود بدانکه بعضی از حکما در کتب ثبت و ذکر نموده اند که مشام نموده ایم
 در جهت انسان شمی را و سینه بسان قرن بطول بکند تا در او زده و بهرام در صورت حقیقت این مطلب
 بجهت علاج لازم است که او را از فصل نکافته بردارند فصل ثانی از باب ثانی در بیان شیب و غلظ
 جرم غلیظ از غلظت بدن انسان و شکل است بر دو جمله و چون این علت خالی از دو قسم نیست
 با خان است که ماده خضرو فی جرم غلیظ از سبب الی منتهی سبب و او را در رده نموده و در جوف
 اندا که در این قسم است اینها تم نامند و قسم دیگر آن است که در موضعی از غلیظ دلی با این
 عارض و بر روی سبب و غلظت بهر سبب از او را نکشند تا سینه اند و در اولی در بیان آن قسم
 باید دانست که در بعضی بوجهی که فرک یا خناری یا نفوس می شود که ثبت در جرمی از غلیظ
 و جوی سبب عارض شود بوجهی که در جرم خضری و بعد از ورم رطوبتی از و شریح که در غلظت
 و قوام صمغ که بر در رطوبت مذکور سبب و غلظت بهر سبب و نادر است که در حسیع اطراف
 از غلظت این علت عارض شود بلکه همیشه در کجاست است و هم باشد که بسان فولی باقی بود
 نماید و این علت در حسیع غلظت بدن عارض شود بلکه در غلظتی بهر سبب که از غلظت پوشیده
 نیستند مانند زدن و ترقه و جبهه و هم در منافصل عروض او نادر است و هم می شود
 که این ماده در جانب باطنی جبهه و ترقه و دماغ و منصفه و صورت صریح و بر اثر ارض دماغی
 گردد و علامات و اعراض این علت مختلف است با اختلاف اسباب موثره و چنانچه هرگاه
 سبب آنکه باشد و لایالی و جع باشند و باید به بلاد و آنکه در ابتدا و جع در حسیع غلظت
 و آخر در غلظت صورت مستقر گردد و در آنجا که سبب مرض ماده خناری باشد و جع خفیف شود
 عارض شود با سبب یا عارضی که لازم و وجود خناری است و سبب زاندر است که دلی که
 رجم و متفرج شود موضع او و کانی این علت مشتمل شود بوزن غلظت از ضرب و منقطع عارض
 شده باشد نیز نما از یکدیگر بعلاماتی که سبب عارض او در باب او ذکر شد باید نمود اما علاج
 باید بر روی سبب او نمود چنانچه اگر سبب آنکه و ماده خناری بری باشد انفع صمغ او در سبب

رویت

او در بدنه است اگر چه از استعمال دوائی مذکور و جع نفوس هم نکین باید در آنجا که با این
 التهابی جسم همراه باشد باید موضع علت زدن شده و از دهن زدن را دی نریج فرموده
 و بعد بخیه از خناریش عطره بکار داشته تا بخیل رود و هم بعضی از حکما استعمال
 تخم ازاشق و شوکران و زینق را بجهت غلیظ نافع دیده اند و هرگاه بخیل زود و صورت تالم
 و اندامی مشدید گردد و حرکت را مانع آید بر معالج لازم است که با عانت عمل بری دلی مذکور
 سبب غلظت و زال سازد بدین قسم که با بعضی جلد فوق موضع عطره صلب و استکا فیه و لغت نموده
 و نگاه با آلتی شبیه با سکنه بخار آن و مطرق با زنه از غلظت را با غلظت بریده و در رده و در جوف
 او را فاده نموده تا التیام باید جلد ثانی از فصل ثانی در بیان مرض استی اینها تم داد
 عبارت است از آنکه غلظتی از غلظت بدن و در رده و در جوف و جوف او رطوبتی قوام صغ عربی
 منصب و بر روی غلظت بهر سبب سینه و الاخره سبب و غلظت شود در صورتی که در جوف غلظت
 رطوبت منصب گردیده است او را استی یا تم نامند و بعد از غلظت و غلظت استی
 استی یا تم نامند و سبب این مرض اغلب بجهت و لکن عارض میشود و شامی را که مزاج رده و دی و دی
 ضعیف و مرض آنکه و خناری و نفوس قبل بوده یا استعدا آید و از علامت این مرض
 بیضه انداخت که اگر کسی از آنکه در ابتدا و جعی منصفه نموده و لایالی عارض شود و بعد از
 بر ستر شده گرم شدن سکت گردد و بعد از جندی که بدین حال گذشت استخوان را برید و جع مذکور
 نزد اید و جلد فوق موضع علت منته و دانند آنکه در طرآن باشد که بعد از دقایق و غلظت غلیظ شود
 گردیده صدیدی شق از او بالوده و در اطراف موضع متفرج کمی زانده و روینده و غلیظ از شد
 سبلان بجای و فی قیلا و ملاک گردد و در بعضی از صاحبان این علت میشود که و جع خفیف باشد
 و علت زاندر که در یک نوال باشد و بعضی را از ابتدا و جع شده عارض شود جندی که خود را لا
 خواهند نمود اما چون مرض در جرح کامل رسیده نکین باید نیز با این علت که کسی تر بدین نحو بود
 که کسی تر از موضع علت محد است از نسج سالم بخلاف آنکه این مرض غیر محدود است غلظت
 از سالم و کسی تر منفرج گردد و ماده از او پالاید و اما علاج چون در ابتدای این علت غرض
 التیابی شده است باید او را در پاره التیاب بکار داشت از اسالی عارضی

در حال مرض سلسله و گنگیان اما سلسله عبارت از دلی که در تحت جلد واقع و گنگیان اما طرف متعلق
 ماده موجود که با خلاف او سلسله نیز مختلف است و آن ماده با رطوبت مختل است و اگر گنگیان سلسله
 یعنی گنگیان با رطوبت او بقوام غلیظ است و اگر گنگیان سلسله یعنی سلسله شسته نامند و این
 سلسله ماده ایست که با رطوبت مختل است و در او شکر یا شکر سلسله یا شکر است و در او از رطوبت نامند و این
 شکر کافوری باشد و این گنگیان که در تحت جلد است با خلاف ماده موجود در او و این گنگیان که
 در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و این گنگیان که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 بهر سلسله و سطح داخلی آن صاف و در بعضی صاحب خل اند و این گنگیان که با رطوبت مختل است که سلسله
 بسته است و این دلی از اندام صغیر و در گنگیان که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 تغییر ندارد و در ذات جید است که گنگیان که با رطوبت مختل است که سلسله
 و هرگاه که رطوبت در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 مستقر در جوف غده مندرج شود و علت و علاج او بهر سلسله است و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 طوره که در پشت دست عارض شود و سوسوم گنگیان و از دست که رطوبت در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 از او تا پشت دست و باشد که جوف رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 سلسله بداند که جوفی که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 هر گنگیان گنگیان است که با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 چون شود که سلسله در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 بهر سلسله است اما در صورت امکان بهر سلسله که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 تا آنکه سلسله با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 که سلسله را شکر و بعد از خروج ماده غده در جوف او با رطوبت مختل است که سلسله
 و هرگاه که با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 موضعی قرار داشته باشد که جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 که بقدر امکان و جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله

در بیان

در حال مرض سلسله و گنگیان اما سلسله عبارت از دلی که در تحت جلد واقع و گنگیان اما طرف متعلق
 ماده موجود که با خلاف او سلسله نیز مختلف است و آن ماده با رطوبت مختل است و اگر گنگیان سلسله
 یعنی گنگیان با رطوبت او بقوام غلیظ است و اگر گنگیان سلسله یعنی سلسله شسته نامند و این
 سلسله ماده ایست که با رطوبت مختل است و در او شکر یا شکر سلسله یا شکر است و در او از رطوبت نامند و این
 شکر کافوری باشد و این گنگیان که در تحت جلد است با خلاف ماده موجود در او و این گنگیان که
 در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و این گنگیان که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 بهر سلسله و سطح داخلی آن صاف و در بعضی صاحب خل اند و این گنگیان که با رطوبت مختل است که سلسله
 بسته است و این دلی از اندام صغیر و در گنگیان که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 تغییر ندارد و در ذات جید است که گنگیان که با رطوبت مختل است که سلسله
 و هرگاه که رطوبت در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 مستقر در جوف غده مندرج شود و علت و علاج او بهر سلسله است و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 طوره که در پشت دست عارض شود و سوسوم گنگیان و از دست که رطوبت در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 از او تا پشت دست و باشد که جوف رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 سلسله بداند که جوفی که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 هر گنگیان گنگیان است که با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 چون شود که سلسله در جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 بهر سلسله است اما در صورت امکان بهر سلسله که در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 تا آنکه سلسله با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 که سلسله را شکر و بعد از خروج ماده غده در جوف او با رطوبت مختل است که سلسله
 و هرگاه که با رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 موضعی قرار داشته باشد که جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله
 که بقدر امکان و جوف او رطوبت مختل است که سلسله و در جوف او رطوبت مختل است که سلسله

۵۴
 منجر جانب است قرار گیرد و ثقیله که از آنف بر آن می رسد و در دو بعد قدری ته کلور نموده و ثقیله
 منفر فرود برده تا بدین واسطه دم نه از آنف خارج شود و نه از ثقیله منفر منجر بطن نصب است باید بود
 دم در آنف مختص و منجر که دیده فوایت عروق منفره رسد و در بطن منفر شود و بعد از آن
 ته کلور شده فرود برده و ثقیله آنف و در خارج شده و سرسانی که از دمان بیرون که از آنف
 کلور مستقره در ثقیله منفر بسته اند بکشد تا هم از آن بیرون آید و نجائی که بعد از آن
 بوسیر نهائی در اجزای آنف بهر سه باید داده و در پاره خنده او بکار داشت و از خوف آنکه مباد
 دوباره عود نماید لازم است که قدری کات بکند و در آن جیل و با آنف تنوق با با قدری سکنه
 جتم انوضع را پالایند و اگر با وجود رانیج با و اسیر عود نماید مکرر آنرا محلی را بکنند و در صورت
 بوسیر در منفر منفر روز نماید و غلظت بهر سه بایند و در حلق پا و در دانه عود عللیل را و ایم
 نشان روی و در و اگر زیاد غلظت شود مکنیت بهر هوای ستنش رسد و در صورت خفاق کرد و اگر از
 دمان مشاوه نماید دیده شود که غلظه فرود فرود شده و هم از سس به صبح ادراک می توان
 نمود و در این قسم با و اسیر حلقی نامند اگر چه بندت از خود حلق میزد و این قسم از علت
 خطر و در بعضی باشد که مورت هلاکت شود و اما علاج در آنکه از آن این بوسیر بوسیر بکشد
 با آنبر محال است پس باید اصل او را با بر شمی بسته تا بر در ساخط شود و این علت بسیار
 دیدن طریق باید نمود که اولاً لوله لاک که قبل نموده ایم از آنف فرود بر نه با جوف دمان دیده
 سرفراو ابریشمی بسته و پس کشیده از آنف خارج سازند و بعد دوباره لوله از ثقیله دیگر فرود
 و از دمان خارج ساخته و ابریشمی دیگر بر او بسته و پس کشیده و از پنی بیرون آورده و از آن
 سرفرا بکشایند در انوقت و در هر ابریشم از دمان دیگر از ثقیله منفری خارج باشد آنکه دو
 ابریشم خارج از دمان را که نموده و در علت صبیح بسیار ابریشم برده تا برسد بجانب منفر
 اتصال بوسیر و بعد در ابریشم خارج از آنفر از ثقیله لوله منفری گذرانیده و بر بیچانند تا آنکه
 گره شده و پخ بوسیر را بکند و باید روز روز این در ابریشم جوف میل قدری بکشند
 تا گره اصل بوسیر سخت شود و بیچانند بوسیر سخت شود و بیچانند بوسیر سخت شود و بیچانند
 و متورم گردیده و جاتفر یا نموده ساخط شود و چون دیده شده که از این عمل بوسیر

منفر

ساخط بر روی غروف بکلی افاده و منفر سس رسد و در بطن اخذ نموده است پس
 بر عامل لازم است که همیشه موجب باشد و چون به بند که زد بکشد مقوطا و باید که در
 واقع در جوف میل را بکشد تا که اصل بوسیر سخت گردد و در قطع نماید آنکه از پنی کشد
 از دمان فرود برده و لوله لاکر شمی بیرون آورد و فصل ثالث در بوسیر بابت از جوف غلظ
 فک اعلی بوسیر کانی بر وید و در پنج شباهت نامی دارد و بشیوه منفری که قبل است تمام
 نماید و در از غرض اوست که در بابت او جوی در یکجانب فک اعلی عارض و از جوف نف
 ماده غلظتی جاری باشد تا آنکه بوسیر نموده و غلظت بهر سه و جانب علت و جبهه و بالافره از غلظت ان اجزای غلظت
 و هم بدین واسطه جانب اصل او که جانب است بکشد و بوسیر نموده برسد
 تا سطح تحتانی مقطه و در اغلب سرعت واضح است که از غلظت او نذدی در اجزای
 غلظت بهر سه و بدین واسطه جوی صعب عارض و آخر عللیل از منفر و کثرت سیلان بر منفر
 علت عجیبی دتی بستلا و هلاک خواهد کرد و اما علاج جز بعل به بخود مکن نیست و طریق عمل
 آن است که با پنی از طرفین غش شریان سباز تر منصفه نموده و عامل با منفع جذب از ثقیله
 لب محاذی زانده فک اسفل دمان را بشکافد و بعد از آن موضع نیز باین روشش بکشد
 لف نماید و جبهه را تا آنف آنجا با آلتی شبیه با سکنه بخاران و منفر غلظت فک اعلی بکشد
 و قطعه قطعه بر دارد و از آنجا که فک شده و بعد از عمل آب سرد استعمال نماید تا سبک
 دم گردد و آنجا قطعه لف نموده و با پنی آورد و جبهه نماید و هم لازم است از جوف سیلان
 دم که تا چند ساعت بعد از اتمام عمل شریان باین را منصفه ساخت فصل چهارم
 در بوسیر نهائی از جوف و در منفر ابریشم را در قعر با در عرق اوداق و همیشه کانی و کل
 با منفری دقت و شفاف و در صورت منفر اعراضی غلظت ندارد تا بعد از آنکه غلظت عللیل را بکشد
 محل ریخ نماید با تنوع و غشبان و سوزش و خارش نشان و سیلان لبین از پنی
 شباهت نامی بهر سه بکشد و بعد صید می منتن آیمچه با خون از و سیال و بالافره و بال
 غلظت از دم منفر عللیل را عارض و بوسیر نموده و زول نموده از غش رحم خارج و در میل
 قرار گیرد و در اینوقت اجزای منفر را بوسطه غلظت منفر و کثرت و از محادرت

کافی در جوف فک اعلی

از غلظت ان اجزای غلظت
 و از یکدیگر متفرق و بوسیر
 از خطا هر وجه براید صح

نصفه

مشانه و معاستقرا منصفه و مورث غیر المول و غیر هم کرده تا آنکه نموده از آنجا
 جمل گذشته و از غرض خارج شود و در بنوقت بسا دیده شده که بواسطه کت و در
 خود حرر مطلب شده و بالاخره از وجع و سیلان علیلک هلاک شود تا آنجا در هم دیده
 که غرضی رحم فاعله و احاطه نموده و منصفه ساخته و علیلک نجات یافته اما علاج بعد
 نزول و غیر وجع بواسطه غرضی رحم و مستقر را در جمل با غرض جز اسقاط و سقوط
 جز جمل و از اعمال بدی جز بستن طریق دیگر ممکن نخواهد شد و بستن او بدین نحو است
 دو میل مشغوب الراس کش گرفته و دو ریمان ضخیم از شفته آنجا کشد و بر اعانت
 دو صبیح میل افروزد تا اصل بواسطه در انجا میل را بر خاند تا مانند نصف دایره
 دیگر شود و بعد از خارج اند و میل از جهت نوبت از هم کشیده و میلها کشیده و بر میانها
 دانه شیب کشند و از ظاهر آنها را بشمارند تا که حکم کرده و با طرف میل بواسطه کشا
 هم روزه و نهایی شیب را بشمارند تا از استقامت که اصل بواسطه کشیده شده
 و تا پیش که بعد از عمل التیاف و جوی صعب در نسبت بواسطه عارض شود و چنانکه
 اعتدال و سیلان دم و با بنوقت علاج او نیست که ادویه خنک و نرم و مخدرات بکار آید
 و علیلک را در بستری راحت گذارد و روزی یک نوبت لبن فانی از جمل بر جرم رخته تا
 شست و شو نماید و از صندید و اگر علیلک را ضعیفی در قوی و و منی در عصب بهر سبب
 باشد باید مقویات مسبارت نموده و مطبوخ پوست کنگنه و کنگنه و جند با شراب پوست
 بد و نوشانیده و از اخذ به تخوم میل فرایند و از تجاربین شده که این قسم بواسطه
 خلاف سبب اقسام بعد از سقوط و خود نموده اند و بعد از فصل خامس در بواسطه نایب از
 مستقیم به نیکو این علت را مجازا بواسطه نامیده اند چون بواسطه حقیقی عبارت است از
 مستقیم از دم که در موید معیسی عارض و از اند فاع دم تخفیف باید اما این دانه و در کل
 و از غلبه غریب بشیر و فاع و در بعضی در مافوق او قرار گیرد و از وجود او در عین اجابت
 صعب با حله و سوزش عارض شود و این دانه با شسته شود و بواسطه
 او بواسطه کش و منلی است از دم و در بدی و بواسطه معیسی منلی و خالی شود و خلاف

از متعاضات

این دانه که بلون کلسخ و بران و برش این علی ای تقدیر علاج او نیست که باین خصوص اصل او را
 و بکشند و از آن باز و ادویه قابضه سیلان هم نمایند بواسطه رابع در مرض سرطان و قیام
 و اسباب و علل او مثل است بر غرض فصل اول در قیام سرطان و علل او و علل
 و تا سرطان علی است نراجی که ماده او بر عین که منصف کرده و متغیر فاسد کش کرده و این ماده
 با شسته است بخ و او را سرطان مخی نامند و آنکه همان ماده اسود اللون است او را سرطان اسود
 نامند و این علی است او را اسکیروس نامند و در بعضی این ماده و ظاهر علیلکسان دکه بر دانه
 او را سرطان جلدی نامند و او را سرطان مخی در نسبت صلب غلیظ القوام و محدد و صلب که جلد علیلک
 از ابتدا بهیچ وجه تغییر در لون هم نمیرسد و بعد از غلبت و توجع بهر سبب دانه و لی نهج
 بافته و بعد ریح جلد علیلک و متغیر گردیده و خرد شوند و متغیر شود و بعد از دفع صددی که در آنجا
 مخی زاید از خوف موضع علت لبان فارسی بر وید و از لیس جزئی خون از جاری شود و با
 متفرج گردیده و جوی صعب را و عارض دانه و اعتدال اطراف او متفرج شوند و از سیلان
 دم و کثرت دانه علیلک مخی و قی عارض و لون بشر لبان که گردیده و مزاج فاسد و قوی
 بملاک رساند صاحب خود را و دم و سیر این مرض مساوی نیست لکن اسرع سیر است از
 اقسام دیگر چنانچه آلات و اعضا لکن است بدین قسم سرطان مبتلا که در بدن لکن اغلب در شکم
 و دین و مضیق و رحم و کبد و پسر و کبد و مضیق عارض شود و در صورتی که پسر بدین
 مبتلا که در عظم بهر سبب با صلابت و جوی شده و او را عارض شود و بعد ریح عظم و جیش این و
 گردیده و عروق صفی در دانه و غده و فاعه در میان نورم شده و بالاخره سرطان علیلک
 سیرت و صاحب خود را بملاکت رساند و بنا بر شود که در جرم عظمی با خوف او با غلبه غریب
 ماده سرطان منصف کرده و در صورت فاسد شود و هرگاه این دانه در خوف عظمی بر دانه جرم او را
 و از خوف او خارج شود و از انجالی که بعد از تشریح این سرطان ماده لبان مخی علیلک در خوف او
 موجود میشود دیگر دانه علی ذاکت او را سرطان مخی موسوم نموده اند و اما سبب این علت
 لکن اغلب در انشای سن شباب عارض میشود و با شسته که شخصی و اعدا چند موضع از بدن
 مبتلا شوند و اما علاج حقیقی را در اینست و از آنکه او بکلی ممکن نه بلکه قبل از انچه که شسته و سلم است

دکهای و صبح

من جگر سلطان در جوانی نادر الوجود بک زان بیهوشی
 در دم و صلابت بانی از مخالف اغلب شایع
 برین علت مبتلا شوند و کسای و محدود موضع علت از هیچ سبب
 سیاه بود و محل جگر از موضع جگر محدود و بدین سبب سبب
 در کمال مجاری خود واقع در باطن تورم و غلظت و سبب
 از استعمال او و به منصفه و عملیات
 قوی حاصل گردد و
 قاعده چنان است که این علت علامت
 فرد ششده و اطرافش را
 و اما نیز این سلطان شری و سبب حادثه و در باطن صعب است که اگر که سلطان را و جوی صعب
 و سبب از جوی نیست اصلا و نیز این سلطان و بعضی البانی که در نزدی هم برسد شوان نمود
 که از مجاری لایقه و باید دانست که دختران یکی آن سبب را باشد که از علت علت بیانی قاعده
 بود و دور می و در می و جوی که جاف نماید تا کثیف و غلظت بدون آنکه سلطان باشد
 بجز آنکه در دم که در کمال غلظت و غلظت تمام و غلظت خود باشد و در بعضی چنان می شود
 که از کاهوت حسن علیل از قی و غلظت دست دهد و فی مابین را جاری شود و سبب این
 علت است که از خلاف حال جوی خستانی هم و بجهت علاج بولازم است که در علت علت
 و بعضی موقوفات اندک علاج و اولاد و شال آنها بکند و از آن جهت که در سبب سبب است
 در بول و جوی و در کون بیهوشی بیهوشی و بیهوشی و جوی و بیهوشی و جوی و بیهوشی
 مانده بول و کل و شال آنها میل فرایند و این حالت است که سلطان نیست بلکه نکات
 حسن بدین از علت علت است و اما سبب سلطان شری البانی است که سابق
 دیگر در باطن است که بعد از شش و جوی برود و این علت بدون تا بل
 موضع علت و قطع نماید و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب
 چنانکه در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب
 و اطراف او را با تمام از هیچ سالم نیز سبب و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب
 خون جاری شود و بول و غلظت و سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب و در سبب سبب

جاری است

جراحت هم وصل و بجهت نود و با شمع و اخیون پوشیده و در روی او قدری کن نسیاده
 و با نوری بچسبند و اما اینجا یک نام شری بول که فرجه سلطان فاسد گردیده و باشد عمل چنان نمود
 که از سبب سلطان از طرفین دو نیم دایره از جلد شکافه و لاف نموده و نگاه با وقت تمام است
 سلطان را با انز که در باطن قرار قطع نموده و خون را شسته و جراحت را با تفشکی پوشیده و جگر
 بکار دارند تا بده نشیند و حکم جگر روید و نسیم باید فصل خاص از باب رایج در سلطان قصب
 و این علت اغلب غلظت و نوک حشفه را قید بقسم که اول چند شتر در موضع مذکور ظاهر شوند و در
 و جی بعد از چندی و جوی خاص بر آنها را عارض گردید و غلظت هم رسانند و متفرج شوند و سبب
 منتن از آنها لایق و کثرت در قرحه شمع و بسان تاج فروس غلظت هم رسانند و بعد از ده روز
 بجای بول چند نشانه سوری موجود گردند و در این حالت باید فرجه سلطان را از قرحه جوی خسته
 و قاعده در این موضع نیز داده و نیز این شوان نمود که از علاج بجهت که اگر استعمال او
 منصفه اند و در این و در شال آنها شربا و قرحه اسلح از برف دال را که قرحه مذکور بود
 و از فرجه بوده و الا در سلطان شکی باقی نماند و اما علاج اینجا که در کس سلطان
 در جلد قصب و غلظت حادث شده باشند ممکن نیست از آنکه آنها که بواسطه عمل بدی که حرم
 قصب است پس برسد و اما در صورتی که قصب سلطان بولازم باشد و قطع او و این عمل
 مختلف است اختلاف مقرر و وقوع سلطان هرگاه نوک حشفه را سلطان عارض شده باشد عمل بدین
 نحو باید نمود که نایب جلد را پس کشد و قصب را حکم بشار و دعال موضع علت را گرفته و با شری
 قطع نماید و با استعمال آب ریخ سلطان دم رسد و سازد و بول شری بجای بول و دانند
 و را داده و موضع جرح را با لایق آلوده و شمع و اخیون پوشیده و به بندد و هرگاه قصب
 از وسط خواهند قطع نمود عمل خود که است الا آنکه در این حالت جلد را نباید پس کشید و در
 صورتی که قصب از اصل جگر خواهند قطع نمود عمل چنانست که نایب از موضع علت بشار
 و دعال جلد قصب را پس کشد و با شری قلعش نماید و شریان او را بسته و با شال آب
 ریخ و او را تا بده سلطان دم او را رسد و سازد و بول شری بجای بول و دانند
 و از اینجا که بعد از این عمل خوف است که حرم قصب متقلص گردیده و بجای بول

و ادویه مطبوخه بخان شود و اندک کور و شستیم که جلد را پیش کشند که بیشتر بریده شود تا از تعلق صم
 قیض برای بول شود و بخان شود و هرگاه جلد ازین عمل مجرای بول ضیق لازم است که با
 کشته زجر می را وسیع نمود و با باشد که بعد ازین عمل علیل برض و سوسیس و یا نخویا و جسم شید
 قلا کرد که هیچ وجه علاج آنها ممکن نشود و بهم بنا برید شود که قرصه از آبله فرنگ قیض را عارض
 و تا گلش سازد و برینو اسطه قطع او از دم بهر ساند در خیال البته عمل به بخور مذکور باید عمل آورد
 فصل سادس در سرطان پخته و این سرطان بعد از درم با از ضرب و آورده بر صفت عارض
 میشود اگرچه در بعضی بدون سببی ظاهر باشد که پخته بر سرطان مبتلا شود علی ای حال علامات
 اینست که در حرم پخته غلظ و صلابت بهر ساند بدون وجع و انداخته که صاحب خود هیچ وجه
 زحمتی ندید تا آنکه بعد از چندی بالذات با از ضرب و آورده و حی بخش مراد را عارض و عظم کرد
 در سطح او تخریب و تغییر بهر ساند و علت تا جمل البضه بخا در نموده متفرع شود و بالاخره بر
 اعراض لازم سرطان و حی و فی علیل عارض و هلاکت رسد و چون شود که سرطان پخته
 مشتبه کرد و فعل آلا کند و تقریب اینها بدین نحو باید نمود که در سرطان وجع صعبیت و شفا
 ندارد و در قیل الماء و جرم سدهم و او بخند می است که اگر جراحی در پس او بداند ضو او شاد و مرنی شود با سایر علامات
 سابق در باب قیل الماء ذکر شده است بمقتضی اگرچه از فرود درون زو کار قیض صحت میسر است
 با این قیل الماء و سرطان پخته و هم شود که سرطان پخته مشتبه کرد و با صلابت با فی
 از درم او اما سرطان در حرم پخته و درم صلبه مذکوره در زنده پخته مشتبه شود که اگر اوس
 صلابت زانده مذکور محسوس شود و اما علاج این علت نیست سوا ای آنکه پخته علیل را قطع نماید
 و از آنجائی که این عمل زیاد خطیر است نباید کار داشت الا در صورت وجوب قبل از آنکه
 سرطان بمقتضی البضه سربست نموده و او را فاسد ساخته باشد و اطریق قطع پخته بدین است
 که صغیر آن یک غصی گرفته مرشح ساخته و شرطی دقیق فرو برده و جلد را شکافته و پخته را از غلا
 خود جدا نموده و جمل البضه را باغ نمک بسته نگاه از تحت موضع کشته نموده اند پخته قطع
 نمایند و صحت که اگر بدین نواز شد جمل البضه علی نایند سیلان دم خواهد دست داد و
 از قطع قدری تفکیک بروی او نهاده و مشطر باشند تا جراحات بریم شسته و در میان

باده خارج کشته و جراحات واسطه کجی نالم لستام باید و اما قیض این علت است و نخویا و سوسیس
 سیما در صورتیکه پختن را قطع نموده باشند و اگر یک پخته را قطع نموده باشند عمل او از درم
 صادر شود و از صاحب او و لا بد وجود آید و با باشد که بواسطه کلوله یا سبب دیگر پخته صحت
 و متفرع شود و اگر سرطان سیلان نازده حی و فی علیل عارض و خوف الاک با و برینو اسطه قطع
 و جوب بهر ساند در این حال عمل به بخور مذکور باید نمود مقتضی البضه در امر اض عد از زباده و
 عضوی از غصه بدین نشان مشتبه است بر دو باب باقی در فحاش و نقصان التی طریق
 صلاح او بدینکه بعضی اعضا مفقوده از بدن را میتوان بواسطه اعمال جراحی صلاح نمود و
 لب پچی و امثال آنها و اما صلاح آنها با بطور سوزنده است یعنی از عضو قرب بد جلد او
 و عضو زایل را از قیض نمایند و آنگاه عاریتا بطور صنعتی عضوی ترغیب نموده و بر وضع
 مفقود قیض نمایند تا آنکه نقصان در شکل هم نرسد چنان و این با شکست و در فصل اصل اول در صلاح
 عضو مفقود بواسطه سوزنده از جمله است لب زایل تا سبب فقدان لب یا بضر و آورده و راست بواسطه
 التی قطع و با از قروح و حات سرطانی و سالک بنا در از قروح خفا زنده و آبله فرنگ لب متاثر و زایل شود
 و طریق صلاح و پیوند او چنان است که سابق در باب سرطان پخته تفصیل بیان نموده ایم و اما
 انف مفقود چون سبب اغلب مرضی است جراحی لهذا بر حال لازم است که اولاً باستانه حال او
 مناسب علت جراحی او را زایل سازد و آنگاه بدین عمل پردازد چون کز قبل از علاج مرض اصلی
 او نماید البته جلد بدو پیوند نگردد بلکه غایب یا نموده فاسد شود و از او آسبی رخ نماید و لهذا باید
 سبب زوال و فقدان او را پدید کرد سبب آبله فرنگ یا خا زرد و امثال آنها باشد او دیده کتاب
 بدینا کار و پخته تا یقین حاصل شود که مرض اصلی زایل شده و انوقت بواسطه عمل بد انف
 پیوند نموده و صلاح نمایند و این عمل اولاً حکمای هند اخراج نموده اند که از جلد جبهه انف مفقود
 تشکیل میدهند و حکمای آلبان از جلد غصه پیوند نموده و از آنجائی که سبب در شود جلد غصه با
 پیوند کرد و در حمت او غلیظت معمول نباید داشت که هرگاه یک جلد جبهه فاسد باشد و از او
 انف ممکن کرد و او را طریق تشکیل انف مفقود از جلد جبهه بدین قسم است که بر میدارند و بر او سبب
 پنی بریده و بطور در آب جانب این با اسیر جبهه نهند بخوی که غلط او در پنی قرار گیرد و بعد

بسیک جنم جلد جبهه را قدری شل از انداز به نرم نشاند و بشرطی که طرف بی مفقود اگر
 بریده و بر دارند و هم جلد جبهه را از شانی که نموده اند بریده و سطح تا نید بخوبی قطع سلوخته جلد از
 قلع به پنج مانی وصل و آنچه باشد انکاه جلد سلوخته را چنانچه در بر دارند تا ظاهر نظام
 و باطن او باطن انف مخاوی شود و با بعد از هر غن او را بر یک سو وضعی از انف که بریده اند مثل
 ساخته و آنچه نمایند و هم جانب اسفل جلد را با آن چنانی بر گردانیده و شکل متحرک ساخته و با
 نیمه کجای انف و شش سازه و چنانچه بی را باید نیمه نمود تا کجای را حایت جبهه یکدیگر تقرب جویند
 و بعد از اتمام عمل دو لوله خوف بر داشته و نه یا کنان بر نه یا چیده اند و بدو ثقبه منفرجه و نه
 تا نیکه و بعد باشند در شکل آنها و هم باید که از آنجا مشغول و بعد از آن رصاص طلا بگذارد
 تا چهل و هشت ساعت بعد از عمل بعضی از بخیمار بر آورده شده و بعضی دیگر بعد از هفتاد
 و دو ساعت بر دارند و قاعده چنانست که جراحت انف با قرب طرق انبساط باید و جلد پیوسته کرد
 و انف مفقود بدین واسطه مثل کرد و جراحت جبهه بعد از یکماه تمام پذیرد و صلاح آید و بدین
 که قطعه سلوخته از جلد جبهه بر نه کرد و بقاعده را بست تا شود و سبب این حالت نیت مکرر می
 و هم در صورتی که قلع و پنج جلد و قلع و یک است بریده باشد بخوبی که نماند قدر کفایت انف جلد
 خدا و در البته فاقه را یکدرد و فاسد شود و از بخیماری است که ناخدی اگر جوانی باشد
 و غیره بر روی بینی جلد را در دو صاحب او چنان پندارد که در پیشانی او راه میرود و از طرف پیوسته
 و شکل او از جلد غده چنان است که قبل از عمل چند روزی غده را منقطع ساخته و با دستای بگرد
 پاویزند و بطوریکه مقابل بینی واقع باشد و بعد از آنی که قدری بدین حالت دست عادت نمود
 با نماند بینی از حریم برید و سطح انسی غده نموده و نشان نموده و بشرطی که جلد بریده و سطح نمود
 قلع او را در غده باقی گذارده تا بواسطه او قطعه سلوخته جلد غده را رسد و فاسد نکند و انکاه غده
 مرثع نموده و بگردن او نیمه و در استمالی مخاوی و متصل به انف ساخته و بطریق سابق موضع انف
 پیوسته و نیمه نمایند و بعد از آن روز که جلد خوب پیوسته گرفت و جراحت انف التیام یافت
 قلع او را از غده قطع و پنج بینی نیمه نمایند با سایر اعمال و تا از یکدیگر قبل بماند نموده و هم فصل
 در طریق شکل بعضی اعضا مفقوده مانند پا و دست و بینی و گوش و چنگ و دندان و موی

عنه

عاریت او از تربیت سبب نماید ساده یا با چرخ ساده او آنست که مفصلی ندارد بدین قسم که چوبی
 برداشته و شکل با تراشیده و جانب علی او را قفسی میانزند که مانند چکالی را نور کمر و لب
 یکمخته طولی بجانب حشی او پیوسته و سر نخه را با کمر بندی بگردانند و با چرمی وسط و جانب
 او را محکم می بندند و با او راه میرود چون خدی باین پاراه روزی قرب حرکت لب پیوسته بتواند
 حرکت نمود اما اگر کجای از دیگری قصیر تر باشد به بیواسطه علیل لب که باید چنگ زفت نمود اما
 لب که از پیوستن او مساوی شود پای قصیر با دیگری و اما در صورتیکه قد مفقود گردیده باشد
 هم مانند سابق چوبی شکل با تراشیده و جانب علی او را مفقر ساخته و غده را در غده
 و نیمه بجانب حشی او پیوسته و با کمر بندی او را محکم بندند و حرکت نمایند لکن ازین خوب ضربه
 بقدر آرد و به شش سازه و او را چار و نیت سوزی اگر بر دارند چوبی و شکل با نرسند و
 اعلا می او مانند کرسی ساخته و زیر سرین نهاده و محکم بگردانند او را باید بواسطه کمی حرکت تواند
 نمود و چندان صدمه بر آید و نباید اگر چه جلد است و آن علم جلد و انفال با دست
 تربت نموده اند صاحب مفصل که فی الجمله به آنها بتوان حرکت نمود و قرب حرکت طبیعی لکن از آنجا
 در وقت قبیل و بهینه کمی وضع از شکسته است برای غرض کار نمیشود و هم تازه از صمغ
 که بر چا و پوست مصنوعی تربت نمایند که زیاد نیکوست و اما طریق تربت بینی و گوش مفقود
 عاریت چنانست که از غده اشکلی بینی و گوش اتی ساخته و رنگ نموده و موضع مفقود
 و فیزی برای آنها قرار گذارده که از سر سیکه رانند و بقاعده می بندند تا موضع خود بی آید
 و ساقه شوند و اما خلک مشغوب در بعضی خلقی که او را خلک کرکی مانند و با از قروح
 خبیثه متاثر و مفقود شود و بدین واسطه نفس و از درد و تحمیرت بهر ساند در حال
 حکایتی شکل او برداشته اند و با در صمغ که بر چا و در آنها را برین و قلع بواسطه آنها
 پیوسته انکاه یکی از آنها را جمع نموده و از دمان بخوبی پیوسته را در نهاده که باز شود و
 نکرده و پارچه دیگر او در موضع خلک قرار گیرد و سوزانده و دمان و چون دانه آنها قاف
 باشند عمل موضع و بلع عورت بهر ساند و اندر صورتی که یکی از دانه آنها مفقود شده باشد
 باید آنکه از عاج یا صدف یا صنی و نهانی تراشیده و موضع مفقود نهاده و با نماند

۷۴
 به خوردن بسیار منقعات و بعد از آنکه در شکم فرامیاید تا بهوش آید و اما در جمل
 سیاه عرق صاف و با از بعضی فصد نمایند و اغلب در امراض رحم و بخت نشین دم طبع و بواس
 و اسهال خنین از آورده رطل سیاه عرق صاف فصد نمایند برین طریق که باراد آب گرم سدا
 و با بعضی فصد نمایند به صورتیکه قبل از خوردن آب و اما در امراض طاهر چون بدایع اقرب است
 از سایر آورده و غنای را بواسطه او اسهل است فراغ می توان نمود و اما از بعضی امراض
 و اغیبه و قلبیه مانند سکنه و خفاق و خشان فصد و نافع است و جایز کن در این عمل زیاده
 احتیاط لازم و جز در زمین و جوب کار نباید داشت و اما طریق فصد و اینست که با پی بادن
 و در نزد کور اصبعی نهاده تا بهر ساند و بعد از خروج شدن هوا بوجف و خسل کرد و در
 نزد و صاحب خود را مالک است از آنگاه با بعضی فصد نموده و کاغذ را زواله کرده یک قطره
 او را تحت موضع فصد نهاده ملحق سازند تا خون و اسهال او داخل ظرف شود و بعد از
 اینکه بقدر کفایت خون خارج شد و مقصود حاصل آید بر دارند و البته آلوده میشود و باید
 و جلیب و در موضع مجروح را فاد نموده و با دستمالی به بندند و اما فصد شرابان با دست
 سوازی آنکه در امراض عین کبابی شربان صندغ راسل نمایند و اما اینجا کی که مقصود اسهل
 شربان مسدود و صافین معبر او باشد تا خون شود از او عبور نمود و ثمری نخواهد بود و چون
 بعد از سسل و طبع شربان از شعب شربان مطلق را وسیع سازد و قبضه علی غنچه
 دم از او تواند عبور نمود و آنست که از شربان اصل چنانکه این مطلب کرد در عرض او نیم
 مشاهده شده است علی ای تقدیر بعد از سسل شربان قدری پیچیده موضع او سدا
 و با دستمالی به بندند تا جراحت التیام پذیرد و استفرغ دم از عروق غیرت باز
 علق و حجامت نماید نمود

اما ارسال علق در او را و اما التیاب کبابی بسیار بد بخت شقیف و جع و خلیل با فصد و مرمه و مس
 میل و خون را بهر صورتیکه خواهند و البته بخت شقیف دم طبع و بواسطه ارسال علق نافع است
 و اینجا کی که در مرضی که مرمه و شربان فصد و ارسال علق ارسال علق نمودن اسهل است
 چون خون می را در اینست و بهر چه فساد می خواهد نمود و طریق ارسال و اینست که یکم از زوی

جوان

۷۵
 ز لوی جوان در کسند و در لویه حید و عضو این آب آلوده و نشانند شش و اگر در کشتن کرد با
 باید عضو را با فدا خون یا شیر یا لایند تا یکم و در صورتیکه عضو را قبل با دهنی سیاه و من پختن
 ترنج نموده باشند البته ز لوی نخواهد گرفت که آنکه انوضع را خوب بسته ز لوی نشانند و هرگاه با طراف
 و مان باله لازم شود ارسال علق باید مویک بود تا بخلق فرو رود و اگر فرو رود قدری نکند
 بنوشند تا کسل سازد و بعد از سقوط ز لوی قدری صبر نمایند تا خون از پیش زخم شود و آنکه با یکم
 عضو بسته و قدری قویا تا رنگیست بد انوضع نهاده به بندند و اگر با اینها سیلان مسدود
 نکرد و مورت نصف بدن دقوی شود سیما در اطفال لازم است که دان جراحت ز لوی را
 جنم را پالایند و اگر با سیلان انداد نیافت بر دارند بخانی و از یکجانب محل پیش ز لوی فرو
 و از جانب دیگر خارج ساخته و بد و در یسانی بخند تا انوضع جراحت مسدود گردد
 و اما حجامت کبابی باید داشت بخت جدب میل مده از باطن بطاهر و در موضع که ارسال علق
 ممکن نباشد و در آنکه کثیر اللحم مانند سرین و هم در موضع بدایع بعضی حیوانات مانند رتلا و غیره و هم
 در مرض عرق لثا و راج افره و او را مصل حاصل حجامت انفع سایر استفرغات است و حجامت
 بر دو قسمت باخص شرط بدون مجامع با شربان مجامع بدون شرط و طریق وضع او این است که شراخ
 یا کوزه بعضی وضع نموده بعد از آنکه شربان شربانی برداشته و چند نوبت بد انوضع کشیده آنگاه
 با عانت کشش بقدر ضرورت استفرغ دم نموده و شسته به بندند و تا آخرین علم سبابی خرا
 نموده و در جوف او بقدر شربان شربان تعبیه نموده بعد از آنکه با عانت شراخ یا کوزه عضو را به
 و اما بعضی مصل نموده اباب نه کور به انوضع وضع و یا شسته که مرورا قرار داده اند حرکت
 و شربان کبابی که فصد مرمه و عضو را مرمه و زنده بدون ایلام شد
 دویم مجامع و شربان شربان که مرمه و خون را از اعالی میل با فدا و هر که با فدا
 نموده و شربان استعمال نمی کنند چنانچه در صحن طبع فصد کوزه استعمال نمایند شربان بدون
 مجامع و این استعمال نموده و جانی که کذا رذن مجامع نباشد مانند لثه و خلق و غیره
 فصل دویم در بیان ادویه جذبه که ماده را بکله میل دهند مانند فزول و ما در یون و در راج
 و فجل بری و ادویه مذکور را با یکم یکم خون بدایع همچان نموده باشد از جده دوع و انصرا

اطراف عظم و با در خود عظم است اما اشاره به واسطه افراشته شدن اجزاء و آلات لبته اطراف
در صورتی است که تفرج فرمی در جلد بهر سبب و علل از شغل و عمل خود باز داشته و بهر وجه شفا
نشود و بهر قوتی شدیدی در تحت جلد بهر سبب و علل افراشته شود و بهر وجه
هذهان جلد شولان نمود سیم آنکه عصبی غایب باشد و معدوم گشته بطریق دیگر شولان
چهارم آنکه قطعه بزرگی از جلد بواسطه ضرب مشغول شده باشد و عروق و سایر اعضا بواسطه
مشغول شده باشد پنجم آنکه عروق و سایر اعضا بواسطه ضرب از کله منقطع شده و با سبب عظمی از جلد
برهنه مانند ششم چون سیلان دم شدیدی بهر سبب و بهر وجه اخذ شریان و سبب آن ممکن گردد
هفتم در آفرینش شید هشتم در سرطان ترزاید و مخصوص در سرطان مغزی اما اشاره به واسطه
غریبی خود عظم اول بواسطه آنکه عظم و تصفر آن و ترکب کس عظام با جراحات جلد و عدم جرح
که در مدت زمان بند ریج رفع گردد و دوم بواسطه تصفر عظم با وجود هذهان جراحات جلد و تحت
چنانکه هرگاه کله که قوتی بای خود عظم را منقسم نموده بدون آفتی در جلد سیم آنکه هرگاه
کله عصب را برده باشد باید از فوق آن عصب قطع نموده تا زخم سالم حاصل شده و بزودی تمام
پذیرد و چهارم در صورتیکه کس عظم و خلق مفصل هر دو باشد پنجم آنکه تفرج در عظم بهر سبب و بهر
رفع گردد و مخصوص بهر سبب که در در مفصل بهر سبب که چون توفیقی در عمل نمایند بر بعضی ملاک کرد
ششم چون غایب باشد و عظم بهر سبب و بهر وجه چون نو بهر سبب و بهر وجه در عظم بهر سبب و بهر وجه
هفتم چون از کس عظم مفصلی جدید و غیر طبیعی بهر سبب و بهر وجه دیگر شولان رفع نموده اما اشاره به
در صورتی که عظم و این با نصف نبوده و عدم قوه و خلق و اضطراب با جمعی و قوتی عمل شولان نمود اما در قوتی که
سبب تفرج عظم بود که از قطع آن رفع می گردد اما از آن قطع نمودن بحسب قطع عصب و در زمان
معین شده است زمان اول چون جراحات عارض شود و قدری تأمل نمایند تا آنکه نصف مریض رفع
شده و دوم مراجعت نماید و در دوم اول قبل از بروز جرحی قطع نمایند که در این زمان اکثر شفا یابند اما از آن
دوم بعد از دوازده روز است که جراحات بر نمی نشیند و در این زمان عمل نمودن روی است
زیرا که اکثر ملاکات پسند ولی در نیم بعد از سه روز که می برود زخم بود و قطع نموده اند اما از پست
بکفر صحت با فیه در یکی از جگهای بزرگ تا بیون که جراحان قطع عصب می نمودند در زمان اول

زودیت و زود

از و پست و زودیت و جراحات و چهار نفر ملاک شدند و در زمان دوم از پست و پست و پست و پست
تلف شدند اما عمل قطع هرگاه جراحات و توفیق شفا بود و ساعد و باز و هر چه از پست و پست و پست و پست
انچه از ملا قطع نمایند ولی اگر ساعد هر قدر بلند باشد شتر کار بود و ساقی پنجه کوتاه تر بود و کمتر از پست
ناید اما تا حدیکه است که در قطع عصب اول از عمل سالم قطع نمایند که جراحات سالم حاصل کنند و دوم
از مکانی قطع سازند که جلد بقدر کفایت ذخیره نماید و از قطع عصب چون ممکن باشد از مفصل قطع نمایند زیرا که
جراحات در استیام پذیرد و هم خوف ملاک است ولی جراح کاهی لابد شود که از مفصل قطع نماید چنانکه
هرگاه اعلای قله عصب منقسم شود لا بد باید از مفصل قطع عصب نمود و همچنین هر کاهی از سلا بیات عصب
از مفصل قطع باید کرد اما قله عصب منقسم است اول بواسطه سبب چنانچه هرگاه از اسباب خارج شود
باشد ولی از آن است که از اسباب داخل باشد و دوم بواسطه جراح چنانچه در دومی و بعضی جراح
از او از اسباب خارج باشد سیم بواسطه زمان عمل است که در زمان اول به از زمان ثانی باشد چهارم بواسطه
صغر و بزرگ عصب و بعد از آنکه عصب را منقسم کرد و شغل و مکان و حالت غمی و ضرر مریض و بهر سبب که بعد قطع
عصب با وجود هذهان دست و بواسطه منقطع در مریض از وجع و آلم دست و پاست کی باشد
و حال آنکه دست و پایی باقی مانده است اما اسباب ملاک لازم که قبل از عمل باید متا شود و لا کار و معدوم
برای بریدن جلد تا کار و دمی بعد که چنانکه از کار و اولی برای خلق جلد تا کار و دمی برتر از کار و اول
بجست بریدن عضلات کار و دمی دوم با دم راست از برای بریدن عضلات پهن و عظم مانند ساق و
خامنه و استالی بر سر برای حفظ عضلات با فوق ساد از برای قطع عظم بنا کار و دمی بهر سبب و بهر
از عظم باقی ماند و اینها که خواهد بود ذخیره جلد از طرفی نمایند کار و دمی بزرگ و دوم نیز لازم است و از جلد لا
عاصره و استن از دجای و سرکه و غیره است اما سبب لازم بعد از عمل و قطع عصب بهر سبب
سیلان دم در اندام و بهر سبب و دمی لازم است که در بین عمل فشار بر شریان نموده تا مانع از سیلان
دم شود و هرگاه عصب کس شتر باشد بر شند و قدری شمع و اخلون و سنج و آب سرد گرم
و شنج نیز حاضر نمایند و در آنها اول شناختن موضع شریان دوم چنانچه شریان کبری
و دوزن نمیدانی و چنانچه ریمان و نخ و قلاب چند بالش کوچک و خضره و کان اما وضع بر بدن
عالم و شستن معمول اول باید معمول نباشد که عامل از عصبه و پست و پست و پست و پست باشد

دوم آنکه معین و مد صاحب سرشته حاضر باشد و هرگاه صاحب سرشته نباشد خارج باید باشد
 پنجم و نهم فصل در کندن کان از استقرار است اول از در و دوم طوطی که سیم شخصی که عضو
 اوقاف را نگاه دارد و چهارم شخصی که عضو پانین را نگاه دارد و پنجم شخصی که مولهب اشکات و اسباب باشد
 و در این عمل چهار شرط معتبر است اول بریدن اجزای بسته اطراف عظم و دوم قطع عظم سیم
 نمودن و هم تمام جراحت را بر روئین اجزای بسته و اطراف عظم در قاعده بود اول آنکه
 طریقه سبزه و سانی طریقه بی قوت نمایند اما طریقه اول این است که پای عضو اوقاف را گرفته
 با قوت تمام به سمت اعلائی بدن میل دهد و جراح بکفر به اجزای بسته ببرد و این عمل را
 طریقه اولی نامیده اند و حال این طریقه متروک شده است برای آنکه جلد بقدر کفاف ذخیره
 نمی شود و عظم برهنه میماند اما چون باید عمل در قاعده اسفل فخذ یا عضد کرد و شود و نایب صاحب
 بهر سه استادان کامل چاکد است این عمل را ترک می شود اما طریقه دوم که در کتری بی قوت خارج
 آن بود و حال تر شده اول است اگر چه عمل و اشد و جاد و ابطال الیه است ولی اسلم
 و اقل و خفایا می باشد و این عمل بر یک گونه نموده شود که اندک جراح با کار و عصبی دم حلقه جلد را
 عضد برود بعد قدری از جلد اوقاف را بسلخ نموده و لایق نماید که این جلد ذخیره باشد و را
 پوشاندن نقش عظمی که برهنه مانده است و از برای سلخ کار و ای عضو کار و اولی
 لازم بود و بعد از سلخ با کار و بزرگ عضد بری عضلات را بریده پس از آن عظم را از نو نماید
 اما در بریدن جلد باید که با دست چپ فاق را گرفته و کاد را بخوی در دست راست بگیرد
 که انگشت ابهام در آشنای تیزی کار و محاذی با او قرار یابد اوقاف از روی خط نشان
 کار و را بر کشته بقیمکه ابهام کینه گاه آن کشته و جلد بریده شود و لازم است که در بین
 عمل قوت یابد و نه منهد که بعضی نشیند بلکه قوت باید بر کشید آن نمایند و بعد از بریدن
 برای سلخ آن بهتر است که ابتدا از سمت اسفل سلخ نمایند خون پانین جراحت
 منصب کرد و چون بقدر کفاف سلخ کردید منطفش سازند و در اوقاف اگر نامای هم داشته
 باشند با تمام رسانند اوقاف جلد منطف را با دست چپ گرفته و کار و عضد بری از محاذ
 و قریب موضعی که جلد منطف است عضله را با قوس و ساعد را به ضرب چوب منصفه و فخر

پنجم ضرب طبع سازند و اگر لازم شود که مدی بضر بخریب و در مواضعی که دو عظم بود با کار و دوم
 دم راست عضلات پانین عظام را قطع نماید اطراف عظم را منصفه و منصفه بکنونی پاک نموده بعد با دستمال
 دوسه بار بر عضلات وسط و اوقاف را محاذ نماید و غافل ابهام دست چپ بر روی عظم نهاده و از
 از محاذی و قریب ابهام بکشد تا عظم بریده شود و در بریدن عظم باید ابتدا دوسه مرتبه از نو عظم
 بکشد تا آنکه خطی در او دیده شود و از آن خط از نو عظم را بریده و در او نودن هرگاه دو عظم بود باید برای
 حرکت دهند که هر دو عظم با هم قطع شود و چون خواهند پانین سیمون البو نمایند کار و دوم می نیز
 لازم بود و این عمل طریقه معتبر است که اگر کاهی بکفله کافی و کاد و قطع لازم شود و کاد با از ادا
 خارج و با از خارج داخل در این عمل بسیار لازم است که قبل از بریدن هر عملی را که باید برید باید
 یا رنگ دیگر نشان نموده از روی آن برهنه نماید بعد از بریدن عظم باید شستن آن عضو را بختن و
 سابق ذکر شد نمایند تا سیمان دم کرد و بعد نوبت در لیسیم جراحت نمایند
 و عضو خروج را بقسمی که از آنکه در نیم ثقل خود جاری گشته دفع کرد و کن ر جلد را با هم میل
 نمود با ششیم به چند برای آنکه جلد کشیده نگشته و اشلاج عارض نشود و فاش را از سیم
 داده شود و از عضو بچند و بر نفس را بقسمی بخواهند که بکشد عضو خروج را حاصل شود و از روی سیم
 پنهان با تقسیم که کرده است و با دستمال ملول در آید با دستمال نمایند و چون از استعمال
 آن وجع شد دیگر دید و قشیر بر عارض شود که آن نموده خاموات عارض با انصاف چون
 از بزرگ و شیر نمایند تا ماده نفع یافته دفع کرد و لازم است بر لیسیم نمانی را که بشر با سیم
 در بالای عضو با ششیم بچسباند و زمان باز نمودن زخم همگامی بود که ماده سود و ماده هم بر
 زخم را باز نمایند و این در قاعده بعد از بوم چهارم از عمل بود و باید بعد از زخم قشیری چای
 یا شراب بر نفس بنوشانند تا ضعف قوی و بدن رفع گردد و باید در بر نفس و در جلد شود
 اول آنکه حی شده نباشد تا آنکه درم زیاد کرد و اما از جتر رفع حتی هرگاه لازم باشد
 فصد نمایند ولی در قاعده به استعمال منصفی از کل و غیره رفع نمی کرد و از جتر رفع از نو
 درم زانو انداخته و از شکم سر بر غیره طلا نمایند و هرگاه از شدت درم ششیم که بعضی
 چمد اند شک کرد باید ششیم امقراض نمود چون از دانت مکان و غذا خای غوی

مانند آنکه در مفاصل چون جراحات بهر سهولت در حالت شایسته شود
فصل دوم در طریقه قطع اعضا از وسط عظم عضو و شل است بر دو جلد جلد اول در قطع
عظام بر حسب
اجزای اولی در سلامیات برین چون در سلامیات عمل از دم بهر سهولت تا سیون نمایند و از
قطع کنند که در سلامیات بزرگ که عبارت از باهام بود در اینجا سعی لطیف نموده جوی القاد
تا اینکه کمتر برین شود اگر چه بقدر رازنی باشد زیرا که هر چه کمتر بریده شود بیشتر بکار آید اما
طریقه عمل ابتدا از طرفین انسی و وحشی جلد را شق نموده بعد بطور دایره بریزند که قطعه از
و قطعه از شل به یاد بعد طعین را سطح و منطف بقوت سازند و معین آن دو قطعه را
نکاه بشت جراح عضلات و اوتار را بریده بعد بازه کوپلی عظم را قطع سازند و موضع مجروح
بقسمی که ذکر شد بسته و در التیام یافتن آن بکوشند اما قطع ممتد که از وقوع در دو نوع
بود نوع اول آنکه حسیع عظام شل را قطع نمایند و درین قسم است که دست را در میان حرکت
انسی و وحشی گداشته مدی باهام علیکر گرفته بجانب برین منجذب سازند و دیگر ساق
انامل را گرفته بجای کشند و جراح بر وضرب جلد را با بسته بریده و سطح نموده منطف
بقوت نماید و با کار دوم دیگر فاصله با این عظام را از عضله پاک نموده و از آن فایده و از هم را
بطریق مذکور بنسب و دیگر که از سمتی جلد فاسد شود باید شش از فوق یا تحت عاریه کنند و این
امور تا سیون شش یا الم بر نمانند و از طرف سالم نخه از جلد سالم ذخیره و با بقی را بطور
دایره قطع کرده و بقیه عمل را بطریق سابق با تمام رسانند نوع ثانی آنست که یکی از عظام
فاسد شوند و این نیز دو قسم بود یکی از عظام شل طرفین فاسد شوند و با عظام وسط
اما هرگاه عظم شست یا با بصر خراب شوند
باینطور قطع نمایند که موضع مطابق جلد که از تحت او خواهند عظم را قطع کنند نشان گذارند
و ازین نشان خطی کشیده که از وسط دو نخست گذرد و از کف بین خط مر اجبت نمایند بطوریکه
دایره پس منحنی حاصل شود انگاه جراح مشرط اگر چه از بین نشان جلد را بریده بعد مدتی
اطراف را لف نموده پس از آن عظم شل را از اوتار و عضله پاک نمایند بعد شش تا زکی در میان

بجای

و عظم شل نصب نموده بازه موسوم بازه سلامیات بوزن زده نموده قطع سازند انگاه یکی جلد را
بیکدیگر متصل کرده و موضع مجروح را بشمع و اخیون رفاذ نمایند نوع دوم بجای
جلد از فوق و از تحت نقطه نشان گذارده انگاه این نقطه را بوسیله دو خط که میان دو نخست
گذرد بیکدیگر متصل سازند بطوریکه شکل مربع مستطیل در آید انگاه جراح از بین نشان پوست را
از فوق و تحت بر دو اطراف جلد را لف نموده و عظم شل را از اوتار و عضله پاک نمایند و شش در میان
عظمین شل نصب نموده بازه بوزن رفاذ نموده و از شمع و اخیون رفاذ نمایند و نایب باینکه نشان
سالم را ملاحظه نموده تا خط از اوقات نماید اما قطع عظام رسع ممنوع و مژدک اهل است و اما
آنکه هرگاه جراحی را منوط وضع دارد باید صورت تفریح کرد و اما قطع عظام ساعد حکای سلف
در قطعه اسفل آن عمل بدنی نموده بجهت خوف جراحات و تار و لی اکنون از هر موضع که خواهند
عمل نمایند اما طریقه عمل باید عامل بر نفس نشانده و خود بقسمی است که با دست چپ نشانده
ما فوق عضو را بکمر دو دست اشترایان عضله را بطوریکه بسته بر نفس را بهوشش نمایند پس از آن
جراح با کار و محذب جلد را بریده قطع نموده و سطح کرده منطف بقوت سازد و جلد را گرفته
جس را ج عضلات و اوتار را برید و چون در تریاکار بریده نشود باید کار در زیر انحصار برده از
داخل جراح قطع نموده بعد عضلات و اوتار میان دو خط پاک کرده و با دستمال سه سر با فوق
محافظت نموده و عظام را زده و از جهت سهولت قد شریان باید عضلات با این را مانند زبانه باز گذارند
تا سهولت اخذ شود و لازم است که دو عظم را پس اوات ازه نمایند که هر دو یکبار قطع شوند پس
از آن شریان را اخذ نموده شد نمایند اما شریان که در اینجا باید اخذ نموده باید ازین قرار است
شریان زده اصلی و شریان زده اسفل و اکثر اوقات شریان وسط عظمین بر بوده و هرگاه از ورید دم
سیلان نماید طوری که است نموده و در بعضی چند نفس متواتر و متعاقب کشند تا دم سد شود بعد جراح
بطریق مذکور رفاذ نمایند و از برای آنکه ماده بغلاف عضلات رود نواری چند و چون درم
رایا کرد و زوایا انداخته شکر سرب طلا نموده و در وسط و اعلائی ساعد نیز همین نوع عمل
نمایند ولی در قطعه اعلائی از خوف عروض تو دم در مفصل اکثر حکا منیع نموده اما طریقه عمل
نخست عاریه در قطعه اسفل نمایند و در وسط نیز بندرت عمل نمایند اما طریقی عمل بد نمودن چون خواهند

از پیش ساعد مباشرت عمل نمایند باید با انا مل ابهام سبب از سمت النسی و وحشی ساعد کشته
 با کار دی دودمه از سمتی محاذی با کشت نیز عضلات فرو برده و از سمت دیگر نیز محاذی با کشت
 پرون آمده و بواب کار در پرون کشیده قطع نمایند و مد کشته را بالا گرفته جراح سبب را اعمال را
 بطریق مذکور با تمام رسانند و چون خواهند از پشت کشته عاریه بکنند باید از پرون بریده و با
 روئولی این عمل را بزند و نباید اما قطع عضله چند نوع است و در هر یک از انواع باید بر آن
 بواسطه فشار ساعد نمود تا سیلان دم عارض نشود و چون مد صاحب سر شسته بود و در قطع
 عضله نخواهند عمل نمود اولی آنکه جلد را بالا کشیده و جراحی قطع آن نماید و دیگر نیز جلد
 جلد و عضله مشطبه را بقوت بالا کشیده و جراحی عضلات را تا عظم برود و بعد از پاک نمودن
 عظم از عضلات از برده شده عظم قطع نمایند و بعد جلد را با این آورده زخم را زخم نماید
 ولی این قاعده اغلبی نیست اکثر به وضرب قطع نمایند و طرفی این عمل است که در قطع
 ذکر شد از بریدن جلد و مشطبه نمودن آن و بریدن عضلات و پاک نمودن عظم و
 کردن آن با چون خواهند که کشته نماید در قاعده دو قطعه ذخیره نمایند و با این طریق مباشرت عمل نمایند
 که با ابهام و سبب طرفین عضله را گرفته و با کار دودم از سمتی فرو رفته و از سمت وحشی
 پرون آمده قطعه داخلی نمایند و بعد از طرف خارج نیز قطعه نموده و عظم را پاک کرده از آن نمایند
 و شریان غائر و ظاهر موضع را سبب نموده زخم را زخم نمایند تا شریان این عضو که با کشته
 از این قرار است اول شریان عضله است که از سبب سمت النسی عضله ذوالکعبه
 نمایند و دوم شریان غائر عضله است که بطور دراب از سمت النسی و پشت مهره وحشی عضله
 عبور نمایند
 جلد ثانی در قطع عظام رجل با سلامیات و مشط و سبب مانند سلامیات و مشط و عظام رخ
 ریاست اما قطع ساق چون ممکن بود توان بایستی صغری از فر با چوب ترتیب نمود قطع
 ساق نمایند بدین قسم هرگاه که فر باشد هر چه از اسفل بریده شود اولی تا مورت ثانی تا
 نمود و هرگاه چوبی باشد هر چه از اعلى بریده شود اولی است اما چون بایستی فری بر
 شود باید چوب کشت مضموم از تحت زانو مطلق به قصبه بگری و نیز زانو نموده و در اینجا اگر
 صغ

و در اینجا اکثر قطع دایره نمایند اما طریقه عمل باید عامل برض النقیصی بخوابد که بایستی جرح از
 تجاوز نموده و او نیمه و بایستی دیگر ساعد بگری و دیگر کینه داده و مد آن نقیصی که ذکر شد عمل را
 او را گرفته جراح ابتدا جلد را بریده و مشط نموده و بعد عضله ظاهر را بریده پس از آن
 عضلات با این دو عظم را با دستمال سر را حفظ عضلات نموده عظمی قصبه بگری و صغری را
 پاک کرده و از آن نمایند و در بریدن عظم اندکی از قصبه بگری نموده تا نصف شود و بعد قصبه
 صغری را با مشط نموده و چون قطع عضله شد شریان النسی و وحشی و علف نموده و زخم
 زخم کند و گاهی شریان با این دو عظم نیز از دم سبب زانو آنجا که جلد سمتی غاصه بود باید نیمه
 از طرفی بگری و لیکن اکثر قطعه را از خلف نمایند و در این عمل باید که با سبب و ابهام طرفین ساق
 شست نموده و با کار دودم از طرفی فرو رفته و از طرفی دیگر بواب پرون آمده و قطعه
 و باقی عظم بطریق مذکور با تمام رسانند و در این عمل ملاحظه نموده که ریم در عضون جلد ساق
 از جلد برهند تا ند که سبب طول النیام کرد اما قطع نموده عمل در عضله است ولی اکثر بگویند
 و در این عمل هم آن رود که طبیعت غذای انضواء محل دیگر رساند و سبب قوام او که در دو
 اموناسیون بر وضرب و قطعه بطور کشته توان نمود
 فصل دوم در قطع عظام از مفصل چون در قدیم عمل قطع را در زمان سحر میسبب نموده
 اکثر بطلان میسر میشدند و با این واسطه ازین عمل بسیار خوف بودند ولی حال چون معلوم
 که ملاکت ایشان را سبب روانت زمان بود برفع بیم و خوف شده اکثر از حکما در وقت
 از دم قطع عضله از مفصل نموده و نمایند بطلاده عمل رسکسیون که عبارت از کشف مفصل و
 از نشانی عظام مفصل و النیام جراح است آخر آن مشغفت زیاد از آن میسر نموده اما
 در این عمل که قطع عضله از مفصل باشد لازمست که عامل عالم علم تشریح بوده باشد و ارتباط
 و رکت مفصل را بخوبی در خاطر داشته باشد و نیز باید عالم باشد که از کدام زانو عظم
 بریده شود و چه عضون جلد مادی عمل است و باید از وسط جلد که در مفصل چپا بریده با زانو
 و نشانی آن و گاه چون جلد را بریده و از مفصل خارج شود باید عضله را حرکت داد تا از
 حرکت مفصل را باید در قوا عدل کلیه اول باید که با دو کشت از طرفین محل عمل را

tariqhema.org

tariqhema.org

مشخص نماید و درم چون خواهد از سمت انبساط مفصل قطع کند عضو مات را نمی سازند
 سیم آنکه بایست و ثانی قطع عضو کند بقوت شدت بواسطه آنکه اگر مفصل را نشاند
 آنچه قوت نماید چیزی برده خواهد شد چهارم چون مفصل کشوده و غیره و ف بود اگر در
 کار در اوقات نباید که گرفت که مانند مضرب کا بخور دست گرفته و ثانی قطع نماید چنانچه چون
 طولی در قطع هر سه ممد را شاید که بقوت عضو را از مفصل جدا سازد و بواسطه آنکه و طبی
 شد و از عارضی که در او قطع عظام رنج ششم آنکه عالم باشد بر آنکه تا طبیعت غلبه
 مفصل را از این نماید و در انبساط هر جهت نبرد از درم چون در سابق مذکور شد که حال در قطع
 از مفصل باید که ای از علم شریع داشته باشد اندازنی از ترکیبات مفصل را شریع
 میداریم تا آنکه اگر عامل عالم علم شریع نباشد فی الجمله بصیرت در شریع و ترکیبات مفصل
 هر سه سینه و در تکب عمل شود تا ترکیبات مفصل از این قرار است به آنکه در بنده مفصل
 اول سلاطین عظم سیم در وسط توده از طرفین ثمره و عظم دوم قرار باشد و از طرفین رباط می
 کشیده شد که باقی از حرکت طرفین است و مفصل دوم سلاطین را بند و اتصال
 بطریق مفصل مذکور قرار تا در مفصل سیم که عبارت از مفصل شط و اندک بود و توده عظم
 سلاطین و ثمره و عظم شط میباشد و این توده و ثمره و عظم سیم در اعلی مفصل
 رنج و شط منوعت اند علم و شناسائی بر ترکیب آن لازم نیست اما مفصل رنج و شط
 سه عظم علای رنج محذب مانند قوسی بود و در اعلی مفصل شود دیگر عظم اسفل که عظم می
 نامند و در اسفل پوسته و از طرفین زمین دو زائده است که قوزک نامند و این دو
 زائده از طرفین عظام رنج تجاوز نموده و عظام رنج در تقعر باطن دو قوزک قرار یافته اند
 اما مفصل مرفی در زمین اسفل در خلف او زائده عظمی است موسوم مرفی در قدام نیز
 زائده صغیری است که در میان این دو زائده و ثمره باشد به جهت مکن مهره ای منقسمه و در
 اعلی را نیز ثمره میباشد به جهت مکن مهره و شش عظم عظم مهره و مهره از جانب شش
 و انشی میباشد و در خلف عظم تقعر عظمی به جهت مکن مهره عظم زنده اسفل و در قدام آن نیز
 تقعر صغیری است به جهت مکن زائده صغیر زنده اسفل میباشد و از طرفین این مفصل رباطات می

ثانی را در وسط ثمره و از طرفین
 توجیه شد که توجع عظم
 سیم در ثمره و عظم ص

اعطای دارند

اعطای دارند اما مفصل عظم و کتف در عظم مهره و در عظمی می باشد و عظم کتف ثمره صغیری است
 عظمی عسلاده زائده عظمی از عظم کتف برآمده و بطرف ترقوه پیوسته که همچون چادر است مفصل را
 دیگر عظمی نیز مفصل اعطای دارند که تا آن بریده نشود مفصل نبود از مکرر و اما سلاطین بر جل
 مانند سلاطین در مفاصل در مفاصل رنج و شط جل بخلاف راست که در مفاصل منوع
 و در این عمل مکن و جایز است بتوان عمل بر نمود و این مفصل بطریقی است که از زائده و شش جل
 که متعلق بطرف آخر شط است مفصل بر او راب و درم چون عظم متعلق نباید رسیده قدری برآمده
 و عظام رنج فرو رفته و چون از او گذرند عظم متعلق نسبت نزد در و یف عظام مذکور است اما
 در مفصل رنج جل نیز عمل منوع بود لهذا ذکر ترکیب آن نیز نمی نمایم اما مفصل رکتبه در رنج
 کبری و دوزخه است که در سلاطین واقع و در عظم فقره دو زائده می است که در ضرای فیصیه
 قرار دارند و در مفاصل نیز عظمی است بعضی شکل موسوم بر صفت قرار دارد و اما طریق عمل در سلاطین
 باید که عظم اخیر را منحنی نموده از تحت برآمده کی که نمودار شود جلد بر مفاصل رسید
 و اتصال مفصل را نیز قطع نموده بعد کار را از مملو عظم نیز مفصل برده و قدری از جلد
 بریده مفصل را برینند و باید داشت که چون از روی برآمده کی مفصل کار گذارده برینند اند
 مفصل بتوان رسید اما در مفصل شط و سلاطین شط از پشت مفصل نشان کرده و عضله
 پستی شکل بریده و چون مفصل نمایان شود اتصالات از مشرق نموده و قطع سازند و درین عمل
 بهر قسم که خواهند قطع میستوان نمود اما قطع مفصل باید دو نکته باین تر از مفصل قطع
 مایه سطح نموده و منقطع بفرق کرده بعد دست را بجانب تحت منحنی کرده و از تحت قوزک
 زنده اعلی با کار و کجی بطور دایره برینند از دست البه نمایند اما قطع مفصل مرفی در این مفصل
 عمل کمتر نمایند و اکثر قدری از بالای مفصل قطع کنند اما طریق عمل ابتدا جلد را شل
 و منقطع نموده بعد دست را خم نموده و در عضله دو زائده را کس را که مرفی مفصل است
 بریده و در دست را عقب منحنی نماید که راس زنده اعلی پدید آید و در اوقات اتصال از این زمان
 نموده کار در میان شیار خلف عظم دوزخه زنده اسفل برده قطع اتصالات آن کند و شش برین
 نموده زخرا را فاد نمایند اما چون خواهند قطع قطع نمایند مری از پشت مرفی برینند که یک

قطع مفصل نباید و نیز
 میتوان بعضی آنکه جلد را
 مایه جرح

مصلح علی آن متصل بحد بود از بالا زنده و در مذکور از مرفی بریده و قطع نهال اعلی نموده
 اگر خواهند که نهایی مفصل را به شفا قطع کنند تحت بزرگم نهاده آرد کنند و الا در صورت
 مقصود قطع زدن از مفصل باشد باید بعد از قطع اتصالات مفصل کار در اوقات
 گوشت نیمه قدری برده و بر زنده و شش این نموده و باین قطعه در ابی جراحی پاشیده
 بعد از فاد نمایند اما قطع مفصل ابتدا جلد فوق مفصل و عضله الی کتف را بطور مرتب
 بریده و بالا زنده بقسمی که مصلح بالای متصل بحد بریده نشود و چون مفصل نمودار شود
 در دست را بایلی جانب فوق بدن نموده و شش را خارج دهد و جراح کار و بسیار مکی را
 با قوت زیاد در پشت گرفته و شکافی بیکر محیط مفصل داده تا آنکه بقوت شش را جدا
 مفصل از یک خارج شود و جراح یک را بریده و شش نموده از مفصل بردارد و در اینوقت چون
 خواهند که سگسور نمایند تحت بزرگم که آرد و در غلظت را آرد و بر دارند و غلظت را
 متصل نموده و زخم را فاد نمایند و چون خواهند بالمره مفصل را قطع نمایند کار در تحت غلظت برده قطعه
 دیگر از تحت لوراج نموده شش را بران کرده زخم را فاد نمایند و در این عمل قبل از شروع
 باید قوت شش را بران تحت زخم نماید که خون زیاد متوقف نگردد و این عمل اغلب ممکن
 و خلیل الوقوع است و اگر اوقات جراح خود را جراح سارز اما قطع سلامیات حل نماید
 برده و اما قطع مفصل رسن و شطرجل برده نوع است یکی آنکه از مفصل رسن و شطرجل
 کنند دوم آنکه از این رده اول دوم رسن قطع نمایند اما طریقه اول که متعلق بطریقه حکیم
 نیز است بدین نوع نموده شود که چون زنده و ششی غلظت را پس از نموده قدری از مقدم آن
 قطع نموده و منقطع بقوت نمایند و بعد از فاد از جلد خارج قطع کرده و دردی غلظت را از تحت
 برآمد کی مذکور پاک سازند تا خضروف مفصل نمودار گردد و جراح مفصل را بکسر و بطل
 در ابی قطع نمایند و چون مفصل چهارم رسد بقدر دو خط بالا تر از جلد یعنی که در دست است
 و در غلظت را پاک سازند تا خضروف نمودار شود و بقوت را با این شش را در دو نوعی که چنان
 نمودار شود که خواهد شکست و جراح مفصل از طریق قطع سارز و بعد مفصل خمر اسوی قوت
 و جدا نمایند بقسمی که کار در اعلی برده با این کشت قطعه دیگر از کتف و جراح خارج شده

و نحوه

و قطعه کافی از کتف با بواب بریده زخم را فاد کنند اما طریقه ثانی که متعلق بحکیم شویات
 چنانست بدین قسم است که خلف برآمدگی زور قی را بقدر یک شصت از قوتک النسی ببرد
 نشان نموده و قدری پیش از آن خطی در جلد پشت پانوده و از طرفین النسی و وحشی نیز شش
 بقدر یک شصت در جلد داده و جلد پشت را از موضعی که خط کشیده شده است سلیج
 و منقطع بقوت نماید و بعد از خلف برآمدگی غلظت کور مفصل زور قی و کتف را بریده و مفصل
 باین زردی و کتف را جدا ساخته و نایب با بقوت با سفل فشار داده و جراح او را
 اسفل را نیز قطع ساخته و با کار دیگر قطعه نخعی را نیز برداشته و سیش این نموده زخم
 را فاد نمایند اما قطع و عمل نمودن باینده و طریقه امری است عظیم و هر شخص شود که مرکب شد الا
 آنکه مفصل آگاهی از علم تشریح یا از اشکال و ترکیبات ان اطلاع کامل داشته باشد
 در این صورت تواند مرکب شدن اما قطع از مفصل ساق و رسن ممنوع بود اما قطع از
 اول سده شش را این او نموده و از ردی که جلد را پس می بریده سلیج و منقطع بقوت نماید
 و بعد از آن قطعه را گرفته تا خون سیلان نماید و بعد دیگر را زخم نموده و جراح او را با سفل
 در باط ان موضع را بریده و مفصل را قطع کرده پس از آن کار در تحت غلظت عظم برده قدری جلد را
 از عظم جدا نموده و قطعه اسفل را نیز بریده بعد از شش بران زخم را فاد نمایند اما قطع
 مفصل قده از حاق القوه ممنوع و متعذر العمل میباشد خانه کتاب جراحی در بیان نسخه جانی
 در ضمن این کتاب بنا بر محتاج گشته و رجوع نمایند و مثل بر چند جلد اول در ذکر ششعات با قول آنها
 شمع مردار سنگ ساده صفت آن کبر زنده مردار سنگ نرم کوفه پنج جز روغن کچند جز دریا
 ریخته و دردی آتش ملایم که آشته و متصل به نرند تا بقوام آید و در اینوقت باید که کم آب بر روی او
 ریخته و در روغن او نوزد و سپس قسم بقدری بچوشانند تا بقوام شمع گردد و بعد بیکر خویط
 کرد این شمع از برای جراحی است ساده و پوشیدن جلد متفرج سودمند است و چون قوت
 چسبندگی او کم است لهذا اکثر محتاج میشود به استعمال شمع مردار سنگ که کتب که هم او را شمع
 و یا شمع دیاغلیون نامند و در طهران بنام شمع عربی مشهور است دوم از آنها شمع
 سنگ مرکب است که شمع دیاغلیون باشد صفت او کبرند شمع دیاغلیون ساده که

مذکور شد چهار جز موم زرد نیم جز آبش لایم در ظرفی گذاشته از روی آتش بردارند
 و چون قدری سرد شد ربع جز روغن زیتون با روغن سفید و ربع جز روغن
 و بار دیگر قبل از آنکه منجمد باشد علاوه نموده و بسوزند دوباره در روی آتش لایم
 خوب بچرخند و تا روی آتش است متصل بجز ده و یکدگر خوب مخلوط نمایند و چون هم منجمد دارد
 لهذا باید در حالت بخن که کم آب اضافه نموده و بهتر شد و چون این شمع چسبندگی
 دارد لهذا در اکثر جراحت زیاد مفید است سیم از آنها شمع در اربع صفت او بکشد
 موم زرد و روغن سفید و روغن کجد که سه جز و در روی آتش لایم با هم مخلوط نموده
 نموده بپزند و چون مانند شمع گشت از روی آتش برداشته و بکند از نادر می
 شود بعد شش جز در اربع کوبیده با و اضافه و مخلوط نمایند و این شمع است که
 در شش ساعت جلد را زخم کند چهارم از آنهاست شمع در اربع صفت او ای صفت
 بکشد موم زرد و دو جز زرف سه جز پسته کوفته و سفید و بنفشه که دو جز با هم بکشد مخلوط
 و در روی آتش لایم بچرخد و ببرد شدن دو جز در اربع کوفته و اصل او نموده
 خوب بپزند و چون چسبندگی زیاد بجلد دارد و لهذا در صورتی استعمال نمایند که بخوابند
 مانی زیاد ماده از عضوی بسیار و افلاک و روز طول کشد تا این شمع از عضو بکند
 شود و بدانکه در اربع با بناید در روی آتش مخلوط بسیار از آن نموده در آنکه حرارت آتش
 او را بوزانند و تا آتش تمام شود نیم از آنها شمع شوکران است صفت او بکشد موم
 زرد یک جز قلع بنیاد و روغن کجد که نیم جز و چون آبش لایم که آتش و هم مخلوط نموده کم کم
 یک جز کرد شوکران اضافه کرده و خوب بپزند تا مخلوط شود و این شمع محل در خیار
 و تفرسی و خدی است و اکثر استعمال شود در اراض چشم ششم از آنهاست شمع کلک
 طریقی ساختن او بکشد کلک ملک تازه سه جز پسته کوفته که آتش چهار جز و در آتش لایم کم
 کرده و از غزال که رانیده بعد از زرف و شش جز موم اضافه نموده دوباره با آتش
 لایم که آتش مخلوط به هم نمایند و این نیز محل ادرام خاکیست هفتم شمع بارز و باغیان
 صفت او بکشد شمع ملک و شمع مردار سنگ ساده که سه جز موم دو جز با زرد مخلوط

در روغن

در روغن زیتون شش جز روغن کاج یک جز روغن زعفران سه ربع جز با حرارت لایم بپزند تا
 گردد و این نیز محل ادرام است هشتم شمع شبنم با روغن که غرض صفت او بکشد شش جز روغن
 غنصل دو آتش قدری بپزند که توان مانند شمع روی تاج کشند و این شمع بسیار خوبی
 بخت تخلیل ادرام مفصلی نیم شمع انگلیسی موم شمع نافه صفت او بکشد تا قدری صاف بسیار
 بار چند در کارگاه قلابه و زنی سخت کشیده بطوریکه چنان باشد که بعد سرشیم اسی را حل کرده
 با قلم موسادی بر روی او بکشند و بعد از خشک شدن دوباره سرشیم مایه آید و بکند از
 خشک شود تا دو سه مرتبه همین طریق عمل نمایند تا مانند ورقه بر روی او کشیده شود بعد بکشد و
 حسن به و در عرق حل کرده بعد از روی او با قلم موبالید خشک نمایند بعد از کارگاه باز کرده
 گاه از آن و هم شمع چوبه است بکشد شمع مردار سنگ ساده یک جز موم سفید ربع جز آبش لایم
 که آتش و هم مخلوط نموده از روی آتش بردارند بکشد قدری خشک شده چوبه یک جز با روغن
 روغن کاج بسیار تا کشته کرده بعد کم کم داخل شمع و موم آب شده نمایند و این شمع
 بسیار خوب است بخت تخلیل ادرام

شمع جات ادرام

اول دهن بکشد موم کجور با دو جز روغن کجد که آتش نزدیک ببرد شدن یک جز کلاب
 اضافه نموده محمول دارند اما محل استعمال در شقاق جلد اعضا بسیار بکشد و مفید است دوم
 دهن با سلقون بکشد روغن کاج یک کوفته قلع بنیاد موم زرد یک جز روغن کجد شش جز
 طبع لایم داده استعمال نمایند اما محل استعمال بخت جذب مواد نیکو و بسیار از نموده است
 شمع دهن در اربع روغن کجد شش جز موم سفید چهار جز با یکدگر بکشد واده در اربع سه جز شاف
 نموده استعمال کنند اما خواص بخت جذب مواد بکشد زیتون دو از ده جز اصل مصفا چهار جز
 روغن زیتون سه جز صبر زرد یک جز با هم که آتش و مانی حاصل شود و خواص بخت
 جذب مواد است

دهن بخت حاصل شدن زخم بکشد روغن ساده سه جز زیتون فی کجور صلابه نموده تا دهنی شود
 و از جهت حصول جراحت دهن نمایند روغن چوبه خاکسری بکشد چوبه دوازده جز با شش جز

ایضا بسیار مفید است
 ایضا دهن بخت جذب
 مواد است

پس که سفید صلابه نموده تا کشته شود بعد ازین با شانه زده جزیره خشک سخی و صلابه نموده
 بعدی که با ذره بین کولهای چوبه محسوس نشود و از عل صلابه است از خود بود هرگاه قدری
 از روغن چوبه خاکستری بطورایه بکار رود و بجهت تحلیل ادرام بی نظیر
 و هن بد که در روغن ساده چهار جز، یا هشت جز، یا در قلیا بی کج، یا خالص شش ساید
 تا دهن شود بجهت تحلیل نفوذ و ادرام زنده بی نظیر و همین چوبه سرخ کمره چوبه سرخ
 دو کدم روغن ساده بکشتال یا صفت آن چوبه را اولاً با اندری دهن ساید بعد
 دهن ساده را اضافه نموده و صلابه کرده تا دهن شود و بجهت شقاق لب و بینی بسیار بی
 نظیر است
 دهن معطر کمره مغز استخوان کاه مصفی است شقاق عطر کل سرخ بقطره اضافه نموده
 بسیار تا دهن شود و بجهت معطر داشتن مو استمال نمایند
 دهن مخفف فروحات کمره پنبه روی کج، روغن ساده نه جز، یا یک کمره ساید تا دهن
 کرد بجهت مخفف فروحات نه من نمایند و دهن کافور کمره صمغ عربی هشت شقاق با شانه زده
 شقاق آب خالص ساید تا آب غلیظی شود بکشتال کافور مقهوری ساید تا روغن
 شود بجهت فروحات جبهه که سبب خاندن باشد بکجهت بی نظیر
 دهن بجهت سوختگی کمره زرد روغن بزرگ بعد کفایت آب آهک مصفی بعد ری بجهت کاه
 و از روغن سیج مرئی شود دهن جرب رطب و زرد ریش کمره زرد روغن قیطان کج
 روغن ساده کج، در روی آتش کاه نموده تا روغن شود
 روغن شکر سرب کمره شکر سرب کج، روغن ساده و از ده جز، بجهت تخفیف
 صغیر
 آب دلاک کمره صابون جلیبی سه جز، کافور شش عرق دو آتش دو جز، با حرارت آه
 حل نموده بعد از سرد شدن روغن حاشا از شانه زده جز کج، عطر اسطوخودوس
 شش جز، جوهر نوبش در سه جز، یا یک کمره خلوط نموده تا دهنی حاصل شود و موسوم
 با اسم عربی شده و آب دلاک گوشت و بجهت اد جاع و ادرام مفصل بر من بی

در مایات

اول است آب سیرین موسوم با اسم حکیم مخترع کمره زرد کمره پست و چهار جز، عرق دو آتش
 کج، زرد عرق کوه کمره زرد عسل مصفی کج، و خلوط نموده بجهت سبیلان دم و تحلیل خونی
 در تحت جلد مرده باشد مفید آب کولار و نام حکیم کمره شکر سرب نیم جز، آب چاه و عرق آه
 دو جز، خلوط نموده بجهت تحلیل غلظت و تحلیل خون مرده مفید
 آب پلک موسوم با اسم حکیم کمره کافور و آه شسته که سه خود راج صغیر شکر سرب کمره زرد
 سرکه و عرق شکر که سی و شش خود خلوط نموده تا مانند کک است شده بعد روی پارچه کشیده
 بر روی نولهای کوفی موسوم بکدیلان انداخته از جهت دفع موی نظیر
 در عرقیات با عرق کافور کج، عرق دو آتش، با کافور خلوط نموده تا حل شود پس از آن صاف کرد
 بجهت تحلیل خون مرده و غلظت و کوفه شدن عشا بسیار مفید و چون با دوازده جز، عرق
 کافور یک جز، زعفران اضافه نمایند و قوی کرد
 در ضادات کمره بزرگ با شیر کاه و طبع داده تا مرهم شود بعد در میان دو لته نهاد تا
 آلوده شود بجهت نفع مراد بسیار بکوست
 ضاد مخفف کمره بزرگ شکر آن کج، بزرگ بزرگ بزرگ کج، دو جز و در شیر کاه
 داده تا مرهم شود و از جهت تحلیل ضاد نمایند
 ضاد دیگر کمره بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ کج، کافور و با شیر کاه و طبع داده بجهت نفع
 مواد ضاد نمایند صوف دندان کفایت کس که کمره و از صینی ریشه ایر با دقال که دو
 ل ده کدیم صوف نموده بجهت رطوبت نشویند صوف دندان کج، و از ده جز و صوف
 صدف در با شش جز و نیتن که جوهر باز و با کج، و چون جوهر باز و مکن باشد از خود باز
 در جبهه و صوف نموده با مساک فرنگی دندان را بنویسد بجهت رویندن و پاک داشتن دندان
 و حکم داشتن نه دندان بسیار مفید
 در نتیجه جات مختلفه
 نسخه جوهر کدنه از دوالی بکندم جوهر کوه کوه کج، پنج قطره شربت پوست نارنج دو درم آب خالص

چهاردم دواي کروز به دفعه صبح و ظهر و عصر بخت نقیبت کوزه سیلان داده که بخت
 نسخه است که یکی دو مثقال در دو سیر و نیم آب دم نموده بعد صاف کرده و یک
 زنجبین که شش مثقال اضافه نموده بنوشند مسهل است بگو از جگر رفع ثقل و
 و جذب ماده از اعالی به اسفل مجرب
 نسخه دیگر کلک یک الی سه گندم فسل از خواب بخورند و صبح بعد بخت مثقال روغن کر
 مسهل است منفع مخصوص تحلیل اودام و صلابت آن بسیار مفید
 نسخه دیگر بوزن چینی شش مثقال خود حق نسبی مکیس شش مثقال خود از رفع ثقل و استلا
 در ناهین و انخاص ضعیف است بگو است
 نسخه دیگر شکر سرب یکدم سرکه و عرق و آتش از هر یک چهارم آب خالص چار
 در او تر نموده در ظرفی با قروح نازده طلا ناید نسخه یکت طعام و نموده و نشا در آب
 بساوی آب خالص بعد کفایت محلول است مبره و قائم مقام نج
 نسخه دیگر که زنده در چهار درم سرکه و عرق از هر یک چهار درم عرق کافور و شکر
 محلی است بسیار یک مخصوص در قل الماء که طحال را عارض شود
 نسخه کل سرخ یکدم در چهار سیر آب دم نموده جوهر سوره دو درم خفاده کرده و در
 بدن تفیل نمایند
 نسخه نظرون می بندد درم عصاره زرد اسبج دو گندم شیر بادام شیرین چار سیر
 از جهت رفع حرقة البول استعمال نمایند
 نسخه دیگر که زنده یک بندد درم باج شیر کاه و سائیده و مریض را در شب بخوراند
 نیز جهت رفع حرقة البول و نفوذ بسیار نافع
 نسخه دیگر بلبان یکا بوسی قطره پانزده قطره صبح و پانزده قطره شام بروی
 چکاند مسهل نمایند هنگامیکه هت و شدت حرقة البول شکسته شده باشد
 نسخه دیگر که یک یا چینی چار مثقال صوف نموده دو مثقال در صبح و دو مثقال
 در شام میل نمایند در حرقة البول مفید بود

نسخه

نسخه دیگر که زنده جوهر از و که غلین نامند چار مثقال خالص دو سیر در صبح و شام
 نسخه دیگر که زنده زاج آهن که زاج سیاه صباغان مشهور است نظرون می از هر یک شش مثقال
 عرق جوهر اسود درم آب خالص سه سیر شرب یک سیر دواي دور در سه دفعه صبح و ظهر و
 بخت ناهین و قله دم بسیار مفید و هنگام استعمال وقتی است که باجی نباشد و موله دم
 طیش قلب که سبب قله دم باشد نسخه دیگر که زنده از یک الی دو گندم بابت التوس
 چارده حب نموده یک حب صبح و یک حب شام یا دارا شکسته از یک الی دو گندم بابت و مثقال
 کلاب مزاج نموده دو مثقال صبح و دو مثقال شام بخت رفع مرض کوفت میل نمایند
 و یا یک یکم باند که ترکیب با سایر اجزای است و سبب غراب شدن اثر دارا شکسته است
 و اگر از دو گندم در یک کف جاز نیست
 نسخه دیگر که شیمون قی سه گندم الی یک خود در قدری آب خالص حل نموده و بنوشند و در
 قحانی آب گرم میل نمایند که معنی است بسیار یک
 نسخه دیگر که زنده یکا شش خود اینون یک گندم بر بستور ساقی میل نموده که معنی است
 نسخه دیگر که زنده شیمون قی یک خود داشت با زنده از هر یک دو مثقال شصت حب نموده دو حب
 صبح و دو حب شام میل نمایند در تحلیل درم غده و صلابت او بسیار مفید
 نسخه دیگر که زنده بوزن ارمی یکدم عمل دو درم و آب خالص چار سیر عرقه نمایند بخت
 قلع بسیار مفید
 نسخه دیگر که زنده زاج یکدم جوهر که کرده قطره تقطیر سرد و درم بطوخ پوست پد سه سیر عرقه
 بسیار قابض
 نسخه دیگر که زنده صوف باز و یکدم شکر سرب بندد درم دهن باکول شش درم برد از آب
 نموده در دهن نمایند
 نسخه دیگر که زنده شکر سرب یکدم اینون یک گندم و نیم و باج شش حب نمایند دواي یوم
 در سه توبه یکی صبح و یکی ظهر و یکی شام بخت رفع اسهال بسیار باغی که از دواي
 قابض شایسته تر گردد

نسخه دیگر که زنده زاج آهن که زاج سیاه صباغان مشهور است نظرون می از هر یک شش مثقال
 عرق جوهر اسود درم آب خالص سه سیر شرب یک سیر دواي دور در سه دفعه صبح و ظهر و
 بخت ناهین و قله دم بسیار مفید و هنگام استعمال وقتی است که باجی نباشد و موله دم
 طیش قلب که سبب قله دم باشد نسخه دیگر که زنده از یک الی دو گندم بابت التوس
 چارده حب نموده یک حب صبح و یک حب شام یا دارا شکسته از یک الی دو گندم بابت و مثقال
 کلاب مزاج نموده دو مثقال صبح و دو مثقال شام بخت رفع مرض کوفت میل نمایند
 و یا یک یکم باند که ترکیب با سایر اجزای است و سبب غراب شدن اثر دارا شکسته است
 و اگر از دو گندم در یک کف جاز نیست
 نسخه دیگر که شیمون قی سه گندم الی یک خود در قدری آب خالص حل نموده و بنوشند و در
 قحانی آب گرم میل نمایند که معنی است بسیار یک
 نسخه دیگر که زنده یکا شش خود اینون یک گندم بر بستور ساقی میل نموده که معنی است
 نسخه دیگر که زنده شیمون قی یک خود داشت با زنده از هر یک دو مثقال شصت حب نموده دو حب
 صبح و دو حب شام میل نمایند در تحلیل درم غده و صلابت او بسیار مفید
 نسخه دیگر که زنده بوزن ارمی یکدم عمل دو درم و آب خالص چار سیر عرقه نمایند بخت
 قلع بسیار مفید
 نسخه دیگر که زنده زاج یکدم جوهر که کرده قطره تقطیر سرد و درم بطوخ پوست پد سه سیر عرقه
 بسیار قابض
 نسخه دیگر که زنده صوف باز و یکدم شکر سرب بندد درم دهن باکول شش درم برد از آب
 نموده در دهن نمایند
 نسخه دیگر که زنده شکر سرب یکدم اینون یک گندم و نیم و باج شش حب نمایند دواي یوم
 در سه توبه یکی صبح و یکی ظهر و یکی شام بخت رفع اسهال بسیار باغی که از دواي
 قابض شایسته تر گردد

۱۰۱
بارب سوس چارده حب نموده یکج صبح و یکج شام میل نمایند از جبهه رفع کوفت بسیار نافع
نسخه دیگر آب اکث و کسیر خالص یا با شیر نیم گرم بنوشند از جبهه رفع حموضت معده و جش
حاض و حرقة البول و کثرة سبلان آده بسیار مفید

۱۰۲
نسخه دیگر که بر نذر پناس اندوالی سه خود در چهار مثقال کلاب حل نموده و دو مثقال شام
و دو مثقال صبح میل نمایند و این نسخه بجهت رفع کوفت مزمن و وجع عظم از اثر کوفت
و نفرس بسیار نیکوست

نسخه دیگر که بر نذر عظم سقر و درم لبان کپا پوشش درم غلو نموده سی قطره صبح و سی قطره
و سی قطره شام بر روی بخان قد داغ اضافه نموده میل نمایند در حرقة البول با غی
بسیار مجرب است

نسخه دیگر که نذر زاج سیاه صرزد از هر یک دو درم روزی یک مرتبه حب نموده در شب
یک یا دو حب میل نمایند در پوست مزمن استعمال نمایند که بسیار خوب است
نسخه دیگر که بر نذر پناس کچو و عصاره پوست سبز که دو و دو مثقال آب یکج نصفی صبح و نصفی
شام دواي خايزه مجرب است

نسخه دیگر که نذر زاج سیاه یک خود بر نذر پناس کچو یا حب کنند و با در کلاب حل نموده
بخورند دواي بکروز است از جبهه خايزه بسیار مجرب است

نسخه دیگر که بر نذر آهمن که محلول در آب نموده باشد و بعد ملخی کرده باشد با شکر
اندو و اندو کند شربت نارنج سه درم کلاب یک کسیر و نیم دواي سه روز در روز
بار وقت میل نمایند بجهت قلت دم در اطفال بعد از عروس نوبه مولد دم و هر
تحلیل از سایر املاح است

یکم نذر آهمن چار خود و در سه کسیر آب قره فرد حل نموده دواي سه روز است
خون در افع درم محال

نسخه دیگر که بر نذر زاج سفید و دو مثقال فلفونیا و صمغ عربی از هر یک نیم کسیر غلو نموده
بر موضع سبلان دم در نمایند

نسخه دیگر که بر نذر سسم الفار سفید یک کندم با سی کندم قد بسیار حق نموده یک کندم
و یک کندم شام که دواي بازده بوم باشد بجهت نوبه ریح عاصی و نبات قفس مزمن
و سرطان از موده است نسخه دیگر که بر نذر جوده و از موده و هفت الی ده کندم بارش

195

BLANK PAGES

196

BLANK PAGES

Foliated 4/17/90
JM



END OF REEL
PLEASE REWIND

