




START



REEL 130



Microfilmed 1990

**University of California
Reprographic Service
Los Angeles, CA 90024-151804**



6 inches

Reduction Ratio 13:1

**National Preservation Program for
Biomedical Literature:**

**Preservation of Persian and Arabic
Medical Manuscripts**

**Funded in part by the
National Library of Medicine
and the
University of California at Los Angeles**

(Contract Number N01-LM-9-3534)

October 1989 - September 1990

**The material on this microfilm
is of varying quality. Portions
of the material may be illegible
due to:**

**Aged paper
Foxed, stained, or insect
damaged paper
Water damaged paper
Glossy paper
Illegible script or faded ink**

**Red and purple within the
manuscripts may appear paler.**

**Los Angeles,
University of California**

Louise M. Darling Biomedical Library

**History and Special Collections
Division**

Persian Medical Manuscript Collection

(Shelved as Ms Collection 60)

**For permission to publish, or obtain
copies of microfilm, write to:**

**History and Special Collections Division
Louise M. Darling Biomedical Library
University of California, Los Angeles
Los Angeles, CA 90024-1798
U.S.A.**

*Ms.
coll.
no.60
RARE

Persian medical manuscripts. -- ca.
1100-ca. 1900.

150 v. ; 15 x 8-38 x 24 cm.

Entire collection microfilmed as part
of a National Library of Medicine
preservation project: the preservation
master negative is at NLM; the printing
master negative is at the University of
California's Southern Regional Library
Facility; a positive copy is housed in
the UCLA Biomedical Library's History
Division.

Formerly a part of: Near Eastern
manuscript collection, Dept. of Special
Collections, University Library,
University of California, Los Angeles,
and assigned accession no. 1117.
Transferred to the History Division
of the UCLA Biomedical Library in

CLU-M ejf 891113

CLUHsl SEE NEXT CRD

*Ms.
coll.
no.60
RARE

Persian medical manuscripts. ... ca.
1100-ca. 1900. (Card 2)
March, 1986.

Finding aids: Annotated and indexed
list available in library: Richter-
Bernburg, Lutz, Persian medical
manuscripts at the University of
California, Los Angeles : a descriptive
catalogue (Malibu : Undena
Publications, 1978)

1. Medicine, Arabic. 2. Manuscripts,
Medical. I. University of California,
Los Angeles. Louise M. Darling
Biomedical Library. History and Special
Collections Division. II. Series: Near
Eastern manuscript collection ; no.
1117.

CLU-M ejf 891113

CLUHsl

Persian Medical Manuscript Collection

Ms. 132

Author: Identified as Dr. Riḍā

Title: Nazf al-Damm

299 fols., 8.5 x 6.5 in.
(216 x 165 mm.)

Ms. not catalogued in Richter-Bernburg.
Description supplied by Dr. Hossein
Ziai, Department of Near Eastern
Languages and Cultures, UCLA (June
1990).




qas A

coll. 1117
ms 132

a book in *lindes*
part IV

1294 AH





THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES

BLANK PAGE

BLANK PAGES

3

CLU-M

BLANK PAGES

خود را سبک و خوشحال بیند و این در صورت امتلاء دم است و چون در هر خون در جوف
الت پانچ میماند و در وقت بعضی ملاقات مخصوصه میگرداند از جهت منع که در اجزاء
عمل الت میماند چنانچه در پنجین و مثانه و مجری بول منع میکند و منع بول را و چون در الت
دقیق نشکند اجزاء او را پاره کرده فساد بپاورد و علامتیکه مخصوصه ان الت است بوق
نماید چنانچه بعد در نزف الدم دماغی بیان خواهد شد و این خون مجتمعه در الت بعضی
اختلالات در حالت الت و در آلات اطراف و بجهت وسایل چنانچه در انواع سکه مذکور
خواهد شد

نزف الدم بسیار مختلف است که گاه غفله عارض شده و بعد از چند دقیقه دفع گردد و گاه
مدتی بدون انفصال طول کشد ولی در فاصلهای که باز با منقطع گردد که در این صورت
اخبار باشد که از چند روز تا چند ماه دوام ببرد و در این صورت خون مخرج جمیع
ملاحظه گردد که گاه خون سالم است یعنی که جمیع صفات خون طبیعی را و میباشد و گاه
در طبیعت است خون الود و چون نزف الدم طول کشد یا آنکه بدفعات چند عود کند انمی عارض
شده و جمیع علامات از قبیل پیرنگ جلد و پیش قلب و صدای دم در قلب و شرائین و تشیی
و اوجاع عصبان و اختلال در عمل تغذیه و ضعف قوی عارض گردد و خون این اشخاص در
ابتداء اکبر و لشر که گردد و چون عدد نزف الدم زیاد شود یا آنکه در یک دفعه مقدار بسیار
خارج گردد و قوی و سایر اجزاء صلبه خون نیز کوشوند و چون مریض جوان و قوی الت
بود انمی سرعت دفع شود ولی چون شخص پیر و ضعیف بود مدت زیادی جهت دفع
اولا دم و باید دانست که عرض انمی منع نزف الدم تازه نمی کند بلکه گاهی از وقت استعدا
شخصی بر عرض نزف الدم میافزاید

مصنفین انواع چند برای نزف الدم قائل شده اند بملاحظه شرایط و علامت عارضه که با آن
هر اهر کند مثلاً در وقت که نزف الدم شود در شخصی که جمیع علامات غلبه دم در او بود و بکنوع

کسالت

کسالت و جمالی در او بروز نماید که بعد از اخراج دم بر طرف شود نزف الدم اکطیوی نامند و
خون مخرج در این صورت بسیار قوی و غلیظ است و این نوع از نزف الدم در حقیقت معالجه
خودش است که پس از اخراج مقدار کمی از دم هم نزف الدم بخت شود و هم بکنوع بهبودی
مریض پیدا بد و معتقدین نزف الدم پسود در قوی که سبب و صدمه خارجی بود که حاصل
شده بود در تفریق اتصال الت یا عرف بغیان نزف الدمهای جوی و طی معاصرین این اعتقاد
ندارند و نزف الدم پسوان نوع از نزف الدم را نامند که عارض شود در اشخاص ضعیف و صفا
سوال القسید و این انواع نزف الدم با هیچ علامات عارضه و مقدمه همراه نکند و خون مخرج در
وسپاه و نک است و بعین غلیظ شود و این نوع در پو و با شکل شد و بعضی از انواع نزف
الدم است که بقواصل کوبانید و گاه بطور انتظام عود نماید و چون در زمان که باید عود نماید
ظاهر نشود و در صورت ظهور بعضی اتفاقات خطرناک میگرداند و از این چنان بود که طبیعت
بکنوع احتیاج باین نزف الدم دارد لهذا نزف الدم مریض نامید و عرض و لازم دانسته اند
مانند طشت در زمان که از بکنوع میباشند و این نوع ملاحظه گردد و اغلب در لوایف مخصوصه
شبهت دارد بر نزف الدمهای اکطیوی و آنجا که عود این نوع با انتظام بود غالباً در یک نوع هم
خواهد بود و چون بند ریت و موضع دیگر بروز کنند گویند که نزف الدم مخرجی اصلی خود
مخوف شده است و چون عرض نزف الدم در میان مریضی حادث بود که همراهی کند با بهبودی
انمرض نزف الدم بخلاف گویند تشخیص جالبین و معلین ببلدا و مدعی بودند
که میتوان عرض نزف الدم را پیش بینی نمود از علامتیکه در نبض بهم میرسد که نبض متله
و مطرفی گشته و انگشت لامر احساس کند که طولهای کوچکی در طول شریان عبور میکند
ولی معاصرین شکی در سقم این عقیده ندارند از اختلافات زیادی که در وجود با علم این
علامات در نزف الدم دیده اند و چیزی که میتوان با و حمل بر نزف الدم نمود عرض علامت است
که سابقاً در غلبه دم موضع مذکور شد و بعد از بروز نزف الدم چون خاب جی بود همه



تخلف دهند و فقط اگر خون از عمق مجاری طویل جاری شود و بعد بخارج دفع اشکالی در
حمل مرض بهم رسد و آنجا که نوزاد لدم داخل بود اگرچه الجلد شده باشد نوزاده شود از
شعرین و بوی و دقت و با احتیاجی جلد و غبار و عشی و سایر علامات که مذکور شد و اشکال
کلی در نوزاد لدم است که نوزاد دهند اصلی ما عرض بودن انرا و این مسئله را در نوزاد انواع نوزاد
بیان خواهیم نمود و فقط در اینجا ذکر میکنم که جز عراف و بواسیر هر نوزاد لدم که در سطح
مخاط روی دهد اغلب عرضی میباشد

تقلید المعرفه خطو لدم مختلف میشود بجهات چند چنانچه منکب طول کشد خاصه در نوزاد
الدمهای داخل که سبب و در دین دم نباشد دلیل بر خطر مرض است و عرض نشجات تقدیمه
الجبش مرگ خواهد بود و بر خطر مرض افزوده میشود هر چه خون بیشتر دفع کرد و هر چه زیاد
مرض نمود کند و خطر نوزاد لدمهای عرضی زیاد تر از اصلی است و در مشیوخ نقد المعرفه و در
نوزاد جوانان باشد و خطر مرض مختلف میشود موافق عضو معلول و موافق آنکه خون بخارج
جریان نماید یا آنکه در جوفالت جمع شده مورث اختلال نسج و عملان الت کرد و در چه بسیار
فرقا است مابین عراف اگر چه شد بد بود و نوزاد لدم و ما غی اگر چه بسیار خفیف باشد و در
قلبی از اشخاص نوزاد لدم لازم و نافع است ولی در اکثر مرض میباشد و لطیف باید بخلاف
قول فلما در دفع او بکوشد

اسباب جمیع اغشیه بدن میتواند محل نوزاد لدم شوند ولی اغلب عروق و اعراضه است
که عرقشان کثیر و جوشان نرم و شیشان لطیف بود و باین جهت است که اغلب عروق نوزاد
الدم در اغشیه مخاط باشد و عارضی که در جمیع اسنان بخصوص در سن بلوغ و در
شبان و بعد بیان خواهیم نمود که در هر سنی هر موضع از بدن استعدادش بعرض نوزاد
الدم بیشتر است و در زنان پیش از مردان بروز نماید و هم در زنان جانشین طمث
میکرد و از جهه موی و کثیر لدم و اشخاص عصبانی مزاج استعدادشان بعرض نوزاد لدم

اصلی

اصلی پیشتر است عارضی که در ازادت و اشخاصی باشند که بالطبع بکثرت استعدادی بعرض نوزاد لدم
دارند که کمتر تفرق اتصال دفعه مانند زخم زخم مورث نوزاد لدم کلی کرد و گاه در این اشخاص نوزاد
الدم در نقاط چند روی دهد بدون اینکه هیچ تفرق اتصال در آن نقاط عارض شده باشد و این
صورت میگویند که این اشخاص یک سوء القینه دارند نوزاد لدمی که بعد مانند مرض مخصوص
خواهم نمود و اکنون آنچه جستجو در سبب این نوع نوزاد لدمها نموده اند بچا اصل مانده و بعضی
بر آنند که در عروق شعرین بکثرت و عاوت و سستی عارض شود که نتواند خون را در جوف خود
نگاه دارد و بعضی دیگر بر آنند که اختلالی در وکیب خون بهم رسد که بهسولت از او عبور خود
کند و اگر چه این اعتقاد اخیرین رجحان کلی بر اعتقاد اولین دارد ولی باید فهمید که این اختلال
جز از خون بهم می رسد که ایانش کلونها تغییر یافته است یا نقصا در مقدار رسیدن بهم سبب
و این مسئله تاکنون حل نشده است و اگر چه موسسوا ندال بخوبی نموده است که چون مقدار
فیسرین خون را کم کنند در اغلب سبب نوزاد لدم کرد که همیشه نوزاد لدم پسو میباشد و
شود و در امر ارضی که امورث قلت فیسرین کردند مانند آنکه در کتاب حمایت خاصه تفهونید
و حمی اصغر و ابله و اسکا و لاین بیان نمودیم و هم چنین است هر ماده چه سستی چه متعفن چه
جلائی که داخل خون شود و فیسرین انرا کم کند موجب شود و مورث نوزاد لدم کرد و اختلا
اعصابی نیز بعضی اوقات سبب نوزاد لدم کرد و در خلاف زیادتی کلبول نیز مورث نوزاد لدم
شود و این نوزاد لدمها اغلب نوزاد لدم کلبولی میباشد و بیاید چنان در صورتمی که جمیع
نوزاد لدمهای اطباء از زیادتی کلبول است چنانچه عارض شود نوزاد لدم کلبولی بواسطه زیادتی
حرکت قلب اثر مرماض و اوت و تعب و فعی هوا و کم شدن تشار هوا و بویج و در بعضی از بلاد
بواسطه اختصاصی که هوای آنجا در گاه کاهی نوزاد لدم بطور و بکثرت روی دهد و هم دیده شده
بطور کافی و باید دانست که سبب جمیع نوزاد لدمهای پسو قلت فیسرین خون است بلکه اغلب
از آنها عارض شوند بواسطه اسباب موضعی چنانچه بروز نماید و در قتی که مانعی در

کودش دم بپرسد اتم از آنکه در قلب با شریان با او رده بود و هم چنین است نرف التم شدید
 که بعد از وضع حمل روی دهد و در زمان قلبی زن را بجلد است و ساند بواسطه آنکه ضعف
 نفع و هم بپرسد و متشیج گشته دهان عروق باز ماند و هم چنین بعضی نرف التمها میباشند
 که عرضی نامند و حاصل شوند از تغییر در اجزاء صلبه بدن اینک فهمید شود که این تغییر
 مورث نرف التم گردد چنانچه طوبی کول نام برده و اسفند برده و بسیار و محمد فی معده با هم
 سبب نرف التمهای شدید علیه العالج میگرداند اگر فرض کنیم که این نرف التم بواسطه خرق عرق
 و رطوبت خطا در آنکه شرح مرضی نموده است که در سراق در حبه تغیر آلات هیچ عرقی نمیگردد
 و خرق اتحاد را خود حبه این مرضهاست که نرم و مجروح گشته و این جولحت مراب بعرق
 مجاور نموده مورث نرف التم شود

علاج قدما بر آن بودند که بسیار است عموما اعانت نرف التم نموده و تحریک بر آن
 کنند و در مقام انسان و نبات مکروه و قهقهه بسیار شدید شود و باد را از بدن بر آورند
 نماید و معاصرین این نفع نرف التم و نام در میباشند و بر آنند که برفدی اگر ممکن بود سدد
 او کنند و علاج نرف التم مختلف میشود باختلاف طبیعت و محل اسباب و هرگاه نرف التم
 اکتب بود و شدت در نداشته باشد بدن و خیالات را راحت نمود و در هوای ملایم
 بماند و هر سببی که مورث میل خون بان الی است دفع کنند و آنجا که نرف التم زیاد
 و سبب ضعف مزمن شود و مدت طول کشد باید یک یا چند فصد نمود و قصد علم بر
 فصد موضعی در حجاب وارد و فصد موضعی غلب مورث میل دم بعضی کور و دیگر دفع
 از بدن لازم است که زلوی زیاد بر موضع اندازد تا که خون زیاد خارج گردد و آنجا که
 فصد موضعی منظور از تصوف بود باید که عدد زلوی که واسا شود و در موضع معلول
 بود و بعد از فصد بپوشانده و اشرب بپوش و سرد بنوشند و هم چنین نافع است
 تسکین حرکت قلب نوشاندن در جبال و استعمال مسهلات و مدت ذات و معتدلات

و جلدیه

جلدیه از قبیل ضما و حرک و دست شویه و پاشویه و حمامات و استعمال مصرفات باید و در
 موضع معلول باشد برای آنکه میل خون از آنجا تواند سرایت بموضع معلول کند و
 لازم است که عضو را بنحی و از آنکه خون با شکل با موضع برسد و بسبب هولت از آنجا حجت
 کند بنی نافع است که در بعضی از اعضا منع و اویش کنند تا خون در موضع مانده که بپرسد
 و سدد مانند عقد باز و در آن و بستن بعضی از شریان و حمامات بزرگ و در آنکه بواسطه
 او میتوان منع فشار هوا از یک یاد و از اطراف نمود و آنجا که دایم نرف التم بپرسد لازم
 استعمال مبر وجه در اغذیه و اشربه که باید حتی الامکان سرد بود و وجه از گذاشتن باید چه سرد
 باخ بر موضع معلول و لازم است که با چه سرد و مدت زیاد گذشت که اگر طولی میسر آید
 بعد از برداشتن خون زیاد و میل با موضع کند و باعث اشتداد مرض شود و آنجا که ممکن بود
 باید فشار بر عرق داد یا نامپیون نمود چون بمعالجات مذکور در دفع نکود یا هر که کند
 با ضعف مزمن مانند اغلب نرف التمهای پسینو باید استعمال نمود و او به مغالطه در میان
 فاضلات اتم از آنکه آنجا بر موضع گذارند یا بنوشانند مانند شربت حامض از جوهر کبریت
 و پوست بلوط و پوست نار و کاشور و او به جدیدی و سکر سرب و بخار خون سیاه
 و روغن طرباشن و آنرا هر چه بهتر بپزد و سرد و فسر و عصارة و تیاج است و اطباء اینها
 بسیار استعمال کنند سکر کحه و او هم بر آنند که اثر او در نرف التمهای اکتب و بیشتر از نرف
 التمهای پسینو است و آنجا که بهیچ خود سدد خون نکود و باید در موضع و در سراز موضع معلول
 مدام جذب دم کنند مانند طاع باز و غیره و چون سنگین عارض گردد لازم است که
 بکدرند و سردی و ام کنند و بر آنکه اغلب سردی عرق و نرف التم باید شد و آنجا که
 میدان جنک که در کشتهای پیفتند بواسطه و از عرق فرا کنند و لی چون دوام او زیاد و جلد
 شود لازم میشود که بطریق دیگر در مجت خودش بیان میکنم و دفع او کنند و در فاصله نرف
 التمهای پسینو باید اغذیه مقویه و او به جدید بپزد و بکار بر آنکه بهترین معالجه است نرف

الدمهای مزاجی را نباید سد نمود و بطور ذیاد شود باید کاری نمود که خفت یابند و اگر این
نزف الدمهای مزاجی را التی می یابند باید در مقام انصراف برآید که در اوقات معین خون
میل بعضی همد و اینجا که نزف الدم از محل خود منصرف شود و در التی می یابند و نکند
باید کاری کرد که نزف الدم سابق بر و نماند و چون نزف الدم هر چه کند باعث دیگر باشد
ان علت کوشید چنانچه هرگاه امتزاج در معده و امعاء باشد مسهل دهند که اغلب نزف
الدمهای پرو و ام بعد از مسهل رفع شده اند و چون هر چه کند با نوبه یا ظهورش مثل نوبه
ادویه ضد نوبه بکار بوند و اینجا که هر چه کند با و جمع شد بد قیاس دهند و در نزف الدم
بین الاث و انساج باید کار کرد که خون منترش منجذب گردد و انزواج حاصل آید و من
درم با خفت او کنند و الاث مجاور و انزواجی این مستعمل است فصد عام و وضعی
و مصرفات جلد به و اینجا که شرخون در سطوح ظاهر باشد مصرفات موضعی و در جلد
او کردند و چون نزف الدم بسیار طول کشد یا آنکه دفعه بعدی شد بد و نماند بود که در نزف
و بکوفی برای نگاه داشتن حیات باقی نماند سنگین طوفاقی شده و بعضی نزف الدم بکوفی
باید بدون تا مل خون در عروق او کنند و آنچه این عمل اغلب حاصل میگرد و ولی چون بعضی اوقات
مورث حیات شده است لازم است که بنماید و برای این عمل با نوبه بوند مانند آنکه
در فصد معمول است برای آنکه وریه قدری برآمده شود و شرطی طوفاقی کرده و وریه که
بزرگتر باشد پیدا نموده و شرط کنند و طوفاقی و را بفرستند که مباد خون بکد و را بیا
برون آید و در طرف اعلی میل نقره بد و اندود و همین بین شش و جوان قوی را در فصد
فصد و شش کنند و اب و زک در میان اب که مباد در میان پارچه های نیکه شش و شش
حوارث داشته باشد نگاه دارند و پس از آنکه از پیست الی پیست و پنج مثقال خون جمع شد
در وریه احتقان کنند و حقه و لازم است که او را نماند و لازم است که هیچ حیات
داخل وریه نشود و اگر این دو فقره را ملا حظه نکنند مرض فوگر هلاک شود و نوبه
ادویه

از برای حقه میباید باید خون انسان باشد و در زن و مرد فقی نیست همین قدر لازم است
که خون سالم و پیکبول و فیرین باشد و پس از این دگر مینمایم هر یک از اقسام نزف الدم را
جدداً **ا پیست اک سیس یعنی نزف**
نزف الدم اغشیه فحاطی رفاف عبارتست از نزف الدمی که علرض شود در سطح غشا مخاط
محل جوفانف
علامات و فواید و انتفا اغلب هر چه کند با علامات مقدمه مانند صداع
فقل سر و سبات و حرمت وجه و تمد و پیوست و حوارث بینی و ریش و معده و طپش و ضربان
شرابین شقیقه و گاه کوفتی در بدن و این علامات مقدمه اغلب و امشان از یک تا چند
ساعت است و باشد که ناسه و نر طول کشند و ضعیفی گردد نزف الدم و فاد راست که این
نزف الدم در هر بینی با هم باشند و اغلب نزف خون بقطران متوالیست ولی گاهی از او
دیش مانند فوآره یا یک خیاطه کوچکی است متصل مانند آنکه عرق پاوشد باشند و بعضی
مصنوعی ادعا کرده اند که هرگاه سر را بعقب برند و در جوف بینی نظر کنند بحلی را که خون
جریان مینماید به بینند و این چیز نیست بسیار مشکل و خون مخرجه قریض و نزود غلیظ
میگردد و با پنجه بعضی معتقد شده اند که خون از شرابان خارج میگرد و حوارث این خون
بجای نزود فانی گردد که بعضی گفته اند که خون مخرجه از بینی سرد است و هرگاه در بیض نشسته
خون از فخرین مقدم خارج گردد و چون به پشت بخوابد خون داخل حلق کشند قند حرا داد
بواسطه عمل قذیف پرون و بخته شود و قدری دیگر داخل معده گردد و اینجا که نزف الدم
شد بد بود خروج خون هم در فخرین مقدم و هم از فوخره فعه است و و ام این مرض از
چند دقیقه تا چند روز است و مقل از خون مخرجه اغلب از پنج مثقال تا پیست مثقال
و گاه بلند تر است که قول اطباء آنرا که انمقدار نوشته اند نمیتوان قبول نمود بدو
تشکیک چنانچه دو پوس نقل می کنند از مرضی که در ۳ ساعت قریب سه من خون بول
سطح

رغابت
در پیش

دعاف اذا خارج شد و بعضی از مصنفین فیه بر این هم نوشته اند و عموماً دعاف بنده
 که کشته و چون بطوقی در خروج دم به سر خون در جوف بینی غلط شده و فشار بر آن موضع
 خارج شده نموده مورث را انداد او کرد و چنانچه پس از مرگ دعاف آن غلطت را برادر
 با جابجا نماید از جهت گرفتن بینی تا عطسه خون و در فوج جاری شود و گاه عرق عاف در دست
 بغنی بدون سبب خارج است و اغلب بدون قاعده است و گاه باشد که انتظام او مانند نوب
 که در عموماً بعد از مرعاف نقل و اس و سایر علامات مقدمه دفع کردنند و آنجا که خون نوحه
 زیاد و با عود مرض بسیار بود مانند سایر نزف لدها مورث عرق غرض نمی کرد و گاه نوب
 و هم مذکور شده است که دعاف موجب هلاکت است و این انحاء را به غلبه و مکروه صورت
 مرض ترکیبی داشته باشد مانند سوء القینه نزف الدمی و پور پور
 تشنجی و اشکالی در تشخیص عاف نیست مگر در صورتیکه خون مخمره بسیار و جریانی
 از مخمرین مؤخر باشد که در این صورت اگر با قذف خارج شود مشتبیه گردد با نفث الدم و اگر خل
 معده گردد که بعد بواسطه فی با اسهال خارج گردد و مشتبیه با نزف الدم محاذ تغذیه شود
 نقیضه المعرفه خطری ندارد مگر در صورتیکه بسیار شدید بود یا در اشخاص ضعیف
 البینه عارض گردد و در عاف اغلب بحرانیست و گاه انتقالی و در این دو صورت اگر کشته
 نداشته باشد نباید او را رسد کرد و اغلب از اشخاص هم بعضی از اطباء بر آنند که در جوانان
 دعاف لازم است ولی چون این مرض بسیار عود بالآخر بعوض منفعت بسیار و ضرر
 اسباب اغلب عارض شود در اطفال پس از سه سالگی و در سن بلوغ ولی عراف خطری
 عارض گردد در شبان و در شش و در آن مستعد ترند تا زمان و عارض شود و اشخاص
 پر خون و دمای مزاج و در تغذیه هوا و بودت خاصه حوائط زیاد و از جمله اسباب او است
 و عارض شود از ورود ضربه بر بینی و از تحریک مخاط بینی بواسطه شئی خارج و نیز عا
 شود از قوت زیاد بکار بردن و عطسه شدید و سرخه و سپاه سرخه و عارض شود بطور
 عرقی

عرض از بعضی امراض جوف بینی مانند جراحت و بواسطه و نیز عارض شود و در هنگام طمث و
 ابتدای حیضات بیشتر و در هنگام اول های بیفونید و اغلب بر ورش و در صاحبان سوء القینه
 و در این صورت سبب اختلال ترکیب است و دعاف در سائر نزف لدها در سائر القینه
 نزف الدمی و پور پور بیشتر عارض شود و گاه بر و زکند بطور ربانی
 ارجح اغلب از عاف بواسطه راحت رفع کردن و آنجا که بدون علاج دفع نشود غلا
 که در عموماً نزف الدم بیان نمودیم بکار بوند و در اینجا بیان نمیکند مگر آنچه را که مخصوص است
 آنجا که محل خون در نزدیکی مخمرین مقدم بود از فشار یا نفث یا دخول پنبه یا سر سدن
 کنند و هم نافع است که در جوف بینی اماله کنند از آنجا سر و قابض مانند محلول سولفات
 و ورنیک و شک سرب و سولفات و کوپور و مطبوخ ماز و محلول نمن و افکند یا چ
 سر و روی بینی و جهت است استعمال پارچه سر یا آب سرد و در مجلی از بدن که حرکت بکل بدن
 دهد و باین واسطه اغلب مدت خون گردد و مانند کاردن چیز سرد به پشت و بیضتین و اما
 آب سرد و استعمال این اجزاء سرد باید بطوریکه باشد که آن گذاردن او عرقی اطلاع نداشته
 باشد و همی طور است و رساندن و بعضی از پنبه که بر پیش می دهند ماسد فشار و بیضه
 پستان ولی این نوع معالجه حسنی ندارد و از مصرفات مستعمله با شویه های محرک است
 و حجامت بر محل کبد و غیره و جهت از همه حجامت و نداشت و هم چنین است پس از طوف
 و فشار بر سببات و گفته اند که از بلند کردن بغنه دست از طرفی که دعاف از آن سمت
 و مدتی بالا گذاشتن دعاف سرد کرد و آنجا که خون با بنظر یقها مسدود نشود باید مخمرین
 از دو طرف مسدود نمود و جهت این بکار میبردند میل بولک و اگر مرکب است از یک میل نقره
 که در جوف او میلی است که متصل میگردد با کافی که منتهی شده است بد که از آن منقبض
 که آن میل را فرس و بوند به بینی از آن طرف که خون می آید یا برسد بحلق و در این وقت فشار
 میل داخلی دهد که کان او گنج شده داخل همان گردد و اگر میل بولک نباشد میل از مداد

پاک کن که بسیار نرم و قابل انعطاف بود میتوان بکار برد و از برای برون سر میل بد هان
 باید او را از خلق تا آنکشت در دهان او ریزند و این عمل بسیار و صعب است خاصه در طفلان ^{حیث}
 پس آمدن سر میل بد هان نخ و دلائی بسوزانند و بپزند که آنها را آن نخ بسته شده باشد ^{ان}
 از سر بی پائینه بقدر حجم که بتواند منخرن مؤخر را مسدود سازد بعد میل را برون او ^{ند}
 و بگمراه او سر نخ هم برون می آید و چون او را بکشند گلوله که در انتهای او است منخرن مؤخر را ^{ند}
 سازد و بعد و شاخه نخ را از هم گسوده و در فاصله آنها دو جوف بینی بر سر پائینه که اولی
 بود غنی باشد بخصوص قلعونیا بگذرانند و در سر نخ را بر روی او کوفند تا در مکان خود
 بماند و اگر جوفان خون از هر دو منخرن باشد هر دو را به همین طور مسدود سازند و عمو
 این اسباب از سه ای پیچیده تر باید بماند و برای بریدن او چون نخ را بکشند گلوله
 خلقی بواسطه تشنج حلقوم برون آید ولی بعضی پیش از داخل و بکنج دیگر می بایند نماند
 از دهان برون آورده و بگمراه مرخص بمانند که چون نخواهند بکشند برون و این
 نخ اغلب بواسطه ارجه هان نرم شده و بواسطه دندان پاره شود و طوقه دیگر برای بریدن
 جوف بینی این است که کبسه از پوست بزرگ در دست گرفته و در دهان اولی که
 صاحب شپش باشد تعبیه کنند و او را داخل بینی نمایند که تا بحلق برسد و از لوله ای با هو
 داخل او کرده باندازند که خواهد منبسط گردید و اینجا که اسبابی نباشد استوانه از ^{ست}
 شده و جوف بینی برون و برای داخل کردن او بجوف بینی قدس که بکشند که شبیه میل ^{شود}
 و فرو بردن منخرن مؤخر و بعضی اسفنج در دست شده میتوان بکار برد و منخرن مؤخر را ^{از}
 بر کردن جوف بینی بمر نخو که باشد مرخص باید بچرکت مانده و سرش را بلند نگاه دارد
 از غلبه شدن خون اغلب و قات حس عمد و نرجحتی در مرخص می رسد و بعد از ^{شدن}
 اسباب خون غلیظ شده بتدریج خارج گردد و چون ابتدا بی تعفن در او پدید آید ^{است}
 تا چندی تعفنی در او می رسد که اذیت مرخص کند و بعضی از مرخصی بعد از این عمل ^{میتواند}
 شوند

شوند بر کام و بعضی از عاقلای مرخص است که بفواصل کم عود نمایند و مرخصی در چنان مبتدا
 که تعفنی در سر نخ مخاط بینی هم رسیده است که عروق شعریه او را و لای کوفته اند و در ^{وقت}
 باید با بصنات استعمال نمود مانند ذلیج سفید که بالمساک و بانتری مخلوط نموده در روز ^{چند}
 سه عوط نمایند و همچنین خواست غبار پسترت و هم نافع است استعمال انقبیه و اینجا
 که محل معلول در دهان شود بهتر آنست که با قلم سنگ جهنم بسوزند و اینجا که عروق بسته
 با اختلال مزاج بود معالجه مزاجی نمایند چنانچه اگر مرخص ضعیف و صاحب غنی باشد او را ^و
 حدیدی و مقویات واد و پهلخ و اعذبه مقوی بکار برند ^{نورانی}
 که نفث الدم که با عصاره رشت از خارج نمودن مقدار رحل از خون که نوشید نمایند و غشاء
 مخاط مجاری تنفس یعنی از حلقوم تا اخرون شعبه قصبه و نفث الدم را که بقطر و جالبینو
 حدس زده بودند اسنال و مضمین بخوبی بیان نمودند و یکی از نوزادان که در دهان است که بسیار
 مشاهده می کرد و خاصه در بلاد سر و اغلب هم را می کند با تعبیراتی خطونان و اگر چه ^{میتواند}
 جمیع اقسامی را که در عموم نوزادان بیان نمودیم در این مرض هم قبول نمودی باید بنا
 نمایم که نفث الدم اصلی و مرضی بقدرش نامدرست است اغلب از مصنفین انکار او را نموده
 اند و اغلب عرض است از امراضی که به با الی مجاور او مانند قلب و ^و
 تشویم مرضی بطوریکه بیان نمودیم اغلب اوقات پس از کشودن سینه اش ^{میتواند}
 که از نفث الدم مرده اند مشاهده کرد و یک یا چند تعبیراتی که موثر در مرض نفث الدم ^{است}
 گفته است چنانکه گاه مشاهده شده است تفرق انصاف در یک یا چند عرق حجم مانند ^{سیم}
 او را بطور بعضی از عروق خود بر یک مجاور بعضی از آنها می بایست منع غانغرا ^{شد}
 بود و مرض سرایت با آنها کرده است قبل از آنکه اندکی در آنها می رسد باشد و ^{باید}
 پیدا کردن نقبه عروق باید مرید را در میان اب بوده اگر کسی نکند و ^{اغلب}
 نوزادانهای مرضی و جمیع نفث الدمهای اصلی بر پیش خون بد و منخوق عرقست

نفث الدم
 در نوزادان

که بطور نثر در روی غشاء مخاط ریه می نماید که گاهی از اوقات مشاهده میشود که
 جوفی از مخاط ریه متورم با سیاه شده است ولی هیچ خواش و دالی در عروق او
 نکرده و گاه دیده شود که مخاط پرنک شده است و گاه ریه به تهیج و رطوبتی رقیق و
 رنک در جوف او است بواسطه جمع شدن و استادن خون و هجوم الت و بعضی
 اوقات مشاهده شود یک یا چند دانه سیاه و سخت سکنه و آنجا که عرض قلب
 بواسطه شدت نفث لدم بود مشاهده کرد که یک چند شعبه از قصبه مسدود شده
 از جوف سیاه و غلیظه که بجای و رت و غشاء مخاط آن شعبه منتهی اند و اغلب
 خون از تر پاست

علامات اغلب اوقات قبل از بروز نفث لدم کسالت و خستگی و کمبود بدن
 دسد و احساس کوفتی و جرات در مینه شود و سرخ خشک و طپش قلب روی
 داده و مزه شور باختر خون در دهان بهم رسد و قشع و عارض شود و اطراف سرد
 گردد و دام این علامات اغلب چند ساعت و گاه تا چند روز است و باشد که
 هیچ بروز نکند و اغلب ریه عارض گشته و همراه او مقدار چندی خون از سین خارج
 که مورث تعجب و هم مریض گردد و اغلب خروج خود مترشح در شعبه قصبه بواسطه
 سعال است بجهت آنکه مخاط خارج میگردد و آنجائی که خون مقدار زیاد تر کند
 منع دخول هوا در شعب نماید و مورث قلق و اضطراب پیدا کند و با پیچیده
 که طبیعت بواسطه نگاهلاری بدن جمیع عضلات مجریه هوا را متشنج نمود میباید
 فشار دهد که خون جوف او مانند لوله از دهان و بینی جاری شود و در بعضی اوقات
 بواسطه دغدغه که از مجاری و رت خون در حلق عارض میگردد و بعضی حركات جهتی
 کردن نمودار شود و گاه از این حركات عارضی که در شک اشیا بیکه در معد میباشند
 بیرون آمدن مخلوط با خون خارج گردد و آنجا که مقدار خون کم بود بند ریح حلق

دسد

رسد بدن مورث و دغدغه او گردد و بعد بواسطه عمل قذف از دهان خارج گردد و خون
 غریبه از مجاری هوا قریب کلی و با کف میباشند بواسطه اختلاط با هوا و آنجا که خون
 قبل از خروج چند ساعت در شعب بماند و رنگش سیاه تر میشود و مقدار خون بسیار
 مختلف است و عموماً از بیست تا بیست و پنج مثقال میباشد و گاه بود که در روز
 چند دفعه برای خون که گاه صاف و گاه مخلوط با ادران هان بود خارج شود و گاهی
 خلاف در چند ساعت باشد که مقدار او تا یکین بلکه بیشتر رسد و زرد لفرانک بیان
 میکند در سه ساعت مقدار خون دو من و هم به پنجم رسد ولی خروج اینقدر خون
 که همیشه مهمل است بند رت و یک میشود و آنجا که نفث لدم ساده بود صدای سینه
 از قوع بحالت صحه باقی میماند و از تجمع اغلب شنیده میشود که صدای نفس ضعیف گشته
 و گاه در هر روز و زمان تمیز داده میشود و آل موکوی بسیار بزرگ که شدت آن و الهاد
 ریشه شعب میباشد و چون نفث لدم شدنی داشته باشد علامات عمومی که در کلیه
 نفث لدم مذکور شد روی دهد و یک شده است اشیا صیکه بعد از خروج فقط چند نفث
 فقط قشع بر شدید عارض شد و یک باخته و بدن سرد شد و ضعف زیاد عارض شد و جمیع
 فانی گردد ولی این ائافات عارض نشود مگر از نرس که بعضی اشخاص از رت و بت خون هم
 میباشند خصوص چون بدانند که این خون از سینه میاید

ز قاع و دام و انتها و تفاوت نفث لدم بسیار مختلف است چنانچه ملاحظه اشیا صیکه دفعه
 نفث لدم شدیدی گشته و پس از چند ساعت بکلی رفع گردد و در بعضی بعد از چند
 فاصله دوباره عود کند و این عود میتواند تا چند هفته و چند ماه دوام کند و در بعضی
 لدم پس از آنکه باشد عارض گردد و چند ساعت دوام نمود و بعد ریح خف میاید و خون
 مجریه سیاه رنک شد و بعد از سه روز مریض خارج نماید مگر نفثی غالی میاید و دانسته
 وجود ریح شدن نفث لدم اغلب چسب نفس و ستر و جرات صدر تا چند روز نیست و نفث

بندرت و زمان قلیل مورث هلاکت شود و سبب این هلاکت غلبه از بابت کثرت خون
 عجزه است بلکه خون مقدار زیاد و دفعه نثر کند فضای شعری مسدود نمود و منع دخول هوا
 در ریه کند و مورث اختناق گردد و نادراست که برون نفث لدم همان یک دفعه باشد و
 اغلب اوقات بغواصل زیاد با کم عموما و نکر نماید و فاصله مابین دو نفث اغلب بقاعده است
 و راجح اینکه نفث لدم اشتغال از طبع بود که در این صورت فاصله دو نفث لدم مانند فاصله
 که مابین دو طبع میباشد و اغلب برون نفث بکلی متوقف میماند و بعضی اوقات فاصله
 ضعیف میماند مخصوصا اگر گاه گاهی عود کند و تقریباً جمیع صاحبان نفث برون هلاکت میسر
 صور مختلفه نفث لدم است که پس بویا اگر بویا بود و بیان نموده اند نفث لدم مزاجی و این نوع
 نفث لدمها هر اهی کند باسل مخفی یا سل شفا یافته و نفث لدم اشتعالی بسیار پیش از نفث لدم
 مزاجی عارض گردد چنانکه در فی شصت سال داشتیم و چون یکبار از مجرای طبیعی عود کرد
 و بعد منتقل بنفث لدم که هر گاه یک دفعه برون میگرد و هم مشاهده شد بیکه طبع او بجهت
 کشته و منتقل شد بنفث لدم که تا چهل و دو سال طول کشید و هر دفعه که عارض میشد هم اهی
 میکرد و باجمیع علامتیکه قبل از برون طبع روی میداد و هم بدین است ولی بسیار بند
 که نفث لدم یکی از اشکال نوابیه بوده است و رفع او بواسطه استعمال او به ضد نوبه
 و هم بدین شد است که هر اهی کند با غلبه صفرا و رفع او از استعمال موقوفه می شود
 تشخیص در تشخیص نفث لدم سه چیز را باید ملاحظه نمود اول آنکه عالم باشد که خون از
 مجاری تنفس جریان میماند و بیم آنکه از کدام قطعه مخاط مجاری نثر میماند سیم آنکه در نفث
 که نفث لدم اصلی است یا عرضی بعد از این طریق تشخیص نفث لدم را از فی لدم بیان خواهیم نمود
 آنجا که خون از فضای دهان سیلان نماید از ریه و یا می توان معلوم کرد و بعلاوه و برون
 لدم دهان خون سیاه و رنگ و اگر گاهی هم قرمز بود کلی رنگ و صاحب مرغ و شقیقت و در
 دعای حقیف که خون از مخزن مؤخر خارج شد و بخلق و فقه و باخود دفع گردد باشد که

سود

شود با نفث لدم ولی این خون نیز سیاه رنگ و بدنی هواست و در سینه هم هیبت از علامت
 برون میگرد و از مشاهده کلوده میشود بعضی قطعات خون سیاه و هم اغلب اوقات چون
 مخزن مقدم بخوف بینی نظر کنند باز قطعات خون فحجیه مشاهده گردد و اگر کوفتن بینی
 قطعات خون منجمد شبیه بآنکه باخود دفع میشود برون آید و از بوی فحیدن آنکه خون
 چه جز مخاط مجاری تنفسی نیست قد سری اشکال دارد و اینکه نفث لدم واقعتا کوفته اند
 بنفث لدم حلقوی و قصبه و شعبی که با آن ریه فاعن در سینه نباشد وجهه تشخیص دادن
 نفث لدم اصلی است یا عرضی باید آلات صدر را امتحان نمود و از مزاج استحضار کامل حاصل
 آنجا که نفث لدم از برون شدن ابوریه میماند تشخیص و حاصلی نه از برون که مرگ دفعی است
 که سبب آن سلی است و آن را همانم شد باشد بواسطه برون علامتیکه مرض سل است
 خواهد شد تشخیص و دهند و چون آنها هنوز نرم نماند باشند باید از حالات سینه
 مریض مخصوص از علامتیکه بعد برون خواهد کرد تشخیص را بر نماید
 نفث لدم مزاجی غالب خطرناک است نه آنستکه خطرش بواسطه خود نفث لدم است بلکه
 بواسطه مرضی است که نفث لدم یکی از اعراض او است و اعراض همیشه لا علاج است و نفث
 لدمهای اشتعالی و نفث لدمها شکی از اسباب خارج میماند ضربه و سقوطه عارض گرد
 و نفث لدمهای اصلی اغلب بدون خطرند

اسباب در اطفال صغیر تا کنون نفث لدم مشاهده نکشته و شاید سبب این
 باشد که اطفال جنون نکنند و آنچه در دهان جمع شده به بلعند و اغلب برونش از بابت
 نامی و پنج سالگی است و در زمان قدش پیش از برون برون نماید و آنچه در موی و
 و عصبانی مستعد توند عروضا بنمروض را و هم عارض گردد از او و کسبها شکی نیست
 انجام کار آنها باید سینه را بوی شک انداخت و بواسطه فشار بر سینه عسری در
 دم داد مانند خباطها و کفاشها سبب استعدا این مرض میگرد و اسباب اصلی

بودن قوت زیاد و خسته کردن آلات تنفس مانند فریاد زدن و او را زخوئیدن و سازها
 بادی زدن و هم چنین است ضرب و جواحت بر سینه و فرود آوردن انحراف حرکت و کمر شدن
 هوا و هم چنین است امراض عروق کبیر و سال که اغلب سبب نفث الدم است
 علاج چون طبیب بیالین مریضی که مبتلا به نفث الدم باید او را ادرام کند و
 از دلش پر کردن کند و وضعی باده دهد که نیم نشسته باشد و البته که فشار بر سینه دهد
 بکشد و بچرکت شک خاموش نشیند و بعد رقیق خود را از سینه نمودن باز دارد و انجا
 که مریض شدت داشته باشد بکشد و فصد کند و اگر چه صوت مزاجنه و اطراف سرد و نبض
 بود بیشتر آنکه مریض قوی و مقدار خون مخرج زیاد نشد باشد و انجا که مریض ضعیف بود
 بعضی فصد چند زلو باطراف مقعد اندازد و ضما د های حرکت بسا و اندازد و حجامت کند
 و اطراف را محکم بپنسد و اشربه مبره بنوشاند و اگر بتدا برسد خون کشت اشربه سرد
 بخورد و بنوشاند و پنج بروی سینه اندازد و شمع عربی میان دو کف اندازد و باضا
 معمول دارد بخصوص را بتایخ که یک یاد و انتقال او را چه مانند حب و چه داخل شربت صمغ
 نموده در درون بنوشاند و بعد از آن بتایخ تن است که دو کدم او را با هشت کدم صمغ
 چهار حب نموده در هر سه ساعت یک حب میل نماید و مستعمل است شکر سرب و زهر
 سبز و انجا که سرفه و یا مریض با وجع بوی تر یا دل دهند و معالجات مذکور مستعمل است و در
 نفث الدم عرضی و مریضی هر دو و در نفث الدم مریضی با اختلافات در مزاج بهم میرسد
 که چنانچه مریض شغالی از طبع بود باید کاری کرد که خون از جم جاد شود و چون هر گاه
 با غلبه صفرا مفعی دهند و از استعمال و نباید تر سید و چون مریض از معالجات مذکور
 دفع نکشد بدون خوف بپاکوانا معمول دارند برای آوردن فی یا بمقلار که برای آوردن
 تحقیق که هر کدم بنوشاند و پنج دفعه بعد و دو کدم دیگر با سه بار دهند
 نرق الدم دهان عبارت است از جریان خون از فضا دهان و ابتدای حلق و فاود است

این مریض

این مریض اصلی بود و چون اصلی باشد اغلب مریضان انتقال از طبع نماید با بعد از آن
 بر و نکند و اغلب منتهی شود از کمر شدن الیا و خون و از نرم شدن لته و از جرحا
 و آمدن بر مخاط دهان و از بیرون آمدن دندان و سرطان دهان و نزف الدم دهان
 مریضیت جدید سبب قلت خون مخرج مکرر صورتیکه عارض شود بواسطه سرطان
 دهان و تغیر ترکیب م و در وقتیکه مقدار خون مخرج بی حدی شود که شخص را در
 خطر اندازد و چون خون از مؤخر دهان نشت کند و مریض بر حسب عادت همیشه به
 پشت بخوابد خون بجلو نخیزد و سرد شود و مابقی با بر اندازد و یا آنکه مؤثر عروق
 سرفه کشته و مشتبیه شود بنفث الدم با باقی الدم ولی دفع اشتباه کرد و چون بواسطه
 غرغره دهان و خلط را بشویند و در آن نظر کنند که محل انتشار خون دیده شود و هم
 اغلب ملحوظ کرد و علت التي است که موریث او کشته است و در هر حال میتوان
 حاصل نمود که خون مخرج از جوف دهان سیان دارد از اینکه سردی را خیم نماید که سبب رفع
 شدن سرفه و مکرر و حال آنکه خون جاری است و خون مخرج از دهان اغلب قرمز
 بدون کف یا خالها را مخلوط با آب دهان است و برای علاج این مرض استعمال بشود
 ابهای سرد و قابض و چون عرق کشوفشک باشد با اهن سرخ شده و اع کنند و
 و در انجا که خون از یکی یا خا های دندان بیرون آید و بواسطه استعمال قابضات رفع
 نشود با انگشت مدق موضع فشار دهند یا آنکه کاوله از موم یا کافور سفید التي
 با ازل سفید بر موضع نهند

نرق الدم معده این مرض عبارت است از ترشح خون در سطح و حلق معده و در الدم
 عبارت است از دفع شدن این خون مترشح برقی
 تشویش مریضی از کشودن ملاحظه مکرر و مقدار که یا زیاد از خون در جوف معده
 و گاه باشد که معده بر و منبسط شده باشد از یک پا و چه خون مغلفه سپاه ولی اغلب

اوقات ملاحظه کرد مگر بعضی با چپه های خون و هم دیده شده است که این خون سبنا
حل گشته و مخلوط است با رطوبات معدیه یا غدا و هم مقدارش از خون مشاهده شود
در سایر مجاری غذا و گاه غشاء مخاط معدیه بالتساک و سرخ یا کبود است که گویا ماده
دنبلی خون با این غشاء داخل گشته است و گاه غشاء مخاط متحرک باشد که سباهه گردد و در
بعضی از مواضع و عروق مجاری و ریه ها و بند می شود و گاه دانی گردد و هم نادراست که
تفرق اتصال در مخاط مشاهده گردد که اغلب اوقات زردی خون بطور تشنج میباش
و چون نوزاد دم معدیه اغلب عرضی است لهذا بعضی از تغییرات التي مشاهده کرد
مانند ابو ریمای او رطوبی یا شریان اسمانی که در جوف معدیه منخرق گشته باشند و
امراض التي قلب که مورث عسرت گردد و شرم شوند و اغلب و گاه در جوف معدیه
مشاهده گردد اسفند و یا سرطان نوم و جرح و گاه این تغییر التي مشاهده گردد
کبد یا در طحال یا در ریه

علامه او ریه و انچه اغلب اوقات قبل از عرض نوزاد دم کسالتی عارض شد و اختلال
در عمل معدیه و عروق حاررت با وجع در محل معدیه با سوزن شدن و کشیدگی قطن
و احساس خفگی و سردی بدن با باختگی صوت و تشنج لب است بر پختن خون در
معدیه که بزودی حالتی در دست داده با اضطراب زیاد خون از دهان جاری گردد و در
وقت کوبند که قیال دم عارض شد و اغلب اوقات پس از این مرضی را مگر و لی تا
مگر تشنجی در معدیه با عطش شدید و طعم بد بدع در دهان با ماندن و نبض سریع
و مرضی بسیار ضعیف نمایند و لون خون مخرج همیشه بلبخ نیست و انچه که خون
قدری پس از تشنج بود لون او قرمز و نوزاد بک بخون شریانی است که گاه و قیو گاه
غلبه شده باشد و چون مگر در معدیه توقف نماید لونش سباهه تیره گردد و بوی تشنج کند
و نادراست که مقدار خون زیاد بوی تشنج مخرج دهد و گاه مقدار کمتر باشد و اغلب

اختره ۳۰

او از ده عا ماه ۳ بود و چون مقدار خون زیاد بود مانند لوله از دهان بیرون آید و انچه
که مقدارش کم بود خارج نشود مگر بواسطه عملی که بصورت خون مخرجی یا حال است یا
مخلوط با مخاط و اغذیه و اشرب و در روفی که مقدار خون مخرجی زیاد بود بعد از
متعلقه بعموم نوزاد دم تمدد زیادی در موضع معده بمرسبک و انتر فرغ موضع بواسطه
جمع شدن خون صدای کد مسموع شود و نادراست که قیال دم منحصرا بلبخ باشد و اغلب
پس از آنکه خون سدل شد بعد از ساعتی بکود و باره تشنج نموده قیال دم و بکری دست
دهد و این قیال دم تا چند روز و ام نموده نقصان نماید و جمیع خون مخرجی
معدیه با دفع تشنج و مقدار از او از قیاب پریون دفعه از عا ماه ۴ ساعت بعد از نوزاد دم
با بران دفع شود و وجود خون در پریون صاحبان نوزاد دم معدیه ای است و حال آنکه باشد
که در انچه قیال دم عارض نگردد و چون قیال دم با نوزاد دم معده هر اهری کند علامه ای که ذکر
مانند و جمع و حرارت در موضع معدیه و عطش و تشنج و غشی عارض گردد و این علامه
اگر چه بخودی خود دلیل بر نوزاد دم نخواهد بود ولی اگر بدانند که این بپیش سابقا مبتلا
بقیال دم شده بود باید باز حدس بزنند و بپیش بر مرض حاصل نگردد و مگر قیال دم و تشنج
در پریون مشاهده شود و نوزاد دم معدیه باشد که بعد از آن مگر بزودی مورث هلاکت شود
و گاه باشد مگر بقسمی فوریت که سببش معلوم نشود مگر پس از کشون معدن و اغلب این
اوقات مرضی شفا یابد ولی ایام نقاهت و بسیار طولانی خواهد شد زیرا که نوزاد دم
معده از سایر اقسام نوزاد دم بیشتر قوی و ضعیف کند و نیز چون بعد از نوزاد دم معده
اختلالی در عمل تغذیه بمرسبک و غذا بطور شتابسته مبدن نوسبک مورث بقا ضعیف
شود و این اشها که ذکر شد در قیال است که نوزاد دم اصلی بود ولی چون عرضی باشد
صورت مرضی اصل شفا یابد و بود معلوم است که مرضی شفا نخواهد یافت و در اینصورت
نوزاد دم هر چند وقت یکبار بروز نماید و صورتی از مان حاصل کند و این نوع نوزاد دم

را و اما مرض سباه مینامند که ما بعد از این در محیط سرطان او را مذکور خواهیم شد
 تشخيص چون نرفالدم معده منتهی بقیالدم نشو عسر در تشخيص این بهم رسد ولی
 باید دانست که اغلب اوقات هر چه خون نشر نماید و نک صوت باخته و بدن سرد و گسسته
 و غشی روی دهد و مرغان این علامات دلیل بر آنست که در موضع نرفالدم عارض
 شده است و چون با بر و تر این علامات از موضع سوال نمایند و بدانند که این علامات
 همراه میکنند با حرارت و وجع و نقل معده بدلی که حدس بر نرفالدم معده باید زد که از
 ملاخذه بر این بقین حاصل شود و باشد که قیالدم مشتبه گردد با نرفالدم چنانچه
 نفت مذکور نموده که گاه چون خون بخلق رسد تحریک کند بقسمی که کان رو که خون
 معده خارج میگرد و بخصوص اگر مقدار از خون بلع گشته و در معده توقف کرده
 بعد بالونی سباهه شود و با مخلوط بر اندفع گردد و در اینصورت طایب باشد که علامت
 این در مرض را موازنه کند تا اختلاف آنها بفهمد چنانچه در نرفالدم احساس وجع
 و حرارت شود در حد در پشت با عسر تنفس و اغلب خون خارج نگردد و مکرر باشد
 و حال آنکه در قیالدم احساس وجع و حرارت در موضع معده است و سفر وجود ندارد
 و صفات خون مخفی در این دو مرض یکی نیست چنانچه در نرفالدم سرخ کلی و قیالدم
 و در قیالدم سباهه و اغلب سباهه و بسته شده است و هم مقدار خون در نرفالدم
 بسیار کم و در قیالدم زیاد است و هم چنین باید دانست که در نرفالدم از سمع
 بعضی دلهاستنبه شقی که در قیالدم وجود ندارد و چون عاف با خون نجوف دهان
 مانند آنکه سابق ذکر کردیم باشد که بعد دفعه و بعد با دفع شود و مشتبه با قیالدم
 گردد ولی در این دو صفت صوت از مقدار خون که بسیار است و از مشاهده نجوف
 دهان و خلق و پنی بسجولت نیز مرض داده میشود و تشخيص این مرض عمدتاً از
 این است که تمیز دهند مرض اصل است یا عرضی و اینجا که عرضی او بخته باشد که
 تشخيص

تشخيص صحیح المزاج قوی البسیه بخصوص چون بعد از حبس نرفالدم طبیعی عارض گردد و بعد
 مرض برودی و بکلی شفا یابد نرفالدم اصلی خواهد بود ولی چون قبل از بروز قیالدم
 مذکور اشتها کم و غذا در دست تحلیل نرود و هزال عارض شود باید حدس بر آن زد که مرضی
 النی در معده بروز نموده است و برای تمیز دادن محل و طبیعت مرض اصلی را اینجا
 آلات بطن و اختلاالاتیکه در اعمال بدن بهم رسد
 تقایم المعرفه مرضی است پوخطی و خطی و کثرت است چون مرض اصلی با انتقالی بود
 اسباب چون اصلی باشد سبب و اسباب پیست که در عموم غلبه دم و نرفالدم
 بیان شد و چون انتقالی بود بروز شود در زمان و در سن و قوف است و چون عرضی باشد
 عارض گردد از اسبقه س و سرطان معده و عارض شود از او را مالتی طحال و کبد و
 غده لوز المعده و از منع و از رش دم و در شکم و از امراض شرابی معده چه بواسطه
 ابورسهای آنها و چه بواسطه جوی که از خاله معده سرایت با آنها کند و عارض شود بواسطه
 اش سمومات اکالجه بلا واسطه بعد از آشامیدن آنها و چه بواسطه و سرجه و شراب
 آنها بهم رسد و باشد که سبب و علتی خارجی بود مانند نرفالدمهای که عارض شود
 در حرمی صفر و پور بر این چهار جهت نرفالدم معده عارض شود یا بدین سبب
 یا بعد از رسیدن ضربه بمعده و یا بعد از افتلاء معده و یا در اسراف اشر به مسکن
 و یا در سر مادی بریدن و بعضی برانند که نرفالدم معده عارض شود از بلعیدن زلو
 ولی این اعتقاد نیست باطل زیرا که اگر زلو بمعده رسد طولی نخواهد کشید که هلاک
 میگردد و ان نرفالدمها بلکه اکثرو پیسوم مذکور شده اغلب را اینجا استعمال است
 که پس از خوردن زلو عارض میگردد یا مرست
 علاج معالجاتیکه در نرفالدمهای اکثرو پیسوم مذکور شده اغلب را اینجا
 استعمال است و چون خون نشر کند و مریض نماید ابتدا کاری که لازم است سگردد

manat.wikihema.org

نشر خون است و برای این اگر حالت بنض مقتضی بود فصد کنند و مصرف جلد از
قبیل پاشویه و ضماد خورل و غیرها علی الاتصال معمول دارند و شدت حکم در اطراف بکار
و حجامت زیاد در رشت کنند و اگر به کی ترش و بسیار سرخ نباشند مانند لایم و لایم که
کو که نباشند و چنانچه باینها دفع بشود در روی معده و شرا سیف پارچه های پنج دار
ببندازند و شربتی از جوهر کو که نباشند و در موضع بنشینند و بپختن بماند و
انجا نیکه غشی روی دهد باید با انگشت و نظردان و حلق مرین را امتحان کنند زیرا که
باشد که خون چون بگور رسد نسبتا خنثی تر و در چه در و خورش در رقبه لایم
و چه از جمع شدن و بسته شدن او در حلق و راه تنفس را مسدود کردن و همین معا
لجان از بکار بردن تا چند روز بعد از رفع نفوذ لایم و چون بمعالجات مذکور دفع
نفوذ لایم نکرده قاضیات از قبیل عصاده و تباخج یا مطبوخ پوست ناد یا محلول ذاج
سفید و مسکو کوبه نباشند و انجا که نفوذ لایم بعد از دفع ذلوعاد و شتاب غلبه
نفوذ لایم امعا این مرض عبارت است از نفوذ لایم که عارض شود در غشاء مخاط امعاء از
اشیء غیر مستقیم و با اسم بواسیر بیان میکنم بعضی از نفوذ لایمها نیکه عارض شوند از
اسفل معاء غلاظ که اغلب همراهی کنند بحصول بعضی از آنها در این موضع و نفوذ لایم
که از جمیع نفوذ لایمها کمتر مشاهده میگردد و منقسم میشود باکلیو و پیسو و اصل و
تشریح مرضی چون نفوذ لایم اصلی بود با آنکه سبب و در موضع غیر از امعاء باشد مشا
که در آن موضع که خون نشر نموده است که غشاء مخاط متبجح و سرخ شده است و این
یا بالنسبه و بست یا آنکه دان که چون این غشاء مخاط را با انگشت فشار دهند و با اب
بشویند سرخا و رفع گشته و لون طبیعی مراجعت کند و بعضی از اوقات بخلاف غشاء
مخاط عوضا نیکه سرخ گردد و متبجح شود بی رنگ و بی خون شود در نفوذ لایمهای غشی
بعلاوه این علامات بعضی تغیرات دیگر مانند حرجت و سرطان چه در حق امعاء

بواسیر را امرا
در سبب کوبه

و چه در

و چه در عضوی دیگر مانند کبد و طحال مشاهده شود و باشد که سبب این نفوذ لایمها
پارچه مواد بود که بواسطه فشار بعضی از او رده امعاء مسدود نموده باشد
علامات در نفوذ لایم اغلب از مرضی یکد و سرخ و قبل از عارض نفوذ لایم احساس ثقل
و وجع در شکم یاد در شرا سیف نمایند و اغلب شکم زیاد متنفخ بود و باشد که عرض او
بدون مقدمه بود که در بعضی احساس وجع در موضع ناف نموده و بزودی جمیع علامتا
نفوذ لایمهای لایم و سر کنند و گاه شده است که نفوذ لایم معوی بچگ شد بد و سرخ لایم
بوده است که در بعضی فعه بعضی افتاده هلاک شده است قبل از آنکه خون خارج و لایم اغلب
این غشی طول نکشد که دفع گردد اما باشد که بقواصل کو مراجعت کند خاصه در او فایده
مریض با حرکت دهند و انجا نیکه عو غشی بد و ن سبب ظاهری بود از نفوذ لایم خواهد
بود مجدد و چون غشی دفع گردد احتیاجی زیاد بدفع بواسیر هم رساند و پس از دفع کردن
قدر عارض از مقدار مختلفی از خون یا در حق یا غلبه صاف یا مخلوط با بعضی از اجزاء معا
مختلف میشود باختلاف محل نفوذ لایم و انجا نیکه محل نفوذ لایم قریب بمستقیم باشد بعد
ترشح خون طولی نمیکشد که دفع میگردد و در چون موضع مرضی دور از مستقیم بود اغلب
از دو تا سه ساعت طول میکشد تا خارج شود و در این صورت غالب صفات خون تغیر
پذیرد که اگر نفوذ لایم جوزی بوده و منقسم میرود علامت عامه نکشته مرضی نشانه خواهد
دوام و انتهای نفوذ لایم معوی عموما گردد و است که اغلب چون خون نشر نماید فی الفور
مسدود شده و دیگر نشر نماید و باشد که مکرر گردد و در این صورت مرضی مدت چند
خون دفع نماید و مقدار خون مترشحه در اغلب و سه فتمان است باشد که کمتر یا بیشتر بود
مشاهده شده است که در چند ساعت تا یک و سه چهار ساعت خون نشر نموده و از بندها
او مرضی هلاک شده است و انتهای نفوذ لایم معوی مانند آن است که در نفوذ لایم معوی
دکشد و چون مرضی اصلی بود مرضی برود شفا حاصل کند بدون آنکه اختلال در اوقات

نمودار کرد و ولی مرض مستعد میشود که بهولت مبتلی یا بمرض کرد

تشخیص در تشخیص نرفالدم معوی باید فهمید اولاً وجو نرفالدم و ثانیاً محل
 که خون از آن محل مترشح شده است ثالثاً سبب و راد و قبیله خون دفع نگشته است نمیتوان
 از بروز علامات عمومی بقیه نرفالدم حاصل نمود و داشت که نرفالدم معویست و بقیه
 حاصل میشود در وقتیکه خون دفع کرد و نباید چون بواسیر باشد بگوید که نرفالدم بروی
 داده است و این اشتباه در وقتی روی دهد که مقدار خون مترشح کو و بواسیر اخلاصی
 بهرسانند باشد ولی اغلب و ذات در ظرف مقدار ری خون که تغیر نیافته باشد منجر و سیاه
 رنگ مشاهده میکرد و کاهی مشاهده شود غباری سیاه و رنگ شبیه بانقبیه باحرم قهو که در
 سطح بواسیر در میان او پوشیده شده باشد و چون از وجود خون در بواسیر حاصل شد با
 معلوم نمود که نرفالدم در امعاء شده است و یا آنکه در معدی یا در دهان یا در جوف
 نشر کرده و اینجا که علامات مبلدم بعد بود و بخصوص فی النظم که چند ی قبل عارض شد
 باشد تمیز میدهد که نرفالدم در سطح معدی بوده است و اگر چه ممکن است که نرفالدم
 که در جز اول امعاء عارض شوند بعد و بختی دفع کرد ولی چون نرفالدم در
 عشر بسیار نادر است اغلب باید تشخیص نرفالدم معدی بود و اینجا که نرفالدم معدی با هیچ
 علامات موضعی همراهی نکند و فی النظم و جمیع خون مترشح بواسیر دفع شود ممکن نیست
 تشخیص دادن او را از نرفالدم معوی و کویا ممکن نباشد مشبه کردن نرفالدم معوی
 با رعاء و با نرفالدم جوف دهان و چون تمیز داده شد که نرفالدم در غشاء مخاط امعاء
 باید جهد نمود که محل او را معین کرد و این تمیز حاصل میشود از ملاحظه بواسیر و لمس و قی
 مشک و زمانیکه فاصل شده است از هنگام بروز علامات عمومی دفع خون و لازم است که
 بعد از دفع خون یا انگشت مستقیم را امتحان کنند و بقیه حاصل کنند که سبب و مرضی
 غشاء مخاط مقعد نباشد و هم دانه بواسیر داخلی مخرج نشده باشد که اغلب نرفالدمها

معوی

معوی بواسطه انقباض اخبر است چون چنین باشد خون غریبه صافی و درین خوشه رنگ
 از بواسیر جداست و هرگاه مرض بواسیر بود و نرفالدم داشت آنکه در دفع بواسیر میباشد
 یک یا چند دانه بواسیر ای مخرج بیرون می آید و بواسیر غریبه از آنکه نرفالدم اصلی یا غریبه
 باید حالت سابقه و حالی مرض را دانست چنانچه نرفالدم در راستی امعاء و جوف
 نرفالدم اصلی است اینجا که صاحب نرفالدم قبلی مرضی مزمن بود اغلب نرفالدم علامتی
 از سرطان خواهد بود و چون بواسیر را در سرطان حاد بود سبب و بقیه جراحات
 غده پینه میباشد

تقدیر المعرفه اینجا که مرض انتقالی نباشد مرض بواسیر است و چون نرفالدم معوی
 اصلی بسیار نادر است هرگاه عارض مرض در استیحا می باشد که ظاهر امعاء و جوف
 نباید که تقدیر المعرفه را باید دانست زیرا که این نرفالدم اغلب علامات اولی است که در
 التي امعاء غوطه خورد

اسباب اینجا که مرض اصلی بود اکنون سبب از بواسیر معلوم نشده است اغلب
 عارض شود در استیحا که حرکت و خوش غذا و از سبب نیست تا چهل روز درجه لغایتیک
 و باشد که بجای طمعت در زمان نمودار کرد و و باشد که عارض شود بواسطه اسباب
 خارجی مانند سموم مفرجه و استعجالات مسهلات قویه مانند منطل و صبر زرد
 و اغلب نرفالدمهای عرضی امعاء عارض شوند بواسطه نفخه که در هجوم مخاط بهم
 رسد مانند جراحات درد و سنط و یا بقیه و بند شد در صاحبان سل و بواسیر
 اسفرو و سرطان و هر علتی که عسر در کرد و شرم و رید بابا لکبد و بواسیر مانند
 بزرگ شدن کبد و طحال و غده دلو و المعده

علاج آنچه را که علاج نرفالدم معدی بیان کردیم و اینها هم بکار برده میشود
 و چون در اطفا می که نازم متولد شد باشد بواسطه امعاء عروق نرفالدم

عاض شود و در لوب مقعده اندازند یا آنکه بند ناف را بکشایند تا در زیر خون آید
 بواسیر عبارتست از بروز زوائدی چند در جن آخر مستقیم یا شری خون از همین
 موضع ^{تاج} مری است که جمیع مصنفین از آن گفتگو نموده اند ولی جن بقرط و جالینوس که این
 مرض را در پیش خون از او رده مستقیم دانستند سایر مصنفین بکفوف بسط و عمو و با
 دادند و معتقد شدند بواسیر همانند دهان و رحم و غیرها ولی امری در مصنفین
 با اعتقاد بقرط رجعت نموده موضعی برای بواسیر قائل شده اند
 تشریح در این نوع از بواسیر که جن سیدان دم چند یکی عارض یکی در ناگون معلوم
 نشد است که چه تغییر در رخا ط بهم میرسد و همین قدر باید قبول نمود که تغییرات
 و املا دم که در سایر نزف الدم معوی اصلی بهم میرسد و این مرض هم باید موجود باشد
 ولی در اغلب اوقات بواسیر شناخته میشود بواسطه بروز بعضی دکها و زوائدی مدی
 و بنفشی که بعضی از آنها پدید میآید است و بعضی دیگر برخلاف آن دکشان عرض میآید
 و در این صورت اخوی بعتر میتوان فرق مابین دکها داد و سطح این دکها یا صاف یا نا
 هموار است و حجم این دکها از عدس تا نخود نسبت و بعضی از این دکها برونیشان در
 مقعده است که نامیده میشوند بواسیر خارجی و بعضی دیگر برونیشان در جوف رقی
 و در بالای عضله مضبقة داخلی مقعده است و نامیده میشوند بواسیر داخلی و نامی در است
 عروق از شش تا هشت سانشه بطریقی مقعده ولی دیکه شده است ناقص مستقیم
 و مصنفین در رنج این دکها اعتقادات مختلفه دارند که بعضی از آنها این دکها را از
 دالی میدانند و برخی نزف الدم نسبی و جمعی از نوع باصه متخلف و این اختلافات از اینجا
 بهم رسیده است که تشریح این دکها در درجات مختلفه انواعها و فیه که بعضی تغییرات
 ثانوی در آنها بهم رسیده است نموده اند و چون بواسیر ساده بود حاصل شده است
 فقط از انشاع و رید ولی چون این دکها مدتی دوام نمایند و مکرر متبجح و متورم
 گردند

بعضی

بعضی تغییرات در آنها بهم رسد که جرم الت در این رخا ضخم و بزرگ گردد و اتصال
 او را با و رید مسدود سازد و گاه برخلاف جهت و آنها تا نرگ و نرم و مقوی کشته
 و چون خون نشتر در غشاء لحمی جای گیرد و مشتبه گردد با نزف الدم نسبی و التی و گاه
 از اوقات چند دانه بهم متصل بشد و جدایشان بیکدیگر ملصق گشته بود متفک شود
 و شبیه گردد بیا فیه متخلف و بعضی اوقات این دکها صلا بتی حاصل کنند مانند مواد
 و این صلا بت بواسطه آن است که خون جوف دانه غلیظ گشته یا بواسطه آن است که
 غشاء لحمی اطراف بطور از همان متورم گشته و صلب گردد و چون غلافی در ده
 احاطه کند
 علامات قبل از بروز دکهای بواسیر خون زیادی بخراست مسقیم میل میکنند
 از این جهت حسن ثقلی در موضع عجز و حرارت و عکس در مقعده بهم میرسد و دفع نمود
 بواسیر و مویع است و اغلب همای کند با نشتر اندک و طوبیت رقیق و سفید یا
 بخاط و این علامات همای کنند با وجع کمر و عسر البول و وجع شکم و عدم اشتها و نحو
 و کسالت و دوام این علامات عموماً از یک تا سه روز نراست و باشد که در چند ساعت
 تمام گردد یا آنکه هفته طول کشد و رفع شدن این علامات یا همای میکند با بروز خون
 یا دفع میگرد بدین آنکه خونی نشتر کند و در اغلب بروز میکند یک یا چند دک که بواسیر
 و بروز این دکها بعد از تبخیر مکرر است یا آنکه بطور از همان بروز نکند و چنان نماید
 که او قبل از بروز خون حاصل شد و سبب نزف الدم گشته است چون در این دکها
 خون میل کند در اطراف یک یا چند بوامدکی باصفاقی که در گوشت بروز کند با وجع
 و صلا بت و گاه برخلاف بسیار نرم و مقعده سرخ و پر خون کشته و میل بد دفع باز
 زیاده شود و وجع در کمر و شکم بهم رسد که در وقت نشستن و ایستادن شدت
 این علامات بهم رسد و راه رفتن عسر و مویع است و عدد این دکها تخلف است

که گاه يك و گاه متعددند و باشد که مانند چنبره ناهوار جميع اطراف مقعد وافر اکبرند
 و چون مقعد را با انگشت لمس نمایند هر چند علی است بسیار موجع اغلب اطفال
 شبیه بدائیات مذکور در جوف احساس شود و گاهی از اوقات دانه در خارج
 نکند و جميع آنها در جوف مستقیم بودند و در این صورت هر چند احساس موجع و امتلاء
 و اتساع در مستقیم نموده و قولنج و وجع کمر و عسر البول و گاه بواسطه فشار دانه بر غش
 مثانه حبس البول عارض گردد و میل بدفع بواسطه علی الاضطرار است زیرا که این دانه ها در
 میان مستقیم همان طور عمل کنند که شئی خارج عمل میکند و باشد که حجم دانه ها بقدری
 که فضای روده پر نماید و در این صورت دفع بواسطه اعمال گردد و در این وقت خستگی و
 کسالت زیاد شده و نفخ و تهوع و گاه قارص گردد و بعضی از مرضی در وقت دفع
 بواسطه وجع زیاد بحدی قوت بکار برند که این دانه ها با انگشت از مخاط مستقیم بیرون
 آیند و در بعضی از زنان که صاحب بواسیر اخلاقی باشند بعضی از علامات بیرون رفتن
 مانند آنکه در علل رحم از قبیل وجع کمر و ثقل مقعد و طبع سفید و همدم کرم باشد
 که بعضی از زنان با شوهر خود نمیتوانستند هم خواب نمایند بواسطه وجع که از فشار
 بود آنها میرید

زقار و انتفاخ مرض بعد از آنکه این علامات چندی برقرار بودند و بدین میثاق دانه ها
 شده و بر طرف گردند بدون آنکه خوفی در پیش نماید و این قسم بواسیر را پس از آنکه
 در اغلب فرد نشستن دانه بواسطه مقعد و یا دخول است که مترشح گردد و نامیده
 میشود بواسیر با جویان و این در پیش خون کاه فقط ترشح است و گاه بواسطه پاوه شد
 جلد رانه و این پاوه شدن با انجمه زیاد است که در این وجه سید یا انجمه فشار است
 اعم از آنکه عضله مضبقة بواسطه تشنج فشار بر او دهد یا آنکه فشار از بابت مواد
 بواسطه در وقت دفع شدن باشد و بعد از پیش خون نادر است که این دانه ها

بجای

بکلی بر طرف گردند و اغلب اوقات در اطراف مقعد بعضی برآمد بکهای کوچک نرم
 و بدون وجع نمایند که بعد بواسطه میل دم با آنها از نو حجم و متدد و موجع مانند
 جميع علامات مذکور در اینها میسرید خلاصه نادر است که هجوم بواسیری مختصراً
 باشد و اغلب مکرراً عارض شود بفواصل مختلف و بدون نظم یا با نظم و در بعضی
 بواسیر تغیری در بعضی از فضول است و در اغلب هر چه سن بالا رود شدت
 او بیشتر گردد و در بعضی بدن سببی مرفع گردد و در بعضی هر چه سن بالا رود
 فاصله حملها بیشتر گردد و بعد از دفع شدن بواسیر بعضی اطفال بسیار کوچک
 شبیه به غصون جلد در اطراف مقعد مادام العمر نمایند و باشد که بعد از دفع
 هیچ علامتی باقی نماند و آنجا که فاصله های هر حمله بواسیری بتدریج زیاد گشته
 و مرض خفیف گردند و بعد دفع شئی از این دفع گشتن هیچ اشفاق و علقی برود
 نخواهد کرد ولی آنجا که این اشداد دفعی باشد بخصوص در اشخاص موی خلیج
 چنین نخواهد بود و اغلب پاوه نرفق لدمهای دیگر خاصه سکنه عارض گردد
 ترکیبات دانه های بواسیری میتواند مرکب شوند با علل چند و موثر اتفاقاً
 خطرناک گردد چنانچه باشد که چون بواسیر داخلی در هنگام زنجار با و در
 از مخاط خارج شود بواسطه تشنج عضله مضبقة مقعد مختل گردد و در این
 صورت حجم و تمدد دانه ها زیاد گشته و بنفسی شوند و در اغلب بمرض جميع علل
 فتوح مختلفه روی دهد و هم در بعضی از آفات الت بواسطه غائرها پدیدند و گاه
 ورم از دانه بواسیر سرایت باطراف خاصه در غشاء الحیانی مجاور غده و
 جویان ویم در اطراف مقعد شده و در مایل برای مری حاصل گشته و بالاخر شقاق
 و ناسور در اطراف مقعد بهم رسد و هم بواسیر مرکب شود شقاق اطراف
 مقعد و خروج مستقیم و ضیق معاء و نشر دانی مرطوبی مخاطی با پی و بیرون

در مستقیم و عرض و جاع عصبانی و عسرت در دفع بواسیر و هم دیده شده است بعضی
 مرخصها که چندین سال از اطراف مقعد آنها ترشح کرده است از این رویش خون
 منبج گردد انجی با هزار احتیاط و احتیاط عمل هضم
 تنبیه انجا که داغهای بواسیر منبج و پرخون شوند با هیچ علتی مشتبه نمی شوند
 شد زیرا که هیچ مرضی صفات و علامات مخصوصه او را ندارد و چون داغها نرم
 و کم خون بود باشد که مشتبه گردد با پولیپ بعضی داغهای کوفتی مخصوص با کندی
 و با تاج حوض و طایف داغها در اطراف شان بعضی پدید کجالت و بیخ آنها بسیار
 صلب و همراهی کند با علل دیگر کوفتی و هم این داغها بزرگ و نموشانند ریچی بطور
 ارمان است و هیچ وقت در داغها این توان از تحجیر و رفع او که مخصوص بواسیر
 مشاهده نگردد و پولیپهای مقعد که هم بزرگتر از آنها بطور ارمان است اغلب
 بولیکوله و نرم و مانند اسفنج است و چنان میباشد که از خند قطعه حرکت
 باشند و تشخیص بواسیر داخلی مشکله است از بواسیر خارجی ولی انجا که داغها
 نزدیک بعضی مضیق مقعد باشد در وقت دفع بواسیر که بنظر می آید شناخته
 میشوند از ترنک بنفجی شان و چون محل آنها بالای مقعد باشد بواسطه مسطح
 انگشت و رقتا داغها تمیز داده میشوند از علل رحم و مثانه و غده و ذی و بعضی
 از صاحبان بواسیر معص عارض گشته و دفع بواسیر مکرر مدفع گردد و فی الحقیقه
 و در این صورت از دست و سنا و پانته داده میشود از مشاهده مقعد و دیدن
 داغهای بواسیر و باید تمیز دهند خون بواسیر را از سایر خونها بیکه از مقعد
 جاو میشوند از غور کردن در علامات و طریق انگشت و در هنگام ضرورت
 استعمال این مقعد
 قدامه المعرفه قدامه و اغلب معاصرین بمانند که بواسیر عملی لازم است که طبیعت
 در بعضی

در بعضی از اشخاص چون نیمه سایر اعمال ایجاد میکند و بسیار است و از نگاهداری نمود
 و این قول خالی از اغراق نیست هیچ شکی نخواهد بود که بعضی علامات بسیار شد بدو
 نرخطر بعد از حصول بواسیر دفع گشته اند و طایف نوع چیزها اتفاق است بواسیر
 اغلب ذات مرضی است و میسر و بهتر نبودن او است بخصوص چون مرکب با علتی دیگر
 شود مانند آنکه اگر از بواسیر مشتق گشته و غائر یا گرفته بیفتد اغلب موثر هلاکت
 تر از الدمهای مکرر مورث انجی و هزال شوند و شقاق و نواسه و خروج مقعد که
 منبج از بواسیر شوند از امر بسیار جدی میباشد بجهت خطر بواسیر داخلی پیش از حاق
 و باید دانست که اگر بواسیر قدیمی باشد و مزاج عادی بر او گردد بخصوص چون عرضش بقاعد
 و منظم بود دفع نمودن او را بقتله خالی از خطر خواهد بود و این عموماً است او در هیچ امر
 عادی مانند دیگر و غیره
 اسباب عارض گردد و در جمیع اسنان ولی اغلب ابتدای بروزش در سن و قوف یعنی
 سی یا چهل سالگی است و در زنان بیشتر از مردان عارض شود و این زیادتی استعداد البته
 بواسطه حمل و طمث است و عارض شود بطور ارث و در بعضی از بلاد پیش از سن پانزده
 و بیست سالگی معلوم نیست چرا که در بعضی بلاد حاره و در بعضی بلاد باره زیاد و بعضی
 از این بلاد کم است اغذیه حیوانی و سواری و شستن زیاد و سفر و کماله که و پیوست
 و موافق و در حوضه خاصه اتساع رحم بواسطه حمل اغلب مورث این مرض گردد بواسطه
 آنکه اکثر از آنها منع وارش خون از او رده معاء مستقیم و غیر نمایند و هم عارض شود
 که قبل از هندی خون را مستقیم مانند انداختن زلو مکرر و نوشاندن مسهلات و سبک
 خاصه صبر نرزد و وجود و در مقعد
 علاج این مرض بر سه نوع است که بالیانیف کور یا نیف و پو فیلاک تیف باشد
 چون هر یک احساس کند علاماتی را که دلیل بر ابتلاء او رده بواسیر باشد خاصه چون داغها

خورانند مانند گوشت سفید و سبزیها و میوه جات و قوی و دفع برادر بکار بند
 که هر روز اما له از آب گرم یا از طبوخ برزگنان نمایند و صبح و شام مقعد را از آب
 سر بشویند و در هر هفته اولاد و باراستیام نمایند و از سواری اجتناب کنند و در
 دوشک پستی یا کاهی اغلب به پهلوی بخوابند

بول الدم عبارتست از خارج شدن خون از مجرای بول مانند اولاد و بول
 تشنج مثانه و از این کلام مفهوم میگردد که هرگاه موضع تشنج خون در مجرای بول بود
 خارج از بول الدم است و در بعضی جا که بیان خواهد شد

اقسام بول الدم بعلوه اقسامی که در نطفه الدم بیان شد از قبیل نطفه الدم اصلی یا
 عرضی و اکلیب و باسپو با اختلاف موضع نشخون بول الدم منقسم گشته است بکلیه
 و برنجی و مثانه و این تخصیصات را در بابین مرصفا غلبتین آنها نوزد یک با هم است
 تشنج بول الدم اصلی بوقدر غشاء مخاط مجاری بول مجری و پوختن
 و گاه بعضی لکهای سپاه چیزی مشغول نگردد و اینجا که عرضی بود بعضی تغیرات مختلف
 در کلیه و بویج و مثانه ملاحظه گردد مانند مل و سرطان که هر گاه می کنند با ورم حاد
 یا مزمن غشاء مخاط و گاه بول الدم حاصل شود بواسطه دلیلی و زده مجرای بول
 بخصوص و زده واقع در اطراف عنق مثانه

علامات و قیاس علامت مقدمه بود و نوع است موضعی و عمومی علامات موضعی
 مختلف پیش از اختلاف محل نشخون چنانچه اگر محل او در کلیه بود احساس وجع و حرارت
 در صلب غده شقی و اینجا که مثانه مبتلی گردد در زین شکم احساس وجع عمیق و درد
 شرح و مقعد احساس ثقل یا وجع و در انتهای الت تناسل نموده شود و اینجا که سبب
 خوردن در زین با مبتدیک حرارت و سوزش در جمیع مجاری بول نموده شود و نطفه
 شدید مجموعی روی دهد و این علامات همراهی کند با کالت و تشنج پاره های پیکاع

و میل

بول الدم در نطفه
 نما توری گویند

و میل زیاد دفع بول و چون مرصفا بول کند مقدار کم باز یاد می و خون دفع شود این
 دفع خون گاه چون فواره و بدون وجع است و گاه بسیار عسر و سوزان و گاه کم یا
 قطره قطره خارج شود و باشد که حبس بول عارض گردد و این حبس بول بواسطه تشنج
 که قدر از خون غلیظ شک عنق مثانه و امساقی کند و خون غریبه گاه صاف و غیر مخلوط
 با بول است و طایفین قسم بسیار را در اغلب مشاهده شود در جرح کلبه و اغلب
 اوقات خون غریبه مخلوط است با مقدار زیاد بول در این صورت بول قرمز یا سیاه
 دنگ و حاوی پارچه های کوچکی مانند لپ سپاه دنگ از خون غلیظ شده است و
 گاه مقدار خون بجدی کم است که لون بول قدری کلی رنگ شک و از ماندن هیچ رسوب
 از خون مغلطه حاصل نمیکرد و در این صورت اگر بول را با ذریعین امتحان کنند کلبه
 خون را در او مشاهده نمایند و این کلبه ها عبارتند از اجسامی صغیر که حجم آنها یک
 صد و بیستم یک میلی متر است و شکل آنها مانند عدس و سرنگشان زرد و دارای
 یکدانه مرکزی میباشند و این دانه غیر محلول است در آب و تیزاب و محلول است
 در اسید استیک و هم بول حاوی خون بواسطه حرارت غلیظ میگردد و با تیزاب رسوب
 زیاده حاصل میکند و مقدار خون غریبه مختلف میشود و هم بحسب نکات مرضی
 هم در هر بول از یک و زین و نیز یک شک است که در بول الدم کلبه دفعه اول را در
 پرنک کشته است و این از آنجه است که بویج متعلقه بکلبه معلول بواسطه خون
 مغلطه یا در مل مسدود شود و بول که فقط از کلیه صحیح بماند و رسد بدون اختلاط با خون
 خارج گردد و هرگاه بول الدم عرضی بود همراهی کند با بعضی اختلاط دیگر که مختلف
 شوند موافق طبیعت مرضی اصلی و تغیراتی که در آلات مجریه و علامات عمومی
 نیز مختلف شوند بواسطه قلت و کثرت خون غریبه

در اتمام و قیاس چون مرضی صلی بود و وام و انتهایش از چند ساعت الی دو روز است

و هرگاه عرضی باشد بود که در حجات مختلف تا چند ماطول کشد و باشد که بول الدم اعظم
 از آنکه عرضی یا عرضی بود بحدی شدید باشد که مورث هلاکت کرد و ولی این انتقام است
 و بول الدم مانند سایر نرف الذمهها فیصله های مختلف عود کند و اینجا که انتقالی باشد
 عرضش در هنگامات معین خواهد بود

تناج بول الدم نشر خون در مجاری بول سبب بعضی اتفاقات میگرد و چنانچه قبل
 مذکور شد هرگاه قطعه از خون مغلطه غرق مانند و اسید و سوز و سبب جبر بول شود
 و اینجا که خون مغلطه یکی از پنجین بر اسید و سوز نماید بول در حوضه کلیه جمع گردد و سبب
 اتساع او شده و مورث بر نوزاده در صلب و شراستیف گردد و در حوضه بول موجب بول
 بعضی علامات خاصه قولنج کلیه گردد و ولی این علامات طولی نمیکند که دفع میگرد و بول
 خارج شدن خون مغلطه که اغلب بی و طویل و شبیه بدود امعاء میباشد و باشد که
 قطعه از خون مغلطه در حوضه یا پنج یا مثانه ماند و سبب انعقاد و مل میگرد
تخصیص در تخصیص بول الدم چند چیز را باید معلوم کرد اولاً باید فهمید که بول
 خون الود است یا نه و این مسئله اغلب بر وقت بول ظاهر میگرد و و اینجا که شکی حاصل نشود
 باده و بی امتحان کنند که کلیه های خون هیچ چیز مشتبه نخواهد شد ثانیاً باید دانست که
 محرجه در کلیه یا پنجین یا مثانه نشر نموده است و این مسئله اغلب غیر معلوم نمیکرد و حد
 بنرف الدم کلیه زده میشود و وقتیکه احساس وجع و ثقل در صلب نمودن شود یا آنکه خبر
 بکلیه وارد آمد باشد یا آنکه بعضی خونهای منجمد شده و لقیه دفع شود که شعب چند داشته
 باشد و دلیل بر آن شود که غلطت آنها در زاده لوله کلیه بعمل آمده است و هیچ علامتی دلیل
 نخواهد شد باینکه موضع نشر خون در پنجین است و وقتی حدس بر نرف الدم
 میتوان زد که جمیع علامات موضع و محل مثانه بود و این صورت اختلاط خون با
 بول بسیار کم است ثالثاً باید معلوم کرد که بول الدم اصلی است یا عرضی و این تخصیص
 مبرق

میشود موافق ظهور یا عدم علامات بعضی علل در مجاری بول و موافق آنکه بعد از انسداد
 خون در بعضی وقت که با آنکه مدتی نماند و بول الدم عود کند و باشد که نرف الذمه
 کلیه اصلی بود ولی نرف الذمه مثانه همیشه عرضی و بسته بعلت دیگر است

نقطة المعركة خطری نذاری مکرر و قتی که خون محرجه بسیار یا نبرد و ام بود یا آنکه منجمد شود
 از غیر شرج الت با آن وجود رمل و آن بول الذمهها بیکه عارض شوند در میان اراض
 حاده مانند حجات طاعون یا ثوری خاصه جد کرده لیل بر حرکت بوند

اسباب اینجا که مرض اصلی بود در حرمان و جوانان و ده موی خراجان میگویند از
 اسباب مستعد اند و غلبه الذمه و افراط در شرب الکلی و اصراف جماع میگویند اسباب
 محصل میباشد ولی انجمع اسباب اثر هوای در این مرض بیشتر است و مخصوص است
 به بلاد حاره و در بلاد معتدله بسیار نادر است چنانکه فرایک در شش ماه در بعضی که معالجه
 نمود شش نفر مبتلی ببول الدم اصلی بد و بول الدم عرضی حاصل نشد بول اسطه ضرب
 جرح مجاری و وجود رمل و از وجود سرطان و دلی و در وقتیکه این مجاری بواسطه
 حبس بول بسیار منبسط شده باشند عارض شوند از تغییر یافتن حالت عمومی بدن مانند
 آنکه در حجات خطر مثل طاعون و حمی امفردید میشود و هم عارض شود در مرض پوچ
 و بول الدم اصلی عارض شود یا بغتة یا بعد از خستگی زیاد مانند سواری یا بعد از شغل
 مسهلات در سببک مخصوص صبر نبرد و بعد از خوردن مقدار زیادی از برنج و
 باشد که عرضش بواسطه انتقال نرف الذمه دیگر بود مانند بواسیر و هم دیده شده است
 بول الدم مجاری ولی بند مرت

علاج بول الدم اکثراً و سپو را باید مدا و اگر با فسام معالجه آنکه در عموم
 نرف الذمه بیان شدند و بول الذمهها چیزی من که بسته بتغییرات مجاری بول بودند بواسطه
 اعمای معدنی آهنی و یا ککری و الکلی معالجه کنند و اینجا که عارض شده باشد بعد از

جذب نزدیج بعلاوه استجمام درهائ فاق و نوشاندن اشربه زیاد لازم است و چون
 کافور و ترپاک حقه دفع حبس البول که عارض شود بواسطه غلظت خون در مثانه بعضی
 علایها نموده شد است اغلب بپزند که اشربه زیاد بنوشانند و میل نقره در مثانه بپزند
 تا خون مغلظه را باور پارچه پارچه کرده و بعد بواسطه ای که احتقان در مثانه نمایند
 بیرون آید ولی چگونه میتوان آب در مثانه کرد که باین حد متملی شده باشد و با پیچیده
 بعضی از خواص بیان کرده اند شرط نمودن شرجی و طایفه عمل نموده نمیشود مگر در وقتیکه
 مجرای بول بسبب مسدود شدن باشد که زلفور نتوانند ش کشند و در سه با و وقت
 بهتر آن است که مبللی برک از کم الاستیک با کمی مدام مکرر در مثانه نموده و خارج نمود
 و اگر تری و داری عبارتست از نفوذ الدم غشای مخاط مجرای بول از ابتدا عشفه تا عقب
 مثانه و این مرض که تقریبا مخصوص مردان است اغلب همراهی کند با وجعی در او و بر تری که بشیر
 بشرج و صلب کرده و احساس سوزش در مجرای بول خاصه هنگام ببول نمودن و دفع
 بول عسر و ناقص بود و خروج خون اغلب قطره قطره و صاف است و اختلاطی با بول
 ندارد و اینجا که در پیش خون در جرد ذی مجری بود قدام خون داخل مثانه شد و خلط
 یا بول گشته و در بول با او دفع شود و مقدار خون مخربه بسیار کم است و در وقت
 از چند دقیقه تا چند ساعت است و نادر است که تاسه و سوزش طول کشد و تشخیص
 این مرض از بول الدم باین نحو است که در اینجا پیش خون فقط بواسطه نقل است که
 تشخیص در مثانه لازم نیست و مقدمه المعرفه او جید است و عارضی اغلب بواسطه
 سوزش با مسقطه یا ضربه وارده برالت و از انحراف غشاء مخاط از خول کستر و از
 اقسام جراحی که درالت نمایند وجهه علاج این مرض الت را دراد و به محله به پیچند
 و در اعمود و در وی شکم نگاه دارند و غرض ولت نموده به پشت بخوابد و
 از اسباب محرکه احتراق و اینجا که سبب مرض سوزش بود از او بهر معالجات

زوف الدم مخاط
 مجرای بول

اصل

اصل مرض که اغلب آنها معالجه ضد و سرم است نرف الدم رفع کرد

همراهی سرم

نرف الدم سرم عبارتست از زردش خون در سطح مخاط رحم غیر از اوقات حبس یا در
 هنگام او و طبع مقدار یک زباده از خصوصه طمث بود و قسامی که از برای عموم نرف الدم
 بیان شد از اکطوب و سپو و اصلی و عرضی و غیره را اینجا مجری است و بعلاوه نرف الدم
 دوی و هدیاد رخلاء رحم یا در هنگام حمل یا در زمان قلبی بعد از وضع حمل و چون
 وقت از این مرض در هر یک بطوری دیگر و خط و اسباب علاج بنویسد بگو است باید هر یک
 از آنها را عرضی دانسته و در فصل جدا گانه ذکر شود و ما در اینجا بیان نمیکند مگر قسم
 و تحصیل آن دو قسم را ذکر کتابی باید نمود

تشریح مرضی شقاق و خولش و مخاط ملاحظه نشود مگر هنگامیکه سبب و سر طایفه
 مجروح بود و در جوف رحم مخاطی مخلوط با خون جمع کرد و والت الت متعجب بود که چون
 بر او فشار دهند خون از سطح داخل تراوش کند و اغلب پیچش نیز متعجب شوند
 علامات اینجا که عروض مرض بواسطه ضربه و سقطه بود که بلا فاصله نرف الدم
 دوی نماید علامات مقدمه مشهور نکرد و در غیر این جمیع علامات مذکور شد
 عموم نرف الدم بر و نر نماید بخصوص علامات که قبل از بروز طمث دوی میباشد یا
 شکم پیشتر و زردش خون مذر پیچ با دفعی و سیلان او با اتصال است یا آنکه بفاصله
 کم مسدود شود و با زجر بیان نماید و عموما در پیش خون با اتصال است که گاه شدت
 نماید و همراهی کند یا خروج پارچه های خون غلیظ بخصوص در هنگام بر و وقت
 و چون زنان چندی به پشت بخوابند خون در مهبل جمع گشته و غلیظ شود و با سوزش
 که خارج شد پارچه های خون مغلظه همراهی نمائید با اوجاع شدت که در رحم عارض
 کرد و در وقتیکه او بخوابد دفع کند اشیاء خارجه را که در جوف و منعقد میگردد
 و اینجا که نرف الدم بدون ترکیب اصلی بود با اوجاع رحمی همراهی نکند و فقط در پیش

احساس کند بعضی اوجاع در زبانشکم و در ریه و از امتحان رحم بواسطه این
اینست در مجمل و ما لبدن شکم هیچ صلابتی و عظمتی در محو مشهور نگردد و فقط چیزی
که محسوس گردد انشاع ثقبه رحم است که گاه بند انگشت میتوان در او داخل کرد
مدت نفوذ لدم صلاخ و کسالت عارض شده و اشتها نقصان یابد و سایر علامات عمومی
مختلف گردد باختلاف نفوذ لدم و مقدار خون مخزیه

بقیة دم انقباض است و دم هرگز نفوذ نمیست که بعد از آنکه چنگ بطور اتصال سپلان
نمود بقاصله چنگ سد گردد و بند ریح فاصله هردو نفوذ لدم بیشتر گردد تا آنکه بالمره
قطع شود و در دم این مرض غلب یک هفته است ولی در آنکه راحت نبخشد یا آنکه
نفوذ لدم منوط بمرضیاتی و یا بوجود شئی خارج بود چندین هفته و چندین ماه دوام کند
و در این صورت دیگر خون غلیظ نگردد بلکه چون ضعف مرض مزید شود و نازک شود
کم گشته و خارج نگردد مگر بطوبی رقیق و اندک خون الود و مقدار خون مخزیه را می
توان بدست آورد اینجا که مرض اصلی بود و در حلاله رحم عارض شود منتهی باقی نگردد
کو پا دیده نشد که این نوع از مرض بحدت رسد و اینجا که در دختران نوبالغ عارض گردد
چنین نیست بلکه هر چند دوام مرض کوتاه و مقدار خون مخزیه کم باشد ضعف
زیاد مستولی گردد و هم چنین است در زنان و دختران کلوریک که بعد از هور
مرض شدید و علامات عصبانی بیشتر گردد و دو باشد که منتهی بمرگ شود و عموماً آن
بعد از جریان خون خفت یا بند یا بالمره مفقود گردند ولی باشد که بعد از جریان خون
هم باز ماند و این بقاء اوجاع و دلایل بر مصل خون است و اما بر هم و با اینجهت است که در
این اشخاص مرض بسیار عموماً کند و اغلب عود مرخص و هنگامات طمث است چنانچه
در چهل مشاهده شود بعضی زنان که چندین سال طمث آنها مانند نفوذ لدم میماند
شود باشد طمث و بعضی از مصنفین ملاک کور نموده اند عروض نفوذ لدم را
بطور

بطور نوبه بشکل مواجبه و غب ولی این نوع بسیار نادر است و اینجا که نفوذ لدم رحم
مزمن بود در اکثر عروض خواهد بود و برین خون در این هنگام گاه ملاطبت ولی
اغلب بقاصلهای چنگ سد و کشته دوباره شدید تر عارض گردد و این شدت
اغلب عروضی کند یا هنگام طمث و بعد از سرعاف نفوذ لدم رحم از سایر نفوذ
بیشتر مجزای بود و بعضی بر آنند که نفوذ لدم رحم سبب سرطان الت گردد و این
اشخاص سبب بابت سبب نیستند اندک آنرا که چون خون از رحم سپلان کند در آنجا
که بسته بسرطان باشد همیشه عضو تغیر کلی میسر میماند است

تشخیص اختلاف کلی در بر و نز طمث میباشد نه همان باختلاف زمان
بلکه در بکرین معین یا بجهت بسیار مشکل است تعیین این را که در چه هنگام سپلان
خون از رحم از طمث خارج شده و داخل نفوذ لدم میگردد و اگر چه ملاک کور نموده اند
که باید بمقدار خون مخزیه تمیز داد ولی بجهت میانه که قبل عود میماند بقیه را و حاصل
نمیکردد و بهتر است که طبیب حالت مرض را ها دی خود کند که چه تغییری از نفوذ لدم
در حین اعمال عمل بدن بهم میرسد بخصوص در دختران غیر بالغ که یا جریان خون طمث
یا نفوذ لدم و حل این مسئله خواهد شد یا اینکه اگر سپلان خون موثر ضعیف گردد
معلوم است که نفوذ لدم و مرض است و الا طمث پیش افتاده است و هم گفته اند که
تمیز داد طمث را از نفوذ لدم باینکه خون طمث رقیق و خون غیر او غلیظ شده است و اگر
این قول عموماً نیست دارد ولی بعضی از زنان دیده میشوند که در بر و نز طمث خونها
غلیظ شده چند خارج کنند بدون آنکه بتوان گفت که نفوذ لدم دارند و اینجا که نفوذ
اصلی رحم بسیار کم طبیب باید که چون چنین حالتی بدید در دست دقت کند زیرا که
اغلب از آن عارضی خواهد بود و در غالب که نفوذ لدم رحمی را می کند با خونها
غلیظ شده و جمع دامه در رحم و لیل است بر سقط چنین و جمیع نفوذ لدمها باشد



در دختران جوان و در زنان فاحشه روی پدید می آید و سبب می باشد و باشد که سبب
تخیر الت و عرض از انقباض رحم و بروز نشی خارج مانند پولیب سرطان در جوف رحم
که بواسطه لمس با انگشت استعمال این رحم متبرزه شود و در زنان پائسه که بعد از چند
سال دیواره طمست را غایب و ترکند اگر چه عرض او بقاعه بود ولی باید حدس بر مرض
التي کنند و هم چنین است که چون بروز طمست در ماهی و در فعه شود

تقدم المعرفة اختلافی همسان از حیثیت کثرت و قلت خون مخبره از حیثیت اثر
نزف الدم در مزاج و از حیثیت اصلی بودن و عرضی بودن علت در هر صورت خطی
زیاد شود و ای در نزف الدم هم رسد زیرا که اغلب مستعد کنند زنان و بسقط
چنین و گاه منع کند و باین حمل پرداختن را و آنجا که عارض شود در دختران نابالغ و
صاحبان کلر و نیز خطرش بیشتر است و چون مرض عرضی باشد هرگاه بسته به پولیب
سرطان بود خطری زیاد تر خواهد بود

اسباب نادراست قبل از بلوغ و بیشتر عارض شود در نزد یکجهای یا سببی هر چه
زن بسن یا سوزد بکثر شود نزف الدم و حی بیشتر عارض کرد و آنجا که مرض اصلی بود اغلب
عارض کرد و در زنان جوان که دموی مزاج یا عصبانی مزاج باشند و صاحب عصبونند
و اغذیه قویه خورند و طمست ایشان زیاد بود و دیک شود بطور ارادت در بعضی از
خانوادها و حوارت بلد از اسباب مستعد این مرض است و هم عارض شود بواسطه
حرارت مصنوعی و از اسباب محصوله شمرده میشود محرکات نفسانی و جماع زیاد
و ساحفه و تمی و میل بمقتضی رسیدن و حرکات شدید مانند رقعه و سوار و زور
زیاد رفتن و افتادن بروی کمر و کف و استعمال ادویه مدر طمست و مسهلات
قویه و سوزاندن عنق رحم و امثال علوق در او و آنجا که عرضی بود عارض شود
بواسطه بعضی از امراض رحم و از اختلاف مزاجی مانند اسکر بوت و حیوانات

خصوص

خصوصی و سبب حیات شدید و اگر چه اغلب اوقات قلت دم با کلیل و ش
قلت طمست و هم انسداد او کرد و اما باشد که گاه برخلاف و موجب زیاد او شود
علاج اول باید رفع سبب کرده و در بعضی راحت نموده در بستر سخت
به پشت بخوابد که خاصه رفع ترانسایریدن باشد و بواسطه امالهای قوی با
مستقیم را تحلیه نمایند و شرب به میره بنوشانند و غلظت دهند که باین پنج اغلب
نزف الدمهای اصلی رفع شوند و آنجا که باقی ماند اگر بنض قوی و محتلی باشد
نمایند و گاه عوض اینکه خون زیاد کم کنند در در و سرد و دفعه فصد نمایند و
در هر مرتبه زیاده از ده یا نوزده مثقال خون خارج نمایند و بعضی از اطباء بر آنند
که بعد از کشتن در یک گاه کاهی انگشت را بر موضع فصد شده گذارند که خون
نیاید و بعد از چند دقیقه انگشت را برداشته قدری خون خارج کنند و همین
خویر عمل را مکرر کنند تا آنکه بقدر کفایت ولی متد رجا خون خارج شود و آنجا که
و جمع کمر و صلب غیره دلیل دایمی میل خون بر رحم باشد علاوه چند حجامت بر موضع
خاصه نمایند و در همین بین بعضی مصرفات در اعضا و درازن رحم بکار بند
مانند پاسوهای محرم و ضماد خردل و رساق و کف و حجامت بدون شرط و سینه
و چون باین تدابیر سدد م نکند و در نزد پزشکم و در وی عجز پارچه های سرد اندازند و
حفته از آب سرد کنند و در مهبلیها قانقیر بستر کنند و هم مستعمل است استحمام در آب
سرد و در این صورت چون زن ضعیف بود او را در آب سرد فرو برند و برون
او برند و لی چون قویه است باشد یک ربع الی نیم ساعت در آب بماند و چون حیات
در خطر باشد باید مهبلی را محتلی ساخت و هم نافع است فشار بر او بر طی و بروی
این زن را بطور بخوابانند که اطراف سافله و سر و حالت انقباض باشد یعنی
بیکدیگر نگاه کنند و بعد با چها انگشت از زیر پانف شکم را فرو برند بحدی که احسا

ضربان او بر طری شود بر این صورت او را سخت بپسند فقا و بفشرد تا آنکه فرغات و ساقط
 گردد و میتوان تا چند ساعت مداومت بر این فشار نمود و او به چند بوی نوزالدها
 پسور هم مستعمل است مانند ادویه مر و فاضله مخصوص عصا و رقیانج و تن و ادویه
 حدیدی و حوضات معدنه و انفع از جمیع این ادویه که در عموم نوزالدها مستعمل اند و اینجا
 سکون کوفه و ارجینی که یک یاد و مثقال غبار و ارجینی را سه بار در روز بنوشانند و سکون
 و استعمال میکنند اغلب از طباء و هم منفعت برده اند و اینجا نیز سبب نوزالدها سرطان
 الت بوده است که تقریباً یک مثقال او را در ۲۴ ساعت بتدریج بنوشانند و سایر روفا
 بهین مقدار را پیشتر بکار برند در کامبه صاحب فرض نمود که بعضی از نوزالدها پسور هم
 که هیچ قسم ریح نمیکرد و هیچ تغیراتی در ریح و در هم مشاهده نمیشد بپسندید و
 بعضی شو رات یا ناالبها یا ریح لیمانی لهذا اسباب اختراع نموده که داخل در رحم میشود
 داخل او را بکنوع باردی میبری و این ناالبها را بر طرف میگرد و از این عمل دفع نوزالدها
 میگذشت ولی وجود این ناالبها تا کنون مبرهن نگشته است و بعضی از علامات عمد
 این فرض را علاج مخصوص لازم است و اینجا که هر گاه کند با کل و زاملا ح حد بگ دهند
 اغذیه مقویه خوراند و اینجا که علامات امتلاء بود مقیه دهند بدو و اینکه و هی از اسناد
 نوزالدها کنند و چون پیوست باشند حق ملین و مسهلات بر وفق معمول دارند و ادویه
 ضد تشنج و تریاک در زنان عصبان و صاحبان وجع رحم بکار برند و تریاک را بخورارند و
 بهر آنکه حقیقت کنند و بعد از آنکه دوم لازم است که تا چند ساعته مداومت با دویه
 مذکور نمایند و جمیع اسبابی که میتوانند سبب عود مرض شوند و کنند که گواه روند
 و تقلیل ریزان کنند و از حرکات نفسانی و تحریک رحم احتراز نمایند و اغذیه ملائم خورند
 و اینجا که سبب قلت خون باشد بخلاف اغذیه مقویه خورند

امراض صفای

تفرق

تفرق اتصالی و الت میسرید که بر نوز خون همیشه بطور تشریح است مانند آنکه در اغشیه
 مذکور کرد بد و در جمیع اغشیه صفای نوزالدها دیده شده است ولی و اگر محل او در صفای
 و ما غشیه و بعد از او بر تریه صفای جنب و بطن و بیضه و کبسه قلب و مشیمه نخاع است
 تشریح مرضی علامات تشریحی این امراض وجود خون است و ریح و صفای که بالکل با جری
 از او غلیظ شده باشد و مخلوط بود با غشای کاذب آنکه حصول او قبل از برزش خون باشد
 یا بعد و مقدار خون مختلف است و خون متر شمر بعد از چندی تغیرات کلی میسراند تا
 مجدوب شود و اغلب اوقات کبسه بد و سر و احاطه کند و گاه تبدیل شود بیافته و بیوفه گاه
 عضلاتی و اینجا که مرکب باشد از طبقات چند طبقه اعلی و تبدل شود بیافته و غرض و یا غشای
 و گاه حاصل کند بنحی شبیه بیافته صفای و بر این صورت مشتمل گردد بخود صفای
 علامات علامات این امراض مجدی میهم است که اغلب شناخته نشود مگر از تشریح بدن
 و اینها علامات میباشند که بر وزن نمایند از فشار بالی ریش چنانچه اگر محل او در ریش
 عسر النفس عارض شد و صوت قریع که در و اصوات و بیضه و کبسه قلبی شوند و صدای شبیه
 شود بصدای معز یعنی نکه بر وزن کند جمیع علامات آنکه از برزش با ریح جنب حاصل میشود و اینجا
 که محل او در کبسه قلب باشد نفس تنک و نبض بیقاعک و ضربان قلب میهم و عمو کشته و
 غشی و تهیج روی دهد و هم چنین علامات فشار بر دماغ بر وزن نمایند هر گاه که محل او
 در مشیمه دماغ بود که بعد مفضلاً بیان خواهیم نمود و عمو ما در این امراض هیچ وجهی عارض
 نشود بخصوص در صفای دماغ و کبسه قلب و غشای جنب ولی بر وسه بیان میکند سر بر
 که هلاک شدند از احساس وجع شدید در شکم که چون تشریح نمودند آنها را جز مقدار
 زیاد از خون که شرد در صفای نموده بود تغیری دیگر یافت نشد و اینجا که مقدار خون
 متر شمر زیاد بود اضطراب زیاد روی داده و سیمای تغیر یافته و نبض ضعیف گشته باشد
 که در چند ساعت مرضی هلاکت رسد و معلوم است که هر گاه مقدار خون ضعیف زیاد

باشند جمع علامات که در عموم نرفالدم بیان نمودیم روی خواهد داد و این علامات دیک
نشد مگر در وقتیکه سبب نرفالدم پاره شدن عرق باشد و بود که نرفالدم صفاتی هر یکی
با نرفالدم مخاط مجاور و از فرایند که مذکور شد تشخیص این امراض بسیار مشکل است که
ناکنون هیچ علامتی بدست نیامده است که مشخص کند و بیش خون و در جنب کبسه قلب
صفای بطن و تقدمه المعرفه این امراض عموماً خطرناک است و اسباب آنها نیز بسیار میباشند
که اغلب اوقات در صفای هیچ تعبیری مشاهده نکرد و گاه اندک و سری در آن دیده شود
و ناکنون بواسطه تشريح و بیش خون در صفای مفاصل دیده نشده است ولی در اینجا هر
صاحب سؤ القینه نرفالدمی باشند مشاهده کنند است که در هر وقت در یک یا چند
مفصل آنجا جمع شد یک عارض کرد که هر احوالی که با جمیع علامات یک دلیل اند بر نشانه
در کبسه مفصل که بعد از چند روز در اطراف آن مفاصل لکه سیاهی نمود اگر در دو مفصل
بحالت طبیعی نباید مگر بعد از یک یا دو هفته لهذا میتوان قائل بر نرفالدم مفصلی شود
نرفالدم صفای دماغ عبادت است از بر بیش خون در جوف مشیمه دماغ یا در غشاء المخاطی تحت
مشیمه یا در بطون دماغ

کسبه مشیمه دماغ

تشريح مرضی مدتی معلیین طب بولن بودند که ممکن و بیش خون در مابین ام الغلیظ و
طبقة خارجی مشیمه باشد ولیکن با تیره اول کسی است که این اعتقاد را رد کرد و نمود که اغلب
بیش خون در جوف مشیمه است و خون مترشح باشد که محدود بود ولی اغلب منتشر شود
روی هر دو نیم کره دماغ و در سطح محدود آنجا و مقدار خون مترشح مختلف است از چها
کم تا هزار گرم و اغلب بعد و پنجاه گرم است و اینجا که صاحب مرض زود بهلاکت میرسد
خون رقیق است و طبعاً چون مدتی بماند غلیظ گردد که هرگاه مریض چهل روز یا پنج روز
ماند خون بکلی غلیظ شده و مخاط شود از غشائی کاذب که شبیه است با غشیه صفائی
یعنی آنکه مدخل و مخارجی ندارد و اغلب اوقات ملتصق گردد با طبقه خارجی مشیمه که در

نخار

تجاوز از خون مترشح غلیظ گردد با خود مشیمه و باین واسطه بود که ناکنون معتقد تر بیش خون مابین
ام الغلیظ و مشیمه شده بودند و این غشاء کاذب چون دوام کند باشد که ماد و میلی مطر
ضخامت بمیرساند و سطح داخلی او خشن گشته و عروق چندی را و میبرد و بواسطه این خون
مغلظه جذب شود ولی گاهی اوقات در این غشاء علقی بمیرسد و در طوبت یا خون از
او نشتر کند و با پنجه دیک شود که در یکی از این کسها خون مغلظه بلفی شده و خون مغلظه
سپاه و خون رقیق میباشند و چون طولی کشد که مریض هلاک نکند و جمیع اینها جذب بشد
و باقی نماند مگر غشاء کاذب مشیمه بصفاق و نشتر خون در اغلب بواسطه تشريح است ولی
دیک شده است که عروق و بواسطه پاره شدن و رید یا معصر یا یکی از نشترانی قاعه دماغ
بوده است و این نوع از نرفالدم که ثانوی و عرضی است عارض شود در تحت مشیمه و
فشار بر دماغ بسته بر پادتی و یکی خون مترشح است که طر زرد های دماغ چمن شده
و گاه فرورفتگی در اطراف این علامات دیک نشتر بوی آنکه چون عظام و سبب ملتصق
نکشته اند دماغ بر فشار مقاومت نماید و عظام رأس مانند آنکه در ام القیاس است از
یکدیگر دور میشوند و چون نرفالدم نخاعی بسیار نادر است از علامات و چیزی بیان
نمیکم ولی باید دانست که هرگاه نرفالدم در سر عارض شود علامات تشريحی او مانند نرف
الدم صفائی دماغ است

علامات و در قاعه قبل از بروز مرض چند روز بعضی علامات مقدمه از قبیل صلع و
دوار و کوفتی اعضا و تحمیل بران بروز کند و ابتدای مرض غلبه فعلی است و شدت
و ضعف علامات بسته است بقله و کثرت خون مترشح و اینجا که عروق مرضی نباشند
صلع و ثقل در سر عارض شده و این واضطراب اعزاء روی دماغ و سراسر بدن
و ضعف و تمدد در اطراف میسرند و این ضعف و تمدد باشد که در عضوی محدود و بلند
اعزاء شدت نموده فلج در حین حوکت بهم رسد و بتدریج مریض هلاک گردد و اینجا که مرض

مرض فعی بود علامات دفعه با علی درجه شدت بر و نر کند و باشد که بعد از چند خفتن از
بهرسد و دفعه شدت بایند و این دلیل بر آنست که مجدداً خون ترشح نموده است و عمدتاً
از علامت است که اغلب نوزاد دم مشیمه روی دهد و بعد از آن تشنجات است و هم چنین
فلج و در این مرض فلج خیلی پروکتر از آنکه در سکه دماغیست و نر کند و اینجا که در
خون محدود بود یکی از نیم کهای دماغ میشود که فلج در هر دو طرف بدن عارض گردد و
هرگز در یک نمیشود که محدود باشد فقط در یک عضو یا در نیمه صوت و اینجا که در پیش خون
در تحت مشیمه بود بواسطه سرایت نمودن خون مترشح در میان و طوبیت دماغ و
فلج روی نمیدهد مگر در وقتیکه در پیش خون بواسطه پاره شدن عرقی بود و مقدار
از خون دفعه خارج کرد و در سببات و اغما و در هر دو صورت عارض شود و لیکن اینجا که
در پیش خون در جوف مشیمه بود و در هر دو صورت عارض شود و لیکن اینجا که
بواسطه صورت شدن مشیمه و ای حاصل نمودن غشاء کاذب و طواف خون مغلفه و حال
آنکه در پیش خون در تحت مشیمه مرض هر چه کند با کسالت و خستگی و سرخی و حرارت
دوام و انتفا و طم این مرض بسیار مختلف است باشد که در چند دقیقه مرض از
دساند و اغلب و ام از چهار تا پنج روز است و باشد که تا پنج ماه حیات باقی ماند و بسیار
بندرت مرض شفا یابد و عموماً خطر مرض بسته بر پایدی خون مترشح و محل و است
نوزاد لدم تحت مشیمه هرگز از هشت روز نمیکند و حال آنکه نوزاد لدم جوف مشیمه باشد
که تا چند ماه دوام کند و هم این قسم اخوی قابل التفاس است بخلاف اولی و در اطفال
مرض بطور ازمان و در صورت اول همای متصل عارض شده و از ابتدا ای مرض همراهی
کند با تشنج در غیبت و بعد چون در پاها و دستها تمدد عارض شده منتهی شود و بعد
تشنجات و هر چه نوزاد بکتر عمر شود تشنجات بیشتر شود اگر چه حسن جلد قدری
شود و هر گز فلج عارض نگردد بخلاف بزرگان و اگر چه در قاعده مرض بسیار سریع است
ما عارض

ولی عرض مرض بواسطه مرض دیگر است که مرگ با و باشد بخصوص آن که در وگاه مرض منتهی شود
باز همان در این صورت علامات شبیه بام الصبیان است که ذکر خواهیم کرد
تشخیص
تشخیص این مرض بسیار مشکل است اینجا که دفعه عارض شود و همیشه
باشد و حال است تمیز دادن او را از سکه دماغی با کثرتی سهون شد و بعد بیان خواهد
نمود تشخیص او را از نرم شدن دماغ بهر جهت عرض تمدد از ابتدا و بقاعده کی علامات
مانند اشتداد و انتفاص اغما و فلج مایه تمیز دادن این مرض میشوند و از برای تمیز دادن
مرض کو با تقریباً محال باشد و نوزاد لدم مشیمه غما که منتهی شود از کثرتی سهون دماغی
میشود بواسطه وجع شدت که در محل اتصال فم و بافتار یا افتادن سر و جبهه شدت
غاید از حرکت کردن پست و کمزوری و این که تعبیری در قوت محسّاسه بهر سید و حال آنکه
فلج خفیف و شدید و حرکت بهر سید
تقدیر المعرفه بسیار خطرناک است و اغلب مصنفین او را شدید تر از سکه دماغی
میدانند ولی باشد که منتهی گردد بشفا بواسطه آنکه در یک شده است غشاء کاذب در جوف
ولی چون تاکنون غشاء کاذبی در فضا تحت مشیمه دیده نشده است میتوان گفت که این
نوع از مرض هیچ وقت منتهی بشفا نمیشود
اسباب و زیاد عارض شود در مجنونین خاصه در مجانبین مغلوب و بر و نر کند
جمیع اسنان و گویا یکی از اسباب است که سبب مرض اطفال در وقت وضع حمل میشود
و بیشتر در کودکان و در مردان و در فضل بهار و منیع کود و از کثرتی
دماغی که بکرات عارض گردد و بر و نر کند از منعی سرگردن خون و سردی مانند
آنکه از معصرهای ام الغلیظ یاد واج غائز مسدود گردد و باشد که عارض شود و در
سبب واضح
علاج این مرض مانند آنست که در سکه دماغی بیان میشود

عرق الدم

عرق الدم یا قیال الدم در کتب طباء مذکور است ملاخطات چند که گاه کاهی خون نشانه است
 بسطح جلد از همان مجاری که عرق منشرح میشود ولی نادر است که نشخون از جلیج جلد
 بود و اغلب جلد قوی بیک جزا است و اکثر بر و زرش در موضعی از جلد است که سفید
 و فائزک و اغلب پوشیده از عرق بود مانند سرانامل و زهر بغل و قانکشتان پا و
 اطراف انف و گاه در روی اثر جرح است قدیم
 علامات و رقباء بدن اینکه مقدمه و کد هلی بعضی قطرات خون در موضعی از جلد نشخ
 نماید که چون او را پان کنند هیچ تغییری در لون و نسیج الت مشاهد نکود و گاه موضع
 قرمز و متعجب و مویج گشته که پس از خون بر طرف کرد و دوام این مرض بسیار است
 که اغلب در چند ساعت رفع شود و مقدار خون نیز بسیار است مگر در وقتیکه
 هر جلد بود و هیچ وقت منتهی نمیکرد و ولی عود مرض بسیار است خواه در همان موضع
 خواه در موضع دیگر و چون اغلب و قات این مرض همراهی کند باسد طمث اغلب بر
 بطور نوبه مانند طمث است و تشخیص این مرض بسیار آسان است و چون بعضی
 ادویه که در موضع استعمال شوند میتوانند عرق را قرض رنگ نمایند باشد که این
 حالت مشتبه با این مرض گردد ولی باندک ملاخطه و وقت دفع این اشتباه شود
 نقده المعرفة خطری ندارد مگر آنکه نشخون در سطح زیاد از جلد بود یا آنکه بسته
 بسوء القیبه بود
 اسباب عارض شود اغلب در زنان جوان و همراهی کند باسد طمث و قلت او و اغلب و قات
 عارض شود از زیادتی خون و گاه از خوکات نفسانی چون غصب خوف شدید
 علاج چون مرضی است خفیف اغلب علاج موضع لا زم ندارد و بایاد دفع سبب
 کوشید اینجا که سبب غلبه دم باشد در حد قلت او بایند و چون بدل قلت طمث بود
 دفع او نماید و اینجا که از محركات نفسانی عارض شده باشد مسکنات و ادویه ضد
 نشخ

زرق الدم

تشخ بکار بر بند و چون سبب معنی بدست نیامد بهتر آن است که هیچ ملا و نکند اینجا
 که نشخون از جلد بحدک باشد که موثر ضعیف مریض کرد و اشتباه بار و کوی موضع اندک
 و فشار بکار بر بند
 زرق الدم التي اینجا که خون نشخ نماید در جرم آلات نامیدک میسوی سکنه کوچک قاتا
 این لفظ استعمال میکردند برای نمودن ابتدای هر مرضی که بر روی موثر هلاک میشود
 و بعد استعمال شد برای هر علت دماغی که ظهورش بواسطه فانی شدن حس و حرکت در
 یک یا در چند موضع دفعه بود و بعضی از مصنفین استعمال نمیکردند و او را مگر برای
 نمودن نشخون در جرم دماغ و ادوی این لفظ استعمال میشود برای نمودن نشخون
 بقتدر جرم هر التي که باشد و هیچ عضوی از بدن نیست که مبتلی با این مرض نکود
 ولی علقه بر و زرق دماغ و در پیه است و بعد جلد و غشاء الحیانی تحت جلد
 عضلات حیات حیوانی و شبیه و کبد و طحال و جرم و کلیه و قلب است بهر صورت
 در عضوی که چون نشخ کند لا بد الباف او را از یکدیگر و هر یک و طند و گاه آنها را
 پاره میکند و این رطوبت در حقیقت ملک شئی خارجی میگردد که موجب تغییرات تافت
 ان عضو میگردد و اغلب و قات خون مترشح میشود ریج جلد و پیشی با بعضی تغییرات
 التي یجر میسرساند که بعد از آن که خواهم نمود و ان محل اذالت که خون در اینجا نشخ
 و الباف او را متفرق یا پاره کرده بود محل بعضی اعمال برای رجعت بحالت طبیعی
 میکند که نیز مشهور حامله کوی رخ خواهند شد
 سکنه دماغ سکنه دماغی عبارتست از نشخ نمودن مقدارش از خون در جرم دماغ
 و فانی کردن دفعی یا بجز بابا الکل مشاعر حس و حرکت را در یک یا در چندین موضع
 بدن در حین حیات
 تاسیخ اگر چه طباء قدیم این مرض را شناخته و علامات و رقباء او را بخوبی ملک

کرده اند ولی چون از تشریح مرضی کاوی نداشتند طبیعت و اسباب و را نشناخته و با
بعضی امراضی دماغی او را مشتبه نموده اند و اول شناسائی این مرض بواسطه حرکات
طبیعی یا تبیست که موضع و علامات مخصوصه او را در حین حیات معین نمود
و بعد از او معاینه پیروی و اگر کرده و بطور شایسته علامات و تغییرات بدنی
در این مرض نگاشتند

تشریح مرضی وجود مقلاری از خون در جرم دماغ ضمیمه اولی است بوقت الذم
دماغی و جمیع جرم دماغ میک نخ مستعد نف الذم نیستند و اغلب محل نف الذم
جسم عظیم و فراش باصر است و بعد از اولن قطعه از نیم کرها است که واقع اند
ما فوق مرکز یعنی بوسان و طرفین دماغ کوچک و قطعه مقدم دماغ و هنگامیکه
حجم را بر دارند عموماً در ظاهر دماغ چیزی مشهود نکند و ولی اینجا که نشخون در
سطح دماغ بود ترزیدها و قشری کشته و از فشار با انگشت احساس نموجی کرد
و چون قطعات سالم دماغ را که قدری بخون میباشند دارند تا آنکه محل نشخون
مکشوف گردد تغییرات چند مشاهده شود که مختلف اند باختلاف مدت زمانیکه از
ابتداء مرض هنگام مرگ گذشته است و اینجا که مرگ در سه چهارم روز اول حاصل
باشد خون مترشح غلیظ و سیاه و نرم و مخلوط است با بعضی از قطعات دماغ که ترا
شک باشند و مقلاری خون مترشح از چهار کوم تا ع کوم است و باشد که تا ا کوم
بود و بعد از روز ششم تا هشتم حجم خون مغلطه کوشیده و قوامش زیاد گردد و این
سیاهش کمتر شد و رطوبتش مجذوب بانتر در جرم دماغ گردد و در روز نهم
خون مغلطه نسبی لینی هم رساند و قشری رنگ و با بکلی سفید شود و بلا واسطه از
اطراف ملصق بجرم دماغ گردد یا آنکه در میان مقلاری از رطوبت ترزید و نک
شناور شود بالاخره بعد از مدت زیادی که مختلف است از جهت اشتیاق
خون

خون مغلطه بکلی مفقود شود و هر چند در بعضی جوان تر و مقلاری خون مترشح کمتر بود و جدا
شدن او زود تر میباشند و احتمال کلی را نیست که جذب خون مترشح بواسطه رطوبت
بود برای آنکه عروق جذب بر دماغ بسیار کم میباشند و در سر پا و اوقات ^{مشق} دپله
که خون مغلطه لینی شده محاط است از طبقه خون سیاه مانند آنکه در سه چهارم روز
اول سکت مذکور شد و این دلیل بر آنست که نف الذم مکرر شده است که اولی از ^{حیثیت}
طول زمان توانسته است لینی شود و ثانی جز سه چهارم روز بیشتر طول نکشید ^{است}
و تغییرات چند نیز در موضع سکت بنظری آمد چون طولی در مرض بهم نرسید ^{شد}
مشاهده میکرد که اطراف محل نف الذم بدون قاعه یا مر شده است و پر خون میباشند
و چون در این ملاحظه موضع کنند بعضی قطعات مرثی کرد که در میان اب موج
و قشری و تنها از یک سمت بجرم دماغ متصل است و بزرگ محل نف الذم بسته بمقلاری
خون مترشح است و شکل او اغلب کوی است و باشد که اتصال بهم رساند ^{بکلی}
دماغ با غشاء لینی تحت مشیمه و اطراف این فضاء از ر و تا هفت میلی متری ^{مست}
خون و قشری رنگ و نرم میباشند و پس روز نهم این رنگ قشری بدل بزرد ^{گاه}
گشته و تا روز نهم این پیرنگی ر و زرد زرد شود و از ر و زرد نهم ^{غشاء}
کاذب قشری رنگ و نرم و صاحب عروق زیاد و در اطرافش هم رسد که بد ^{صفا}
غشاء صفا قریب آید کند مگر آنکه صفا مت و قوامش پیش را و میباشند و در میان ^{این}
کسره رطوبتی زرد رنگ مترشح گردد که خون مغلطه را نرم نموده و جذب شد ^{سخت}
کند و فضا ی این کسره بد برنج کم گشته و باشد که جدا رها نشیم ملصق گرداند
جراحی بوجوب آید و عموماً یافت نمیشود مگر یک محل از نف الذم و باشد که متعلق
بود که تا ع و هم تا ع شمرده است و تا در است که همه اینها بکمر تبه حاصل شده
باشند بلکه عروض آنها در ریجی است و از صفات هر یک از آنها میتوان طول

زها نشان از امعین نمود و گاهی اوقات مشاهده کرد که شرابین دماغ استخوانی شده
اند بخصوص عروقیکه در فاعك دماغ و در جسم مخطط و در فاش باصره میباشند
و از این تغییر از نازک زیاد شرابین دماغ چنان معلوم میشود که سبب این مرض بواسطه
پار شدن این عروق و طی تا کنون هیچ مدخل و ثقبه در عروق دماغ دیده نشده است
و یک نوع از سکت است که نامیک میشود سکت شکر یا سکت نشری که برونز منتهی
در ماده و مادی ترزید هیا در مرکز دماغ و شناخته میشود بواسطه نقاط متعده
سپاه در مجرم دماغ و چنان میباشد که در مابین ذرات دماغی قطرات بسپا
کوچک از خون غلیظ شده داخل شده است که مجرم دماغ شبیه میگرد و تبوت
فرنگی و نادر نیست که این نوع از مرض همراهی کند با سکت اصلی

علامات اغلب اوقات عرض مرض وضعی و بدون مقدمه است و در اثر
یک از مرضی قبل از عرض مرض بعضی علامات مقدمه عارض گردند مانند تقل
سرو صلاخ و دوار و وطنی و خواب زیاد و کم شدن مشاعر و حس و پیدا شدن حرکت
نملی در بدن که دلیل اند بر میل خون بدماغ علامات مخصوصه سکت دماغی اعتلا
بهم میسازد باعتبار محل نزول الدم و مقدار خون مترشح چنانچه هرگاه مقدار خون
فدا و سر بر نثار و در مرکز دماغ بود چون اشخاص بوق زده فوراً میفتند و مشا
و حرکت و حس و فانی گردد و تنفس بطی با سریع و قصبه شقی و گاه بر اثر واد را در غیر
اراده دفع شود و طی نادر است که در انصبورت هم حرکت خوری باشد و اغلب
اوقات تا یک روز و الا تا چند ساعت حیات باقی ماند و بعد از مرض بجهل اکت
رسد بدون خفگی در علامات پیدا شود و لی اغلب ابتدا یی مرض پنج مذکور نیست
که در بعضی بطور مذکور میفتند و حس و حرکت و مشاعر فانی گردد و تنفس بطی و نبض
عرض و بسپا بطور بهم میسازد و در اغلب مرضی جمیع اعضا از حس و حرکت میفتند

بلکه

بلکه فانی از یک سمت خواهد بود و اغلب قوه حساسه بکل فانی شقی و باشد که بحالت
محتی بود و فانی مشاعر و ام و زیاد بهم خواهد رساند که بعد از چند ساعت یا بعد از سه
روز قوه حساسه و مشاعر رجوع کنند و در بعضی از مرضی نقطه یک دوا و یی بهم میسازد
که اگر مرضی در حالت قیام باشد میفتند و چون بلند شوند کندی جمیع مشاعر باقی و یک سمت
بدن مفلوج خواهد ماند و باشد که فلج محدود بود و در اطراف عالیله بطور ساقه یا بطرف
صورت که هر احوالی کند با عسرت تکلم و باشد که چون مرضی در هنگام خواب مبتلی سکت دماغ
گردد هیچ پیدار نکشته و عبادتی که داشت بخوابد و چون بیدار شقی و نخواهد از تبیر سوزی
ایده مشاهده کند که از نصف بدن مفلوج است بجز صورت اثر ملامی سکت دماغ و فانی با
حرکت و اغلب اوقات نیز جرحی در یک جن بدن است که اعضا دیگر نمیشوند حرکت
کنند که اگر یکی از اطراف را بلند کرد به پیدار نرند مانند جسم بی جانی میفتند و عموماً فلج در
اطراف عالیله کامل تر از اطراف ساقه است و گوشه لب کشیده میشود بطرف سالم و این
کشیدگی گاه مشاهده نکرد و مکرر در وقت خند و حرکت دهان و طی کشیدگی گوشه لب
نسبتی باشد ترشح خون ندارد که در سکت های شدید باشد که هیچ حرکت ندارد و حال
در بعضی از سکت های ضعیف بسیار نمایان باشد و هم چنین است فلج زبان که در فلج
زبان چون الت را از دهان بیرون آورند نقطه او مایل شود به سمت مفلوج بدن
این برای آنست که چون عضله فك و زبان از طرف مفلوج نیز فلج بهم رساند لهذا زبان از
از دهان بیرون نمیتوان آورد مگر بواسطه حرکت عضله فك و زبان از طرف سالم
و این عضله که مقاومتی از طرف دیگر ندارد قاعك زبان را به سمت خود کشد و این نتیجه
نقطه او مایل به سمت دیگر گردد و فلج جفن و عضلات چشم بسیار نادر است و هم فلج
عضلات حلقوم که در انصبورت صوت فانی گردد و باشد که فلج سرایت کند به عضلات
حیات بنای از عرض عسر البلع و اغلب مفلوج شدن مستقیم و فانی که گاه بول

در مثانه جمع شود و گاه بدون اراده بول هر دو خارج شوند و فای قوه حساسه
 محدود است بعضو مغلیح که گاه حس عملی در عضو جمع رسد یا آنکه حس بکلی فانی شود و
 بند رفت دینک است که فای حس بیشتر فانی حرکت بوده است و فانی حس
 گاه بحدیست که اگر در هر دو عضو جمع رسد هیچ جمعی احساس نکند و دو سبب و قوتی
 باشد که تغییر میسر سازند که گاه با صبر بکلی فانی شود و غالب فانی و محدود و بیک جهت
 و این فانی با صبر در هر دو طرف فانی است با در طرف مقابل و هم چنین باشد که
 قوه شامه در یکی از طرفین تمام گردد و هم چنین است قوه سامعه و ذائقه که زبان از
 یک طرف نتواند ادراک طعم کند و علامات مذکور شدت و ضعفشان بسته است به
 و کثرت خون مترشح و بعضی از معالین می دانند که علامات اختلاف میسر سازند از حیثیت
 محل نزف الدم که در تشخیص کفکوی از او خواهد شد و علامات سکته در اطفال فانه
 متولد شده باشد که بطور مکرر بود و غالب رفقا و مریض را با بطی و بطور خفا
 که فلج یا نیست یا بسیار است و فقط مریض بجهت حرکت باشد و بعضی از آنها مضطرب
 و بی خی مبتلی به تشنجات کشته و اغلب بواسطه اغما و جهالت می رسند
 و قهراً هم و آنها گفتگو نمی نمایند از ان اقسام از عرض که فوراً یا بعد از چند ساعت فتنی
 بمرک میگردند و اینجا که رفتار مریض باین سرعت نباشد منتهی میشود یا تشنجات یا جهالت
 در صورت اول پس از آنکه مریض با علی درجه شدت رسید چه دفعه و چه مدت جرا
 در ابتدا مشا بجهت نموده و بعضی بحالت طبعی آمده و اشتی بجهت کند و اینجا که مقدار
 خون مترشح زیاد بود و تا چند هفته جز بهین علامات بهیچ وجه دیگر روی ندهد و بعد
 از چند هفته یا چند ماه قوه حساسه که ضعیف یا فانی شده بود بتدريج عود کند و
 مریض بد رستی تکلم نماید و اعوجاج صورت بتدريج دفع شود و بعد از اطراف سا
 بجهت حرکت آمد و بعد اطراف عالی و قبل از رجعت حرکت حس عملی در اطراف می رسد
 و اینجا

و اینجا که فالج کامل بوده است شفای کلی حاصل نمیشود مگر بعد از شش ماه و بنعمه بتدریج انجا
 جوان و گاه دینک شد است که با وجود رجعت حرکت گاه قوه حساسه مادام العمر فانی
 ولی اغلب خلا فاین مشاهده شود و چون سن از چهل گذشته باشد مریض هر چه عاقل
 خواهد ماند که حرکت کمی در اطراف سا فله می رسد لکن لکن خود کند و طرف
 عالی بکتر حرکت اید ساعد در حالت بهم قبض و انامل بکف دست بخوابد و هر از
 عضو می رسد و حرارت بلمس کو کرد و ولون او بنفیس شود و بالاخر بواسطه حرکت نکند
 مقاصد بیکدیگر ملتصق شوند و هم در این اشخاص مشاعر بطور لایق رجعت نکند
 که در اغلب ضعف در قوه حافظه می رسد و بعضی اوقات گذشته را بخاطر آورد
 و آنکه اشیاء تازه را همان ان فراموش کند و بعضی باشند که یک جزو را فراموش
 فراموش کنند مانند اسم یا فعل یا صفت و بعضی بحالت طفولیت رجعت عوده
 مد و بی جهت می گردند و مبتلی بخون مشا ح شده بواسطه سکته یا نرم شدن دماغ یا
 مریض بیک جهالت می رسند و رشو صاحب بران است که صد نفر مریض که بعد از آن سکته
 نرند مانند شصت نفر از آنها مبتلی بنرم شدن دماغ میگردند و در صورتی که در نیم
 بغیر اینجا که مریض و جهالت بود اغلب این اشخاص از نرمی و هشتم میگردند و
 آنکه شعوری می رسد و در بعضی مشاعر رجعت نماید ولی بفاصله که بحالت اغما
 افتد و فالج دوباره شداد کلا و در بعضی روی هم افتد و مریض بجهت تشنجات
 عسر و قسبر شود و در وقت خروج نفس و جنتین برآمده شوند و هوالبیابان است
 نموده خارج شود و نبض سریع و صغیر و بی قاعه گردد و صورتی برنگ و لب دندان
 سیاه شد و عمل بلع فانی شود و بول و براز بد و اراده دفع کردند و بالاخره مریض
 می رسد
 عرق مریض عود این مریض بسیار است که اول اشخاص بیکه از سکته اول و بعد از طول

نمیگشت که از سکنه دیگر بجا آید میسرند و اغلب سکنه ثانوی عارض شود قبل از آنکه
علامات عمده سکنه اول رو بر رفع شدن گذارد ولی بعضی از اوقات فاصله مابین
دو سکنه چند ماه یا چند سال است و این سکنه های ثانوی عارض گردند اغلب
در همان کوه و مرتفعی سکنه اول و باشد که برخلاف بود
ترکیبات سکنه دماغی مرکب شود با بعضی از امراض که اغلب فتیج از او گردند و
اظهار شدن اطراف محل خون متراشه است و از علامات مخصوصه او که اغلب
در هفته دویم صدای عارض گردد که محدود بود و تمدد و تشنج مویج در اطراف
بهرسد که متوالی گردند با فلج و نبض سریع و حتی عارض گشته و بنوعی در بعضی
اعضاء بجا آید و در بعضی رطوبتی در بطون دماغ یا در فضای مشیمه
گردد و مورت بر و از علامات فشار بود دماغ گردد و بند تر مرکب شود با ورم مشیمه
و از ترکیبات خارج دماغی اسهال و ذات الریه و جراحات در عروق و ترشحات
تشخیص در تشخیص این مرض سه ملاخظه باید نمود اول تشخیص محل و آثار
ترکیبات او با امراضی که این مرض مشتمله گردد در نرم شدن دماغ و مبلدم بدماغ
بواسطه رفتن فشار و دام مرض است که در مبلدم بدماغ علامات عمده
در چند دقیقه یا در چند ساعت بکلی بر طرف شوند و حال آنکه در سکنه
دوام مرض طویل و ستاینده است و تشخیص و از سکنه مشیمه مشکل
تر است آنجا که سکنه مشیمه بواسطه پاره شدن عرق بود که خون زیاد و
بیش نموده فشار بر دماغ دهد تشخیص محال است اگر چه اعتقاد بوده است
بر آن است که در این صورت هم ممکن است تشخیص این دو مرض باینکه در
سکنه مشیمه مورت تمدد اطراف گردد و حال آنکه در سکنه دماغی این علامات
بروز نکند مگر بعد از نرم شدن اطراف محل سکنه و آنجا که رفتار سکنه مشیمه

ندرجی

ندرجی بود که فلج و سایر علامات فشار دماغ که شدت کند اغلب غاء و
فلج بطور تدریجی پیدا گردد و در سکنه دماغی این
شدت و ضعف ملاخظه نگردد و بعضی اوقات باشد که سکنه عصبانی
بعین آنکه در بعضی بجا آید و در بواسطه بر و از جمیع علامات سکنه بد و آنکه هیچ
علتی از پیش خون و غیره مشاهده نگردد ولی این سکنه عصبانی بجا آید و در
که طبیب باید او را در ویر کند و از امراض خارجه دماغ که با سکنه مشتمله گردند
بیان میکنیم سکرو عشی و اختناق و پاره شدن ابوریمما که هر یک در بعضی
بیان خواهند شد و از برای تمیز دادن محل سکنه باید محل فالج را بنظر آورد که
محل سکنه در نیم کره مخالف طرف مغز است و این بواسطه تقاطع الباق عصبانی
است که آنجا آید که از طرف راست بطرف چپ دماغ میروند و بر عکس اگر چه
بعضی بگویند که میتوان محل نزف الدم را که در حقیقه نقطه از نیم کره است فهمید ولی
تقریباً این نوع تشخیص محال است و گفته اند که چون محل نزف الدم در دماغ گردد
بود نزف اب سپاه و اغشاء عارض گشته و قوه حساسه بر طرف شود ولی
حرکت باقی ماند و در مردان ان غوطه بهر سید و حرکت بد و ن اراده و غیره منتظم باشد
و آنجا که نزف الدم در طرف راست دماغ باشد و همراهی کند با نزف الدم در
دماغ کوچک از طرف چپ فالج عارض گردد و در طرف چپ بدن یعنی در سمت
نزف الدم دماغی و بالعکس چون ریش خون در سطحه وسطی دماغ کوچک باشد
فلج در عموم بدن عارض گردد و بنوعی مرض را بجا آید و این بواسطه
فشار بر بصل نخاع است و آنجا که محل نزف الدم در سمتی دماغ بود فلج عام و
عارض گردد که متعاقب شود مرض تشخیص صریح و در بدین احوال و متعاقب گردد و در
اگر نزف الدم در یک طرف برآمد که حلقه بود فلج هم در یک طرف بدن خواهد بود

فقد المعرفه مرضی است بخطر که ثلث از مریض در سکنه اول بجلالت می رسند و
 آنها بیکه در سکنه اول اول نمردند اغلب عاجز مانند ما آنکه بجلد دیگر بواسطه نرم
 دماغ هلاک شوند و خطر مریض بیشتر شود هر چند جمله مکرر کردند و تقدیر
 مختلف شود باختلاف علامات و ترکیبات و سن و مزاج مریض چنانچه اغناء زیاد و حر
 اطراف و تنفس قهیر و عسر البلع و تغیر سیمای و سرعت نبض و حمی لیل بمرک اند
 چنین است چون فنای مشاعر از سه الی چهار روز تجاوز نکند و سرعت نبض در
 جلد لیل اند برای آنکه مریض مرکب گشته است با نوم شدن اطراف موضع سکنه و هم
 کنند با تمدد اطراف و منتفی شوند بمرک و هر چه سن بیشتر باشد خطر مریض بیشتر گردد و
 هم چنین خطر مریض زیاد است در اشخاص موی خراج و پر خون

اسباب عارض شود در جمیع انسان بخصوص از بچاه تا سکنه سالکی و اغلب غرض
 در مردان است و اگر چه در جمیع ارجه بروز نماید ولی اغلب ملطفه شود و اشخاص
 فربه و پر خون که صاحب بزرگ و کوبه و صوت قریز باشند و از اسباب مستعد
 هنگام هضم غذا و پیوست طبع و بزرگ شدن و هلبز السیر قلب اغلب عرق غش هنگام
 نوم حاضر نوم شب است و باشد که موروثی بود و هم چنین است فکر زیاد کردن و
 نفسانی و اغلب عارض شود در زمره مسنان و بجا رود در هنگام تغیر هوا و نیز هم چنین است
 اکل اغذیه مغویه و محرکات و اشربه مسکوه و لباس تنگ که فشار بر کلو و هدا و اغلب عارض
 شود بد و سببی واضح ولی باشد که حاصل شود از محرکات نفسانی و بکار بردن قوت
 زیاد و هنگام جماع و از افتاد به تغیر هوا و استیقام در بار زیاد کوم و سر و سر شدن
 الدم طبیعی

علاج در سکنه باید دفع زیادی خون نمود بجهت کرد و در خلیل خون من
 و از برای اشاره اول فصد عام و مکرر کنند موافق قوه مریض و سن مزاج او و حالت
 نبض

نبض و فصد از باز و بجهت است از سائر او مریض هم از بیدن شریان شقیفه و بجهت است که
 فصد عام هر اهری کند با فصد موضعی از سائر علق و بکردن و بر اطراف تراشه حمله و بجهت
 اثر قهیر و و پشت کردن و هر چنین است که کردن خون از مخاطه بینی بواسطه شرط
 و از سائر علق و انجا که میل خون بدماغ زیاد بود بجهت است که زلو بر اطراف تراشه
 اندازند ولی خون را بطور اتصال تا چند ساعت و هم تا یک روز خارج کنند از اند
 زلو مند تر جایی آنکه در سائر اندام عدلی از زلو پندند و چون یکی از آنها بیفتد یکی
 دیگر بجای او بیندازند و بعضی زلو را بجای د و سائر دماغ مانند قوزک پا و مقعد
 اندازند و مادی بجای در این بنیسم مکرر و قهیر که سبب سکنه سد نفوذ الدم عادی
 بود مانند بواسیر و طمست که بخواهم او را د و دفعه عود دهم و بندت اشخاصی
 مریضند که کردن خون در آنها مضر خواهد بود مانند انجا نیکه سکنه بسیدار شد و باید
 که اطراف بی حس و حرکت شوند و نبض غیر منتظم و صغیر گردد و جلد سرد شود و این
 صورت باید تحریک حس غود بواسطه ذلك براستعمال محرکات مانند صمغ صندل و
 شمع و زرا و مخ و نوشاددن اشربه معطره و چون باین نوع جلد گرم گردد و نبض قوی
 گردد انوقت شروع کنند باخراج دم که در سائر خون کو خارج کنند و بعد از آن
 باشد زیاد اخراج نمایند و بعضی اوقات اگر چه نبض چندان ضعیف نیست لی
 بدایت باخراج خون نمکنند و این صورت بر طیب لزم است که فصد لیلی کنند
 یعنی آنکه قدری خون کم کنند و از آنرا بداند و انوقت هر طور که مصلحت بداند
 و قنار نمایند و بعد از اخراج دم مصرفات جلدیه و مخاطیه باید بکار برد مانند صمغ
 خردل باطراف و استعمال حمامات زو و مسهلات برفق و حقن و بعضی
 دارند که مسهلات قوی استعمال نمایند و بعضی مقی می دهند و اغلب بجهت خف
 و معلوم است که مریض را بر پهن کامل باید داد و اشربه مبره نوشاند و انام کلا

و اسباب تحريك اذا اود و رنود و هوای منزل سر باشد و سر مرض برهنه با کوفت
 باشد و بروی بالش که غیر پر بود مگه دهد و چون حالت مرض برهنه و بهر جهت که در
 و در هفت هشت روز اول نباید او را از پهنه پیون او رنود که توکیات دعا
 در این وقت عارض شوند و چون علامات تورم و نرم شدن دماغ برور کنند و
 باره برگردند با خراج دم و استعمال مصرفات جلدی و مسهلان بر فوق و حقن
 از قبیل مشمع در ارجح و اطراف مادر پشت کردن و داغ باز و خوش تپیدن
 از روغن چوبه در روی سر و شقیقه و خود اندن کلل بمقدار منقسمه تا سبلا
 براق حاصل شود و چون مرض همراهی با سحر و اضطراب قدیمی توان دهند و
 هنگام نقاهت لازم است دو سر کردن جمیع اسباب که مورث حمله و بگرفتار
 شد و حفظ صحت بطور است که در مبل دم بدماغ بیان نمودیم و از برای فلج که
 منجم میگردد در سکنه آنچه تاکنون مستعمل شده است با ش و اغلب مضرات
 که از استعمال کردن مشمع در ارجح مدای با پرنک و الکتر بسته و اسرکتین و اسر
 اذا في هيج بمره بود نمیشود بخشی اذال که بسیار مضرات است
 و فذلک خانی مرضی است بسیار فاد که کنون زیاده از شش یا هفت با و ملاحظه
 نکته است
 تشریح مرضی ملاحظه گردد که یا چند روز پیش خون در مری کت نخاع پیون و مایه
 و باشد که جرم نخاع را پاره کرده و مریاب کند و مراغشته نخاع یا در جوف عمل نخاع
 و باشد که محدوده بود در یکی از طرفین نخاع و یا اغلب کل نخاع مبتلی شوند و چون
 نخاع در اطراف سکنه نرم گردد و کل آن تغییر اینکه در سکنه دماغی مذکور شدند در
 اینجا نیز ملاحظه کردند
 علامات اغلب بتدای مرض دفعه و بد و مقدّمه است و گاه ابتداء غما بد

روز

بروز و جمیع در یکی از نقاط فشار و احساس حرکت نمایی و ضعف در اطراف و چون
 خون مترشح گردد و فلج در مایه و آن نقطه بهم رسد چنانچه اگر ز پیش خون در سر
 عجز بود فلج در اطراف ساهله و مثانه و مستقیم بهم رسد و چون در محل عشی بود
 عالییه مفلوج گردد و عضلات صدر را حرکت قناده و فضای صدر منبسط
 نکند و مکرر از حرکت حجاب حاجز و با وجود بروز این علامات خللی در مشاعر بهم نشد
 و آنچه که ز پیش خون در سکنه اعلی عنق بود که عصب حجاب حاجز نیز معلوم گردد و
 فانی شدن نبض و صاف نگشتن خون مری خواهد بود چون ز پیش خون نخاع
 آید که فانی نخاع بود فلج هم در یک سمت از بدن بروز کند و باشد که محدوده یک
 عضو بود و یا این فلج همیشه در همان سمت معلول و چون دوا می در مرض بهم رسد
 فلج سرایت کند بطرف دیگر
 دوام و تکرار و فساد در مرض بسیار است که اغلب از مرض مرچند و نیز بواسطه
 فزای نبض جهلاکت سرسند و بعضی از نخاع شدن و عانغرا با کوفتن عجز و تدریجند
 بمرند و فقط گرد و بلبله و مرکبات تشریح مرض خود بیان کرده مرضی را که شفا یافت
 تشخیص بعد از این بیان خواهیم نمود که چگونه تشخیص میدهد این مرض را از
 نرم شدن نخاع و بواسطه عرض فلج در این مرض مرچند مرضی یعنی که در طرفین
 عارض گردد و یا از مایه و موضوع معلول و بجا ماندن مشاعر غیر میده سکنه
 نخاع از سکنه دماغی چنانچه مذکور گشت در سکنه دماغی مشاعر فانی گردند و
 فلج اغلب اوقات در یک سمت از بدن بروز کند و چون عرض فلج در این مرض را از
 یک سمت بدن بود اشکالی در تشخیص بهم رسد و یا چون ملاحظه کنیم که این فلج
 در صورت و زبان مفقود و مشاعر عجز و هیچ علامتی که دلیل بر مبل خون بد
 بود بروز نداشتند البته موضع علت نخاع خواهد بود

فقدیمه المعرفه بسیار بر خطر است تاکنون ناشناس مانده
 علاج مانند است که در سکنه دماغی مذکور شد بخصوص در مع حجاب
 زیاد بر روی قفار بواسطه سته ضرر و نه منع کنند عرض جراحات و عانغ اباد
 که در این مرض بزودی در روی عجز و غیره بروز میکنند
 سکنه ریه عبارت است از ریختن خون و قوه در جرم ریه مانند آنکه در سکنه
 دماغی است و بعضی این مرض را منبأ من نف اللدم ریه
 تاسیح مرضی است که تا زمان لا ینک شناخته نشده است و این معانی بزرگ
 اول کسی است که او را نکاشت و معاصرین اگر چه مثال زیاد از این مرض دیده
 نگاشته اند ولی چیزی بر پادانات لا ینک بیفزودند
 تشریح مرضی جرم الت در موضع معول سیاه تیر کرد که چون الت را شرط
 کنند بافته ریه شناخته نشود و فقط شعب قصبه و عروق بزرگ که بافته
 آنها نیز سیاه شده است از میان این ماده عبور میکنند و موضع شرط مانند آنکه
 در کبدی شدن قرمز ریه مذکور شد ناهوار و دانه دار است و از این معلوم
 میگردد که نشخون نه همان در غشاء الحما نیست بلکه بجوف جابجا میخیزد و
 آنها را فسط نموده است و چون باد و انکشت فشار برالت دهند خون سیاه
 که قدری غلیظ شده باشد خارج گردد و با بواسطه بعضی دفعه این بران
 شدند که نشخون از او مرده است ولی امری که میباید دانست که چون خون
 شرابی از حرکت پیفتد طول نمیکشد که خواص خون و ریه را بهم میسراند
 باشد که خون مترشحه از هر دو نوع عرق بود و سکنه ریه نادر است که جمیع یا
 سطح زیادی از یک قطعه ریه را فرا گیرد بلکه اغلب و انهای کوچک است که بحجم
 یک فندق تا یک تخم مرغ و بعد و مختلف از یک تاسی در سطح ریه متفرق بود

وخل

وخل آنها اغلب نزدیک سطح ریه و در قطعه اسفل است و باشد که در هر دو
 یک مرتبه بروز کنند و باشد که چون مرگ در اوایل مرض عارض شود حد و خون
 در سینه معلوم نگردد که یکبار از او غلیظ باشد و حال آنکه جز در یکش رقیق بود
 و باشد که جرم ریه را پاره کند و سرایت بغشاء جنب نموده و مقدار وی از خون
 مترشحه داخل جوف او گردد و اگر چه تغیراتی که در سکنه ریه در خون مترشحه
 در جرم ریه در وقت تحلیل رفتن خون بهم میرسد در سینه فهمیده نشد
 ولی میتوان گفت که لون سیاه تبدیل بقرمز گشته و بند ریختن رنگ گشته و
 مجاز و ب شود و جرم ریه بحالت طبیعی معاودت کند و هم مشاهد گشته است
 غشاء کاذب ضخیمی که محدوده بود خون مترشحه را مثل کپسره سکنه دماغی و بعضی
 گفته اند که ممکن است خون مترشحه نرم شده و سرخی شود و بواسطه سعادت
 خارج گشته و محل و التیام یابد و هم ملاحظه شده است بعضی قطعات غایب
 شده و بعضی برانند که اثر جراحی که گاه در نقطه ریه مشاهده میگردد در این مرض
 بوده است و هم چنین است وجود سرطان سیاه شک و این دو اعتقاد
 آنکه در صحبت سل و سرطان مذکور خواهد شد چندان اعتباری ندارد
 علامات رفقا و انجا علامات این مرض بسیار مختلف است باشد که مرض بکلی مخفی
 که چون بواسطه مرضی خارج از ریه شخص بملاکت و سد درالت یک یا چند
 مرتبه نشخون مشاهده گردد که در چنین حساب هیچ علامتی از حصول و بروز آن
 پیدا نشده بود ولی انجا که مقدار خون مترشحه قدری زیاد بود احساس خفگی
 و عسر النفس و وجع در صدر نموده و سرفه و گدازد و خون خارج شود بواسطه
 قذف و لا ینک صاحب بران بود است که یکی از علامات مدا می و بر خطر این مرض
 نفث اللدم است که بقواصل چند و بمقدار زیاد خارج شود که هر اهی کند

با سرفه و خفگی و اضطراب کاه مقدار خون مخرج به مجدی است که گویا سرفه
 او را می کند که دفعه از دهان و مخرج بی خارج گردد و این نفث الدم شدید
 عارض نکند و مکرر و قبیله ریه در وسعت زیاد می افتد و در این صورت
 پس از آنکه خون زیاد می شود در ریه بجلالت رسد و با برون علامت اختلا
 و در مدت بسیار قبل و در این ریه برون نفث الدم مجدی نیست که
 لانک بیان نموده است و مشاهده نمیشود مگر در پنج بکره و اغلب مقدار خون
 بسیار کم است اگر چه اختلال ریه زیاد بود و لون خون مخرج سپاه تر است و خللا
 نرف الدم اصلی و عرضی که خون مخرج قرمز می باشد و مقدار کمتر شعله در ۲۴ ساعت
 از دو لی پیست متعال است که دو تا چند هفته دوام کند و بعد مسدود شود و اینجا
 مقدار خون مخرج کمتر شود و متفرق در ریه بین و در عمق الت بود از سمع و قرع چیز فیهو
 نکرد و در این ریه در وسعت زیاد می افتد و در این ریه سانس که حجم خون مغلظه اقل
 شش تانه سانس می باشد بواسطه قرع صورت کدر و از سمع معلوم کرد فنای
 اصوات ریه و باشد که در هنگام اخراج نفس صوت دم در نکوفتی در الهای موی
 در جمیع سطح محل کدر شده مسموع گردد و این علامت است که در مخرجی مجدی
 و چون مرض خفیف بود عارض نکند و علامت عمومی بسته بمقدار خون
 مخرج است اینجا که مقل را و زیاد بود جمیع علاماتی که در نرف الدم شدید مذکور
 شد و ریه می نماید و شخص بجلالت میرسد کاه بغشی و کاه باختناق و چون وقتاً
 مرض رویش نماید مقدار خون مخرج هر روز کمتر گردد تا آنکه بکلی مسدود گردد
 و کاه بعد از دو و نر ششم الی هشتم قد فچر کین شد و عارض شد و جمیع علامت ف
 الیه در ریه اول باد و هم و ریه نماید و محل این ذات الیه کاه در همان سانس است
 و کاه در اطراف او ذات الجنب یکی از توکیات نادرا این مرض است و چون این
 عارض

عارض نکند و مکرر بعد از زیاد شدن ریه لهذا عارضی کند با هیدر و منرا کس و چون خون
 مغلظه نرم گردد و معبر شجیب قصبه می رسد مسموع گردد و صوت جوش و سا بر علامت
 حفره ریه و چون اطراف خون مغلظه غانغرا با کبر و جمیع علامت مخصوصه با این مرض روی
 تشبیه تمیز این مرض مشکل بل محال است در صورتیکه در انهای سکنه کوچک و متفرق
 بودند و عارضی نکند مگر با اختناق و سرفه و قد ف خونین و لی چون قد ف خونین چند
 روزی دوام می رسد و عارضی نماید در سر یک موضع محدد و از صدرا با کد و تر قرع و سمع
 و الی موی که بل خواهد بود وجود سکنه و چون در مدت نفث الدمی و جمیع در یک
 محل از جنب می رسد و عارضی با کد و تر قرع و فانی اصوات ریه و برون علامت نرف
 الدم شدید و دلیل است بر پاره شدن ریه و ریه پیش خون در غشاء جنب و در صورتیکه
 کد و تر قرع در قاعه ریه عارضی کند با قرع طبعی در نقطه اول دلیل بر آن است که اتصال
 از شعبه قصبه با محل سکنه و جوف جنب می رسد است که هوا هم از شعبه خارج شده و
 داخل جنب گشته و در مافوق و طوبت جای گرفته است و تمیز این مرض از ذات الیه
 بواسطه این است که در ذات الیه ریه عارضی گردد و قد ف حالی مخصوصه از دو مسموع
 گردد و صوت ریه های که بی بطانت ضعیف و خشک و ذات الجنب تشبیه و می شود
 از اینکه در ذات الجنب جمع شدید و علامت سمع و قرع می توانند از تشبیه وضع
 در ریه جای کردند و عارضی کند با صوت اکوفنی و قد ف خون الی نیست بخلالت
 تقدیر المعرفه مرضی است بخطر مخصوص چون مقدار خون مخرج زیاد بود و
 محل سکنه اتصالی جنب می رسد
 اسباب عارض شود از کثرت خون و اثر سر ما و سد نرف الدم عادی و لی
 اغلب عارضی گردد و بواسطه منع گردش خون که محل آن منع در قلب هم عارضی گردد و بواسطه
 بعضی امراض عمومی که مورث نرف الدم شوند مانند پورپورا و حمی اصفر

علاج برای دفع این مرض مستعمل است معالجاتی که در نفث الشدید بیان شد بخصوص قصد و مصرفات مانند مسهلات قوی و حجامت بدون شرط و در وی سینه و کوفه اطراف سافله و انداختن خماد خود بر مفاصل و بنفشیدن مدتی بخصوص شوز و چون بعد از وی مذکور رفع نکند و متقی دهند خاصه اپیکاکوانا^۱ منقسمه و در اطفال جدید الوکلات یک پاد و زلوز^۲ بویغل اندازند و در فطاط و را

مخت پیچند
بعضی از سکه^۳ الی بعلاوه این دو قسم سکه جوی که علامات مخصوص دارند و اغلب عارض میگردند بعضی از سکههای جوی هستند که عرویشان نادر و در حین حیات تشخیص آنها قریب بحال است و در جمله احشاء بطنی که مبتلی با این مرض میگردند کبد و طحال و غده لوز المعده و رحم است و هم چنین سکه عارض شود و خصم که اغلب دانههای زبانی از سکه در او بهم میرسد و خون قشری همان تغییراتی که در سکه و ماغی بیان شد بهم میرساند و سکه خصم اغلب سبب سقط جنین میگردد و آنجا که جنین ساقط نشود ضعیف و لاغر میگردد و از لای که مبتلی میگردند عضلات اند که گاهی از اوقات بدون سبب واضحی مقدار زیادی از خون در جرم اجزاء^۴ کند و هم چنین مشاهده میگردد و زایش خون در جرم قلب مخصوص در هله^۵ این که حجم شده باشد

پور پور عبارت است از بروز لکههای حصیه کوچک با بزرگ شدن بستگی بعلت دیگر در جلد که اغلب همراهی کند با نفوذ الدم و با پیچیده منقسم شده است پور پور برای ساده و پور پور برای نوزاد الدم پور پور برای ساده اغلب بروز در شبان و اطفال است که بعد از بروز کسالت وضعف اغلب لکههای قرمز که در سطح جلد بروز کند که عموماً مابعد و روت^۶ شیشه^۷ نکرید^۸

بگردد که یک که از فشار با انگشت فانی نکند و این لکههای کوچک همراهی کنند با بزرگ لکههای بزرگتری که گاه از هم جدا باشند و گاه درهم و آنجا که عرویشان لکهها^۹ و پیچیده مشاهده گردد الوان مختلف بحیثیت سبقت آنها و اغلب بر و ز این لکهها در سینه^{۱۰} و باشد که هم در اطراف و هم در صورت بروز نکند و هم از این لکهها مشاهده کرد و در ملتحمه و جفن و گاه این لکهها بر آمد و وسطشان بکنوع صلابتی^{۱۱} جرم سیاه و این بواسطه حصول سکه است در جرم جلد و باشد که خون مفرجه^{۱۲} نشتر نماید بعضی^{۱۳} لکههای تحت جلد و عضلات و اغلب بر و ز این لکهها بدین عارض شدن و جمع^{۱۴} شلست^{۱۵} در جلد که مرض بحسب اتفاق آنها و ملا خطه کند و از سر و ز چهار دم این لکهها بدین ریج تحلیل رفته و اشیای نرا آنها باقی بماند ولی آنجا که در پیش خون تدیجی بود مشاهده کرد که از چند هفته یا چند سال مرض دوام بهم رساند

پور پور^{۱۶} پس از آنکه مدت سه الی شش روز بعضی قشر برها و کوفتی و سید و می و تهوع و گاه در عارض شود که لکههای پتیش و اکموف مانند آنکه در نوزاد مذکور شد بروز نکند ولی طول نمیکشد که یک استعداد نوزاد^{۱۷} الدم و مرضی بهم رسد که بعضی از لکهها در جلد پدید آید بواسطه زایش خون در جرم او و با که نمون از سطح جلد جاری گردد بخصوص در پشت کوشها و هر جا بیک جلد اندک کشید با فتره شود لکه سیاه بزرگ در موضع نمودار شود و از سطح رچی^{۱۸} اندک تقریفاً اتصالی که در جلد و در مخاط بهم رسد خون سیلان نماید و بعلاوه همراهی کند با بعضی نوزاد^{۱۹} الدمهای پر خطر که در اطفال رعا^{۲۰} و در شبان نوزاد^{۲۱} الدم و اسهال الدم و در زنان نوزاد^{۲۲} الدم و می عارض گردد و اگر چه عرویشان بول^{۲۳} الدم نادر است اما کمترین اغلب بر خون میباشد و بزرگ که اغلب این مرض مبتلی میباشد با در ریا^{۲۴} البیض و این نوزاد^{۲۵} لکهها باشد که با هم عارض^{۲۶} شد

باصوالی هم شوند و اینجا که زپوش خون در آلات تغذیه بود خون از آلات جوفی درها
نشر نموده و اطراف او سیاه و لته و خونی و خون الی که در و چون مرض هرگز اندک با این
علامت خطوناك مضطرب گشته و کمی شدت نموده و هذبان عارض شده و
که باید خون از اینجا برپوش کند و موج گشته و زبان خشک و سیاه و بسیار متغیر و قوی
فاز شده و در بعضی بھلاکت رسد با برون جمیع علامات پیغمبرند و گاه در بعضی بھلا
رسد بدین عرض می بواست حصول ضعف از تکرار نزف لدم و باشد که فقط
در چند روز از شدت علامات و با بواست مرکب شدن مرض در بعضی بھلا
رسد و هم باشد که انتهای مرض بشفا بود و در این صورت مدت نقاهت طویل خواهد
تخصیص عموما سهل است و نمیتوان او را مشتبه نمود با لکهای که عرض
شان بواسطه ضربه بود و اینجا که پورپوری براید و نمی بود باید حالت شرابان و
و رید از موضع و در دست فهمید زیرا که اغلب چون عرق موضعی مسدود
گردد این لکها در موضع بھرسد و لکهای جلدی که هر اهی کند با نزف لدم باشد
که مشتبه نمایند پورپوری را با حمی اصفر و امراض طاعونی و بعضی از اقسام جدی
در این امراض نزف لدم نیست مگر یکی از اتفاقات و حال آنکه در پورپوری لکها
و مشتاق این است و بعضی از فعلین خواستند که مابین پورپوری و اسکریو
فرق دهند ولی چون ایند و مرض در حقیقت از یکبند است و ولی بدینجا مختلف
میباشند تمیز مابین آنها چندین خواصی دارند

تقدم المعرفة پورپوری برای ساده اغلب جید است و پورپوری لکهای بزرگ و خط
بیشتر از لکهای کوچک است و پورپوری نزف لدمی مرضی است خطی و سق
طوقی و سرعت نبض و کثرت نزف لدم و کمی شدت بدین خط و مرضی است
و هم چنین است چون برون ریختنی و الی و در هنگام یکی از امراض خطی

مانند

مانند حیات ثنوری و پیغمبر بود

اسباب عارض کرد بواسطه اسباب مضغه بدن مخصوصا در الحفان
زنان و اگر چه این مرض مکانی میباشد ولی گاه برونش بطور و بانی است
علامت مستعمل است بموضات معدنی و مقویات و املاح این وادیه تلخ و
که کمی شدت و نبض غمتی و صلب بود و علامات قبل دم بینی از احشاء برون کنند
فصل لازم شود و باید بسیار کم خارج نمود و هجا که با وجود علامات غلبه دم
نزف لدمی رودی هد باید اخراج خون را بدل با استعمال مسهل کن و از برای سبب
نزف لدم استعمال کنند آنچه را که در هر نزف لدم پیغمبرند که گور شد و از برای
لکهای سیاه دوائی لازم نیست مگر آنکه در اشتخاص بسیار ضعیف دلاک پایی
و غسل با ادویه که نمایند مانند عرق و غیره

اسکریو عبارت است از مرضی که هر اهی کند با ضعف زیاد و در خارج و
نزف لدهای مختلف و قیج نوم لته و زپوش خون از این دندان

تشریح مرضی اشتقاقی که بواسطه اسکریو بھلاکت رسد علامات و
در بعضی از احشاء هویدا شود ولی باید دانست که ان او را م بسته بخود مرض
نیست و از اختلالات ثانوی که برونشان در ایام قریب بمرک است ولی خود
همیشه در این مرض متغیر است که سیاه و رقیق و نشر در تجا و یف و جرم آ
کند مخصوص مرکب و طحال که حجم و جرمشان نرم گردد و هم چنین نشکند
در میان ماده متخلخل عظام و ضربع باین جهت در اشتقاقی که سن آنها از نوز
سال کمتر بود اس عظام طویل از اندام آنها جدا گردد و هم چنین غضایف
اصلاع از خود اصلاع جدا شوند و هم چنین است کالها که در عظام
شکسته شده بسته میشوند که بواسطه نشر خون حال گشته و عظام از یکدیگر

جدا شوند و نیز بدک میشود که خون در جرم عضلات نشر کند کرده و اینها صلب
 بزرگ یا کوچکی حاصل میباید و این تغیر خون در حالت حیوانیه حاصلست که عدد
 فیروز از سه کم شود یا یک و ربع و هم چنین عدد کلبول از ۲۳ اگر شود ماه ۱۶ رسد
 علامات قبل از عرض مرض لون مرض باخته شد اجتناب کلی از
 حرکت نماید و طولی نکشد که اندک حرکتی سبب خستگی زیاد و تواتر نفس شق
 و بعد از چند روزی چند هفته حکم در لثه بمرسد و متعیر و نرم و کثرت
 گردد و نفس منعقد شود و بوی لکهای سپاه یا زرد در سر بعضی از مواضع جلد
 بروز کند و در معبر عضلات بعضی از مواضع با ممتوح ظاهر شود از جهت
 نشر خون در جرم ان عضلات و همراهی کند با وجع شدید و هم احساس و جمع
 در جرم عظام و در مفاصل که همراهی کند با بولمدکی آنها و در همین وقت بروز کند
 نوزالدهای مختلف چه از اغشیه محاطی و چه جلد بواسطه جراحات ناز یا قد
 و با حرق اثر جراحت و در هنگام ضعف زیاد عارض گشته و نفس تنگ و احساس
 وجع در صدر شود و نبض سریع و ضعیف گردد و غشیهای مکرر عارض گردد خصوص
 در هنگام حرکت و اغلب از مرضی مبتلی گردد با سهالی منعقد و خونی الود و بوی
 اطراف متعیر گشته و لثه ساقه و دندانها بپوشند و متحرک شد و زایل گردد و بماند
 که عظام فکین متعیر شوند و در اینصورت نوزاد شد بر ضعف مرضی بفرزند
 و اغلب چون این اشخاص حرکت دهند صلا ی اصلطکالی از بدن شان مسموع گردد
 و این بواسطه جلد ملنک راس عظام است از اندام آنها و هم چنین این صلا ی اصلطکا
 مسموع گردد و در وقت تنفس بواسطه اصلطکال اضلاع بغضاض و فشان و ممکن است که
 باندن قوتی یک عضله و پاوه کنند یا اینکه غلظی داشته باشند و بیاید دانسته که همیشه
 اینموضع جمیع علامات ملنک و ناز که گاه تغیری در لثه بهم نمیرسد بلکه

مرضی

مرض محدود میشود و بهیچ زبادی در یک یا در دو طرف سافل و این تجمیع که بسیار
 و مویع است بدون آنکه تغیری در لون جلد بهم رسد بزودت بواسطه نشر خون
 در قاعه و دام و قاعه اسکر بوت همیشه بیک تجمیع نیست که گاه حالت مرضی بهتر
 و گاه بدتر شود و این بدی و خوبی اغلب به قوی و خشکی هواست که در هر وقت
 مرطوب حالت بد شود و بالعکس و بعد از مدت زیادی مرضی شفا حاصل
 با بقی و حصول مرک بواسطه اشتداد تنگی نفس و با عروض غشی باضعف راس
 و هم باشد که هلاکت مرضی بواسطه مرضی دیگری بود که ترکیب با اسکر بوت شد
 باضعف از او کشته باشد مانند حیات ثوری و در وسطا و یا و قفوس و چون
 مرضی شفا حاصل کند هنگام نقاهت طویل و اغلب تمدد با وجع در بعضی از مفاصل
 باقی ماند

تغییر

بسیار آسان است و نمیتوان متنبه بانمی نمود زیرا که در این
 نوزالدها نیست و تغیری در لثه بهم نمیرسد و همراهی کند با صدای دم در شرانین
 و اوجاع عصبانی و اختلال در عمل هضم و اغلب اینمرض میتواند با سوسه
 زبانی علامات عمده مانند تجمیع و نرم شدن و خون املک از لثه و بزرگ شدن جلد
 و تنگ گشتن نفس عروض لکهای سپاه در جلد و عروض نوزالدهای سوسه
 بشدت اسکر بوت نیستند و بعلا و سوء القبه زبانی همراهی کند با ورم مخصوص
 در دهان و ذکر نمودیم که محال است تمیز دادن پورپورا از اسکر بوت زیرا که علامت
 علامات از قبیل لکهای سپاه در جلد و نوزالدها و برپوش خون در جرم الت
 در هر دو مرض بیک تجمیع میباشند

تقدیر المعرفه مرضی است بسیار خطرناک بخصوص چون نتوان دفع اسباب
 او را نمود و خطر مرض بیشتر میکند از آنکه در وقت نوزالدها و کثرت ضعف مرضی حصول

اسباب اسکر بوت در ماه گذشته در شهر پارس و لندن زیاد دیده میشود
و الحال بواسطه ترقی تربیت و خوش غذائی و خوب منزل فقر دفع این مرض از این
بلد بکلی شده و از اسباب این مرض است سردی هوا و قوی هوا و هم بواسطه طوبیت
هواست که این مرض زیاد گردد و در مجسم و کشتی و مکنه و لجه و اثر طوبیت هوا
شود چون مرکب گردد با سبب بکرم مانند کمی لباس و غذا
علاج مرضی است که شخص به سبب بکرم از او واقفان کند از این
او مردن اسباب حفظ صحت مانند هوا خشک و لباس خوب و غذا خوش از
جوانی و نباتی و در کشتی باید زورق را تمیز و خوش نگاه داشت غذاهای تازه
جمع اوری کنند و ملاحان ملبوس خوب پوشند و چون تر شود عوض کنند و
میوه های ترش نوشند و گاه قند شراب یا عرق بیاض مانند و همیشه خوشحال و
خوشنود باشند و بعد از بروز مرض میبایست بزودی اسباب او را دور
و هرگاه مریض بتواند غذا خورد غذاهای ملایم مانند گوشت ماهی خاصه گوشت
قنقد و اجای گوشت چرب که سبزی زیاد داشته باشند از قبیل جوجه و کرفس و
و کاه و حماض و جعفری و میوه های ترش و ترشهای نباتی و شراب بنفشه
و از همه بهتر آب بود و بقال است و هم چنین مستعمل است سپر و پان و خردل و
ترنج و پوست کنگنه و جبهه سد نفوذ الدم بعلاوه این معالجات فایدهات بسیار
نمایند و از برای نوری لثه دهند سببه مقوی و آبض معول دارند و با اسید کلر
بدریک بسوزانند و از برای نفخ اطراف با انجا حسن لثه و لک نمایند و جراحات را
بااد و به ضد تعفن به بندند و انجا که مرض مرکب شود با دوسنطرا و مقویا
دهند با کمی و بوند با نوباق و کاهکاهی ایپکا دهند و لازم است خود راوی کردن
از فضیلات و مشمع و مفرج و فصد

عبارت

سوال الفیه ترقی الجبل عبارت است از مرضی جلی و مواردی که شناخته میشود بواسطه
استعداد مخصوص شخص بعرض نفوذ الدمهای خطرناک و مهلك
علامات در قفا شناخته میشود بواسطه نشخون در آلات و نفوذ الدمهاست
که عارض شوند بدون سببی واضح یا جرحی صغیر که تفرق اتصال بسیار کوچک
مانند ثقبه نیست و دهان زلو و کوبیدن ابله سبب نفوذ الدم میگردد و بهیچ وجه مسدود
نکرد و مورت ضعیف مرض و سبب مرگ او شود و اغلب اوقات بنی عارض گردد
نفوذ الدمهای بجهت در ماههای اول تولد بخصوص هنگام بیرون آمدن دندان که
بیشتر از همه در عاف و بعد از پیش خون از لثه و کام رخ و لثات و مجاری بول و نا
امعاء است و هم دیده شده است در پیش خون از زهره و از گوش و انتهای انامل
و میبیل و ملتحمه چشم و این نفوذ الدمها گاه منتهی گردند بمرگ و نادر است که در
انها کمتر از سه ساعت بود و اغلب و ام آنها تا دو هفته است و مقدار خون مخرج
بسیار مختلف است و مذکور شد است شخص در هر ۲۴ ساعت هزار تا پانصد تا
دو هزار گرم خون از سطح داخلی لثها و وجنه و خارج میگذرد و عموماً سه چهارم
در طول میکشید و بعد از نوبت زیاد مسدود و میکشد و خارج خون تجدید
بقا صلهای مختلف و گاه بطور نوبه و باشد که نفوذ الدمهای مختلف منتهی از یکدیگر
یا به توالی هم شوند و دیده شده است که هم گریه عارض گردند و معلوم است که
در این صورت شخص مبتلی گردد با غنی و در کیفیت خون با اعتقاد بعضی بکرم و
و نقصان باید و با اعتقاد برخی بحالت طبیعی است
تشخیص بسیار سهل است و هر وقت عارض شود در شخصی نفوذ الدم
مکرر و عسر العلاج که هر ایه کند باکد و زرد رنگ جلد و بروز لکهای سیاه
مفاصل که سبب انها البته نشخون است در اطراف مفصل تشخیص مریض دهند

و مشتمل بر کورده با پور بر برای نرفذ الدمی ولی پور بر امرضی است جلی
 تلمیذ المعرفه ^{است} مرضی خطیر بواسطه عسرت علاج و نرپادی عود و خطوش بیشتر
 چون مرضی ضعیف و کور من بود و خطوش زیاد تر شود چون حرکت شود با و ارام
 اسباب این مرض اغلب جلی و مولود است و هم ^{مانند} اود در چندین نتاج نماید
 این صورت گاه بدون توفیر در جمیع اشخاص این طایفه بروز نماید و گاه فقط در
 یک نوع بخصوص در نوع ذکور و هم باید دانست که استعداد زنان بهر و نرپادی
 کمتر و هم در ایشان که خطر میباشد

علاج انجا که نرفذ الدم عارض گردد باید جهد نمود در انداد او از ^{استعمال}
 جمیع معالجاتی که در نرفذ الدمهای سپیوم مذکور شد و انجا که در پیش خون از
 خارج بود قابضات قوی مانند سنک جهنم و پیکر و در فیکار بربند و فشار
 موضع دهند و احتراز از کارهای جراحی کنند از قبیل بستن رگ و غیره زیرا
 که اغلب اوقات سطح جرح خود مورث نرفذ الدم مهلاک گردد و هم چنین داغ
 که افتادن اسکار مورث بروز نرفذ الدم شود و چون اغلب این مرض بلفج مزاج
 باشند و مبتلی بانی گردند استعمال ادویه مقویه و اغذیه مقویه و شراب و کنگنه
 و غیره نافع است تمام شد کتاب نرفذ الدم

در ترشحات مرضی

این امراض عبارتند از عللی که موصوف بود بنیاد شدن یکی از رطوبات طبیعی
 با بروز ترشحاتی اتفاق بدون آنکه هیچ علتی در حالت مترشح نمودار گردد و این ^{طبیعت}
 مترشح بار پیش میکند بخارج نامیده میشود جویان یا آنکه جمع میگردد در حوض
 الت نامیده میشود اجتماع و استسقاء و ممکن است این دو حالت در یک الت
 محصور متوالی شود اگر چه اغلب آلات بدن مبتلی باین نوع امراض میگردند

و ط

ولی استعداد بعضی از آنها در عرض این مرض بیشتر است مانند غده و جلد و
 مخاط برای امراض جریانی و اغشیه صفاقیه و اغشیه الحجابیه و جرم احشاء برای ^{من}
 اجتماعی طبیعت رطوبت مترشح گاه خون و گاه رطوبت مائی و گاه بخار است یا آنکه یکی
 از رطوبات طبیعی دفعه بمقدار زیاد ترشح شود مانند صفرا و بول و غیره و عرض
 این امراض اغلب بدون مقدمه است و گاه هر ایهی کند با علامات چند که بامرضی
 ماعومی بود باشد و علامت عمده این امراض ترشح رطوبتی است که بالافعال یا بالا ^{تفصیلا}
 بود ترشح رطوبت باید و نوجع است یا با وجعی است شدید و انجا که رطوبت مترشح
 جمیع گردد در التی هر ایهی کند یا با بروز علاماتی که عارض شوند از فشار و الت
 و شدت این علامات بیشتر شود انجا که قوه متسعه الت کمتر باشد و بروز علامت
 عمومی منوط است به طبیعت رطوبه مترشح و رفتار و چنانکه هرگاه ترشح رطوبه
 بغلته بود و علامات عمومی نهایت شدت را بهم رساند مانند کلر و اسهال از
 امراض جریانی و ترشح رطوبت در جوف جمیع و صد را از امراض اجتماعی و انجا که مرض
 زیاد دوام کند خارج متعبر کشته هنرال و تحول عارض گردد و چون یکی از این
 امراض در بدن مدامی بماند سایر ترشحات طبیعی که و هم بعضی از آنها تکلیف مسدود
 شود و بالاخره جمعی عارض کشته مرضی بجهلاکت رسد و رفتار این امراض گاه
 بالانصال و گاه بطور نوبه است و بعد از آنکه چندی دوام نموده منقطع شود یا
 بصورت پابرمک یا بیک علتی دیگر و باشد که بدون اینکه تغییری در طبیعت ^{طبیعت}
 مترشح بهم رسد مستقل گردد یا التی دیگر مانند آنکه جریان بواسیری مستقل گردد
 بخاطری و گاه ترشح رطوبت خونی مبدل شود به ترشح رطوبتی مائی یا مخاطی و
 بالاکس هم صورت این نوع امراض را عود و یکس از سایر امراض بیشتر است و
 لازم است که چون مرض شناخته شد کالات سابقه و حالیه مرض و قریل

مرض را بقین غمی که مرض اصلی با عرضی و فتیح از تغیر مزاج شده و خطر این اراض بسته است به طبیعت و مقدار رطوبت مترشح و سرعت ترشح در اراض جریا و الت فشرده شده در اراض اجتماعی و هم خطر این اراض بسته است با سبب انها از حیثیت انکه انها را میتوان مرفع نمود یا نه و اسباب این اراض اگر چه اغلب مبهم میباشد ولی بعد خواهیم دید که سن و نوع و سته ضرر و مزاج و ارض و بعضی اراض سابقه و ارث و بعضی از کسبها از جمله اسباب مستعد این اراض است و از اسباب محصله است تغیر در اعمال دماغی و تغیر عروق شعریه و قوه و الت و علاج این اراض بسیار مختلف است چنانکه در رطوبات مجتمعه است خارج کردن انها و در اراض جریانی فشار برالت و برگردان او و نشان دادن او و به مقویه در اینجا که مرض پسب و الت رخو بود استعمال او و به ضد و مرر مسکنات در صورت خلاف و هم نافع است استعمال مصرفات و این اراض منقسم میگردد اولاً به ترشحات مائی و نیم ترشحات مخاطی سیم ترشحات مخصوصه مانند بول و منی و غیره چهارم ترشحات بخاری و هم از جمله این اراض است انواع نفوذ الدم و چون اغلب قوه التها بطور ترشح نیستند لهذا انها را در کتابی که در بیان نمودیم و ذکر میمانیم این اقسام چهارگانه را در ضمن چهار باب ترشحات مائی این ترشحات عارض شوند عموماً در اغشبه الحامی و در اغشبه صفائی که رطوبت مترشح در جوف این اغشبه میباشد و بعضی اوقات ترشحات رطوبت مائی در سطح غشاء مخاطی است اعم از آنکه جریان کند یا مجتمع گردد یا آنکه دو حالتی هم گردد لهذا این قسم از اراض را در کتب ما هم در دو بیان بیان اول در اقسام استسقاء بیان ثانی در سبب ترشحات مائی

فرع

و فرج غشاء الحامی و در جوف اغشبه صفائی

این نوع و قسم مرض استسقاء مرضی است که در قدیم شناخته شده بود ولی در سبب عروض و اقوال مختلفه مذکور میشد و عموماً میبایست بودند که عرض و بواسطه اختلال کبد است تا اینکه جالبینوس رخ بر این قول نوشت و چون این طبیعت سبب استسقاء را در تغیر دم میداند نیست و هم کبد را عامل اصلی حصول خون فرض میکرد و لابد بر آن شده که کبد اصلاً با التبع میباشد اختلال میسراند تا آنکه در مائه هفدهم عیسوی بقصر صاحب از بستن و طبع و اجزی نازل دید که استسقاء عارض میگردد لهذا بر آن شده که او رخه در حصول استسقاء و خالت کلی دارند و بعد از او ازلی صاحب که عرف و جذابه را پیدا نمود استسقاء را در اختلال انها دانست و قول تا اخر مائه هجدهم مقبول عامه الحیا بود ولی در اوایل مائه نوزدهم خرد صاحب بود بواسطه تجارب زیاد نمودند که او رخه در جذبه اختلال و خالت کلی دارند لهذا با نراستینا در اعتقاد قدیم میسرید اگر چه سبب بعضی از استسقاها هنوز نتوانسته بودند کشف نمایند تا اینکه در سئتم عیسوی و کتر پریت نمود که سبب بعضی از استسقاها اختلال کلیه است و این قول نیز مایه ان شده که بعضی از الحیای مشهور عصر در باب استسقاء و اسباب مشروحاً ذکر کنند لهذا با اعتقاد کل الحیای عصر این فرض عرضی است از اختلال بعضی آلات ولی بعضی اوقات عارض گردد بواسطه تغیری در خود الت مبتلی که اسبابش هنوز معلوم نیست و اقسام منقسمه اند استسقاء را با کطیو و پسبوا استسقاء کطیوان است که رفتارش سریع باشد و هر اکی کند با بعضی علامات عمومی از قبیل حمی و غیره و عارض شود در اشخاص قوی و پرخون و استسقاء پسبوان است که رفتارش بطی و علائم عمومی ترشحات اسباب اغلب عارض شود بواسطه مانعی در رخه و درش دم و سر یک مخصوص



چون تغیر در اصل او رده یعنی در خود قلب بود و از امراض قلبی که اکثر سبب عرض
استسقاء میگرددند اشتعاج و بیاض و ضیق ثقب او است که چون قلب در وقت
انقباض بجای خالی نکرده و خون و ریبدی بتمامه داخل و نشو و نه در آلات بماند و
از این بطور حرکت خون و ریبدی بعضی ترشحات مائی روی دهد و آنجا که منع حرکت
خون و ریبدی محدود و بعضوی بود استسقاء هم محدود در هر عضو میگردد
و از این نوع استسقاء است آن اقسامی که سبب آنها بر کمال و کبد باهزال
بکند و تاکنون معلوم نشده است که منفع و اضرش در مریضانی مورث استسقاء
میگردد اگر چه مذکور نموده اند که بعضی از غایغریائی که دفعه بواسطه مسدود
شدن شریان از خون مغالطه عارض شوند هر ایه نموده اند با استسقاء ای عضو
و در اغلب این مرضی مشهور شده است که و ریبدی از عضو نیز بواسطه خون مغالطه
مسدود شده بود و هم اگر و ریبدی مسدود نشده باشد چون بواسطه انسداد شریان
حرکت قلب بوسیله موضع اثر نمیکند لهذا خون در جوف او رده و در دست حرکت
نکرده و در طوبی ترشح کند اما اختلال عروق جزا به اید مورث استسقاء نمیکند
چنانچه دیده شده است که عروق جزا به عضو مسدود بامنه دم شده و هم از
بستن غم الصدر هیچ استسقاء بیرون نکرده و بعضی از استسقاءها عارض شوند از
تغیر خون و بعضی مدتی بران شدند که چون مقدار خون زیاد شود و طوبی
مائی در بدن نشر نماید چنانچه مرندی و غیره امتحان کردند که چون آب زیاد در
عروق بد و مانند قوه جزا به آلات که گشته طول نمیکشد که در طوبی ترشح میگردد لهذا
گفتند که عروق استسقاء در اشخاص پر خون میشود که بنحی مذکور باشد و
این قول را اعقاد نیست و آنجا که خون این اشخاص اگر چه مقدارش زیاده است
اختلالی در کیفیت او بهم نرسیده باشد و برخلاف چون مقدار خون کم با اختلال
در کیفیت

در کیفیتش بهم رسیده باشد اغلب مورث استسقاء گردد چنانچه عارض شود
بعد از نزف الدمه های شدید و در او اسکو بوت و اغلب امراض مزمنه استسقاء
که منزل پست و در طوبی طارنده و هو و شعاع با ایشان نمیرسد و غده ها بکند
و نمک اختلالی که از تغیر کیفیت خون مورث استسقاء میگردد که در شدن بیاض
البيض او است چنانچه بعد در مرض بریت مذکور خواهیم داشت که چگونه
کلیه مقدار زیاد از بیاض الیض خون را کم می نماید و اغلب اوقات اختلال خون
در کبد میشود با فشار و او رده و لهذا مورث استسقاءهای چند میگردد و مانند
آنکه در او از غایغریائی که کمال بر نرسد میگردد استسقاء عارض میشود هم بواسطه
فشار کمال بر او رده شکم و هم بواسطه اختلال بافتن ترکیب خون و هم خنثی است
در امراض سرطانی که ترکیب این امراض با استسقاء هم بواسطه سوء القبه و
تغیر ترکیب م است و هم بواسطه فشار یک از ماده سرطانی بوسیله می رسد یا از
بسته شدن خون مغالطه و مسدود گشتن و ریبدی و از قرار مذکور معلوم میشود
که بعضی از استسقاءها عرضشان بواسطه تغیر پست و در خون و این تغیرگاه در
کبد است و اغلب در کیفیت او و بعضی از معالین برانند که گوشه شدن فیبرین
و کلبول خون مورث استسقاء میگردد ولی این اختلال خون مورث استسقاء
شدید نمیشود چنانچه در او از خون کلز پدیدت اگر چه در او طواف عارض گردد
هم چنین در آنی که بعد از نزف الدم شدید و کم شدن مقدار زیاد و از
فیبرین و کلبول با هم بسیار کم است که استسقاء عارض گردد بخلاف که شد
البویین همیشه مورث استسقاء میگردد و اندر حال برانست که جزا برانست
البویین هیچ تغیر بکوی از کیفیت و کبیت خون مورث عروق استسقاء نمیشود
و بعضی اوقات استسقاء عارض گردد بدون آنکه یکی از اسباب مذکور شود

باشد در این صورت مشاهده میکرد و از دپادی در عملالت و تشریح شدن
مقدار زیاد و از طوبیت بد و ن اینکه در آلات صلبه و رفته بدن
تغیری بهم رسیده باشد و بعضی گفته اند که در این صورت دم ضعیفی در آلات بهم
میرسد که تحریک بر تشریح مینماید ولی این اقوال فرض محض است و تاکنون هیچ
کس بی باصل نبوده و معتقد شدن باین اقوال دلیل است بر نادانی و از این قبیل است
استسقاء آنکه عارض گردد بواسطه اثر سرما چنانچه گاه از اوقات هرگاه بدن
کسی گرم یا در عرق بود باران خورده یا در آب سرد افتد یا آب سرد بنوشد
باستسقاء میکرد و در این صورت باید قبول غمی که چون جلد از عمل خود موقتاً
ببافت بعوض او و طوبیتی در غشاء مجامی یا در یکی از غشای صفاقی تشریح شود
و همچنین طوری باید فرض نمود استسقاء را که بعد از یکی از حیثات ثبوتی
عارض گردد ولی نباید فراموش نمود که اغلب این استسقاها و هم آنها
بنکه عارض گردند در همین صحتی کامل بسته اند سک تغیری در کلیتین
تشریح مرضی در هر موضعی از بدن که طوبیت نشر کنند لون و خواص کیمیائی
او شبیه بود بجز رقیق دم که صاف و بی بو و قدری مایل بر سردی و قلبائی باشد
و در زن مخصوص او از ۱۶ تا ۲۴ است و مرکب است از مقدار زیاد و چنانچه
اگر اعلی درجه آب رجز رقیق خون از ۲۴ تجاوز نمیکند و طوبیت استسقاء
از ۲۴ تا ۴۸ جز آب خواهد داشت و هم چنین رطوبت استسقاء حاد و بعضی
املاحی است که در جز رقیق خون میباشد مانند هیدر کلرات و سولف و پتاس
و سولفات و سولف و پتاس و فسفات و نیتری و فوسف و سولف و علاقه
بر آنها همه صاحب در رطوبت مستسقی ماده الهیه حیوانی یافت که محلول
اب و غیر مغلفه در حرارت است که نامیده است او را بلغم مخبره و بعضی

اوقات

اوقات مخصوص استسقاء که بسته بر مرض برپا باشد آورده یافت میشود
و چون رطوبت استسقاء را بچو شاند و قدری تریا و زردند بیاض لباض
کرد و مقدار او از چهار تا ۱۴ است و قلت و کثرت او منوط بحال استسقاء
و طبیعت و مزاج مرض نیست و هم اگر در شخصی مواضع چند مستسقی شده
باشد اختلاف در مقدار بیاض لباض و بیاض خاکم باشد و سنگینی و قوام رطوبت
بمقدار بیاض لباض است که هرگاه مقدار او از ۱۴ تجاوز نکند رطوبت لزج گردد
شد که در رطوبت مترشح مقدار آن از ۱۴ فراتر بود بخصوص چون عارض استسقاء
بواسطه ورم بود و باید دانست که چون فیرین در رطوبت مستسقی بود موجب
حصول انساج طبیعی با غیر طبیعی گردد و اگر نباشد هیچ نسج بوجود نیاید و باید
که رطوبت مترشح قریب رنک گردد بواسطه ماده رنگی خون باز گردد و سبز شود
در صاحبان برقان بواسطه ماده رنگین صفر یا سفید رنک و شبیهی گردد و بواسطه
دخول چربی یا بیاض لباض مرسوب و مقدار رطوبت مترشح بسیار مختلف
و چون زیاد باشد آلات را منع نماید و بر فضای حفره های فیراید و بعضی آلات
نشان بر آنها رسد کوچک شده هزال یابند

علامات علامات عمومی و موضعی استسقاها مختلفه میگردان
بهمة محل استسقاها و از جهة اسباب محصولة او اغلب اوقات ملاحظه میکرد
عظم حجم الت و محل معلول و بعضی علامات که حاصل میشوند از فشار
رطوبت مترشح بر عضوات مجاور و هم علامات مختلف میشوند از
مبیت سرعت و بطو ترشح و از حیثیت رخاوت و استحکام نسج الت و
علامات عمومی که در انواع استسقاء مشاهده میکردند مانند عطش مفراط
و خشکی جلد و مخاط دهان و بیوست لبع و قلت بول و سایر تشنجات

همچنين بسته بوجود رطوبت مترشح نميگردد چنانچه در بعضي از مرضي غلبه اين
علامات ديده نميشوند و در آنها هم كه مشاهده ميگردد برونشان بسته
با سبب يكواست

در تشخيص استسقاء و ملاحظه شرط است اول تشخيص
استسقاء تا ميان تشخيص عرضي است يا مرضي اما تشخيص عرضي استسقاء عموما سهل است بول
عريض اختلاف در عمال و از علاماتي كه حاصل ميگردد در ملاحظه موضع ذال المس
قريع الت ولي تميز دادن اسباب مرض كاه بسيار عسر مهم ميدهاند و براي تشخيص
سبب مرض بايد ملاحظه رفتار و نمود كه سريع بوده است يا بطي و ابتدا
چه الت برون كرده است و هم بايد ملاحظه نمود اتفاقاتي را كه قبل از عرض
استسقاء عارض شده بودند و علاماتي را كه با او همراهي دارند و بايد در نظر داشت
كه استسقاء بسيار كودك و نادر است و هر زمانكه طبيب بتواند سبب را عضا حال
نمايد كه مورث منع با عسر كردن دم بود البته در تغير كيفيت خون سبب
اويرد يافت خواهد نمود و چون از جميع تغيرات دم كه شدن البوين در خون
و البويني شدن بيشتر است لازم است تجربه بول
تقدمه المعرفة بسته با سبب و محل و عك غرض و تركيبات است و كم
شدن رطوبت مترشح اگر چه از علامات جبهه است ولي تا همراهي نكند
حالت كلبي مرضي چندان اعتباري نخواهد داشت چنانكه باشد رطوبت از محل
حذب شده مانند آنكه ذكر شد و انتقال بدماغ نمائند مورث هلاكت ميگردد
و هم ديده شده است كه در اواخر مرض مقلد مترشح بسيار كمر كشته و بدون
انكه انتقال بعضوي نمايد مرض بهلاكت رسیده است
علاج در معالجه انواع استسقاء بايد و ملاحظه نمود اول بر طرف كوتاه

ترشح ميگردد در مماغ بطور انتقال و مورث سكه بلغمي كوتاهي پس از مرگ انكس
سرايت ميگردد مقلد از بادي از اين رطوبت در بطون ناس و در جوف مشيمه
در غشاء الحماي تحت ام الرقيق كاه در جرم دماغ

در تشخيص استسقاء و ملاحظه شرط است اول تشخيص
استسقاء تا ميان تشخيص عرضي است يا مرضي اما تشخيص عرضي استسقاء عموما سهل است بول
عريض اختلاف در عمال و از علاماتي كه حاصل ميگردد در ملاحظه موضع ذال المس
قريع الت ولي تميز دادن اسباب مرض كاه بسيار عسر مهم ميدهاند و براي تشخيص
سبب مرض بايد ملاحظه رفتار و نمود كه سريع بوده است يا بطي و ابتدا
چه الت برون كرده است و هم بايد ملاحظه نمود اتفاقاتي را كه قبل از عرض
استسقاء عارض شده بودند و علاماتي را كه با او همراهي دارند و بايد در نظر داشت
كه استسقاء بسيار كودك و نادر است و هر زمانكه طبيب بتواند سبب را عضا حال
نمايد كه مورث منع با عسر كردن دم بود البته در تغير كيفيت خون سبب
اويرد يافت خواهد نمود و چون از جميع تغيرات دم كه شدن البوين در خون
و البويني شدن بيشتر است لازم است تجربه بول

تقدمه المعرفة بسته با سبب و محل و عك غرض و تركيبات است و كم
شدن رطوبت مترشح اگر چه از علامات جبهه است ولي تا همراهي نكند
حالت كلبي مرضي چندان اعتباري نخواهد داشت چنانكه باشد رطوبت از محل
حذب شده مانند آنكه ذكر شد و انتقال بدماغ نمائند مورث هلاكت ميگردد
و هم ديده شده است كه در اواخر مرض مقلد مترشح بسيار كمر كشته و بدون
انكه انتقال بعضوي نمايد مرض بهلاكت رسیده است
علاج در معالجه انواع استسقاء بايد و ملاحظه نمود اول بر طرف كوتاه

سبب مریض و تیم اخراج رطوبت مریضه و از برای شرط اول اول اسباب مستعمله
مختلف شوند باختلاف سبب مریض چنانچه هرگاه سبب با عسر کردن شش خون
بود برفع آن کوشند که اغلب مرهست محال و چون سبب کثرت دم با قلت او باشد
رفع آن کنند که در صورت اول فصد و علاج ضد ورم معمول دارند و در صورت
ثانی ادویه مقویه و حدیثک و اغذیه نیکو دهند و در هر دو استسقاء قبل از آنکه با خارج
رطوبت مریضه اقدام نمایند لازم است که دفع ورم کنند اعم از آنکه آن ورم
سبب مریض باشد یا مرکب با او باشد اما شرط دوم و تیم در آنجا که دفع امتلاء در مریض
و هم آنجا که سبب استسقاء تغییراتی در ریه بود و امید شفا نمیشد برای
کردن شفای موقتی باید رطوبت مریضه را خارج نمود و برای اینتنوع علاج است
که اول با اسباب جراحی مانند بضع یا شرط الی که حاوی رطوبت مریضه است دوم
با اسباب طبی مانند مسهلات و مقینات و معدلات بول و بزاق و معونات ناز
نیاد شدن یکی از ترشحات بدن اعانت کنند بر جذب رطوبت مریضه و در میان
این ادویه مسهلات بخصوص مسهلات قویه از قبیل روغن فریون و سقمونیاد
جلد عصره و دیونک و هلیجانات بیشتر مستعمل اند مگر در وقتیکه علتی در مجرای
تغذیه بود و بعد از مسهلات مستعمل اند مانند ما و چوب و ریشه تمشک
و چوب البالو که در مطبوع هر یک از اینها داخل کنند مقلد ریحان ترش و با استسقاء
دو بطاس و هم چنین است و خرطال و عنصل و بعد از این ذکی مینایم هو یک از
انواع استسقاء اجلا کانه

استسقاء طی عبارت است از جمع شدن و توشیح مابیت در ریه غشاء
لحمائی جمیع بدن که مخصوص ظاهر گردد در غشاء لحمائی تحت جلد
تشریح مریض ملاحظه گردد از دیاد حجم بدن و جمع که چون با انگشت فشار
دهند

دهند فرو رود مدت زیادی جای او بماند مانند آنکه فشار بر خیم کنند و چون
شرط کنند رطوبتی جاری گردد که صاحب صفات مذکور بود و غشاء لحمائی کشش
و خلل و فرجش زیاد و وسیع گردد و اغلب این غشاء نرم و قابل انقباض و در لون
سبزه بریشم شود و رطوبت مریضه جمع گردد و بمقتلا سرزاید غشاء لحمائی تحت
جلد و گاه در بین عضلات و هم در غشاء لحمائی جرم عضلات و در میان غشاء
لحمائی تحت غشاء مخاط و صفاق و چون مریض قدیم بود لون عضلات باخته شود
و جلد سفید و نازک و نیم شفاف گردد

اقسام و اسباب جمیع اقسام مریضه در عموم استسقاء قابل شدیم در استسقاء
لحمائی دیده میشود و هم عاکض کرد از جمیع اسباب مذکور
علامات علامات این مریض در اینست که مختلف است از حیثیت آنکه جا
باشد یا مریض و از حیثیت اسبابی نادر است که دفعه در جمیع بدن بوی
بروز نکند و هم نادر است که ابتدای بروزش در نقاط چند بود و اینند
قسم بروز مشاهده کرد در وقتیکه مریض عارض شود در هنگام اخراج ریه
حاد مانند ورم او و ریح و ورم غشاء مجال قلب در قسم حاد بر پیت و
اسکن لاین و اثر سرما و در سایر بیدان اوقات خاصه جو مریض پس و بود مدتی
استسقاء در هر یک نقطه محدود میماند و بند ریح سرایت در سایر بدن نمی کند
و از جزئی که در ابتدا مبتلی میگردد مختلف میشود باختلاف اسباب و این
چیز نیست که باید همیشه در نظر طبیب باشد از برای تشخیص و در این مریض جلد
باحثه و سفید مانند شیر گردد و چون با انگشت فشار دهند بدن اینک حساس
و جوی گردد با مقادیری در جلد باشد انگشت فرو رود مدتی محل او باقی ماند
بر خلاف استسقاء رقی که مقاومت و سختی جلد شکم زیاد از حالت طبیعی گردد

واجتماع رطوبت مترشحه در عروق که غشاء لحمانی رخو تر است بیشتر است مانند
 جفتین و لب بزرگ در زنان و جلد سفید مردان و هم رطوبت مترشحه
 بواسطه ثقل در اسفل جمع گردد و مانند کرم اطراف سافله و چون تمدد جلد
 زیاد شود حرارت او کمتر از حالت طبیعی گردد در رطوبت و فرج و بطن
 شود و قوه حساسه و نقصان بهرساند و گاه بکلی زایل شود که بعضی از
 بسوزند بدن و بفهمند و گاه کشیدگی جلد بخدی شود که شقاق بمرس
 و رطوبت مترشحه از ان شقاقها بیرون و بزد و گاه بواسطه همین تمدد و تمام
 بایک جرح و تحریک دیگری مبتلی بجرم گردد که منتهی بعاغرا یا شود و بعضی
 هلاک نماید و علامات عمومی مختلف شوند از جهت سبب و عموما طبع
 اعمال نقصان یابند و عطش عارض گردد و گاه در اخر مرض اسهالی رخ
 دهد که مورث از دیار ضعف شود و بول کم گردد و چون سبب استسقاء
 لحمانی مرض بریت باشد مقدار از بیاض الیض و بول یافت شود
 رفتار و انتها آنجا که استسقا حاد بود اغلب در چند ساعت در وسعت
 زیاد و گاه در همه بدن فرا گیرد و در این صورت رنگ جلد قدری کمر
 شده گرم و خشک گردد و چون با انگشت بر موضع فشار دهند و جمع
 خفیفی احساس شد و فرو رفتگی کمی احساس کنند که پس از برداشتن
 انگشت بزودی بر طرف گردد و مرض همراهی کند با حمائی شدیدی یا نه
 و چون فصد نماید سطح خون پوشیده شود از باه مانند آنکه در ایام
 دگرگونی باشد که استسقای لحمی مدتی بیک حالت بماند یا آنکه سگ
 اشتداد یابد و لی نادراست که حجم بدن مانند آنکه در استسقای
 مزمن است بی اندازه زیاد شود و رطوبت مترشحه در استسقا

حاد

حاد کو با کمتر در تحت قانون ثقل باشد که در ایام مرض بد نمیشود مانند آنکه در استسقا مزمن در
 اسافل بدن رطوبت مجتمع گردد و چون در استسقای لحمی دست جستجو کنند علیت رطوبت
 در غشاء مجلی او یا در کلیتین یا در خون پیدا خواهند کرد و چون دوا می در استسقا
 لحمی هر سدا اغلب مرکب گردد با ترشح رطوبت در جوف اغشیه صفائی مانند صفائی شکم و
 و چون مرض رویشفا کند رطوبت مترشحه بتدریج کم گردد و صورت و پاد و عضوی هستند
 که رطوبت مترشحه در آنها بعد از رطوبت مترشحه سایر اعضا جلد گردد
 تشخص ممکن نیست مشتمل بر غودن استسقای لحمی را با هیچ مرضی مگر با فقیر مزمن
 زیاد از حد و در ایام غیر مز بواسطه ملمس احساس صوفی شود که مخصوص با غرض است و
 سمن زیاد جلد یک صلایت و مفاومتی دارد که او انگشت را و بنماید و اگر چه تیز
 استسقا لحمی جزئی است سهل فهمید سبب و مشکل است و برای فهمید سبب و بانی
 نمود که ابتدای بروز مرض در چه عضو بوده است و باید ملاحظه نمود رفتار مرض و
 اعمالی که با او همراهی میکنند و اتفاقات حاصله بعد از مرض را چنانچه در استسقای
 لحمی بد رجحی که از اطراف سافله ابتدا نماید سبب و مرض قلب خواهد بود و در امر اغن
 و طحال اگر چه بروز استسقای لحمی مانند سابق است ولی پیش از استسقای ریه بروز
 کند و همچنین است استسقا بیک سبب و فشار بر اجوف سافل بود ولی در این نوع
 استسقا مرض همراهی کند با اتساع زیاد مانند آنکه در دلی او مروه ظاهر شکم است
 و هر وقت که ابتدای بروز استسقا لحمی در صورت یاد اطراف عالی یا در جند نقطه
 مختلف از بدن با هم بود سبب و مرض بوی خواهد بود و استسقا لحمی حاد که در
 در جمیع بدن بروز نکند نیز اغلب بواسطه مرض بریت میباشد و هر گاه در این نوع
 استسقا کلیتین سالم بودند سبب مرض در قلب یا در غشاء مجلی او یا در رطوبت
 و از اتفاقات قبل از مرض که سبب استسقا لحمی حاد گردد یکی اثر سرماست بعبث

و هم استسقاء منجم گردد از نواب مزمن و از جمادات ثوب و از بعضی سوء القبه ها
تقدیر المعرفه مرضی است خطیر مگر آنکه سبب عرضش بر ما بود که این نوع از استسقا
اغلب معالجه پذیر است اگر علتی در کلیتین نباشد

علاج بنحوی است که قبل از گذشت انجا که بهیچ طور دفع مرض نکند و برای
خالی کردن رطوبت مترشحه سابقه مفرج و خوش و داغ بکاری بودند و از امری
هیچیک از اینها مسجل نیستند چه که مورت ورم شوند و در این مرض همیشه ورم منجمی
نماند یا گردد و هم چنین است از برای شرط جلد ولی بهتر از همه آنها است متعوب
نمودن جلد با سوزن که دوزی یک بار و بار چند تعبیه در جلد نمایند

استسقای انتفا این مرض از استسقای فرقی ندارد مگر آنکه مرض در اینجا محدود و بیک جزاء
بدن است و از حیثیت محل رطوبت مترشحه این مرض موسوم میگردد به تجمیع تحت جلد و بهیچ
مخاط و تجمیع تحت صفاق و تجمیع جرمی و علامات تجمیع جلدی و اسباب و مانند استسقا
لحمی است و اغلب عاود گردد و در ناخوبی و در او احوال مزمنه و اغلب برون نماید در
اطراف سافله مخصوص در رگها و قوزکها و هر چه می کند باضعف مرض و جلد سفید
فشار انگشت احساس جمعی نکند و محل فشار نامتق و فرو رفته ماند و بعضی از اوقات
چون عرض مرض مدام نفاقت امراض حاده بود صورت حاد گیرد که در یک جلد با
شود و از فشار انگشت احساس جمعی گردد و اثر او مزید بر طرف شود و این قسم از مرض
اغلب عارض گردد و در زنان حامله و از فشار بر او برده و در اشتغال بکار مدتی چند
در میان کالسه مسافرت کنند و بغير از این حالات که مذکور شد و انجا که تجمیع بسته
بدولی نباشد هرگاه در هر دو پای برون کند درجه اول از استسقا است که برون عام
شود و اغلب بسته است بر مرض قلب و در زنانیکه مبتلی بر طمان رحم بودند و تجمیع در
سافله ایشان بمرید بواسطه انست که خون مغلطه مخلوط با ماده مرطانی و خلط و در

خامره

خاصه پا نگیرد شده و آنها را مسدود نموده است و هر تجمعی که محل و در یک عضو بود
بسته است یا بشکافد یکی از او برده ان عضو چنانچه اگر تجمیع در یکی از اطراف سافله باشد یا جلد
دوای آن پا است بواسطه این بر پهای تخت و کبه یا کش است که فشار بر او برده دهند
یا بواسطه فلجی نماید بر پهای شرابین جو و خامره است و طبعی که تجمیع محل و در یکی از اطراف
عالیه باشد سبب و انسداد یکی از او را است در رابطه و رجوف صدر مخصوص این
رسمای این موضع و اگر تجمیع در یک طرف وجه و عنق بود سبب انسداد و دایج اطراف است
و اگر تجمیع در نصف اعلی بدن بود سبب انسداد و باضع که دشوار است در اجوف نازل
عالی و در بعضی از فلجونه های عمیق اغلب نیز حصول نیم داده نمیشود مگر بواسطه تجمعی که
در تمام اعضا مخصوص هم میرسد و قبل از بعضی غائر یا های اصلی اطراف تجمیع زیادی در آن
طرف بهم میرسد و در این صورت باید تمیز داد که سبب غائر یا انسداد یکی از او را
عده اطراف است و علاج تجمیع مانند معالجه استسقای لحمی است که اغلب دفع گردد
بواسطه راحت و گرفتن وضعی که موجب سهولت گردش دم گردد و اغلب دفع است
پچیدن موضع منجم را با نوار و در تجمیع مویع ناخوبین با دو به عذر ضامن نمایند
دو قسم از تجمیع تحت جلد است که باید بخصوص آنها را ذکر کرد یکی آنکه عارض گردد
در اطفال تازه زائده شک دیکری فلک اسباب البوالنس استسقای
تجمیع بدلی و لوله الحفا لیکه در هر مرض خاها متولد میگردد و اغلب مبتلی میشوند به تجمیع
عده و یا منتشر که بعضی از مصنفین او را از سایر تجمیعات فرقی داده اند و با اعتقاد
دلکس علامات تجمعی این مرض را مانند سایر تجمیعات یافته و فرقی با تجمیعات دیگرند
علامات تجمیع اغلب تجمیع عارض میشوند از روز اول تولد تا روز هشتم و در
ابتدا جلد بکودک در جمیع بدن سرد شود خاصه اطراف و عسرت در تنفس بمرسد
و زهرمان دخول نفس کوتاه گردد بعد تجمعی در پاها و دستها و صورت بمرسد که

سایر تهمیمات از فشار با صبع فرو رفته و کوبیدن و بر رفع شوق و این تهمیم بدیج
 سرایت بسایر اعضا نموده و لون صورت باخته و سایر بدن منقبض گردد و این لون
 اغلب ملاحظه میگردد بالون پر قافی و پرودت بدن بدیج زیاد شود که چون مبر
 الدرجه و درین زمان که از ۲ تا ۴ حرارت قرار نماید و بنظر بسیار ضعیف و
 حالت مخصوص در صورت بهم رسد که نازک و بزرگ و بسیار ضعیف شود که گاهی
 و خفه باشد و طفل بهلاکت رسد بواسطه اختناق یا از حرکت شدن مرض با علته
 دیگر مخصوص ذات الریه و آنجا که منتهی بشفا گردد ابتدا تنفس سهل شود و بعد تهمیم
 طرف گردد

تشخیص از جمیع تهمیم که فقط میتوان با این مرض مشتبه شود غیر داده میشود
 باینکه در هر جلد قرمز و مویج و بواسطه و صلب است
 تقدیر المعرفة این مرض بسیار خطرناکست و سبب این مرض اینست که عارض
 در اطفال قبل الحینه و ضعیف و آنهاست که قبل از وقت تولد پابند و هم عارض
 شود از اثر سرما و باین واسطه اغلب بر و نرزش در زمستان است
 علاج بهترین معالجات این است که از یک تا سه دانه زویند زرد
 طفل زیاد در آب گرم کند و با آب چها گیشمی بپوشانند و او را با دویه عطش
 دلک نمایند و چون ضعیف زیاد بود مقویات مانند شراب کنه کنه و طریخ ادویه
 معطر بپوشانند
 البادولنس زنان تازه زائیده بعضی اوقات مبتلی شوند به تهمیم که اغلب
 محدودست در اطراف سافله با صبع بسیار شدیدا که گاه مرکب شوق با علته
 ورمی مخصوص ورم عروق جذبه و ورم او رده و مفصل خاصه
 تشریح مرضی در زمانیکه از این مرض بهلاکت و مسند تغیرات چندی
 در این

در ایشان مشاهده شوق که از آن قبل است وجود ورم در غشاء الحمانی و در تمام
 عضلات اطراف مافله و در بعضی ملاحظه میشود که غدد کثیر بزرگ و نرم و بی
 نشانه اند در اینصورت عروق جذبه بزرگ و در جوفشان ورم بهم میرسد و هم
 دیده شده است وجود ورم در غشاء الصد و بعضی اوقات او رده نخه و خاصه
 متورم و ورمی شوند و دلپوش مشاهده نموده است که مفصل عانه متورم و بی
 شده است و غضروف قشرین گردیده است و اگر چه جمیع اختلالات با شکی که
 در این مرض بر و نرزد و لی هیچیک ضعیف مخصوصی مرض نیستند مگر
 توضیح و طوبت رقیق در اطراف سافله

علامات نادراست بر و نرزد قبل از نرزش و نیم وضع حمل و بعد از آن
 ۲۵ و اغلب در و نرزد ورم و باز درم عارض شود و نادراست که در هر دو و پابند
 و اغلب برای چپ بر و نر نماید و گویا اکنون دیده نشده است که غیر از اطراف سافله
 در عرضوی بزرگ عارض شود و در ابتدا حس ثقل و سنگینی با وجعی بهم میرسد و در
 جمیع پا فقط در ثلث اعلی و انسی و دیده شود و گاه محدود شود و ماهیچ با کیشاله
 دان و در صورت اخیر غدد جذبه بزرگ و وجعناک گردند و بعد ورمی ملاحظه
 شود که اغلب از فوق تحت سرایت کند و گاه بر عکس این تهمیم هر اهری کند با وجع شده
 در محل مبتلی شده و سنگین گشته از حرکت بپهد و جلد صاف و کشیده شوق و نرزش
 سفید شیری و شفاف گردد و حرارت موضع زیاد شود و از فشار با انگشت
 اشتداد یابد و گاهی از لمس بعضی بندهای یا کوه احساس کرد که عبارت بودند از
 عروق جذبه یا او رده متورم شده و اینکه از فشار با انگشت مانند آنکه در سایر
 تهمیمات است فرو رفتگی بهم میرسد از آن بابت است که بر طوبت متر شمع که در
 محل او غشاء الحمانی غاوان است و بولی حاصل گردد که کودی میباشد فشار زیاد کنند

و این بجهت احساس وجع شد بد حال میگرد و هر وجعی که بپا میزنند دهند و بجهت
 در تجمیع هم نرسد و از علامات عمومی عطش و تشنگی و جوی و عرق زیاد و قلت بول است
 و مرضی را می کند با انسداد شری و نقصان با انسداد نفاس و استیاضه
 ریه و انتفاخ بعلل آنکه چند و دوزی علامات مذکور در استداد بودند و با
 با غلط کذا رند که می رفع شد و وجع تخفیف یافته و تجمیع بر طرف کرد و جذب
 رطوبت مترشح اول در آن و بعد در ساق و پاست و اغلب و سه هفته لازم است
 تا رطوبت بکلی جذب گردد و باشد که چند ماه طول کشد و گاه بود که از یک پا جک
 شده بپای دیگر انتقال باید و گاه مرض متعین می شود بواسطه ترکیباتی که حاصل کنند
 مانند حصول دمل و برهم زباد و ورم مفصل عانده و مفصل و ریه و عجز و ورم صفراوی و
 تشنج از سایر تجمعات نمیزداده میشود بواسطه وجع و عدم حصول ترکیبات
 از فشار با انگشت حرکت تجمیع از فوق تحت و تغیر یافتن او از تغیر وجع و از تغیر
 عمیق یا اینکه در او وجع باشد و علامات عمومی بسیار حاد بود و طول نمیکشد که دریم
 حاصل شد و مورث اختلالات کلی گردد
 تقدیر العرفه خطری ندارد مگر بواسطه ترکیباتی که حاصل می نماید و چون و بر یک
 مسدود گردد و تجمیع باقی ماند تا اینکه او مرده و دیگر بزرگ شود و خون در آنها بکشد و شاید
 و باشد که تجمیع مادام العمر باقی ماند
 اسباب مرضی است بسیار نادیده عارض نگردد مگر در زمانیکه مادر زنایده باشد
 و اغلب عارضش بواسطه سهرامست و یا بجهت غلبه بر و کند در بلاد بار و رطوبت
 فصل زمستان مدتی اجتناب بران بودند که سبب و انسداد و جف و تشنج و وی این قولی خالی از اعتبار
 علاج معالجه کنند ورم چون فصد و زلود و موضع تجمیع با در کشاله ران و استیمام در
 فاق و آمیزه ملبنه و ندهین با دها ن محذره و لودانم و عصاره بلادنه و اشربه
 معرقه

معرقه و مدتر و ملبنات و مسهلات بر فوق و انقباض بمقدار زیاد در صورت حاد
 نافع است و چون وجع دفع کرد و تجمیع بماند یا با نوار بر بچند
 استسقای مانع و مرندی صاحب نمود که در جوف حجه و فقر رطوبت رقیقی است که
 مقدارش بعکس خود دماغ و نخاع است یعنی هر چه حجم دماغ و نخاع بیشتر میشود مقدار
 این رطوبت کمتر میگردد و این رطوبت که واقع است در میان مشیمه و ام الرقیق احاطه
 دارد دماغ و نخاع را و هم داخل میگردد در تجاویف دماغ و دماغ کوچک و هر گاه
 بقدری مقدار این رطوبت زیاد گردد حاصل میشود استسقای دماغ و نخاع و استسقا
 دماغ و نخاع منقسم گشته اند به هیدر سفال و هیدر دانتی هیدر سبه منقسم
 میشود و مرین واحد که موسوم است بسکته مانی و هم قابل شد اند قسم چهارم از
 استسقای دماغی که نشتر رطوبت در جرم دماغ بود و لوق سبب جنون هم از او پیدا
 و چون مرضی است نادر و قبل از حق بحث میکنم اشاره با خواهم نمود
 هیدر و هفال احاد این مرض را که در سینه عیسوی اطبای انگلیس معین نموده اند
 دیت او را مرض مخصوصی نگاشت و بعد سایر الجباء او را بکنوع استسقای مشیمه و نخاع
 دماغ دانستند بدین آنکه منبج گردد از هیچ علتی ولی هر چند تشریح مرضی ترفی با
 معلوم کرد بد که در این مرض در دماغ یا در غشیه او علتی و رمی میباشد و بر
 مترشحه منبج انغله خواهد بود و حال اغلب اطباء بودند که نشتر رطوبت در جوف دماغ
 بطور حاد منبج میگردد از ورم امین و از ورم دماغ اعظم از آنکه ورم ساده باشد با
 بود و هم منبج گردد از نرم شدن دماغ و امر هر هیچ استسقای حادی که اصلی باشد
 امین و دماغ و بک غیشو مکرانکه نامیده شود سکت مانی که حال گفتگو مینمائیم
 سکت مانی عبارت است از منبج شدن مقدار زیادی از رطوبت رقیق
 در جوف دماغ که دفعه حسی و حکی و مشاعر که با فانی گردد

تشریح مرضی طر زندهای دماغ اغلب بچین شوند و جرم دماغ باخشد و بخون گردد و نادراست که رطوبت مترشح در جوف مشیمه بود و اغلب در غشای لحمانی تحت مشیمه در بطون دماغ است و اینجا که مقدار رطوبت مترشح زیاد بود مشیمه بلند شده و مابین بطون دماغ با در کشته بطون یکی شوند و رطوبت مترشح پریک و صافی ماند اب است و البومین در او بسیار که با هیچ نیست و مقدار او تا واسپکان و بلند شد و باید دانست که چون دماغ رطوبت را جذب میکند در مرده تمام رطوبت بنظر نمی آید و او را در قریه و رقبه بزند و هر قریه قطراتی بیرون آید و چنان می نماید که دماغ در میان این آب بچسبد و بعضی از او مضمحل و بر طرف گردد

علامات در فتا بر و زاین مرض بر دو خواست یکی آنکه تدریجی بود و یکی آنکه دفعی در صورت اول احساس وجع و ثقلی در سر کرد و خواب زیاد شود و حواس ظاهر و باطن هر دو نقصان یابند و گاه هذیان بر و ز کند و چون علامات اشتداد یابند مریض بتدریج در اغا و قد و مغلول گردد و اینجا که ابتدا مریض دفعی بود بغتة حواس و مشاعر فانی گردد و دست و پا از حرکت بفتد و مردمک چشم عریض و وسیع و بجهت شود بنظر بلخی و حسرت فانی گردد و صورت باخشد یا قرص یا بنفش شود و تنفس عسر کرد و از چند ساعت تا چند روز مریض بملاکت رسد و بعضی اوقات مشاعر بر گردد و حس و حرکت عود نماید و گاه بعد از چند روز جمیع علامات بر طرف شوند و لازم است که در این مرض سه چیز را حظه نمود اول آنکه ظهور دفعی است و دوم مغلول شدن همه اطراف و سیم آنکه چون منتهی تسفای علامات بزودی بر طرف گردند و بعضی از مصنفین بر آنند که چون نشر رطوبت یکی از بطون طرفین باشد عرض فلج در یک سمت از بدن خواهد بود و این امر اگر چه محال نیست ولی تاکنون مشاهد نشده است

تشریح هیج علامتی نیست که تمیز دهد این مرض را از سکتة خونی و میل دم

دم

دم بدماغ با فانی حس و حرکت و باختکی صورت و بطون نبض و حالت سوء القیه که اطباء سابق از علامات همزه این مرض میدانستند چندان اعتباری ندارد زیرا که گاه در مریض منقود اند و گاه در سکتة خونی و میل دم دماغ موجود خطیر است خیلی تقدیر العرش اسباب عارض کرده و در شش و در استخوان ضعیف و در او اغمام ارض من و گاه عارض شود در او اغمام استسقای لحمی و ترق و عارض گردد در و زهای اول ضعیف حمل در زمانیکه مبتلی بتهجج الحواف و استسقای لحمی بودند

علاج الجبای سابق فصد و در این مرض منع کرده بودند ولی در اینجا که نبض قوی و صلب بود لا محاله باید فصد نمود بخلاف در ضعف نبض و در بعضی در مریض باید بعضی از رطوبت طبیعی را زیاد کنند یا آنکه رطوبتی مصنوعی در عضوی بیاورند و از این قبیل مسهلات و ملاترات و مفرجات

ام الصببان مرضی است که اغلب بر و زش در حیوة رحیمیت یعنی آنکه چون طفل متولد شود با این مرض مبتلی می باشد و یا شد که بعد از تولد بر و ز کند

تشریح مرضی چون عرقش در رحم یا قبل از سخت شدن در و ز باشد حجم سبز کرد و از شکل طبیعی خارج گردد چنانکه دانه شد و در طفلی شانزده ماهه و در سرب یکتر بر نیم اندازد داشت و این از دماجم اغلب رطوبت حجه هست که قاعده او همیشه بحالت طبیعی باقی است و یا شد که بزرگی حجم در یک سمت یا در یک نقطه بود و این بزرگی حجم بر بصورت که بحالت طبیعی میماند خارج از نسبت خود شد و حالتی مخصوص بطفل میدهد و در این مرض قطر عودی محل مقله کو تا به میشود بواسطه فشار یک بطن جهه برسد و با بواسطه مقله از جای خود حرکت نموده بیرون آید و برآمد شود و در بعضی از مواضع سر یعنی آن مواضع که استخوان زدن حرکت کرده است پان مواد چیم و موالج مشاهده می گردد و ضخامت عظام اغلب کم شود که نازک و شفاف مانند

در قه کاغذ کرد و گاه بخلاف غنای امت نهاد و سه مساوی شود و گاه در فاصله غلظ
غشائی مشاهده کرد و گاه این غشائی یکی استخوان شود و چون رطوبت مترشح را غلب
بطون دماغ است آنجا که وسیع شوند که طریقه های دماغ بکلی محو گردند و دماغ
شبیه شق بکپسله مائی و پنجش بطوری شود که مادی را از ماده سفید نمیتوان فرقا
و این حالت دماغ هیچ ضرری بجایات نمیرساند بلکه در این مرضی قدر عقل و شعور
کم میماند و بعد از بطون نشو رطوبت در غشاء الحمائی تحت ام الرقیق و بعد از
جوف میماند و هم ملخظه شده است که نشو و تراکم الغلظ و عظام با در میان ام
الغلظ و طبقه خارج میماند بوده است و مقابله رطوبت مترشح بسیار مختلف است
و در یک شده است ماده کپل و کم و در طفلی که مذکور شد تقریباً یکو ربع و نیم و در بزرگ
بود سیزده کپل و کم و نیم رطوبت داشت و آنجا که در این مرض حجم سر بجایات طبیعی میماند
کوچک تر شود مشاهده میشود هزال دماغ و در فاصله و عظام را رطوبت مترشح
کرده است و بیاید دانسته که در شش و پنج یا در بعضی از امراض که هزال دماغ میسر میشود
حرکت نموده اند و فاصله عظام و دماغ که خالی میماند و رطوبتی شبیه رطوبت طبیعی
نشر نموده آن فضا را پر میکند و این رطوبت در حقیقت از این اشخاص لازم و طبیعی
که در خلیه ام الصبیان ندارد

علامات در وقتیکه طفل در رحم است کو با تمیز حال باشد و در هنگام وضع
از پس احساس میشود و بقوام مختلف و عرضی و محدب که جمیع تنه اعلی را پر میکند و بد
آنکه داخل او شود و در وقت تشنج رحم این ماده سخت و در هنگام راحت نرم و مواج
باشد و هم از آنکه احساس میشود و بعضی فاصلهای غشائی و این مرض باشد که
وضع حمل را عقب اندازد و ما به آن کرد که قایله از عمل بد است و در حین آنجا
کتاب قابل گوی مفصل بیان شده است و علا مات این مرض بعد از تولد نیز مختلف

درانی

در آنجا که حجم سر کوچک تر از حالت طبیعی باشد و بجهان حالت بود شکل و خارج از حالت
طبیعی شود که پیشانی و طرفین سر فرو رفته شوند و کله هم چون مخروطی منقبض گردد
و حرکات صورت و سیمای طرف شوند و اوصاف آن که گردند و طفل بیقوت با صوت
ضعیف و گاه عمل بلع محال شود و باشد که غذا را خوب و زیاد خورد ولی بدن تغذیه
نکند و اغلب این اطفال بد بخت چند روز پس از تولد با غشاء یا تشنج هزال شوند و
این حالت که دماغ یا هزال یافته با یکی معدوم شده است یکی از اقسام امراض خلقی
و چون ام الصبیان چند سال بعد از تولد عارض گردد که ملازها مسدود شده باشد
و چون در زن هنوز محکم نشده اند از فشار رطوبت جوف حنجره از هم جدا شوند و
این صورت مشاهده شود که یک یا چند درن مجده با بان شده و عظام این هم جدا گردند
و تا سن ده سالگی این نوع از مرض مشاهده گشته است و صاحبان ام الصبیان
اغلب ابرام در بله میباشند و بعضی مضطرب و مودی گردند و همه آنها بسیار نحسند
و عوایث آن سنگین باشد و بعضی تا دم آخر مشاعرشان باقی است و در اغلب حواس
مختل شود که بصورت خوف زدن و فهم چیزی نکند و حواس ظاهره او بعضی باقی ماند
بعضی دیگر فانی خواهند شد و اغلب این مرضی احوال گردند که چشمتان گاه بوقی کانی
به سخت و گاه بطرفین مایل شود و بعضی یک یا چند عضو شان قانع گردند و اگر چه بعضی
میتوانند با دست اندازی از راه رفتن و بنایند و افتان و خیزان حرکت کنند و نتوانند
سر را بحالت خود نگاه دارند که همیشه بیک طرف افتد و بعضی مبتلی شوند بر تشنجات
مختلفه و غیر منتظم شبیه بصرع و چون بادست فشار بر سر نهند گاه فلج و تشنج متو
حاصل گردد و در مقابل ملاذت این احساس تنوع شق و خلایق داشته های این مرضی
همه بودند که غالب غلظت خوب بلکه زیاد خوردند و گاه تا چندین حواس بحالت طبیعی
و در او احوال مرض بدتر میج نقصان یافته و فانی شوند و عضلات از گت بیفتند

شرح مرضی ماده های هند را شش غالب مشاهده میشود و فطن و بندرت در
عنق و این مواد بد و سرد قاعده آنها عریض پدید آید و در است و حجم آنها از فندقی تا سر
طفل است و جلد آنها اغلب غریب نمیکند و چون مواد بسیار بزرگ گردند جلد آنها نازک
و قرمز یا سفید می شود و باشد که جلد بر طرف شده و ماده پوشیده شود از عشاء غلط
و در صورتیکه این ماده در رحم پاره شود در آن موضع اثر جراحت دیده شود که ملتصق
با طراف بود و عموماً عده این مواد بک است و چون متعده بود چنانچه بر یکی فشار دهند
سایر نیز حرکت می کنند و هرگاه آنها را بشکافند معلوم شود که مجرای نخاع در آن موضع آن
سمت خلف بدون غظم است اعم از آنکه حلقه قفار معدوم باشد یا بد و فقره از هم جدا
شده باشند و رطوبت متراشیده دقیق و مقدارش از پانصد گرم تا چند لیبر است
محل رطوبت متراشیده اغلب اوقات در تحت مشتمل است و گاه در جوف او و نخاع
بدون تغیر و گاه نرم و گاه مهزول است و باشد که ملتصق شود با طراف ماده و گاه
دیده شود که این غشاء ملتصق با عصاب هم آسبی شده است و باشد که هیدر را
با ام الصبیان مرکب شود

علامات مواد مذکور گاه شفاف و اقیام با کوبیدن ممتد و بزرگ گردند
و گاه دیده میشود که در هنگام فرو بردن نفس کوچکتر از هنگام اخراج او شوند و
هم در این مواد گاه ضربان مانند ضربان نبض محسوس شود و سبب تغیر یافتن این
مواد در هنگام تنفس با اعتقاد آنست که این است که او را در نخاع از او انداخته و قابل قبض و
بسط اند و هنگام فرو بردن نفس که خون از جمیع بدن میل بر پیر میکند و خلط را در او رده
نخاع حاصل میشود و رطوبت جوف ماده برای کوفتن مجرای نخاع میرود و ماده
کوچکتر می گردد و برخلاف هنگام اخراج نفس او در محلول می گردد و رطوبت داخل
ماده میشود و از فساد گاه تمام رطوبت داخل مجرای نخاع می گردد و بدین آنکه

هیچ

هیچ وجع و اختلال روی دهد و گاه حسن و حرکت اطراف سافل از فساد مواد
و دخول رطوبات در مجرای نخاع گردد و در صورتیکه هیدر را شش مرکب باشد با ام الصبیان
از فشار بر ماده قطعی هند را شش رطوبت بدماغ سرود و مورث اغشاء و شش می گردد و گاه
و بدین ترتیب ماده طولی در وسط فشار از مقابل عنق تا عظم عصعص می گردد و شش که هیچ
فقرات معیوب باشند و اغلب اطفال بعد از تولد بتدریج هلالا شوند و هر چه ماده
بالا تر واقع باشد حرکت زود تر در رسد و اگر چندی بماند ضعیف شوند و نصفه ^{اسفل}
بدن فالج شود و ماده در زیر برون حرکت شود و مجرای نخاع که بدین رطوبت اختلاج شده
و بتدریج از رطوبت معین و برمی گردد بواسطه تورم مشبهه و البته از این ترکیب طفل
بملاکت خواهد رسید و اگر چه مذکور داشته اند که پس از خارج شدن دیم یک طفل
شفا یافت و چندین طفل دیگر با وجود مدام ترشح نمودن رطوبت و بودن فیقول ^{است}
تا سی سال زندگانی کرده اند

اسباب عارض شود در جنین و بقول شیه بعد از پیر بوار سایر امراض خلقی
کثیر الوقوع تر است که در ۳۲۹۳ طفل که در ما ما خانه پاریس متولد شده بودند
نفر از آنها مبتلی با این مرض بود و سبب اصلی این مرض مانند ام الصبیان مجهول است
گفته و باید بر آنست که سبب اتفاق این مرض آنست که قبل از غضروفی شدن عظام قفا
اغشیه نخاع با جلد ملتصق می گردد و مانع نمیشود قفار می گردند و این عقیده را میتوان
قبول نمود در وقتیکه اعصاب هم آسبی با ماده النصارا یافته باشند ولی اینجا که النصارا
نباشد نمیتوان او را قبول نمود و هنوز معلوم نشده است که در شاخه شدن نخاع قبل
از حصول ماده است یا از ماده شش گرفته شده است

علاج برای علاج این مرض استعمال شده است مشغوب کردن و شرط نمودن
و بستن و از فشار بواسطه اسبابی مقرر شیه با سببیکه برای فتق معمول است کاه ^{شفا}

حاصل شده است ولی اغلب آنکه که داشت همان حفظ ماده از خروج بود و منفعت فشار
 پیشتر منشو هر چه ماده کی چکت و محرش دونه تر باشد و از متعوب نمودن ماده اگر چه
 منفعتی بوده اند ولی ضررش بیشتر بوده است زیرا که موثر است ورم امین کرد با اعضا
 و نخاع را محرش سازد و بعضی معاین ماده را میبرد و بجهت می کنند و ضرر این پیش از
 آن دو عمل است و از وقتیکه او و پدید می آید و در این زمان هم بکار برده اند و کوب بعد
 از این خوف او معلوم شود و اگر ماده بنفسه کشوده شود میباید بجهت نمود که هوای آن
 مجرای نخاع شود و همیشه باید ماده را محفوظ داشت که از استیلا محکم دور شود و متورم
 مجروح نکند

استسقای ^{بف} عبارت است از نشو رطوبت در رنج و به قسمیکه دخول هوا در مجرای
 او کرد

تشریح ^{رضی} نادراست عروق و تجمیع و تبیین و اغلب محد و است در قطعه
 ولون است در محل مبتلی شده و ماده ای باز در کم رنگ است و ثقل الت زیاده و قوه آن
 او که کشته و چون فشار دهند جمع نکند و از فشار با انگشت فرو رود و در بحال اول
 ابد و چون شرط نمایند مقدار رطوبت از او جاری کرد و در این موضع از هر چنان
 مینماید که خون کمتر از حالت طبیعی بود و الت بجهت مجاری و تر بار رطوبت و خستند
 الا ضحلال شود و چون او را بیشترند که رطوبت مترشح خارج کرد و تقریبا بحالت
 عود نماید یعنی نفع تخلی خود را پیدا کند

علامات این مرض چندان واضح نیست که بی وجع و بدون غش و ^{است}
 و از خواهر که لایک مذکور نموده است هر چه کند با عسر النفس قلبی و سرفه و اخراج
 قذفی بزرگ و رقیق و پرهوا شیبه بالی که در او قدری پاخا الیض حمل کرده باشند و
 ولی این علامات را اعتباری نیست زیرا که در اغلب امراض مشاهده میگردند با
 باشد

باشد که در این مرض هم بروز نکند و از قریع محل علت صوت که در او سمع معلوم کرد و گفته
 طبیعی در کوشه است و احساس لرز سوکری بطنان و حرطوبت شود و اغلب اطباء اعتنا
 زیادی باین دال دارند که در سمت اسفل رتین و از خلف سمع میگردند اگر چه این
 علامت در بروز شیت کپیلا و در ذات الیه موجود است ولی چون استماعش
 در طرف اسفل رتین است و چون ملق هم در همان موضع باقی ماند البته ^{لیل}
 بزرگ خواهد بود برای تهیج رتین و در اینجا که تهیج بسیار بود از قریع صوت که در
 سمع اصوات سر به سمع نکوند ولی سرنگوفی بهیج چه شنیده نشود و اینجا که رتین
 مرض سر به شوق و شد بدین و دی موثر است احشاق کرده مانند آنکه در تهیج ^{سپت}
 تسلیخ ^{ملق} از غلظ و جمع رجمی و قذفی خوف و باقی ماندن دال کبری بطنان در
 یک نقطه تمیز داده میشود این مرض از دیر و اول ذات الیه و هرگاه تهیج مجدی بود که
 قریع که در اصوات سر به مفقود شوند مشتبه کرد و بارش رطوبت در ذات الجنب
 خفیف و محدود و دال از تغییر نکردن نتایج سمع و قریع در وضعهای مختلف این
 مرض تمیز داده خواهد شد

تقدمه ^{المعرفه} اگر بطور جدت بروز نکند بسیار خطرناک است و الا قسم من من او اگر
 همان قطعه اسفل محدود بماند بر خطر امراضی که در او رخا این مرض بروز میکند
 کوبانید

اسباب نادراست که این مرض اصلی بود اغلبا ظاهر میگردد در امراض چندین
 مردان و ضعفا و نایب این بسیار مبتلی با این مرض شوند و اسباب این مرض گفته
 از اینجه ملن کو مرشد مانند سایر استسقاها است و اغلبا که بشو با امراض قلب
 علاج این مرض منوط است بعلاج امراض اصلی چنانچه هرگاه هر ^{کند}
 با مرض قلب بکفصد خفیف و در مرض خواهد داد و اگر مرض ضعیف و با خون بود ^{املاح}

حد بدی و سایر مقویات نافع است در هر صورت بخصوص چون اشان خلافی
نباشد در مسکلات و دترات و مصروفات جلده باید اصرار نمود و هرگاه لازم شود
که مریضی زیاد در ستر بماند باید بسیار باو تغیر وضع دهند تا در بهترین منزل
قضی که سبب این مرض میشود وی بدهد

استسقای صدر عبارتست از جمع شدن رطوبت در یک طرف جنب یا در هر دو طرف
بام و بعضی از مصنفین ترشح هر رطوبتی در جوف جنب را استسقا خوانده اند اعلم
آنکه رطوبت مترشحه مائی بود یا ریه و لی بجهت تقدیر معروفه و علاج لازم است
تمیز دادن رطوبت ریه را از رطوبت مائی ترشح مائی در جنب که بسیار بد میشود
کوبایه میوقت اصلی نباشد و همیشه منتهی میگردان از مرضی دیگر و یک رطوبت مائی از
شصت تا صد کوم در میان جنب و ثلث اموات میباشد و در آنجا نیک از مرض قلب
و از مرض بویست بھلاکت رسند وجود این رطوبت دائمی خواهد بود و بخلاف
مهلکین از نسل اگر در یک عشر آنجا بد شود و این بواسطه آنست که در این مرضی
همیشه التصاقی مابین ریه و جنب بهم میرسد که منع میکنند ترشح رطوبت را و
اغلب این اجتماع رطوبت در جنب در هنگام اخراج جواهر است که عسرت در تنفس بهم
میرسد و خون بخود جوکت نکند و معدا را این رطوبت که در هنگام اخراج ترشح نماید
هیچ وقت از ۲۰ گرم تجاوز نمیکند ولی چون سبب و علت قلب را مرض بویست
با علتی دیگر بود خیلی قبل از مرگ عارض گردد مابین آن شود که مرگ زود تر و رسد
علامات تشخیص در صورتیکه مقدار رطوبت مترشحه زیاد بود یا در هر دو طرف
ترشح نموده باشد عسر النفس و سایر علامتیکه در ترشح جنب در مجت ذات الحنجرت مذکور
شد هویدا گردد ولی بدون وجع ریه که از قریع در محل مافوق صوت گذرد و آن
استماع صوت گذرد و از استماع صوت الْفُفْی ظاهر شود و این صوت از تغیر

وضع

وضع تغیر محل گذرد و در صورتیکه در جنب بعضی التصاقات بواسطه و ریه قدیم
حاصل شده باشد اصوات قریع و سمع محدود و مانند آن تغیر وضع تغییر نکند و هم چنین
اگر رطوبت مترشحه بجای شود که یکطرف جنب بکلی غلظت یافته باشد ولی نادراست
که رطوبت پیش از ذوق ثلث فضای صدر را بپوشاند و نیز نادراست که رطوبت مترشحه
بجای بود که صدر منبسط گردد و چون ملاخظه نمایند این اختلافات بخصوص عند
وجع و محمی و حالات سابقه مرض را بسجولت این مرض را از ذات الحنجرت بزداد
رفتار مرض و رفتار این مرض نسبت به رفتار مرضی که استسقا جنب یکی از علامت است
تقدمه المعرفه همیشه ترکیبی است خطونا که نرپا که مورث عسر النفس میگرداند و
باعث ادبنت مرض میشود و در صورتیکه ترشح رطوبت بسرعت و در طرفین باشد
برودی موجب هلاکت میشود

علاج مستعمل است مسکلات و دترات و شمع زردی و بوی
و در صورتیکه رطوبت بسیار باشد و بیم هلاکت بوق میباشد رطوبت را با تود کا و کاخ
استسقای غشائیه که اشخاصی که همیشه در میان پرکار و ایشان مقدار کمی از
رطوبت اصغر میباشد و البته نثر این رطوبت مانند آنکه در جنب نکند و در
احتضار است و مقدار او از ۲۰ گرم تجاوز نمیکند و چون از این مقدار تجاوز کند
سبب غیر از حالت احتضار خواهد بود و اکثر از مصنفین این مرض را منقسم نموده
اند باصلی و عرضی ولی کویا این تقسیم را اعتباری نباشد و استسقای غشائیه
عارضی شود بواسطه امراضی که مورث میشود سایر اقسام استسقا را

مرض بویست

تشریح مرضی مقدار رطوبت مترشحه از ۵۰ گرم تا ۱۰۰ گرم است و در صورتیکه مقدار
رطوبت زیاد بپیکارد منبسط شده قلب بطرف صفر رود و گاه لون آن باخته شود

بریکار در بعضی مواضع لویش شیری و باخته شود و ریتین و مجاب عاجز و معله
و کبد و طحال از محل خود تجاوز کنند

علامات موضع این مرض چنان است که در مردم با تشنگی غشاء
مذکور شد از قبیل برآمدگی صدر در محل قلب خفگی صوت حاصله از قریع با تقیر
از تقیر وضع و از سمع اصوات قلب شنیده نمیشود یا از دور مسموع میگرد و این
مرض که بدون وجع است همراهی کند با ثقل و خفگی و گاه انقباض نفس و صوت
بنفسی کشته و بنفص مربع و صغیر گردد و اگر در اطراف تجمعی قبل از مرض نباشد
بسرعت بدیدار گردد و برای آنکه این علامات بظهور رسند باید مقدار طغی
متر شجر را زیاد بود یا در فشارش مربع گردد که بیکار و از دست انبساط نباشد
و همچون مقدارش قلیل و رتقانی بطئی بود بیکار منبسط گردد و قلب بزرگ و حرکت
کند لهذا از علامات بزرگ نخواهند کرد

اسباب از برای فهمیدن سبب مرض باید ملاحظه نمود علامات سابقه مرض
و رفتار مرض و امراض مرکبه را

تقدمه المعرفة تقدمه المعرفة این مرض بسته بمقدار رطوبت است
علاج جمیع ادویه که در انواع استسقاء معمولند در اینجا نیز استعمال میشوند
از قبیل مسهلات و ملدلات و مصرفات جلدی و مقویات و در صورتیکه مقدار
رطوبت بسیار بود چند نیست که الیاب واسطه نو و کار و رطوبت را خارج میکنند
و بعضی بعد از علاج نمودن با تعفین بد تحرک ان مینمایند

استسقاء رقی عبارتست از جمع شدن رطوبت در جوف صفاق بطن
تاریخ مرضی است که اطباء قدیم او را شناخته و مذکور نموده اند ولی عموماً
او را مرض اصلی میدانستند حال آنکه سوزن قل کسی است که او را عرض از امراض
کبد دانست

کبد دانست و چون پس از آنکه تشنگی مرضی تکمیل شد استسقای رقی اصلی نادر
گشته و تمیز دادن او از سایر امراض بطن اسان گردد

اسباب واضح است که بندرت این مرض اصلی و بطور حاد عارض میگردد و
بعد از شدن خوف لدی و تشنگی و سر ماردیدن با عرق و اسرافه و استعمال مسهلات
بروز مینماید ولی در اغلب اوقات این علت عرضی است و سببش علی است
که در عموم استسقاء مذکور شد اعم از آنکه در استسقای رقی استسقای بکری
گردد یا باشد یا نه چنانچه در بعضی از آنها چنان مینماید که مخصوصاً مورث استسقا
رقی میباشد مانند بزرگ شدن کبد و طحال و کوچک شدن کبد و سپهر و تنگ
شدن بامسدد گشتن و سر پد بابل لکبد و سل بطن و سرطان رحم در وقتیکه مادر
سرطانی در رحمی است و بر بطن فشار دهد و در این صورت در وقتیکه مادر سرطانی
نوم شود و مجروح گردد و ببول بسهولت داخل ممانه شود استسقا بزرگی و دی بزرگی
گردد و این مرض بزرگ نماید در جمیع انسان و هم چنین و در این هنگام بزرگی
چنین سبب اشکال وضع حمل میگردد

تشنگی مرضی از قرار مذکور معلوم میگردد که در اموات این مرض علل مختلف
بدن آنها مشاهده میگردد و وزن رطوبت متر شجر از پنج سیر است تا دوازده من
تیریز و رنک او اغلب صاف و نرم و رنک و گاه شیری یا خون المود است و با آنکه
در میان او بعضی اهای سفید پیا الیض بود و اغلب بی بو و گاه مهوع و متین
بود و در سلس قدری جبینک و بیاض او از سایر انواع استسقا پیشتر است و
متر شجر خود مورث تغیرات چند میگردد و چون رطوبت زیاد بود جلد بطن منبسط
گردد عضلات شکم مخصوص عضله مستقیم نازک و پیرنک شود و امعاء نیز بزرگ
با علائش شکم فشرده شوند و حتی صفات شکر شک چنان مینماید که خسته شده است

manat.wikihema.org

tarikhera.org

علامات چون رطوبت در میان صفاق ترشح نماید حجم شکم بتدریج زیاد گردد
 و در ابتدا مریض از تنگی لباس پندارد و این تنگی بیشتر گردد بعد از غذا بواسطه انبساط
 معده در این صورت اگر شکم را امتحان کنند چون مریض ایستاده بود کوفه های خفاصه
 برآمد و چون مستقی شود برآمد کوفه های خاصه دفع شده شرا سیف عرض کرد و
 اگر بطرفین افتد برآمد کوفه های سفلی نماید و هر چند رطوبت زیاد تر ترشح کند
 تمد شکم بیشتر شود و حجم او دو سه مساکطی گردد در این صورت ناف بالا آمده
 و ماده نرم مویج و شفا فی حاصل کند که در وقت سرفه و زور بجا بردن بیشتر
 و از قریع در هر محلی که رطوبت موجود است صوت کد را احساس شود که این کد را
 بیشتر گردد در هر محلی که اجتماع رطوبت زیاد شود و یا بجهت کثرت کد در شکم
 و شرا سیف می باشد و هر چه در ویالار و ناکه تر گردد تا محلی رسد که بکلی مفقود شود
 و این محل حد رطوبت خواهد بود و دلیل است بر وجود امعاء و چون امعاء ملو
 از اینچره و چون بخار سبک تر از آب است لهذا در روی آن مانند و از برای اثبات این
 کافیست که ابتدا مریض مستقی نموده و قریع کنند در این صورت صوت قریع در شکم
 کد را خواهد بود و بعد مریض را بیک طرف خوابانند که از قریع معلوم خواهد گشت
 که صوت کد از طرف اعلی مفقود میشود و دستسقای زرق بواسطه مسطحی
 احساس توجی میگرد و این توجی بیشتر شوق هر چه رطوبت زیاد تر بود و از برای
 او باید بکد دست را در یک طرف شکم گذارند و با دست دیگر اشتهای بطرف دیگر
 که در همان آن دستی که بشکم چسبید بود احساس توجی و حرکت آب را خواهد
 و چون رطوبت زیاد شود جلد شکم صاف و ممتد گردد و در غشاء الحما تحت او نیز رطوبت
 نشر کند و طولی نخواهد گشت که استسقا سبب است بسیار بدن بخصوص در اطراف سا
 خواهد نمود و غشاء بطنی مخصوص احشا اعتدیه اختلافی در اعمالشان بهم
 و این

و این

و این اختلال زیاد تر گردد هر چند ترشح رطوبت زیاد تر بود چنانچه غذا سرعت هضم گردد
 و گاه قی شوق و طبیعت بیوست به ساند باشد که نفی در امعاء بگردد که موجب کثرت
 اضطراب بود و عسر النفس و تمدد بطن از اکل و شرب زیاد گردد و چنان میباشد که
 از فشار بکلین و بنجین بول گردد و دلیل است که پس از اخراج رطوبت بدون
 هیچ درونی بول زیاد شود و نیز چنان بنظر می آید که از فشار بول در بطن تجمیع در
 اطراف ساخله پیدا میشود و از مده ظاهر یا و شکم تا بنجین بزرگ میگردند از جهت
 املاء بود و از شدت دم باین دلیل که بعد از اخراج آب تجمیع اطراف ساخله بر طرف گردد و
 صدر و شکم و با بحالت طبیعی بگردند مگر آنجا که سکه در وید با بکلید با اجوف
 بود و از استسقا مجاد جاذب و بی اثر و قطعه عود صدر کم شده و شرا سیف غش
 قلب گاه نفث الدم گردد و این اختلالات بیشتر گردد چون مریض در حالتی عارض شود
 خاصه بعد از ماه ششم و صورت این مرض با خنده و سپاه متغیر گشته و تجمیع بالا
 و غشاء مخاط پرنک و جلد خشک و خشن شود و بول او و عطش غالب زیاد بود و
 ضعف و هزال زیاد شود بخصوص در وقت قیام و حرکت و برای قیام و حرکت مریض
 لابد است که بدینا عقب برود و موافق اختلاف اسباب بعضی علامات موضعی و عمومی
 دیگر بروز کنند که بسته با اراض اصلی بوند و اینجا که مریض اصلی نشتر رطوبت کثرت
 کند با حالتی و مری که جلد کوم و نرم و نبض عریض و صلب و سریع گردد و بعضی
 اوجاع در شکم احساس شود

و بعد از این زمان رفتار این مرض بسیار مختلف است چه از جهت اسباب و چه از جهت
 بابت آنکه ابتدا استسقای زرق بروز نموده است یا آنکه متوالی شده است استسقا
 دیگر را چنانچه در اراض قلب استسقای زرق عموما عارض میگردد و بعد از تجمیع اطراف با صفا

manoo tarikhema.org

tarikhema.org

و نشر رطوبت عموماً در پچست و گاه قرق و وقوف متوالی کردند و دام مرض طویل است و فادراست که از دو ماه کمتر طول کشد و اغلب از شش ماه تا چند سال و در کتر که حکایت کند زنی را که بعد از هشت سال شفا یافت و کتو میگوید دیگر پاکه بعد از شانزده سال و پس از آنکه ۸۸ مرتبه رطوبت را و یک خارج کردند شفا یافت و از این قبیل حکایات در کتب بسیار است ولی چون آنها همیشه زن بوده اند شکی خاطر ما می آید و چون استسقا پنهانی بیشتر قابل شفا می آید بلکه در آنجا استسقا در پنهانی بوده است

انهای مرض باشد که استسقای زنی منتهی گردد و شفا از آنجا شدن رطوبت در متدراجا باشد که جذب رطوبت بسرعت بود که در این صورت یکی از رطوبات بدن زیاد خواهد گشت مانند رطوبات معدی و معوی و بول و عرق و بدتر رصا ق و رطوبت مسهل یا رطوبتی انقاع مانند بزم و مقدار رطوبت مخرج زاید خواهد بود که زنی در هفتاد و دو ساعت ده من بول کرد و زنی دیگر در نود و شش ساعت صد و سی من ادرار نمود و بعضی از اوقات ناف بومله و مخرج شده و اخراج رطوبت از او شود و اگر کسی مبتلی بقیق میسر بوده باشد که جلد پهنه مخرج کشته اخراج رطوبت از آن موضع گردد و هم دیده شده است اخراج او از امعاء و انجا که سبب استسقا تغییر یکی از آلات بود هرگز منتهی شفا نخواهد شد و اگر هم چندی وقوف کند موی نخواهد بود که بزودی و بیازاید خواهد گذاشت که عموماً عسر النفس زیاد شده استسقا سربت بسیار بدن نموده ضعف و غشوی عارض گشته لکهای فائز ایدون هو پلا شده هلاکت در مرید

تشخیص ملاحظه سه چیز لازم است اولاً تشخیص اینکه در شکم مائیتی موجود است ثانیاً

ثانیاً تشخیص استسقای زنی از امراضی که مشابه او میباشند ثالثاً تشخیص سبب مرض بزرگ شدن شکم بطور تسامی و نظم و کد و قوت صوت قرق و احساس توجع سه علامت اند که از آنها فهمیده میشود نشر رطوبت در جوف شکم و دانسته میشود از ادای رطوبت از تغییر یافتن صوت کد قرق از تغییر دادن وضع مرض و بعضی مواد و امراض در شکم هم میسرند که شباهت دارند با استسقای زنی و از آنجمله است استسقا طبعی و مواد کپسه و بزرگ شدن مثانه و مواد در رحم و در استسقای طبعی اگر چه شکم بزرگ است ولیکن در همه مواضع شکم صوت قرق طبعی و پر جلد است و حال آنکه در استسقای زنی هر جا که ایستاد صوت کد خواهد بود و انجا که مثانه از جهت سنگ بزرگ شده باشد از بابت کد و رت قرق و احساس توجع مشتبه میگردد با استسقا زنی ولی در این صورت احساس توجع عمیق و از لرز شکم احساس می شود ماده بعضی بکلاری که واقع شده باشد در خط وسط که از تغییر وضع بسیار که تغییر محل پیدا کند و چون فشار بر او دهند میل ببول پیدا شود و بالاخره از ناخفتن کستر بول خارج شد و در هیچ شبهه شود و حال است مشتبه نمودن استسقا را بامایای اخراجی که در حال است در حال احساس می شود مادی بیضی شکل و شپیه بکلاری و سخت بدن توجع که واقع است در خط وسط و قدری مایل به طرف راست و چون کوش دهند صوت نفخ خفیف و دوه صوت قلب جنبی مسموع میگردد و چون لمس کنند معلوم میگردد که غشوی رحم کوتاه شده و احساس بکتمان نیز میشود و طریقه تمیز دادن استسقای زنی از مواد در رحم و از کپسهای بیضی و سایر کپسهای واقع در شکم هنگامی که آن بک از این امراض گفتگو نمائیم مذکور خواهیم داشت و یکی از امراضی که اغلب استسقای زنی مشتبه شد و تا هنگامیکه قرق بدست اطباء نیامده بود حال بود تمیز دادن او کپسهای ایست که در روی صفای بهم میسرند و گاه عجله

بزرگ میشوند که جمیع شکم را میگردانند که شکم برآمده میشود و احساس حرکت نموی میگرد
ولی از قریع خواهیم دید که از تغییر وضع کدورت صوت تغییر میکند و مانند استسقا
زرق امعاء را بالا نمیستند بلکه چون زرق شکم را خوب فشار دهند و قریع کنند معلوم
میکرد که روده ها از جای خود حرکت نکرده اند و صوت قریع اشکال است و بعد از
مریض مذکور بنمایند که ابتدای بروز مرض در یک نقطه بالای شکم بوده است و چون
از فوق به تحت بوده است و بعد از شناختن استسقای زرق لازم است فهمید
او را زرق برای این باید ملاخط نمود حالات سابقه مرض و رفتار مرض و علاماتی
که بود و زرق را میگردانند که بر وزن استسقای زرق بین از تهیج اطراف سافل باشد اگر چه
سبب مرض عسر و آسرها در اوجوف سافل بود ولی عموما سبب مرض قلبی است
بود و اینجا که مرض بزرگ صورتش بلغم و قهقیر باشد و در چند موضع بدن قهقیر عارض
شده باشد بستره بمرض برنیت خواهد بود و در اینصورت از تجزیه بول اصل مرض شناخته
خواهد شد و چون استسقای زرق ابتدا بروز کند و سایر استسقاها از توالی او عارض
گردد سبب مرض در شکم خواهد بود که در لمس و قریع شکم ماده پیدا خواهد
و چون پیدا نکند سبب با عسر و آسرها در اوجوف سافل و با سیر زرقید و اینجا که هر
کند با جمیع شکم و هزال و تمدد و صلابت جلد شکم سبب بلطن و ورم مریض متفاق
تفاقم العرقه مریضی است خطر و عمل بر خطر او افرازد و اگر در چنین عمل اب را
کنند سقط جنین شود

علاج استسقای زرق مانند آنست که در انواع استسقا مذکور شد
بخصوص مستعمل است مسهلات و مد رات و اینجا که از او پرهیز نبوده نشود و
شکر مجدی بزرگ گردد که بیم اشتقاق باشد باید مخمری بطوبیت مریض را داد و خارج
بطوبیت که علی است بسیار سهل و خطری نباید زیاد بتعویق افتد چنانچه هر چه
بزرگ

بزرگ گردد جلد بلطن ضعیف شود و در ثانی بطوبیت زرق و قریع کرد و برای این عمل
مریض را بکنار تخت و در انحنای که میخوانند عمل کنند بخوابانند بقسمیکه سرش بلند
باشد و ثقبه را میتوان از دو طرف نمود و مکرر در ثقبه ماده در یک طرف باشد که پس
مجبور سازد بطرف دیگر و بهتر بنقاط وسط خط سبب که متباعد گردد از ناف تا
شوک مقدم و اعلائی خامه و اینجا که مرض مرکب با حمل باشد چون بطوبیت جمیع میگرد
در شرا سبب که از قریع این موضع صوت کدورت را نرسل احساس توجع کرد و بعضی آن
معصن بن گفته اند ثقبه را در موضع کنند ولی بعضی خوشتر دارند که از ناف با
در یک نقطه از خط سفید عمل کنند و لازم است که قبل از عمل موضع را در دست قریع
کنند که روده در موضع نباشد و بعد ترقه کادر را خوب چوب نموده در دست
بطوری گیرند که دسته او در وسط کف دست نگه دارند و ثقبه را بیکو احساس
مقاومت نکند و بعد مبله اسباب را از غلاف بیرون آورند تا آب خارج گردد
عموما لازم نیست که بغلاف حرکتی دهند ولی گاه لازم میگرد که حرکت او و فشار
بر شکم برای سهولت خروج آب و لازم است که قبل از فرو بردن اسباب هوا را حبس کنند
که مبله خوب در میان غلاف حرکت کند با سافی بیرون آید و عموما جمیع اسباب را
مجلد بیرون می آورند ولی چون مقل را با زیاد بود بهتر آنست که چند باقی عمل
کنند و هر دفعه یک جن را خارج کنند و بعد از تمام شدن لوله و انگشت سمت
چپ را از طرفین لوله مجلد نگه دارند و با دست راست لوله را بیرون آورند و
انچند قطر خون که جاری میشود پاک کرده مشمع بر روی وکله میزنند و شکم را بملا
به پیچند و گاه دیده شده است که از محل ثقبه خون زیادی خارج شده است
صورت استوانه از موم با از اسفنج مهیا شده در میان ثقبه کنند تا خون با
بستند و چون غشی عارض گردد در مریض را به پشت بخوابانند و اشباع اعطی

هر که در دم بینی گیرند و لازم است که بعد از عمل اگر اشاره بر خلاف نباشد برگ
انکه رطوبت و بیا و جمع نکند و مسهلات قوی و مد رات دهند و مصرفات
جلدی نگار پرند و بعضی از اطبا خواستند که بعد از اخراج اب جوی قلع ماده
بعضی اشیاء در شکم مانند سرکه و شراب و الکل و آب فاتر و تخم بن بد و اگر چه بعضی
نتایج از این اعمال مذکور کرده اند ولی مانع این اعمال میکنند و نه بد بگویند میگویند
زیرا که ورم صفاق بعد از او عارض خواهد شد
ترشح اعشیره مخاط نادر است ترشح رطوبت در اغشیره مخاط مکرر در مجاری
والت باسل ریز و ترشح رطوبت در مجاری غذا و کوفه است که یکی یا مبداء شک
هضمه اسبیه که در السنه و افواه مردم و با کوبند و یکی سبلان رطوبت از امعاء
کلرا چون مرض شد بد بود شناخته میشود و باقی و اسهال رقیق شبیه باب
برنج و سد عروق و صغر و سرعت نبض و بعد فقدان او و سردی بدن و نفش
شدن جلد و سرعت هزال یافتن و عروق تشنجات مومج در اطراف و فقدان
صوت و احساس خفگی

تادج در نوری که قدیم ترین کتاب است مرض و بائی مذکور شده است
که بعضی از مردم او را هضمه ریزه دانسته اند ولی آنچه معلوم است این مرض مذ
رمان نیست که در هند شرق بطور مکرر و بزرگ دارد و چندین دفعه از حدود
خود تجاوز نموده و مردم بسیار را در اماکن بعیده بمالکت و سانبه و مشاید
ترین آنها و بائی است که در سنه ۱۱۶۹ه عیسوی از کناور و دهانه کانتر سرباب
ممالک اسبیا و افریقا و اوربا و امریکا نموده و در هر جا اثری از خود گذاشت
و و بائی دوم در سنه ۱۱۶۹ه عیسوی بود و بائی سیم در سنه ۱۱۵۳ه و بائی چهارم
در سنه ۱۱۵۳ه که بواسطه توپین هند در مکه انتشار یافت و از آنجا بواسطه

کشیدار

کشتیهای بخار با سلا مبول و بندرهای او بر پا و مدت قلبی سرباب نمود
و جمیع عالم را بیدار کرد و فرا گرفت که هنوز نهم در بعضی از ولایات و بزرگوار و یکی
مفقود نگشته است

ترشح مرضی علامات ترشی مختلف میشوند باختلاف اینکه ترشح در
دویم هلاک شده یا متد یا در هنگام اول و در هنگام دوم و هم حوارت بدن
بطرف میگرد و در ریزک بنفشی زایل نمیشود و چشم که آب شک و همه بدن لاغر
بود و از قوام عضلات کاهیده و سیاه رنگ شود و این کبودی لون مشاهده
کرد و در غلام رخ و پیچ دندانها و هوای چندانی در جوف رود هان نیست و
از خارج بنفشی رنگ میباشند مخصوصا آنها که در حوضه خاصه واقع اند و
انها را بشکافند ملاحظه شود که سطح داخلشان در بعضی مواضع قور و بعضی
که رنگ و بعضی سیاه رنگ اند و چنان میباشد که اغشیره آنها ضخیم میباشد و
عروق ماسر بقا پو خون است و این پو خونی از بابت ورم الت است بلکه آن
ایستادن خون است و در عروق و در عشاء مخاط نازدهان نامقیده مخصوص
در ابتدای صائم و اعور بعضی دانه های کوچک و کدر مانند نوک سوزن دیده شود
و این دانه مخصوص این مرض نیست چرا که در بعضی مسهلات و یکی هم دیده میشود
و هم در بعضی مرضی بزرگ دارد و در جوف معده و امعاء طیو بی ملاحظه
شود سفید و بی بو که در میان بینی بعضی دانه های سفید میباشد مانند اب
برنج و از قرقر تجزیه معلوم شده است که صفات کیمبائی این رطوبت
بصفات کیمبائی رقت خون و بعلوه این رطوبت و امعاء معده مشا
کرد و صفرائی سبز یا زرد رنگ یا قرمز خون الود و کبد الی چه به حجم طبیعی
ولی خون سیاه و در خلل و فحش نشر کرده است مانند کلبه تین و طحال غمو

کوچک و صلب گردد و جمیع آلات همین لون سپاه مخصوص را بهم رسانند و متناهی که
 خلل از بول است در اطرافش بعضی طعنه‌های سفید مانند آنکه در مجاری غده‌های
 شد بهم رسد و بدین گاه بحالت طبیعی و گاه پرخون است و باشد که بعضی
 سکه در او مشاهده شود و قلب کوچک شده پراثر خون سپاه خواهد و جمیع
 بخصوص آنها بیکه نزدیک قلب سپاه اند عمل از خونند و از کیمیا معلوم شده است
 که سپین و البوبین و املاح خون کم و کلیل و او پیش از حالت طبیعی میگرد و جمیع
 اغشیه صفاق مخصوص صفاق بطن خشک گردد و در هنگام سم امتلاء او بر
 بسیار کم است و علامات شبیه است به علامات ورمی و بعضی از اوقات
 متورم و جگر می شود و لون خون در او قرمز تر گردد و هر چند و لام این هنگام
 بیشتر شود رقت خون زیاد تر خواهد بود و موله مرض از دفعه و امعاء مفلو
 شود و اغشیه صفاق مرطوب گردد و دانه‌ها بیکه در غشاء مخاطی پدید
 بود بر طرف شود و در متناهی مقلاری از بول جمع شود
 علامات ورمی اغشیه در پاره گاه اسهالی بروزش بختی است ولی اغلب
 اوقات بعضی علامات مقدمه از قبیل کسالت و خستگی و ضعف و عدم
 اشتها و وجع و فراق و رنجه و اسهال و زردی و پاستید و سهر و عرق و تشنه
 بروز کند و اینجا که جمیع این علامات بروز کنند مرض را کله بن نامند و این
 حقیقت درجه اول مرض است و این علامات که با انواع و اقسام بروز نموده
 و باهم ترکیب میگردند و امثالان از یک دو تا یک هفته است که متعین نشای
 کردند با منتهی بمرض و هم مذکور شده است که مرض بجلالت رسید است از
 فمائی قوی متدرجا و در هنگام دویم عطش زیاد کشته مرض را شریب نامند
 بحرین زیاد بنوشند و شکم کشیده شده بعضی قوی لجه عارض شود که از نشانه
 شدت

شدت نماید و بزودی قی عارض شود و مدفوع مرطوبی است سفید دانه و از چنانچه قبل
 مذکور شد و پس از قی اسهال بروز نماید و مدفوع در ابتدا زرد رنگ و متعفن و
 مانند مرطوبت مخرجه از دهان است بنفشه سرخ و صغیر گردد که هر چه بر سر عیش
 شود قوتش کمتر گردد و حرکت قلب ضعیف شد و گاه همراهی نماید با صوت دم و عرق
 دم البته بواسطه مسدود شدن قلب است از خون مفلو و تنفس عسرت بهم رساند و مضطرب
 و سر به شود و مرض احساس خفگی در تحت صدر نماید و صوت ضعیف گشته شد
 قانی شود و در وادع و طینین بروز نماید و در عضد و اما مل و عضلات سا
 شمی موجب روی دهد و قوی جدی ضعیف شود که مرضی نتواند با بستاند از
 سپاه خستگی و اپد و زیاد می مشاهده گردد و صورت لاغر شده چشمان که و افتاد
 اطرافش سپاه شود و اگر مرضی رو باشد بدو جلد بدن سرخ و کبود گردد و در
 و گوشها سپاه شود و چین بهم سازد و اگر یاد و انگشت جلد بدن را فشار دهند مدتها
 حالت بماند که قوه ارجاعش مفلو شود و بواسطه مجذوب شدن مرطوبات اغشیه مخاطی
 جمیع بدن بزودی خالی یابد و جمیع ترشحات بدن چه طبیعی و چه غیر طبیعی که مفلو
 بخصوص بول و در ابتدا ی مرض با در و باهای ضعیف در متناهی قدری بول می باشد و
 بول که در حوائی باض البیض است و بعد اطراف و صورت سپاه گردند و این سپاهی
 که سرایت کند جمیع بدن و چشمها خشک و کدر گردد و بواسطه جذب شدن قدری از
 مرطوبت بعضی قریب به بین سبک با و زرع و امثال آنها می کشند و زبان کبود
 احساس شود که کوبادست به بینی سبک با و زرع و امثال آنها می کشند و زبان کبود
 کشته و عطش شدت کند و در این صورت قی که گردد و اسهال بدو ن داده دفع شود
 و مدفوع مرطوبی است قریب و متعفن و صوت مفلو گشته و تنفس سرخ باشد و در
 مخرجه از تنفس اکثرا پیش از حالت طبیعی است و عسر النفس و حس خفگی شدت نموده

manoo.wikihema.org

tarikhema.org

بعضیانی که در وگاه قلب بنی از حرکت بپسند که خون از گردش باز ماند چنانکه در این حالت
 دپنه شده است که شریان بزرگ را بریده اند بقطره خون خارج نکشته و اگر در پد بر اینکا
 میتوان با فشار قله ری خون سپاه لایخ پیرون او زد که بزودی منجمد خواهد گشت ^{بگو}
 که هیچ رقت از او خارج نشود و درجه حرارت خون چهار یا پنج درجه را میسر کمتر از آن
 حالت طبیعی شود و از این معلوم میشود که نقصان حرارت در تمام بدن است چه
 در آلات ظاهر و چه در آلات باطنه و در آن هنگام جمیع حواس که با فانی شوند که سامعه
 نشنود و بامره نه بیند و لامسه احساس نکند ولی مشاعر بجای خود میمانند همچنانکه
 نادر است عرض هذیان و اغما و مریض بجهلاکت رسد و در این اختلالات گاه متدراجا
 گاه بغتة و در صورت اخرو عموما حرارت بدن زیاد شود و با این واسطه بعضی بر آن شده
 اند که اشتباهی که از این مریض میماند حرارت بدن شان زیاد تر شود و این هنگام دویم را
 اطباء هنگام برودت با هنگام خفگی با هنگام سپاهی نامیده اند و چون در این هنگام مریض
 بجهلاکت نرسد دفعه صورت مریض تغییر یابد که سردی بدن دفع گشته و نبض برگردد
 و بتدریج قوی شود و سپاهی بدن و هزال بر طرف شود و صورت برافروخته و چشمان
 پر خون شده و صوت قوت گیرد و بول حاصل شده و گاه پاهای بیض در او پیدا شود و
 خون بتدریج صفار طبیعی خود را پیدا کند و هر چه از حالت برودت دور تر شود قوت
 او بیشتر گردد و این حالت را هنگام سیم با هنگام حرارت می نامند و چون علتی روی
 ندهد مریض بزودی بحالت نقاهت خواهد رسید و طبع همیشه چنین نیست که
 که این هنگام سیم در بعضی از مریضین باقص میشود یعنی آنکه طول نمیکشد که دوباره سرد
 شده و عموما بجهلاکت رسد و در بعضی علامات حی میفریب و بر نکند که جمعی شده اند و
 خشک و خشن و سپاه و دندانها نرسپاه و عطش نماید و فوای عارض گردد و صوت
 حماقت هویدا شود و اغما با هذیان روی دهد و تمام در اطراف بهم رسد و اوقا
 حرکت

بجرت آیند و بعد از پنج یا ده روز مریض بجهلاکت رسد و بعضی از مریضین شفا یابند ولی
 اینصورت حالت نقاهت بسیار طولی بود و در هنگام حرارت فی واسمهال سد کردنند
 باشند که فی باقی ماند و با فوای متوالی کردند و در اینوقت است که بعضی بر گیات دست
 مانند بل دم و او را م بخصوص در ریه و دماغ و بعضی ثورات مانند سرخچه و اسکا
 لاین و غیرها و گاه دپنه شود و سرم غده تحت اذن و پراق و پاید داشتند که بر و زغلهات همیشه
 بخود میزنست و گاه علامات خطر بغتة و در ابتدا بر و نرکند و بزودی بجهلاکت رسا
 و باشند که فی واسمهال روی ندهد اگر چه امعاء از مواد و باقی عمتلی باشند
 و دام باشد که در چند ساعت بجهلاکت رسانند ولی عموما ناشیت ساعت
 طول کشد و گاه تا یک هفته و از قوا بر تجربه معلوم گشته که دوام مریض بستر بقوت
 است که هر چه قوت زیاد تر بود دوام مریض زیاد تر خواهد بود و دوام حالت نقاهت
 عموما بسیار است و توجه زیاد لازم دارد که گاه نکس و عود در مریض بمرسد و با
 که کلرا سبب شفا با تعویق بعضی اراض حاده و مزمنه کرد و چنانچه بدیده شده است
 که اسهال و قلع و یبنا و بعضی اراض مزمنه جلد پیر از کلرا شفا یافته اند
 استقص از مزاجه فی واسمهال و سرد شدن بدن و زبان و فقدان نبض و کبودی
 تشنج و عدم بول و فقدان صوت بحال است مشتمل بر غودن هیضه و دیر را با در مریض یک
 و مسموم شدن از اراد و پیر مرقه بخصوص از سیم الفاراضی میباشند که میتوان با این
 مشتمل بر خود چنانکه اگر مقدار زیاد از سیم الفاراضی بنوشیده شود جمیع بدن
 صورت و اطراف سپاه شوند و صوت تغییر یابد و عسل النفس عارض شود و تشنجات
 که گردد و فی واسمهال عارض شود و مدفوع بقی و بول از سپاه نرک و خون الود میا
 و این مدفوع بقی واسمهال تجربه کردن شیء مدفوعه و سابو عوارضات دفع شبیه خواهد
 نقل المرفه مریض است خطرناک و نصف اشخاص مبتلی شده عموما بجهلاکت

اند و در پیران و اطفال خطوط بیشتر است و هم چنین در مردان خطی تر از زنان است و در
ابتدای و بلوغ مرض پیش از آنرا و است و حالت برودت و فزونی نفی بر خطی است
و چون حالت حرارت شدید نباشد و ناقص نماید امید شفا بیشتر است
اسباب این مرض در هندی بطور مکاری همیشه هست و گاه گاهی در سبب بر باد و بطور
بروز میکند ولی بعد از برای سینه عسوی هر ساله از این مرض بصورت جدید و غیر
دیده میشود و چنان می نماید که بعد از این مانند سایر امراض در سبب جابجایی
و برای فهمیدن رفتار و سرایت او آنچه را که در سبب امراض بانی بیان کرده اند نقل
شده اند که بعضی بر آنند که یک ماده مسریه بهم میرسد که سرایت مرض بواسطه او خواهد بود
و بعضی برخلاف میگویند استعلاء مخصوصی حاصل میگردد که باعث بروز و پیشروی
سبب اصلی این مرض فهمیدن بسیار مشکل است چرا اغلب مشاهده میشود در بلاد
مختلفه الهواء مختلف الوضع لهذا باید قبول نمود وجود شیء مخصوصی را که بر آنکه میگردد
در هوا و یک تاکنون دلیل درستی بر وجود او یافت نشده است و بیاید دانست که اثر
این مرض نه همان در انسان است بلکه بعضی از حیوانات مخصوص صاحب اشباح و غایب
خانگی اغلب این مرض متاثر میگردند و عموماً بروز و رواج در هیچ بلدی در فترت نیست بلکه با
از امراض مانند نواب و دستار را با امثالی معکبی چندی قبل از او شایع میگردد
و چنان می نماید که بعضی اسباب استعلاء در عرض و از پیشتر می نماید و بعضی دیگر سبب
او میشود اجتماع مردم در یک مکان و جسد هوا و آلودگی طوبی و سن و قوف و فترت
در کارهای سخت و از قبیل بازی مدکور شده است اثر سرما و افزایش در غلظت و سردی
علاج آنچه در سبب این ازاد و پدید می آید که در شده است در این مرض استعمال کرده اند
و هر کس میخواست که دوائی مخصوصی برای وی پیدا کند ولی از تجربه معلوم شده است که
طریق مخصوصی برای علاج او نیست علاج او مختلف میشود موافق اوقات و
علامات

علامات عرض در هنگام اول باید در مرض سرایت نماید و پیران هر چه چیز کند و حقن
ملعبه بکار برند و اشربه ملعبه بنوشند و تویاک بخورند یا حقنه نمایند و غماوات
محکم بر ساق پا اندازند و این معمول دارند و اینجا که نفی قوی باشد و جلد کم بود
موجب باشد چند نرود بر شکم اندازند یا مقله قلبی خون بکشند و برخلاف اگر نفی
بود اشربه معطره بنوشانند و او پیر ضد تشنج مخصوص شربت اطریکا بکار برند و در
اول این هنگام دویم نیز همین ادویه معمول است بعد از وفاتی از پیکا کوانا و مسهل
ملحی و اسپیکوانا در سبب فایده نکرده و حال آنکه در سینه فایده کلی است
و هم چنین است مسهلات و چون در اسهال زیاد باشد و علامات عصبانی بود
کند و نفی بسیار ضعیف شود اشربه منعش مانند مطبوخ کرم نغناغ و بابونه و
قهوه و جای و جلد شارب و عرق و الکحل در سینه بنوشانند و هم مستعمل است کونبات
و اسنات دولامانیا که بمقدار سر زیاد و تحریک جلد کنند از دلک بایس و محکم و غما
خودل و حرارت مصنوعی کلوله یا اجر کرم که در اطراف مرض کد کنند و کسپه
مریک کرم غوده با اطراف مرض کد کنند و اخراج خون در این وقت مضراًست خیلی
و بیاید دانست که اخراج او تقریباً محال است چرا که در عروق غلیظ و فشرده کشنده
و بعضی ازاد و پدید یکی نیز استعمال شده است مانند قنب و کلوفوم و نمک طعام
ادویه زرد قهوه و برای سده اسهال حقنه ان سیک جهنم و نوشاندن او مستعمل
و هر چه بدن کرم تر شود باید این ادویه را کمتر استعمال کرد و بعد از آنکه بکلی کرم
فقط اشربه ملائم و کمی ترش بنوشانند و چون حالت کرماتاقی باشد و کبودی
و اطراف باقی مانند فحشاءات را نوزک نکنند و مقویات دهند و برخلاف چون کرم
زیاد گردد و او پیر خند و سرم بکان برند و فصد کنند ولی در اخراج دم باید خیلی
دقت کنند و کرم اخراج کنند و در زمان دویم از هنگام سیم که ضعف بر مرض

مستولی مشک باشد مقویات بخصوص کنه کنه نافع است و برای رفع تشنج دلا کنند
 و خدر رات بکار برند و آهن بر بپا کنند و کفر فوم بمالند و از برای بر طرف کردن
 این مرض تاکنون چیزی پیدا نشد و کنه کنه و دکل و استعمال کافور و غیره هر چه حاصل
 است ^{سبب از رطوبت} سبب از رطوبت است که گاه یک رطوبت شفا فی بدن آنکه صفر یا پخته مخلوط باو بود از مفعول
 خارج شود چنانچه مریض در سفری باین مرض مبتلی شد دکل و لیسب بزرگ در بعضی خانه بآن
 بعد از این خوردن چند روز مبتلی باو بود و هلی بزرگ هر وقت بودت باو تاثر
 میکرد مبتلی میشد و دلم این مرض بسیار کم اگر چه کبار تا چند ماه مبتلی بود و این
 با هیچ وجهی رشک هر اهی نمیکند ولی در بعضی بزودی ضعف بهم نمیرساند و سرت
 لاغ می شود و تاکنون معلوم نشده که رطوبت از چه الت نشر می نماید اگر چه بعضی
 که از غدد و لوز المعده نشر میکنند ولی این قول چند ان اعتمادی ندارد و از اقسام این
 مرض شمرده میشود اسهال بلکه در مستسقی عارض میشود و رفع استسقا میکند
 چنانچه گاه مستسقی مبتلی میکند و بقی و اسهال و رطوبت نرود نکی دفع میشود
 و رطوبت مترشح در جوف صفاق و تحت جلد بخوشحال دفع میکند و علاج این مرض
 در صورتیکه در مستسقی عارض شود بسیار در اعانت آن نمود و علاجی نرود و چون
 فقط از مفعول دفع کرد اسپکا کو نادهند و چون بقی خارج شود مسهل دهند ^{چون}
 از هود و طوف خارج شود مقویات معده و خدر رات و مصرفات جلد بکار برند
^{سبب از رطوبت} سبب از رطوبت است که از رحم چید در حالت خلأ و چید در حالت حمل گاه رطوبتی
 ترشح میکنند با خارج میکند با در جوف الت صفتش اند و این مرض که چه نادر است
 ولی بعضی زنان مشاهده شده اند که تا چند سال قبل از زمان حیض مقدار این
 زیاد می شود و رطوبت از اتحاد دفع شده است بدون آنکه هیچ اختلالی در مزاج پیدا
 بهم رسیده باشد و از اقسام این مرض است رطوبتی که در زنان حامله مخصوص
 در ماهها

در ماهها و از جنس خارج میکند و قایلها انرا اب غلیظ مینامند و خرج رطوبت
 یا فطره و قنوه است یا یکدفعه و اگر چه اغلب در خواب و در وقت راحت خارج میشود و
 حرکت بدن بیشتر تحریک او را مینماید و این رطوبت که خروج او بدون جمع و تشنج
 رحم را و خللی بر محل وارد نمی آورد در اصل و اطباء اختلاف کرده اند بعضی میگویند از
 مشیمه بواسطه نشر یا انحراف خارج میکند و بلکه میگویند که نشر رطوبت از سطح
 رحم است که پس از نشر در میان سطح داخلی رحم و اغشیه جنینی جمع میکند و چون
 مقدارش زیاد گشت اغشیه را عنق از رحم جدا شود و رطوبت خارج کرد و چون
 این اتفاق بیفتد باید وزن به نسبت راحت کند و اغلب اوقات رطوبت مترشح
 بخصوص در هنگام خلأ قبل از آنکه خارج شود چندی در جوف رحم مینماید و این
 جهه ^{سبب از رطوبت} سبب از رطوبت است که از رحم چید در حالت خلأ و چید در حالت حمل گاه رطوبتی
 ترشح میکنند با خارج میکند با در جوف الت صفتش اند و این مرض که چه نادر است
 ولی بعضی زنان مشاهده شده اند که تا چند سال قبل از زمان حیض مقدار این
 زیاد می شود و رطوبت از اتحاد دفع شده است بدون آنکه هیچ اختلالی در مزاج پیدا
 بهم رسیده باشد و از اقسام این مرض است رطوبتی که در زنان حامله مخصوص
 در ماهها

در هنگام حمل
 علامت از رطوبت در رحم باید و چیز موجود باشد یکی انسداد
 عنق و دیگری از ریداد رطوبت و عنق مسدود میشود بواسطه ورم الت و تشنج
 و وجود اسقروسی یا بواسطه فشار ماده خارجی یا انقباض از قطع خون و نیز با تشنج
 سخت و غلیظ و هم گفته اند که عنق رحم مسدود میشود بواسطه تشنج او در این صورت
 چون مقدار رطوبت در جوف رحم جمع شود و با النسبه زیاد کرد و در بعضی
 زنها برآمده شود و احساس ثقل و تمددی در کشاله ران و کمر نماید و چون تشنج
 مسر نماید ماده بجم مختلف در خط وسط احساس کرد که از قعر صوت گذران
 مسر یابد و دست احساس قوی شود و چون انگشت بمبیل کنند و عنق رحم را
 نمایند میتوان حرکت بماده داد و معلوم نمود که ماده در عمق رحم است و

مسدود است بخصوص اگر مرض وای داشته باشد و هرگاه مرض مرکب یا یکی از امراض خطره
نباشد قوی باقی ماند و مرینه هیچ احساسی نکند مگر علامت آنرا که حادث میشود از
بزرگ شدن رحم بواسطه ماده که چون فشار بر عروق دهد خون درست حرکت نکند
و تجمیع در اطراف عافله بجز رسد و باشد که پس از مدتی در طوبت خارج گردد بتدریج یا
و نادر است که در طوبت غرض بکلی رقیق بود و اغلب مخلوط است با رطوبتی مخاطی و
قطعات خون مغلظه یا خون و بعد از خارج شدن در طوبت رحم بند ریج بحالت طبیعی است
کند و اگر سبب اصلی بر طرف شده باشد متفکام است و الا دوباره عود خواهد نمود
تشخیص ^{مشتبه} میگرد و با حمل و با ماده های صلب رحم و پستی و استسقای
و انبساط مثانه و تمیز داده میشود از حمل بواسطه علم بلمان و عدم صوت قلب جنین صلب
و بالحدب و وزن میباشد و از استسقای رقیق تمیز داده میشود از آنکه در استسقای رقیق
و در این فرض عمیق و غائر است و در استسقای طوبت جایجا میگرد و در اینجا ثابت است
شکل ماده و وضعیت در خط وسط و پس از مهبل تمیز میدهد محل مرض را و هم پس از
و استعمال کستر تمیز داده میشود از امراض مثانه و بعد از تمیز مرض باید تشخیص داد سبب
او را از اسباب انگشت و استعمال این مهبل و این تشخیص لازم است برای تقدیر معالجه

و علاج

تقدیر المعرفه ^ش جید است چون رحم سالم بود و ری است چون مبتلی یکی از امراض الخطه
علاج باید دفع رطوبت نمود که در ابتدا رقیق و استسقام نمایند تا عثر رحم نرم
گردد و بعد بکفطه از اسفنج خشک در عثر گذارند که بند ریج در عثر آب گرفته او را
منبسط سازد و گاه فشار بر شکم و جنبه دهند و جست و خیز با حرکت فی جهت رطوبت
کافست و گاه مبلای رعنوبه و قوت نمایند با ماده که هست جایجا نمایند و آنجا که
خطر زیاد بود شرط کنند و بعد از دفع رطوبت باید کاری نمود که مرض عود نکند

شکم

شکم را می پیچند و تحریک رطوبتی دیگر مینمایند

استسقای رقیق ^{مشتبه} این نوع از استسقای رحم عبارت است از اجتماع رطوبت در
زیاده از عاده و اسباب این زیادتی ترشح اگر چه غیر معلوم است ولی در بعضی اوقات
همراهی میکند با غلبه خون که رقیق ترشیده با استسقای حاد است و نادر است قبل
از ماه پنجم و اغلب بدو زرش در حمل توأم است و هم عارض میگردد از بعضی امراض
جفت و در این فرض شکم بزرگی بسیار حجم کرده که در او اخر ماه پنجم یا پیش بزرگی او
مثل مانده شود که جمیع جوف شکم را پر کرده و مجاد حاجز را بالا برده لهذا مورث ^{کیست}
کسالت زیاد و بعضی اوجاع کرده و جدا ر شکم بخدی رخاوت بهم رساند که احساس
شود که گویا نثر رطوبت در صفاق باشد ولی از شکل شکم و رقیق و دو هادر عقب
طرفین و جایجا نشدن رطوبت و علامتیکه از لیس عنق رحم ظاهر میگردد و بخوبی
استسقا تشخیص داده میشود و انبساط بلا نهایه رحم اغلب مورث سقط میگردد و گاه
بانتها میرسد ولی طفل کوچک و ضعیف میباشد و بعضی اوقات جنین در رحم میماند
و بعد از پیچید خارج میگردد و این فرض که اغلب از برای جنین با خطر است گاه زن را
مستعد میکند بخرق رحم و بعد از وضع حمل نرفالدم بواسطه رخاوت الت و تاکنو
علاجی از برای این مرض پیدا نشده است و آنجا که انبساط رحم بحد بود که اضطراب را
شود و در عمل هضم و تنفس منع با عسرتی بهم رسد باید آب مشیمه را خارج نمود ^{مشق}
کردن مشیمه بواسطه فرو بردن اسباب از عنق رحم در جوف و در خط مفید و هر یقه اول

بجهت است

ترشحات مخاطی ^ش رطوبت مخاطی گاه زیاده از حالت طبیعی ترش میکند و زیادتی ترشح
مداومتله نامیده اند و در باره این امراض تا چندی خیالات فی اصل طشتند که بونیان
و پروان آنها بران بودند که ماده در دماغ بهم میرسد و از آنجا جاری میگردد بجا

۷



یکی از اغشیه مخاط و از عصر هفت و بعد از طوبت مخاط را بجهت تحصیل غوده و چنانچه غوده و این طبیب بزرگ برانند که در غشاء مخاط علی مخصوص بهم میرسد که رطوبت او زیاد و از حالت طبیعی مترشح میگردد و یا آنکه علت غشاء مخاط منجمد میگردد از تغییر رطوبت او اگر چه معاصرین متفقند که این مرض بسته است فقط بعلت غشاء مخاط و در طبیعت او اختلاف اند که بعضی برانند که نکات حاصل میشود از مردم حاد یا مزمن اغشیه بهم میرسد و تابعین این قول اخر بیشترند پس در حالت حالیه نزله عبارتست از زیاد شدن فشر رطوبت مخاطی از غده مخاط بدون اینکه با فعل و در غشاء مخاط باشد و قد ما این زیادتی رطوبت مخاطی را در جهات اصل بعضی از آنها میدانند لهذا معتقد بودند که بجهت نزله و بلغمی و سرکامی و همای نزله و میگویند که مرض محدود بود در مخاط انف و قصبه و بلغمی و وقتیکه مرض در آلات تغذیه باشد و اگر رجوع نمائیم تعریف امراض شایع را که از ایشان بهار رسیده است خواهیم دید که این جهات بلغمی و نزله که آنها را مرض مخصوصی میدانستند امراض مختلفی میباشند که بر و زرشان در بگرفان بود و در جهای نزله که ورم در چشم و بینی و حلق و قصبه بهم میرسد علت این آلات اصلی خواهد بود و این علل یکی از علامات واضح مرضی دیگر میباشند و جهات بلغمی شد بد نخواهد بود مگر همان بقول بدی که ما میگوییم و بقول لبطن معتقدیم اغلب اوقات نزله منجر اندند نه بواسطه آنکه علتی در مخاط بهم میرسد بلکه بواسطه سبب خفای که معتقد بودند و نزلات بعضی از آنها بیکه مزمن باشند اگر چه اغلب اصلی هستند و گاه منجمد میگردد از ورمی حاد که بعد از رفع شد اثری در مخاط میگذارد که نشتر طبیعی و حسب العاده زیاد میگردد

علامات نزله شناخته میشود از سیلان رطوبتی بزرگ و لزج که بشتر منجمد و نزله بزرگ با سبز کشته و بعضی اوقات یعنی در صورتیکه شیخ الت اختلافی

نشد

باید با ورمی در او بهم رسد بر یکدیگر و این رطوبت اغلبی بود که متعفن و بیشتر از الکلی و گاه ترش است و چون در نزدیکی او را نگاه کنند دیده شود که متشابه اجزای و گاه حاوی کولها نیست شبیه بدانه های سریم و باین واسطه تمیز این دو رطوبت از هم مشکل و گاه محال است و سیلان رطوبت مخاطی هم می کنند با اختلافات مختلفه از حیثیت مخاط مبتلی شده و از حیثیت کثرت سیلان و از حیثیت دوام و اغلب این مرض بدون وجع و گاه همراهی کند با حاررت و حده در موضع و غالب بدون غشی است و اگر همی عارض شود بسیار خفیف و گاه ورم خواهد بود و اینجا که جریان رطوبت زیاد و قدیم بود رنگ باخته و قوی ضعیف شوند و عضلات رخو گشته و عمل هضم مختل گشته گاه همی و قی عارض شده و بعضی از هؤلاء و تحول بجلد است و در فترت این امراض مختلف است که گاه شدت بهم رسانند بدون سببی واضح و گاه سبب شدت او اثر سرما و بروت هواست بخصوص چون مرطوب بود و با پیچیده است که نزلات خزان و زمستان شدت نموده و در هوای گرم خفت حاصل کنند باینکه دفع شوند و دوام این امراض بسیار مختلف است و فادراست که آن با همند که نزله و اغلب بکرات عود کنند و بعد بحالت ازمان افتند در این صورت دوام غیر معلوم خواهد بود و باشد که هیچ خالی در مزاج بهم نرسانند و گاه طبیعی گردد که دفع آن موردت خطر گردد و از عدم حمی و سیلان رطوبت بغته و اختلا فائیکه در شدت وضعف آنها بهم میرسد تمیز داده میشوند از او را م اغشیه مخاطی و بعلا و قه و گاه که اغلب این مرض هیچ خلل در عمل الت معلول بهم نرسانند بخلاف ورم و گاه نزله همراهی کند با علامتی باشد از مرض بکری و در این صورت هنرال بصورت بسرعت عارض گردد یا آنکه همراهی کند با وجعی شدید یا آنکه رطوبت مترشح مخلوط باشد با خونی سپاه رنگ یا در سلا و ملا حظ گردد و خطوط چند از ماده دیمی و اگر چه تشخیص

از بیم اغلب مشکل است و چون رطوبت لریخ و شفاف بود و مخلوط با آب نکرده
تمیز داده میشود از بیم که سفید و کد و است و آب مخلوط میکرد و بعد سر سود میشود
ولی چون رطوبت متشخصه قوام غطای و رنگ بیم را داشته باشد در تشخیص اسکا
کلی بهم میرسد و برای تمیز دادن او از ترپین و کیمیا استعمال شده است ولی ما
آنکه سابق ذکر کردیم اگر رطوبت بعضی از غلظتها متساوی الاجز است و کبول
ندارد مانند غلظت رحم ولی در باریک کلوهای است مانند کلوهای بیم اگر چه بعدی
کمتر از کیمیا بنی تا کنون چیزی قابل بدست نیامده و بقول بود فقط از ملاحظه متبوی
تمیز داده که غلظت خالص است با مخلوط است با بیم که چنانچه اگر غلظتی لریخ بود و بدون
آنکه رقیق مانند سرم باشد چون مخلوط با آب نماید رنگ اب سفید مایل بنری
گردد و سرای زبانه از حالت طبیعی کبول مشاهده میکنم معلوم است که غلظتها
تشنجی مختلف میشود از شدت و ضعف دوام و از چسبندگی مقدار است
منشعبه و از محل و ترکیب آنها و این اراضی عارضی کردند در اشخاص ملغاب که در
اطفال و زنان و کسانیکه بواسطه اراضی دیگر خفیف شده باشند و کسانیکه در
ضرورت به صراعات حفظ نکنند یا با غلظت به زنده کاری نمایند و محل این اراضی
مختلف میشود باختلاف اسنان چنانچه در اطفال اغلب غلظت پنی و چشم و امعا قبل
گردد و در اشخاص بزرگ معدی مبتلی شود و شیوخ بزرگه مثانه و قصبه الی به مبتلی
گردد و زنان بخصوص بزرگه رحم و مهبل و چون مرض همی نمیکند با جمعی در
لوزم معالجه ضد ورم و برای دفع او اغلب ملینات و ملعبات کافی است ولی چون
دوای بهم رساند مستعمل است او بهر حد بک و مر و مقویات و معطرات
ملسانات و صمغ سقری و شستن موضع و بخور دادن و گاه لازم باشد شویحات
که بروی الت معمول دارند

عبارت

نزله ریه عبارتست از خروج کردن مقدار زیادی از نفث غلظتی بزرگ و لریخ
و متمد و زجاجی و مخلوط با جابجای هوا و این زیادتی ترشح حاصل میشود بدو و
در غلظت ریه و انبرض منقسم میکرد و مجاد و من من
ترشح ریه بسیار نادر است که بتوان حالت قصبه را در انبرض امتحان نمود
و لکن بدانست که در انبرض غلظت ریه قدس متعجب و نرم میشود و در بعضی مواضع
میکرد و میگوید که انبرض میانه امتلاء مائی و امتلاء دمست
علامات اولاد صورت حادی ابتلای مرضی است که عسر النفس
عارض شد احساس خفگی نموده شود و سرفه خشکی که با عسرت زیاد و انقباض اب
و تشنج عارض گردد و صدای قریح بحالت طبیعی است و طای از سمع را گاه با صد و گاه
مرطوب در جمیع سینه شنید شود لهذا طوی نمیکشد که وجه بگوید و او را غرق
بزرگ کردند و سیمانغبه یافته و اطواف سرد شد و نبض صغیر غیر منتظم
عرق سردی بر بدن بشیند و در اراضی عارضی گردد و مرض ضعف زیاد میسازد
و گاه غشی کند و اغلب در وقتی که کو با مرضی میخواهد بجا لکت رسد مقدار ترش
از نفث سفید بزرگ و شفاف و متمد و لریخ و مخلوط با هوا شبیه بسفید غم
مریخ مخلوط را با باند هان خارج شود و این رطوبت با بواسطه حمله های سرفه
خارج شود و باید و سرفه بمقدار بکوبای مینماید و باشد که تا چند ساعت
و گاه تا یک و نر رطوبت علی الاقصا خارج گردد و بدیهه شده است که از یک تا چهار
کبایو کم از این رطوبت خارج گشته و با وجود این علامات خطر حرجی عارض نگردد
و اغلب بپول از خارج شدن رطوبت شفا حاصل شود و بعضی اوقات تا دو
روز در الجمله تنگی در سینه و کمی سرفه و راهای خشک باقی مینماید و احساس
حرارت در کلو میشود و اشتها اگر میکرد و در بعضی بسیار خسته میماند و بیخوابی

روی میدهد و این مرض بسیار عود میکند و عود اغلب بعد از خپد ماه و یا چند سال است
و معلوم است که اگر فاصلی که هانز یک بود و مقدار رطوبت مخرجی زیاد و هزال
عارضی کشته و علامات حقیقی بروز کند ولی این اشتها بسیار زیاد است و میتوان
گفت که این مرض منتهی میشود و اولاً بصورت بدون نقاهت و ثانیاً اکثر است و ثانیاً بمرکز
بواسطه اختناق در هنگامیکه مقدار رطوبت مخرجی بجای باشد که جمیع مجاری
قصبه را محلول کند ثانیاً علامات مرض در هنگام از زمان اینصورت که بیشتر از
صورت حاد است اغلب منتهی میگردد و از ورم حاد پامین مخاطه پره که در ورم
مزمین مخاطه پره اگر چه ورم رفع گردد ولی رطوبت مانند آنکه در هنگام ورم
بود تشعشع کند و همراهی کند با سرفه و عسر النفس و راههای رطب با بابس و مریض
کسل ماند و در همین مرض است که دیکه میشود در هنگام شب یا بعد از غذا و طبعی
بیاض البیض یا حسن خفکی و عسر النفس و سرفه خارج میگردد و اما نادراست که
علامات بطور آنکه در صورت حادی مدتی که در شدت نماید اگر چه فاصله
بسیار کم است که در شبانه روز و دفعه عارض شود و اغلب را نیت یک
یا دو کیلو گرم رطوبت خارج شود و با وجود اخراج این مقدار زیاد رطوبت
مریض تا مدتی سالم بماند ولی چون طولی در مرض بهم رسد سوء القیه عارض
گردد که لون زرد و یا خنده و قوی و کشته و عسر النفس عارض گشته و هزال بوق
گرفته اشتها تمام شود عمل هضم مختل گردد و بواسطه حرقی مریض بجملاکت رسد
و گاه مرکب روی دهد بواسطه کثرت رطوبت مخرجی و گاه بواسطه مرضی دیگر
مانند ذات الوبه و غیره و دام این مرض بسیار طولی و غیر معین است
تشخیص نزله حاد و مزمین او ورم مخاطه پره حاد میشود و بواسطه
او بغتة ثانیاً بواسطه رطوبت مخرجی که بیاض البیض است ثالثاً بواسطه خروج
رطوبت

رطوبت بمقدار زیاد در مدت قبل از ابتعا بواسطه رفع مرض دفعه و این مرض بسیار است و جمله
با استم مریض با بواسطه اغلب ایند و مریض را از هم تمیز نمایند و این خواهیم دید که حمله
ایند و مریض از هم فرق دارند و رطوبت مخرجی در استم بسیار کم و بندرت بیاض البیض
و از مقدار مرض و علامات عمومی باسانی نزله مزمین را از سال مشخص میتوان کرد
تقدمه المعرفه اینجا که مرض حاد بود خطری ندارد مگر آنکه مقدار رطوبت مخرجی زیاد
بود یا آنکه مواد با شکال آکنده شود لهذا موریث اختناق گردد و چون مریض مزمین بود خط
زیاد است زیرا که هیچوقت بکلی رفع نخواهد شد
اسباب عارض گردد در سن کمال و شیخوخت و در اشخاص کثیر التمنی بلغمی
مزاج و آنها که حرکت کوبینما باند مخصوص در صاحبان نفوس مزمین و از اسباب محصوله
اثر برودت و رطوبت و مصروفات نفسانی و سوء هضم و بخصوص عارض شود پس از ورم
مزمین مخاطه پره
علاج در صورت حاد چون مریض بطوری عارض گردد که بیم اختناق بود یا
معالجات قویه معمول داشت و برای این بعضی از مصنفین فصد از مریض مینمایند و
چون عارض مریض اغلب را اشخاص ضعیف المزاج است و هم در مدت حمله نبض
میشود لهذا ما فصد را جائز نمیدانیم مگر در صورتیکه مریض جوان و نبض قوی بود
و در سائر مواضع فصد هادی به جابراست یعنی در ابتدا مقدار کمی خون بکشد اگر منفعتی
حاصل شد فصد را مکرر کنند و الا فلا و عموماً مقی خصوصاً اسپکا کوآنا بمقدار
دجانه بر فصد ادرک چون از اثر تحقق و قی حرکت و فشار بر پره و اثر اید مواد
مخرجی زدود کنند شده بسکونت خارج شود و اینجا که حمله بسیار شد بد بود که مریض
برای لطیف نباشد بهتر است که بیک دفعه سه گند یا یک نخود اینتمی یا شش نخود

ایک کوانا دهند تا از عروق و واسطه‌های مرض منصرف گردد و هم چنین حقیقتی است که او در وقت
 پنج خود سولات و در وقت بایک تاسه خود مطبوخ رسته بنفسه و یا انقبون و ایک کوانا
 انفعند در هر حال جهت رفع مرض باید مصرفات بکار برد و یا بنحیه مستعمل است
 و مدبرات و مفرجات و محرکات جلد به و همین ادویه مستعمل اند در صورتی که از زمان مرض
 در هنگام عروق و در فاصله عملها باید مرض خود را کم نگاه دارد و غذا را که خورده
 خاصه هنگام شب باید اغذیه مقویه ملینه بکار برد و آرام نشیند و حرکت نکند و گاه
 گاهی مسهل خورده و داغ باز دهند و نافع است حمام و بنوشانیدن آبهای معدنی و گوشت
 و خوردن قطران و ساسامات و نفس کشیدن در انجیره قطران و حسن لبه و امثال آنها
 و آنجا که صورت متعجب و رنگ باخته شود ادویه جدیدی و مقویات مانند پوست
 کنه کنه و غیره استعمال نمایند

کاستور در عبارت است از سبلان رطوبت از غشاء مخاط معده و خارج شدن
 او بواسطه این مرض باشد که اصلی یا عرضی بود در صورت اصلی تعبیری در تسبیح مخاط
 غشاء معده ملاحظه نگردد

علامات و مرفعات در این مرض مشاهده اشیا صبیکه در ظاهر بحالت صحت میباشد
 و هیچ علتی ندارند و گاه گاه بواسطه رطوبتی خارج سازند که گاه مائی و گاه لویج
 و باکشی و شفاف مانند پاشن البیض بود و بدین ترتیب با مالح است و مقدار
 رطوبت محرجه از ده متقال تا صد متقال است و این رطوبت خارج گردد از
 صبح قبل از اکل غذا و گاه در میان روز بایک چند ساعت بعد از اکل غذا در انقبون
 اخبر اغلب اوقات غذا در معده بماند و همان رطوبت مذکور خارج شود و در
 اغلب از مرضی این مرض هیچ اختلالی در اعمال و آلات حتی در آلات تغذیه نرسا

و هرگاه

و هرگاه گاهی در هر ای که با کسالت و وجع معده یا آنکه در بعضی از مرضی روزی قبل یا بعد
 از عروق و غشیه اشتها اگر باقی میگذرد یا آنکه این دو روزی عمل هضم اختلال بهم میرساند
 یا عسرت پیدا میکند اتفاقاً میسرند نادیده که اغلب این اختلالی در اعمال بهم
 نمیرساند و بعد از آن مرضی جمیع حالات صحت را دارد و فاصله مابین دو وقایع بسیار
 مختلف است که گاه چند ماه میگذرد و بدین آنکه قی عارض شود و گاه عروق و

هفته چند بار است و گاه هر روز و نه مخصوص هنگام صبح
 دوام و اینها می‌باشد اگر چه این مرض میتواند رفع گردد ولی عموماً و امش طویل است و اغلب
 مزاجی گردد از این بیماری معلوم میگردد که این زیاد سیلان مخاط بعد از چند روزی
 در رگ غده مخاطی این رگ جمیع غشاء که در دایره حجم هر الی بسته بریادی عمل
 او است ولی هرگز مانند آنکه بعضی از مصنفین نوشته اند این مرض صورت بر و سراسر
 معده نمیگردد و هرگاه بعضی از اوقات سرطان ظاهر شد است بعد از آنکه بعضی
 چندی بود که رطوبت مخاطی نفی خارج می‌شود در آن اشیا صبیکه و ترکیب بوده

با آنکه سبلان رطوبت مخاطی اثر سرطان و عرضی را بوده است
 تشخیص میان غنوم که گاه این مرض عرضی است و هیچ مرضی بقدر است که در سراسر
 معده صورت این مرض نمی‌گیرد و اغلب کاستور علامت اولی خواهد بود که از آن
 مرض مذکور بروز خواهد کرد و حدس بوجود سرطان زده میشود در وقتیکه
 این مرض همراهی کند با سوء هضم و کلی اشتها ملایم و هزال بدن و زردی بیشتر چرا که
 همیشه از اینها در صورت اصلی بودن مرض وجود ندارد مگر هزال در صورتی
 رطوبت محرجه بسیار بود در این صورت هم از سایر علامات میتوان تشخیص
 و عرضی بودن مرض را داد و هم بسیار نادیده است که رطوبت محرجه هزال ایجاد
 تقدیر المعرفه اگر چه این مرض مهلك نیست اما خیلی مودعی و عسر العلاج

اسباب اگر چه اسباب این مرض درست معین نشده است ولی چنان می نماید که عرقش در مردان پیش از زنان است و در اشتیاق همین و کسانی که غذا های ادویه دار و کوشته های و زرد و صوفه های ترش و اشربه الکلی بیشتر می نوشند و با بر وزن نماید و از اینجاست مردانی که شب فراط و شراب و غذا کرده اند غالباً صبح مقدار کمی از رطوبت بیاض البیضی از کلویشان خارج شود و غالباً اشتیاقی که در آن می کنند صبحها لب لب از پدید می آید و هم از این رطوبت می نمایند معلوم است که در اینجاست از رطوبت بواسطه تحریک غشاء مخاط است و گاه سبب اختلال عمل عصبی چنانکه همراهی کند با بعضی امراض عصبانی معده

علاج مرض موافق اسباب مختلفه مذکور معلوم میشود که اغلب بواسطه اغذیه و اشربه موافق رفع مرض گردد و هم باید حالت شخص مرض را ملاحظه نمود زیرا که بعضی اشتیاق هستند که بواسطه استعداد مخصوصی که دارند از خوردن بعضی غذای مبتلای این مرض گردند و از اکل بعضی دیگر شفا یابند و عموماً مرضی شفا یابند آن مقویات معده که غذای حیوانی خورند یا کمالی شراب و دای جوش و بعد از غذا قند های یا قهوه بنوشند و لازم است که در این مرض از لبنی در مزاج بود که اغلب رفع مرض شود و استعمال مسهل و هم چنین نافع است ادویه تلخ و مقوی خاصه عصاره کبکبا و کسبک تلخ و املاح حدیدی و استمخام در آب ریخته و دلخمشک با ادویه معطره و همراهی کند با وجع عصبانی افیون دهند مخصوص تریاق بجهت قوی مقوی ترش بعضی از مرضی شفا یابند از نوشیدن آبهای کوکودی و بلسانات مانند کبکبا و طریاق و غیره

اسهال ساده مجاری امعاء از جمیع آلات بدن بیشتر مبتلای سبلان رطوبت میگردند و این استعداد بواسطه وسعت سطح امعاء و لطیعت عمل آنها و نسبت

مجهولی

مجهولی آنهاست با جلد

علامات مرض اسهال شناخته میشود بواسطه دفع نمودن رطوبتی زرد رنگ و مخاطی بقدر زیاد یا کم و اغلباً و قاعده قولنج و وجع و گاه قبل از دفع بواسطه در شکم هم رسد و این بان حلت و شدت که در سردی غشای مخاط امعاء احساس میگردد و هم چنین همراهی نمیکند ابتدا با معصی که در ذوق سناط را میزند و میزد و هم همراهی نمیکند با معی و عمل تغذیه گاه بحالت طبیعی است و گاه اشتها کم شده عطش شدید عارض گردد و شکم منتفخ شده و قراقرغ نماید و یکی از علامات مخصوصه این مرض بعد از خوردن و بر وزن ضعف است که شدت و خفت او بسته بنیاد و یکی اسهال است که همراهی کند با اندک هزال و باشد که رفتن مرض حاد یا منهن بود یعنی آنکه با در یک چند روز دفع گردد یا آنکه هفته چند بالا اتصال یا بتوالی دوام بهم رساند و عود این مرض بسیار است

تشخیص تمیز داده میشود از ورم امعاء از قنای وجع و جوی و از اینکه اختلال عموماً در عمل تغذیه بهم نمیرسد و هم از تعبیر یافتن عمل تغذیه تمیز داده میشود از اسهالی که بواسطه جرح امعاء یا بنم شدن غشاء مخاطی آنها عارض میگردند تقدیر المعرفه مرضی است حید و خطری ندارد مگر در اطفال و بنی در این صورت خطر او بواسطه اختلالی است که در جرم امعاء بهم میرسد و مرکب با مرض دیگر است اسباب مرض عارض گردد در جمیع انسان بخصوص عارض شود در غریبانیکه تازه وارد شهرهای بزرگ شوند و سرما بکی از اسباب ماثوره در امعاء است چنانچه اغلب ملاحظه گردد در عرض اسهال از سرما خوردن یا با جمیع بدن و مقدار سرما نوشیدن مقدار کمی از آب سرد در وقت عرق داشتن بدن و با پنجه است که دپاک میشود در آنها که بحسب شغل و کسب از جای گرم دفعه بجهای سرد و

وعارضه کردد از سردی غدا و مسکن مرطوب و در اطفال رضيع عارض شود
بواسطه برون آمدن دندان و غداي زياد يا غير کافی

علاج اشربه ملعبه مرکب با قدری قویاک و پوهیز از غداي نامناسب
و چون با پنجاه سرخ نکودد باید با بضات و مقویات استعمال نمود مانند محلول
کاشو و عصا ره و اسانج و مطبوخ کلپو و کسبای تلخ و شراب کهنه و قویاق و دباب
کوچک بود که تر باقی است با سم حکمی و نفوق لوست کند کنه و مستعمل است ^{سویات}
دو پیوست بمقدار و ناسه شغال در مردان و از پنج تا سی نخود در اطفال قبل
از غدا و چون با استعمال او و بهر ماکوره دفع مرض نشد استعمال مسهل نمک یا مسهل تلخ
مانند ربوبند دفع شود و هم چنین استعمال بلسات که از تغییر اذن و طوبیت ^{مشرحه}
از غدا مخاط دفع اسهال کند و آنکه سبب روانت غدا و مسکن مرطوب بود سینه
ضربه و بهر تغییر دهند تا دفع شود انجا که سبب اثر سرها باشد لباس پشمین پوشند
و شال پشمی بپندند و یاها را همیشه گرم نگاهدارند و گذشته از همه در جمیع اقسام
اسهال ساده باید عمل جلد را زیاد نمود از پوشاندن لباس و چه از دل خشک با آب انج
معطر و حمام محرک خاصه جمای کورودی

طمت سفید عبارت است از سبلان و طوبیتی سفید از فرج بدون بستی که هیچ
اختلال التي رحم بطور از زمان و بمقدار که مایه انزجار زن گردد
تشریح مرضی علت معینی در زرها نمیکه طمت سفید داشته اند و مرده در اکثر ^{نیال}
تاکنون پیدا شده است بعضی گفته اند که غشاء مخاط بنفیس با قریب میگرد و ولی اغلب ^{لون}
این غشاء باخته و سفید است و نشر طوبیت اغلب از قهیل و عنق رحم است و گاه
از خوف داخلی اندام رحم و بندرت از شیپور
علامات بر دو نوع است موضعی و عمومی اما علامت موضعی از آلات ظاهر ^{الک}
توالد

توالد سبلان میکند و طوبیتی مخاطی سفید مایل بنری با سبز رنگ بی بو این ^{طوبیت}
گاه دقیق و گاه پاض البیضی و شفاف است و باشد که شفافیتش کم و بعضی خطوط ^{رنگ}
رنگ با رمادی یا زردی را و بجمید و باشد که بکل کدر گردد و باشد بهر شریقه ^{رنگ}
و تاکنون بدرستی سبب تغییر لون در این مرطوبت فهمیده نشده است و بعضی ^{علات}
مهرسانند که لون ابی و زردی بواسطه ترکیب مرض است با حالت و رمی ولی تاکنون
چیزی که این مسئله را محقق کند در دست نداریم و مقدار مرطوبت مخزجه مختلف است
بعضی زرها قدری نرمی کرده اند فقط و در بعضی سبلان و طوبیت علی الدوام و بجدا ^{ست}
که لابد نه از مخاطت کردن الک مانند آنکه در طمت گذشته از همه رنگ و صفات
طبیعی و ترکیبی و مقدار مرطوبت طمت سفید مختلف میگردد در همان بگون ان بان ^{تجرب}
هوای رطوبت و بار ^{استعمال} و بعضی از غدا بهر و هوای معیوم و نزد یک شدن هنگام طمت
عموما مورث از زیاد مرطوبت میگردند و در همان وقت مایه پاض البیضی ^{میکرد}
و بعضی زرها احساس میکنند حکم در فرج و ثقلی در شکم اسفل و تمدد و کشیدگی
و گشت له دان و جزا علی و انسی ران و در رگ و محل عجز و چون موضع را ملاحظه
دیده میشود که فرج پر رنگ و باخته و رخو و مهبل چنان نماید که وسیع تر از حالت
طبیعی است و غشاء مخاطی او باخته و یکو و عنق رحم متعرج و ثقیله و هنگام ^{سبلان}
مرطوبت و رحم باز است و جلد فرج و جزا علی تراها بواسطه حدت و طوبیت ^{فرج}
قرمز و گاه مجروح اند و مذکور شک است که این زنان چندان مایل جماع نیستند
و خطی از او نمیزند و بعضی برخلاف مهبل مفرط چا صل کنند ولی این جمله بهیمنی ^{نیست}
و آنها نمیکه ابفقره دامد کور داشته اند در مزاج و حالت مرضیه اتفاق نگرفته ^{اند}
علامات عمومی چون طمت سفید ملتی و دام حاصل کند رنگ زرها باخته ^{گشت}
بدنشان رخو شود قوتشان که گشته بحالت ضعف افتد و اغلب رخیله شوند

از بروز نغمه و اوجاع عصبانی در معده اشتها کم گردد با آنکه اغلب قیات رخ
 میل نخوردن غذا بهم رسانند اما خیلی زود سیر شوند عمل هضم مشکل و بطی گردد
 گاه اشتها مایل باشد به غلبه کول شود مانند ذغال و خاک نفس و دستک شوق
 طبع قلب و صداع عارض گردد و عموما ملحت کم گردد با مسدود و با غیر منتظم شود با
 الاخره مبتلی شوند بخرش جمیع علامات که با کول زهر اخی دارند
 رتقا در و ام علامات مذکور فوق ملاحظه میکنند بلجات مختلفه و اغلب از مرضی
 ولیکن آنها متصف میکنند بخصوص حالت اذقان مرض را که در حقیقت حالت عمومی
 مرض است و بعضی اوقات بخصوص اینجا که ابتدای مرض بخت و دفعی بود بعضی علامات
 بروز کنند که دلیل اند بر جدت یا تحریک او چنانچه حرکه فرج گاه مجدی شود که تحمل آن
 نمود سوزش در رادر کردن بهر مد و حتی حرارت در مهبیل پیدا شود و هم چنین
 احساس شود و جع در شکم زپین یا شتر اسهف و در ابتدا رطوبت مترشح و دقیق و
 بعد از چند روز قوای بهرسانه زرد پاکد مرکب در بالاخره بعد از چند و یکروز طوب
 خشک شود با مبدل با زمان زرد و دام مرض مختلف است که گاه چند ماه و گاه چند
 و گاه مادام العمر است و اینصورت اخیر سبلان و طوبت که علی الذوام است اختلافات بسیار
 بهم میرساند از جنسیت مقدار لون و بود ثقل که سبب این تغیرات را هیچ چیزی بر
 شرایط حفظ صحت نمیتوان بدست آورد باشد که بروز مرض بطور زود بود و هم
 دیر شده است که چند سالی بدل طبع گردد
 امراض خفیه و انتفا شفا انتهای عمومی این مرض است و حاصل میشود اغلب شفا بخودی
 خود که طی طبع سفید و خزان دفع میگرد بعد از پیداشدن طبع و در زمان بعد از آن
 وضع حمل و هم مذکور شده است که طبع سفید دفع گشته است پس از عرض
 اسهال و عرق و افر و سبلان بصاق و عرق و عرض مرضی حاد اگر چه نوشته شده است
 که این مرض

که این مرض متعین گردد گاه بهلاکت ولی تاکنون بملاحظه معاصرین چنین انتهای دیده نشده
 و بیشتر که آنها اینکه مذکور نموده اند مرکب بوده است با مرض التي که غیر مشهور است و
 گفته اند از طبع سفید منتج میگردد بعضی امراض در مهبیل و رحم مخصوص افتادن این
 دوات بسیار است و سرطان اما مرض ولی ممکن و ثانی محال است اولی اصل ولی هم چنین
 که این مرض در بعضی از زنان مورث عقبی گردد و اگر هم حمل بود از طفل را شی طبع
 و خنازوبی و اخی گردد ولی هیچ يك از این اعتقادات بنا و پایه ندارد و اگر چنانچه این
 مذکور است در صاحبان طبع سفید بیشتر ملاحظه میگردند باید حمل بود خراج اصلی و
 القیه مرض غود که طبع سفید هم یکی از آنهاست تاکنون معلوم نشده است که از برای
 مردی که با این زهرها جماع کنند ضرری داشته باشد و مبتلی بسوزنك گردند اگر چه
 حل این مسئله از برای علم خیلی خوب است ولی از برای حاد واده حل نشدن بهتر است
 بجهت اینکه حمل دهند عرض سوزنك و ابطن سفید و هرگاه جریان طبع سفید و افی
 و مدتی طول کشیده باشد که طبیعت بکنوع عادی مان سبلان داشته باشد
 کو با دفع او بخت خالی از ضرر نباشد
 تشخیص امراض زیاد می هستند چه جاد و چه من من که عارض گردد و در
 فرج و مهبیل و رحم و مورث سبلان و طوبتی سفید با زهر پاسبین بمقدار کم با زیاد
 کو دند ولی تمیز داده شوند از طبع سفید ساده بواسطه رفتار و علامات مخصوص ^{سطح} جدا
 لمس با انگشت و نظر باین مهبیل ولیکن تمیز دادن طبع سفید از جریان رطوبت سوزنكي
 کار نیست بسیار مشکل و معالج لابد به تمیز ایند و مرض از هم بجان حدس و احتمال
 چنانچه در جهت سوزنك معصیل ذکر خواهیم نمود
 مقدمه المعرفة اگر چه مهلك نیست ولی بسیار موزی و اذیت کننده است
 اسباب و در بلاد سرد و تو بیشتر از بلدان گرم بهر سید در شهرهای بزرگ بیشتر

از دهات است و غذای بلغمی و دمای و فربه بیشتر از آن غریب مبتلی کردند و هم از اسباب مستعلا
و محصوره اند از نه و فشار بر شکم بواسطه گرمی و افراط غذا های ثلاثیتی و کمی حرکت و
غم انگیز و مسکن و رجا های پست و مرطوب و افراط در جماع و نمک یافتن شئی خارجی و
مهل و مقعد و بواسطه خلطی و اختلال الحمت و وضع حمل مکرر بخصوص وضع حملها
غیر وقت و قبل از موعد بالاخره بعضی اسباب هستند که مخصوصند با افراد و شخص
طبیتهای سفید بکه عارض میگردند در بعضی از زنان پس از خوردن نوعی از اغذیه
یا شیر به مانند چای و قهوه و شیر و بعضی از صدفها و زرخ و بعضی از میوهها یا سبزی
و هم نوشیدن آب بعضی از حیثیها

علاج ادویه زیاد و در این مرض استعمال نموده اند ولی ما ذکر نمیکیم مگر عسل
و مؤثرترین آنها را اینجا که عرض مرض غلبه و بطور حاد بود باید راحت نمود و استیقام در راه
ناتر نمود و زردی با چیزهای ملعب کنند و غذاهای ساده و کم خورند و پرهیز از آنجا که مرض
مرض بود باید تشخیص نمود که ابتدای عرض شریجه و اسطه بوده است تا رفع آن کنند
و چون سبب نامعلوم باشد یا آنکه با وجود رفع سبب طبع سفید باقی بماند معالجه مرض
نمود چنانچه اگر مرضه قوی و دعوی مزاج باشد فصد کنند و اگر به حاضره دهند
و مسهل بامید رود معرق بکار برند و در ابتدا اما له از ادویه ملعبه و ملین کنند و بعد
ادویه قابضه بکار برند که معطر هم باشد مانند تن و مطبوخ خطبایا و بزرگ کردن
و ماند و استات و دویلب و کات کبود و سولفات و در نیک و باید دانست که این
اما لها را بطوری باید نمود که از مهبل تجاوز نکند و داخل رحم نشود بلکه باشد
که رطوبت اما له شک از قوت تجاوز کرده بصفاق شود و مرث و نرم او شود و چون
از اما له حاصلی نماند با قلم سنگ جهنم بسوزانند یا با محلول سنگ جهنم اما له کنند
انجا که مرض همراهی کند با ضعف دائمی ادویه تلخ و مقویات بکار برند مانند کنگر
و خطبایا

و خطبایا و اما له حاد بدی و ابجای معدنی و مرصن باید مسکن کنند و اطباق خشک که هوا
خود خارج و داخل شود و سرد بافتاب باشد و روزها در میان افتاب پیاده حرکت کنند
غذاهای مقوی خورد و بد نژاد کنند و لباس پشمین بپوشانند
نژله مثانه اغلب از مصنفین بمانند که نژله مثانه عبارت از یک نوع و و نیست که
محلول باشد بغضای داخلی و با پنجه او را نامیدند و نرم مخاطی مثانه و بعضی دیگر
او را می نامند نژله مثانه بواسطه طبیعت رطوبت منر شکر و لیکن این دو مرض که بوسیله
یکی از علامات که در هر دو وجود دارد و عبارت است از از سراد غلیظ و باکترش
که با هم مشتبه شده اند باید در حین حیات از یکدیگر تمیز داده شود چنانچه در نژله
نغش از هم متفاوتند چنانچه در نرم مخاط مثانه جدا را و قومن با سپاه نژله و حکم
خفیم و قابل الاضمحلال و نرم و مجروح و غیره بک می شود و در نژله مثانه برخلاف
تغیری در رنج آلات بهم نمی رسد مگر آنکه گاهی فضا پیش کو چکتر میگردد و اغلب با
نژله مخاط باخته و بندرت خفیم با نژله شود و نژله مثانه بطور مرد کور منوط
بهمی مرض حاد باخر من الت نباشد مرضی است بسیار نادر
علامات و رفتار عرض مرض گاه اصلی و گاه عرضی که نتیجه و نرم مخاط مثانه است
و باین واسطه است که این دو مرض مدتی با هم مشتبه شده بودند چون نژله مثانه
اغلب مرضی است عرضی لهذا بندرت علامات تحریک در موضع پاد در عود بد
مشاهده شود هر گاه وجهی در نژله شکم پاد شرح حاصل شود بسیار مهم و اغلب
حسن نقل است نه و جمع و مرصن او را نباید نماید و نژله در و بیج و در حالت
خروج چنان می نماید که او را در حالت طبیعی است قدری ناصاف و بد و نژله
و اغلب الکلی است و بسیار بوی مویناک از او متصاعد شود و چون سر کثرت
منقسم شود بد و طبقه طبقه رقیق گردد و بالا می ایستد و طبقه خفیم که در تحت

قدری غلیظ و بالزشر و لرخ و با تمد است و گاه سفید و گاه شفاف و اغلب شپسته
به بياض البیض و مقدار او مختلف است که در دوزان يك تا صد مثقال میتواند
خارج شود و هم مقدار این جن غلیظ بیشتر شود بواسطه بعضی اسباب و مانند
در هوای بار و در طریقه خشک شدن عرق و اثر سرما بیشتر شود و چون تحریکی با ورم
با ورم جزئی در حالت بجمید بخلاف مقدار او که در دوزان مایل به سردی شود
و احتیاج باد را بیشتر کرد و جمع در شکم باشد که از این علامت تحریک شقی
در ملت و دام مرض چندین بار مشهود شوند و چون مرض ساله و عرق غلیظ در
اشخاص قوی بود اثری در عمل تغذیه نکند که اشتها و هضم بحالت طبیعی باقی ماند
و چون مقدار رطوبت متر شمع زیاد شود علاماتی که در جمیع ترشحات فوق
بروز نماید عارض شوند و هم گفته اند که شدت ترشح رطوبت مورث هلاکت کرد
و این احتمالی است بسیار نادر و دام مرض نامعین است گاه بالمره رفع شود و در
کرم و توقف در بلاد کرم سبب برای عود کردن در فضل سرو و حجت ببلد خود
تقدیر المعرفه بالنسبه بوزن غلط متان و در مبحث جید زیرا که ورم غلیظ
متان مرضی است هم خطر و هم پردام و بسیار که مایه اختلال عمل نوالد و تاسل
اسباب عارض که در اغلب ریشوخ و اغلب سببیکه مایه عروق
مرض عروق متان که در سبب مرض خواهند بود بخصوص سرما و رطوبت هوا
استعداد بیشتر میشود پس از آنکه چندین بار شخص مبتلا بوزن متان که در بلاد
مطلق بواسطه وجود سنک تحریک شده باشد که پس از این عود سنک
مستعد که در بعضی امراض اینجا که مرض منتهی کرد و از وجود سنک در متان
اغلب سنک بسیار کوچک است برای آنکه اگر بزرگ بود مورث ورم
علاج چون شناخته شود که وجود ورم سبب سنک نیست
مکانی

مکانی خشک و خوش هوا مسکن کنند و اگر آب و هوای بلد موافق نباشد ببلد دیگر
روند و بدل از اجامه بشین بپوشند و تحریک عرق نمایند و غذای خوب بخورند و
باید که مرضی را در راه درمان نگاه ندارد که متسع شود و اگر منعی برای خروج ادران
باشد چندین دفعه مبل زنند و قیحه که از حفظ صحت رفع مرض نشده استعمال نمایند
ادویه بلسانی مانند بلسان کپا هو و تلو و پرو و مکی و قطرون و طریاقین و چون
معده قبول طریاقین نکند حقیقه کنند و هم مستعمل است ذرق از اجای که کوری
و معدنی و ضروری و استحمام در آب های معدنی و چون هیچ يك اثر نکند سطح
مخاط قدری بسوزانند
نوع سیم در ترشحات مخصوصه بعضی ترشحات مخصوصی که مترشح میشوند از آلات
انسانی باشد که چریان آنها را زیاد از حالت طبیعی کرد و مورث امراض چندی کرد
و این امراض مختلف شوند از حیثیت طبیعت رطوبت و مقدار او و بابت ریح و عیال
خواهیم که زیاد شدن عرق و چربی و براق و صفرا و بول و شیر و منی و انسلا
دمعه چربی که نمیکند زیرا که زیاد شدن اشک بواسطه ورم جفن یا مقبله
و با از غم و ضعف زیاد و هم هیچوقت سیلان دمعه جدی نخواهد بود که قوت
ضعف خارج و هزال کرد و در این که نمیکند که ترش اشک بصورت همیشه دلیل بر
زیاد شدن ترشح اشک و غالب سبب بر کشتن جفن یا انسداد مجرای معده
و چون از زیاد شدن بول گفتگو نمائیم در این فصل بیان خود را محدود خواهیم
به پلو پوری و بولی پوری ساده و از پلو پوری گفتگو خواهیم که در مکرر از این
دویم در مبحث امراض مخصوصه زیرا که شناسائی و با پلو پوری نبوده و از پلو پوری
او را است بلکه بواسطه پیدا شدن قند است در بول
زیاد شدن عرق بفرایند ریزد که نمیکند ما گفتگو نمیکند از آن عرقهای که باز پادی که

علامت امراض چندی میباشد مانند حمای غشی و نوبه و سلب بره و جذب برهم و غیرها
 بلکه منظور ما از گفتگوی انحرافها نیست که بسته به هیچ اختلالی نباشند و خود باطل
 مرضی بود که مبدأ علایم مذکور کرد و عرق مرضی شود و در صورتی که مقدارش زیاد شود
 با اختلالی در ترکیب کیفیتش هم رسد و عرقهای مرضی اغلب سبیلان شان از جمیع
 بدن است و باشد که از یک سمت بود و بندرت محدود در یک عضو کرد و مانند
 و سر و ایست و دست و آلات قناسل و کف پاپس عرق مرضی شناخته میشود بواسطه
 نشر زیاد از عرق بالا اتصال یا با فاصله اعم از آنکه این فاصله منتظم باشد یا غیر
 منتظم مانند نوبه و چون عرق در جمیع بدن بود و اغلب بر فزایش در ناظمین و
 اشتیاق ضعیف الینیه است و بر فزایش با بلاجهت است ولی اغلب بر فزایش در
 کرم شدن بدن از راه رفتن و لباس زیاد و کرم پوشیدن بدن و حرارت مضطرب
 و بعد از غل و جمیع اسبابیکه در حالت طبیعی مورت زیاد شدن عرق کرد
 فقط در اینجا اثرشان بیشتر خواهد بود و اغلب اوقات این عرق مرضی تش
 و بوی او را با عفونت مخصوصی بمرساند مانند عفونتی که از عرق متعفن
 زهر بغل و با استنشام میشود و طعم عرق با تفرست با تلخ یا شیرین یا نمکی است و
 لون او بابدون تغیر است یا زرد یا سبز یا سپاه یا آبی است و هر آری در فزایش
 شود قوامش با طبیعی بالبح است و باشد که حادی باشد یکی از تشیحات طبیعی
 مانند صفرا و اوره و هم گفته اند که بعضی از اشهر پس از نوشیدن و رسیدن
 از جلد میتوانند خارج شوند بدون اینکه تغیری در آنها حاصل شده باشد
 ولی این حالت بسیار نادر است و هرگاه عرق مرضی عمومی و مقدارش زیاد
 بود مورت قنای قوی و هنرال و سایر علای که از تشیحات زیاد بهم میرسد
 کرد و اینجا که موضعی تغیری و در حوصله قطع از جلد بهم میرسد و اغلب تش
 منتفع

منتفع و سفید و غصون و اسکرود مانند آنکه مدق در آب کرم مانده باشد و این
 مرض را غلب طویلازی است و پیل زملتی نامعین کم شود و تبکی بحالت طبیعی
 اگر عرق زیاد مورت هزال کرد و ولی بندرت مورت عرق محلی شوق و از
 انحراف در یک طرف اگر بغتة مسدود شود پاسد ش کنند مورت بعضی امراض مانند
 الجذب و جمع مفاصل و اوجاع عصبانی کرد
 علاج باید رفع نمود سبب او را لهذا مریض را در محل مرضی حای دهند و
 لباس گرم بپوشانند و در روی توشک کاهی مامون او را بخوابانند و استیلام
 ماء فاتق با آب معدنی یا کرمی یا آب دریا نمایند و او به مستقر غرض
 و معده و غیرها بکار بندد اگر مزاج تقاضا کند او به مقتوی دهد و نافع است
 حریمات معدنی و استات و پالم و غار یقون و بیض بخوانند عرق ابله و یا بوا
 زهری که میدهند لازم العلاج است و باید جوهر را بخ و کشش ناک پوشند و روی
 یک باد و بار پاها را در آبهای معدنی سرد بشویند و چون انسداد عرق با مورت
 علنی گردد و با او را رجعت دهند از کرم نگاه داشتن بواسطه جوهر را بشی
 و بستن شمع یا آنکه میتوانند غاشق کوچکی که پدید آید را در او موقال را باد و غلای
 اهاک ایند بده داخل کنند در جوهر آب پوشیده شب بپایانند
 سمن مفرط عبارت است از جمع شدن چربی بحدیکه مورت عسرت اجزای
 بعضی از اعمال گردد و این سمن مرضی با موضعی است و با عمومی قسم اول که در
 بد شکلی و بد هبیتی است از جمله امراض شمرده نمیشود و بخصوص عارض میگردد
 در جلد ریشم و سرخ و مردان بعد از سی و پنج سالگی و در زنانی که بچه زیاد
 کرده باشند و این جمع شدن چربی در ریشم نادر است که اختلالی در عمل هضم

معدن
نور

اورد و اغلب مانع میشود و مشکل میگوید انداختن بدن را بقدام و وقتیکه مرض
عمومی باشد حجم بدن زیاد گردد و باشد که از پنجاه تا صد و سیمن و وزن بهم رساند
و چیزی که در اشخاص سمن غیر مفراط تقریباً یک ستم و وزن بدن است باشد که نسبتش
با وزن جمیع بدن نصف یاد و ثلث و یا چهار خمس گردد و بدن در این وقت حجم
بسیار هم رساند و آلات مختلفه بدن از شکل طبیعی خارج گردد و این اشخاص را
حرکت میکنند و یک رفتار مخصوصی بهم رسانند بواسطه اشکالی که از منبسط
نمودن و مخصوص منقبض نمودن مفاصل بهم رسانند و اغلب آنها باندل حرکت
ضیق نفس بهم رسانند و غرق غرق شوند و قلب و ریه و پیش افتد و بعضی کور غذا
و برخی بخلاف زیاد خورند و بعد از آن غذا خون میل بدماغ کند و میل بخون
عارض گردد و میل بجاع کم شود و زنان مبتلای باین مرض اغلب عقم و طششان
بقاعله شود و بخطا ذکر کرده بودند که عقل ایشان کم میشود و بپراکند و رخ
معاصرین بما می نمایند که اغلب اشخاص بزرگ که کادهای مفید و بزرگ کرده
اند سمن بوده اند و اغلب بن اشتیاس بمرگ میرسند بواسطه میل دم بدماغ
و اقسام سکنه احتشائی و بعضی بمرگ میرسند بواسطه مرض قلبی و نف
دماغی و هم گفته اند که امراض حاده در اشخاص مورث هلاکت است
تخصیص از ضلالت محم و نمایند انوا نکشت بعد از فشا بسهمی لبتین
داده میشود از استسقای لحمی
نقد المعرفه با خطرات است بواسطه عسرت حرکات و اشکال علاج و چون
در ابتدای جوانی بزرگند امید ذنکافی زیاد مقطوع میگوید و خطراتش در
اطفال کمتر است زیرا که اغلب چون بزرگ شوند دفع این سمن گردد

مرض

اسباب مرضی است اغلب موروثی و نادر نیست که ابتدای پرفزون طیف
بود و عموماً بعد از سی سالگی بزرگند و بعد از چهل اشتداد باید و غالب عارض
گردد در اشخاص پیکار و حرکت و آنان که اعذبه دارند میخورند و چنانکه اکل مواد
و هوان چیزهایی که کربن زیاد دارند املا میکنند در جمع شدن چربی و از آنجمله
مذکوری شد معلوم میگوید که جواب و از مرض اغلب در صاحبان مکنت است و آنها
دهات مبتلای باین بزرگند مگر کدخدایان صاحب دولت و اغلب هالی و قریه
زیرا که حرکت میکنند و بیشتر عارض شود در ملاها و قصایم برای آنکه کوششها
چرخ خورند و کمتر حرکت کنند و هم عارض شود در صاحبان منصبان پیاده
بخصوص در سربازان که است و مستعد میکنند این مرض را به هوای سرد و تو که در
هلاکت و انگلستان و مصر و ایالتا بیشتر از سایر ممالک ارد پاست و در ایران بوی
باشیهای مازندران اغلب صاحبان مرض اند و اختکی و بپیدن بویکی از الحواف
نیز از اسباب مستعد است
علاج چون ظاهر گردد که شخص مستعد باین مرض است مقدار غذا را کم کنند
و هم از اعذبه منتهی نمایند آنها را که مواد غاذیه ایشان کم است مانند سبزی آلات و بعد
امکان پیاده راه دهند و کم بخوابند و مستغرق در محول دارند بخصوص معرفت
و مهلات و مبهبات و در عوام البنا بس معمول و مصطلح است خوردن سرکه و لی و علا
آنکه هیچ اثری ندارد و استعمال زیاد او خالی از ضرر نیست و آنجا که مرض موضعی
بفشارد فحش کنند
زیاد شدن ترشح بزاق زیاد شدن ترشح بزاق نامیده شده است با سم سیالوره و بنیال
و سالیو اسبون بقیالیم آنها قی است که هم می کنند اغلب امراض واقع در دهان
بخصوص اورام و آن و رمی که منتهی میگردان آن ترش و هم می کنند با ورم

و منسوب است به اسباب و در اشخاص

زبان و لثه و پیرون املد دندان و قرصه دندان و عظام فکین را و هم چنین هر ماهی میکند
 با کوزه صورت و اوجاع عصبانی زوج پنجم و در کوزه فشاری که در رعد جانی
 داده میشود و در اوجاع عصبانی بواسطه غریبی که در اعصاب پیکر میشود و جوع
 میکند و کوفت ابروی و با ماضی که سبب آن میشود و در اینچنان بیان نمیکند مگر آن
 قسمی را که با هیچ علتی همراهی و بسبب آن نباشد باشد و اگر چه هرگاه این مرض همراهی نکند با علتی
 معین نادر است که با اصالة مرضی باشد و اغلب همراهی کند با علتی قریب یا بعد
 چنانچه اغلب بدیهه میشود در حجاب متصل و نواب و در بعضی علل عصبانی مانند اختلال
 و هم و در انسداد و اختلال لحت و در ماههای اول حمل و امراض غده لوز العنق
 علامت قرار دارد و ام این مرض شناخته میشود بواسطه جریان مدامی رطوبتی بزرگ و قریق و
 گاه محلول با مخاط در دهان این رطوبت که عموماً بی طعم و بی بوست و بعضی اوقات طعمی
 عفص و بوی متعفن به سرساند و این اندک باد براق قدری بلع میشود و قدری و بکران
 دهان خارج میگردد و گاه رطوبت بجدی زیاد کرد که بدون اختیار از کنار لجه و نریخ
 جویان نماید بخصوص این حالت مشاهده کرد در هنگام نوم دهان خود را میبندد و در
 داخل معده کرد و چون مفکد رطوبت زیاد کرد و حلق را پیکند و گاه هم قدری داخل
 کرد و حالت اختلالی به سرساند که شخصی از خواب بیدار کند و با وجود این از بیداری
 تهیج و جوعی در غلظت براق بهم نرسد و غشاء مخاط دهان باخته شود و باشد که
 سبلان براق در روز تا یکم و پنج پیک تبریز ببرد که هرگاه باین نحو مدتی دوام
 اختلال در عمل هضم ببرد و هوال عارض کشته سایر تشجات و استفراغات بدن که
 کرد و بعضی عرق و بول و ریزش از بدن بطور اتصال است و باشد که در اثر کوه خاصه جو
 سبب اوج عصبانی را در صورتی بود و ام این مرض از یک تا چند هفته است و باشد که
 چند ماه طول کشد و هم دیده اند که نادر و سال و ام به سرساند است و گویا اکنون این مرض

خفقه

خفقه است و اگر گاهی شخصی هلاکت رسیده است بواسطه ترکیات او و
 و عموماً سبلان براق بدین شرح و با مخاط میگذارد و باشد که از عرض اسهال سبب
 یا عرق و فرفری بخته فانی شود

علاج محلولات قابضات مانند و ششهای معدنی و نریخ سفید و شک
 سرب و قش و مطبوخ بزرگ کرد و نافع و مستعمل است و لی انفع است که غریب
 دیگر کنند و لهذا مستعمل است مسهل و مدر و هم مانند معرق انفع است تمام بخار
 و بسیار نافع است و بزرگ بمقدار زیاد که در پیست و چهار ساعت متدرجاً از
 یک تا دو و نخود بنوشانند و جمیع این ادویه اثری ندارد و در اینجا که مرض علامت
 باشد و در این صورت اگر یک حبه نبات با صمغ در دهان گذارند از تیره مرضی را کم
 زیرا که هر براق را بخته نبات بلع کند بدون آنکه درک او را نماید سایر تفصیلات
 مرض را در سرم دهان بقی باید مطالعه نمود

و بای فرنگستان عبارت است از قی و اسهال مکرر از ماده صفراوی زرد یا سبز
 و عرض و جوی شدید در شکم با اضطراب زیاد و تغیر سیما و سرعت و صغیر و
 بدن و گاه غشی و تشنجات

تشریح مرضی اگر چه قدما و متاخرین بعضی تشنجات ذکر نموده اند مانند ورم
 صفاق و ابلاوس و اورام حاد با مزمن در طحال و کبد و غیره ولی همه این علامات
 و علل سبب مرض نیستند و اغلب تفافات مرکبه با امراض اند و لهذا تاکنون تغیر و اختلال
 که مخصوص خود مرض بود بدست نیامده است

علامات اغلب اوقات بروز مرض بخته و میان شب است و گاه از علامت
 مقدمه مانند کسالت و کمی اشتها و عطش هم سبب طوی نکشد که دفعه قی و اسهال
 موزج و مکرر عارض کرد و ماده مخرجی بقی را ابتدا غذا و بعد رطوبتی مائی و نریخ

خلوط با صفر بالاخره صفرای خالص است بندرت خوف و اغلب ترش و سوزناک است
 بر اثر موج و مشکل و همراهی کند با حسن سوزن و بیج و وجع شد بد مخصوص در اطراف
 ناف خلج شدن مواد بواسطه قی و اسهال یا با هم است با بتوالی و مواد غریبه بواسطه
 بر اثر در ابتدا رقیق و سیاه رنگ بعد سبز شود و نادر است که خونی شود ولی بسبب
 متعفن است شکم با چسبیده به پشت یا پهلوی است و وجع او از پیاد باید باندن نشان
 در فاصله و قی مرض علی الاتصال مبتلی است به قوع و فواق و حشاء و عطش زیاد
 کور و سوزن و در حلق و سینه و اضطراب روی دهد و سیاه مغیر و الحراف سرد و قی
 کور و سوزن و در شکم به سید بنفشه و سیرج و صغیر کور و جلد بکه احساس شود نشخورد
 پادیران و ماق و دست به سید ادرار کم و گاه سید کرد و بعضی اوقات لطیف و قی
 و گاه تشنجات دیگر به سید و چون مرض با این درجه رسد صورت سیمای قی و قی
 بدن را پوشانند و چون قوت قی کردن باقی نماند متصل فواق عارض شده هلاک شود
 و قی و دام مرض و قی و قی و اتصال و اغلب قی و عرقش بخته و بزودی با علی
 درجه شدت رسد که ماد و از سه ساعت میتواند با قی رسد و دام و سطران زک الی
 و سر و زاست و چون علامات این مرض بطور قویه بروز کند خاصه بصورت غیبی
 یکی از اقسام نوبه غشی را که قبل از قی نمودیم

انتهای مرض اغلب منتفی شود و بشفا و حالت نقاهت طوی بهم نرسد که بعد از
 چند روزی صحت با علی درجه کمال رجعت کند چیز غریبان است که آلات تغذیه با وجود
 اختلالات شدید بزودی بحالت خود عود میکند و باشد که زمان زیادی عمل تغذیه مختل
 بماند در این صورت مرض مرکب شده با ورم معده یا امعاء و چنانچه ذکر نمودیم گاه مرضی
 منتفی نمیشود و نکس مرض نادر است ولی عودش بسیار و دایه میشود
 تشخیص امراض مختلفه شکم مانند ورم معده و ورم امعاء و وسطا و با قی

میرد

سری و مل مزه و ورم صفاق و ابلا و سوز خوردن سموم علی هستند که مشتبه کردند
 با این مرض ولی غیر آنها بصورت داده میشود چنانچه ورم معده و امعاء ابتدا نشان
 دفع نیست و سبز نشات با این سرعت نمیباشد و مدفوعه قی و اسهال بندرت سبز
 رنگ اند و با این زیاد نیستند و وجع و اضطراب هم در آن امراض کمتر است و طبیعت
 بر اثر و عرض بهیچ فرق میدهند و سطران پادیران نیز قی و سیرج و ابلا و سیرج
 قی مشتبه شوند با این مرض پیوست که علامت عمده آنهاست تمیز میدهد آنها را در حال
 که همراهی کند با کشیدگی و وجع در شراسیف این اغلب با قی و این علامات دفع
 میکند دفعه و دفعه بعد از حصول قی صفرای و ورم صفاق که همراهی کند با قی و قی
 بسیار میشود و برآمدگی شکم اگر همراهی کند اغلب با قی و لیکن انقی هاشباهتی با قی
 ندارد و نیز غو ما شکم پیوست دارد و مشتبه کرد و با خوردن سمومهای عروق
 این علامات عارض شوند پس از دخول این اشیاء در معده و عرض حسن سوزش و قی
 در کلو و هم در دهان که هم در دهان دیده شود بعضی نقاط سبزه که حاصل شده اند از
 بخور و قی حرکت اکل شده و عوض اینکه قی و اسهال بکند بعد بر میزنند عرض
 قی و اسهال تقدم پیدا کند و هم چنین است اوجاع شکم که بعد از خوردن سموم
 او ابتدا در محل معده و سر ایش لسا و مواضع معده مریحی است تمیز این مرض از قی
 بواسطه مواد مدفوعه باقی و اسهال است که در اینجا سفید رنگ اند و هم تمیز داده
 میشود بواسطه سیاه شدن صورت و هزال سردی بدن و فقدان صوت و ابتلا
 مرض و عدم نفوذ زیاد تشنج و بسته شدن ادرار که با علی درجه رسد
 نقد المرفه مرضی است بر خط و خصوص در اطفال و شیوخ و اشخاص مبتلی شده مرض
 مزمن مجاری تغذیه بوده باشد و سردی بدن و فقدان نفوذ و صوت و قی
 اسباب بروز کند در او اختلاستان و در هوای گرم و رطب و بیشترین

در بلاد واقع بسمت جنوب است استعداده در ان پیش از نزول آن است مخصوصا در وقت
 در سن کهولت و اغلب بر سر و سر و سر استخوان صغیر و مزاج است و اغلب بر وضو
 بدون اسباب محض است و گاهی از اوقات عارض گردد پس از تغیر و پس از استعمال
 بمقدار زیاد و از خوردن بعضی از غذاها مانند گوشت خوک و خرنج و بعضی
 میوه ها و از نوشیدن شراب تازه و شراب سرد در حالتی که بدن عرق داشته باشد
 و اثر هوا در بدن و استنشاق بعضی از میوه ها و گاه بر سر کند بطور پدید بیاید که
 حرمت مان زیاد بیک دفعه مبتلی شوند

علاج قدما استعمال میکردند و پدید و سر و حالت نفس و قوه را این
 را بنمایند و هم تلخندی عقاید بر این بود که نباید قی و اسهال را زود رفع نمود و مستند
 بر آن بودند که طبیعت ماده محرکه را دفع میکند قوی است باز ناقص و حر و زایل
 بماند که ابتدا باید سدی و اسهال نمود و علامات عصبانی و تشنگی آنرا تسکین دهند و
 برای این مستعمل است بخ و توباک که اثر بر قدری ترش و بسیار مرطوب و فاش و فاشی
 بنوشانند و از عصره افزون جهای بک کنند و هر ربع ساعت با هر نیم ساعت فوق
 شدت وضعف و اجاع جوی خوراند تا آنکه تسکینی در علامات بهم رسد و هم در وقت
 میتوان یک ربع اما تمام را که در او و زده الی بیست قطره لودنم سپید نم را در آنجا
 برند یعنی خفته کنند و در بعضی در بعضی راحت نماید و اطراف را بواسطه دلك و غیره گرم
 نگاه دارند و همچنین اجاع و تشنگیات و قی و اسهال زیاد قی شوند معلوم است که قی
 شربت توباک بیشتر خواهد بود و گاهی قی و اسهال بحدیست که توباک در معده بسیار
 که توقف کند و هم نوشیدنش تحریکی نماید در این وقت باید یک نخه مفرجی بزرگ
 از روغن امانیاک بروی شکم انداخته و ملخی از عرقین داخل بدن کنند در اوقات
 الی یک گندم و چون در عرض دو یا خطاط کند و توباک نکند بلکه چند روز دیگر

هم

هم استعمال نمایند ولی از مقدار سرش بکاهند بعضی از اطباء در اطفال رضیع علی الخصوص
 با شرب بر مبرج کنند و توباک بکار برند و پستانها را با اسهال و کوی و اسهال بطفل دهند
 و در این وقت هم زیاد از سه چهار ملکدن نکند از بنوشد و در این که دنیا مستعمل
 می و کمال در حالت نقاهت غذا کم خورند تا مرض نکس نکند در بعضی اشخاص بعد از
 دفع شدن جمیع علامات قی باقی بماند و چون عدم حمی و عطش و وجع در محل معده
 میوه ها که و سر می در موضع نیست و سبب قی فقط بواسطه تشنگی معده است
 در این صورت نافع است اشرب معطره و منجره و شربت الطری و ادویه مقویه و تلخ و
 همچنین از اینها دفع مرض نشد شمع و مفرج نفم معده اندازند

وقت بول باید دلا ب عبارت است از خروج مقدار زیاد از ادرار بسیار رقیق که
 وزن مخصوصی کم شده باشد و حادی ذرات قند نباشد و هم اهری کند با عطش بسیار
 شدید که در بعضی لا بد مشروبات زیاد بنوشد و بواسطه بزرگی این علامت است
 که بعضی از مصنفین او را ببول دیسی نامند یعنی زیاد اکل

علامات در این مرض ادراری که در روز و شب دفع میکرد و عموما بیشتر از آن
 که در روز یا بطور خارج میشود ولی کیفیت بول اختلاف بهم رساند در این مرض
 چنانچه در روز و لای در ادراف و بی بو و مانند اب صاف شده است خوش با
 قدری ترش است بواسطه حرارت و تیزاب رسوب بهم رساند و وزن مخصوص
 از هزار یک تا هزار و نه است لهذا اسید او ریک و او را و سایر املاح خفیه که
 دارد و مقدار شربتی که در ۲۴ ساعت مریض بنوشد نسبت تامی با مقدار
 بولی که در همان وقت دفع میکرد دارد چه بعضی از مریضی و ولی سه سطل که
 تقریبا پست من اب داشته باشد بنوشند و اغلب در شرب پیدا میشوند برای
 کردن و نوشیدن با وجود این اختلافها عمل هضم قاعه است و اشتها که زیاد

و اغلب بحالت طبیعی و بندرت که شود و عرضی و جمع دهند غلای بنایق و اکثر بر کم ترش
 را بر سبب این غذا نیز و زبان و هضم و بذاق کم دهان و حلق خشک کردند و عسر در محل
 بهم رسد مانند آنکه در وقت که سنگی و عمل تنفس و دوازش دم بحالت طبیعی است جلد
 عموماً خشک و خشن شود و سرها زود بدن آنرا کند بدن را غرض کرد و ولی قوی بحالت
 طبیعی است مگر در صورتیکه اشتها کم کرد و عمل هضم ببقاعه شود

دفا رود و ام و انتفا چون عرض مرض در اطفال بود بدتر میج زیاد شود و آسن بلوغ و
 در آنوقت بحالت و قوی باقی ماند و چون در کھول عارض شود در چند روز و نر با علی
 درجه اشتداد در همد فصول اثری در شدت و ضعف افکند ولی چون حوائی عارض گردد
 در مدت دوام او عطش نقصان یابد و هضم نامعین و گاه مادام الحبق با شخص همراهی کند
 و وقتیکه رفع شود و این شفا اغلب مرضی است و بسیار عود کند نادراست که فتنه
 شود ولی شخص را همیشه ضعیف می قوت می نماید و چون در طفولیت با در سن بلوغ عا
 کرد گاه مانع آن گردد که نموبدن با انتظام گردد

تشخیص مشتبه میگردد با با پطوس ولی از ترکیب نیز ادیشق از بواسطه ترکیب
 که هرگز قند ندارد و وزن مخصوصش بسیار کم است و کم کم مورت هزال شود و دوا
 نامحدود و مهمل نیست

نقد مالمعرفه اگر چه مهمل نیست ولی بسیار موزی است شخص را مادام العمر
 ضعیف و علیل نگاه دارد

اسباب اسباب این مرض نامعلوم است و اغلب بر و نرش در اوج بلوغ و خناریت
 مردان و سن کھول بیشتر است و علاو ذلک بعرض مرض و یا باشد که مرضی در آنوقت
 مختص با انسان نیست و گاه بطور اید پیک در اسبابان عارض شود

علاج تاکنون دوائی مجرب برای این مرض پیدا نشده ولی جمیع ادویه

ضد وری

ضد ورم و متی و مخدرات و مقویات و امکلاح قابض واد و بر صد تشنج و غلای حیوانی
 و بنایق استعمال شده اند چندان منفعتی نبرنجستند اند و سبب کربل میگویند از آن
 جزئی منفعتی از یک مرض استنباط کردم و حقیر در خدمت موسیو کربل و بعد منفعت
 کلی از استعمال سنبیل القصب بمقدار زن یاد دپله ام

سپلان شیر چون مقدار زیاد از شیر خارج شود اختلالی در حالت مختصر نیز بهم
 میرساند و عروض در ایگان یا نر نیست که تا نر بچر شان از شیر گرفته باشند
 علامات شیر بمقدار زیادی ترشح میکنند و جاری میشوند با نر میکنند باید و میکنند
 و این حالت ثانی اغلب بعد از خوردن غذا است و این جریان هر اهی میکند گاهی از او
 با وجع و کشیدگی در دستها و نر بر بغل اگر چه در ابتدا این سپلان شیر بر اشتها
 بیفزاید ولی طوی نمیکشد که نرک زن باخته و لا غرض که و کوفت کرد و طپش قلب و سنگی
 نفس برو نر کنند و اشتها اگر با فانی کرد و دمای دق و اسهال و عرق مفرط پیدا شود
 و حرکت در دسد ولی این نادراست که بخود خود می رسد بر و نرش بواسطه هر اهی کردن
 مرض است باسل بر به که سپلان شیر مورت هزال و داغهای سلی کرد مانند آنکه
 در د با پطوس خواهیم دید و اینجا که داغهای سلی بر و نر کنند حالت مختصر مراجعت کند
 بواسطه خود حفظ صحت

تشخیص مرض اشکالی ندارد نقد مالمعرفه چند است اگر مرض ترکیب باسل
 و برخلاف بسیار ردی است در حالت ترکیب

اسباب عارضی که بواسطه تحریک اطفال بر شیر خوار در نسیان و اثر شیر
 دادن مدت زیادی و هم عارض گردد بواسطه اسراف در حرکات و اغذیه قوی و
 گاه از سوء غذا و سرد اسب مزاج

علاج شرط اول آنست که شیر دادن را بند برچ موقوف کنند و شیر ندهند

مگر خیلی بعد از غذا اغذیه مقویه برای نگاه داشتن و اصلاح حد بدی استعمال نمایند و پستانها
با پستان بند به بند بطوریکه اندک فشرده شود و باد مستحکمتر کار کنند مصرف آن قبل
یا شب و مسهل و معرق و مدر بکار برند و نافع است شستن با آبهای سرکه دار یا شکر
دار و ادویه معطره و تدبیر هین با روغن کافور و چون بانها دفع شود استعمال کنند بدین خصوص
بدرد و بطاسیم نافع است

سبلان منی یا اسپرماتوره عبارت است از سبلان منی بمقدار زیاد و مکرر
غیر از وقتیکه باید سبلان نماید مانند جماع و جلق بدون مقدمه و تحریک یا به تحریکی بسیار
جزئی که در حالت صحت کافی نباشد چون علامات و اختلالاتیکه در بدن بهم میرسد بهر جهتی
که سبلان منی عارض شده باشد که بدون سبب بود مانند احتلام یا اکثر جماع و جلق
یکی است لهذا در یک مجت کل این اقسام را ذکر نمائیم

تشریح مرضی موسوم بکلیان و آن است که اشخاصیکه از این مرض بمیزند علامت
در خن منی در غده و ذی و در مجاری منی دیده میشود و هم معلوم مذکور ملاحظه نمود
شفاق و جراحت در این مجاری ولی آن مرضی که او ذکر میکند معلوم نیست که مبتلا
بسبلان منی بوده اند لهذا اکنون از علامات تشریحی این مرض چیزی دیده نشده است
علامات بعضی از احتلامات است که با فائده و لازم است مانند آنهاست که
بکبار در خواب عارض میگردد در اشخاص تازه بالغ و در مردانی که زن ندارند و این
نوع احتلامات علایمی است از برای خارج کردن منی زیاد لهذا بعد از این احتلامات
خوشی و مزاج بدن بهم میرسد و هم مذکور نموده اند امراض خطیر بدن دفع شده اند بعد
چند احتلام و لیکن هرگاه سبلان منی بفاصله بسیار که غمخوار شود اعم از اینکه سبب
جماع بود یا جلق یا آنکه بدون سبب مانند احتلام مابین اختلالات چند که در و این زیاد
احتلام با اصلی و بدون سبب است و اشخاصی عارض شود در کسانی که اسراف

در جماع

در جماع و جلق می نمایند در ابتدا فقط برورش در شبهاست ولی با اندازه که مکرر میشود
علامات تحریکی که قبل از احتلام بر و میزنند یا با او همراهی دارند که شده و فانی میگردد
و عوارضات جماع مفقود شوند که خارج شدن منی بدون جهت و بدون تحریک است
و هم منی خارج شود بدون اینکه غرض کلی شود و باشد که هیچ غرض حاصل نشود
جستنی منی کم گردد و گاه جاری شود بدون آنکه شخص بفهمد و باشد عوض اینکه به
خارج سبلان کند منی داخل مثانه شده و بعد هنگام بول کردن در ابتدا با بول خارج
گردد و این حالت عارض گردد در حالتی که مجاری بول در جن بصلی یا و ذی سبب
تنگ شده باشد یا آنکه بواسطه اش جراحات و انصافات ذی مجری منی منعطف
و ثقیب باشد مایل بخلف گردد بهر حال این مرض هر گاه کند با کوفتگی اطراف و ضعف
و صداع و مهر و چون این اشخاصی از خواب برخیزند بجدی کسالت دارند که به
شغل خود نتوانند رفت خاصه اگر علمشان عقل و قوت لازم داشته باشد بمرحله این
سبلان عارض گردد هم در هنگام بیداری و هم در وقت الحاق و در اراده بعضی
عالمین شود وقت سواری و هنگام زور زدن و اندک ملاعبه با کسی و این
اصطلاح سر قضیت را و امل نمیزند هندی را بواسطه قوام و لون و بوی او و
ماندازه که احتلام مکرر میشود و منی تغییر یافته و رقیق میشود و برای تمیز
او باید در زیر پیکان بر خاصه زن بین لازم میشود در وقتیکه خروج منی قوی و دفع
ادرار بود و هم گفته اند که میتوان تمیز داد وجود منی را بواسطه رسو که در وقت
بهم میرسد که در ابتدای مرض مشاهده شود بعضی اجسام که تقریباً گوی است
چون مرض طولی کشد این دانهها بر طرف شوند و یک رسوب خفیم سفید رنگی پیدا
شود که بعضی نقاط شفافه در طبقه اسفل او ملاحظه شود و این رسوب شباهت
داده اند به رسوب آب چلو بسیار بخت و چون این رسوب صفت مخصوصی ندارد

لازم نیست استعمال ذره بین در ابتدای مرض بواسطه ذره بین دیده شود که حیوانات
منی سرعه و حجم طبیعی میباشند و تغییر در صفات منی حاصل نشده است و ^{چون}
طولی در مرض پیدا شود مایع منی زیاد و حیوانات او که و بعد از چند دقیقه میزند و
انها بکثرت کوه تر شود و دم آنها را با ذره بینی که سبب صد مرتبه بزرگتر میکند با سکا
میتواند بعد از آخره این حیوانات تکلیف مقود کرد و اگر چه بوی منی باقی باشد در
این صورت بجای حیوانات منی مشاهده کرد و بعضی طولهای پیچی و کروی یکی از
علامات این مرض کوشدن قوت قصبیب و کوشدن مدت نفوذ منی است و آن
که با لخنه نفوذ بکل حال و بطرف کرد و همراهی کند با باختکی رنگ و هزال و کمی
قوه و لرزش اطراف و ثقل سر و در وطنین و در بعضی از اشخاص کاهی کثری
سپون دماغی هم رسد که بعضی خفیف و بعضی خطر خواهد بود قوه باصره ضعیف
حاصل نموده مرضی ممکن شوند و عمل هضم بطور هم رساند و همراهی کند با روشی و ^{شک}
نفس تنگ و قلب طبعش هم رساند صوت ضعیف کرد و بعضی مبتلی شوند با ^{شیخ}
و صرع و برخی به عمد با فلج در یک یاد چند عضوی الاخره این مرضی بحالتی افتند که
مرده متحرک نامند که قوای بدنی و نفسی تمام شوند و انتفاخ در اطراف هم رسد و می
روند و حواس مخصوص باصره ضعیف هم رساند اسهال و پیوست منوالی شوند
و بواسطه قبول مریض بحالات رسد و بعضی مقاومت و نج طیبیت نتوانند نمود
و خود را هلاک نمایند و با وجود جمیع این علامات هیچ وجهی عارض نکرد و ^{انها}
که جمیع روزه نماید همیشه دلیل بر آنست که مرض ترکیبی پیدا کرده
و قادر و دام و اشکای مرض و قنار این مرض بسیار غیر منتظم است که گاه شدت
و ضعفش روز بروز تغییر مییابد و در هوای محلول و با دانی خفت در ^{مرض}
بهم رسد و در هوای صاف و خشک شدت کند و در مجاری شدت بیشتر و ^و
پایین

پایین تر است و شدت کند و در برونه کهای بواسیری و کرم مقعده و پیوست
خارج و اینها که مرض خیلی شدت داشته باشد این اختلافات کمتر ظاهر شوند و ^{خیاب}
نماید که وقار مرض بالا اتصال است و باین نوع از مرض میتوان حاد نامید اگر ^{مرض}
بسیار بود معلوم است در اینجا برونه مرض بنویسند و در بدن آن کنند و هر چند
فاصله میان دو نوبه بیشتر شود کمتر در قوی ضعیف هم رسد و یاد راست که این مرض
بخودی خود سر رخ کرد و در چنان مینماید که هر چه سن بالا بود بنای کوشدن شرح
اختلافات کمتر شوند اگر چه این اعتقاد عموما حقیقت دارد ولی چون در سربری
سبب این مقدار کمی از منی مورث ضعیف زیاد شود و لهذا اگر چه علت اختلاف کمتر
شود ولی چون هر اختلافی مورث ضعیف زیاد کرد و پس از آن در مزاج مانند در
سبب اسهال است و بعضی از این مرضی از در کردن اسباب حاصله مرض شفا یابند
و هم روزه مرض کرد و بتدبیر جمیع بقاعد ولی در ابتدای مرض که هنوز ^{قوت}
ضعیف هم نرسیده اند و سبب مرض عرفیت بوده است و اما آنجا که ضعیف
قوی هم رسیده باشد جمیع مضر خواهد بود هزال و تحول که از این مرض منتج گردند
باشند که بحدی شدت یابند که مورث هلاکت شوند و در عارض کرد و بول ^{سطح}
غشی با کثرتی سپون دماغی ولی اغلب این اشخاص سبب هلاکت شان مرض حاد یا
مزمنی است که ترکیب این مرض شود
تشخیص مرض تشخیص این مرض اغلب مشکل است زیرا که کرم پیوست که او را
پنهان کند و اغلب مرضی خودشان هم اطلاعی از این مرض ندارند و هم بعضی علت خود
حاصل اسباب دیگر میکنند و طیبیت ^{طبیعی} می اندازند و سبب آن منی را غیبی ^{مشابه}
نموده با سبب آن رطوبت انحرای بول و غده و ذی زنی که در این ادراک ^{بالا}
و دیگر غیج است و حال آنکه در سبب آن منی ریزش رطوبت دفعه و بملک ^{زنا}

که بعد بکلی قطع شود تا بعد از زمان طویل یا قصیر بمیمن طوری چربان میسازند و هرگز
 حیوان او را لا اتصال و قطره قطره نیست و چنانکه سبلان منی مرکب شود با سبلان منی
 مجرای بول دیکه شود بطوری که سبلان شش با اتصال باشد و بفواصلهای چند بدین
 جهت با بواسطه سببی دفعه معدله زیادای از طریقت که صاحب بوی مخصوص منی است
 که از در بین حیوانات او را ملاحظه توان کرد اینجا که سبلان منی داخل باشد یعنی
 در مثانه دیر ممکن است که مرض ما شانس ماند ولیکن چون دیکه شش شخصی که در
 بروز بروز از ضعف شود و هزال باید و در آلات بدن هیچ علتی مشاهده نشود و
 بواسطه سؤال از مرض بفهمند که روزی چند با و باد در وقت سیدان شدن احسا
 میکند صداع و دوار و ضعف و شکستگی و کوبیدگی در اطراف که شباهت دارد با
 دوار و صداع که هر اهری کنند با خروج منی و حدس بوجود این مرض بزند و برای اسکا
 نمودن تشخیص او را در در طریقت گذارند تا راسب شود پس از آن صاحب غوده
 را با در بین ملاحظه کنند تا علامات مخصوصه منی اسکا شود و ماملا شود نمودیم که
 صاحبان این مرض مبتلی شوند به تنگی نفس و طبع قلب و دوار و سوء هضم و قلیح
 کشیدگی اطراف که غالب مورث خطای خطای تشخیص میگردند و احتمالی
 دهند بوجود امراض قلب و دماغ و نخاع و معده لهذا طبیب باید در این
 بدقت زیاده امتحان نماید تا اصل مرض بر او مکشوف گردد
 نقد المهر فیه چون مورث هزال و تحول گردد و عن او در مرضی است
 پرخطر و خطورش زیاد گردد و هر چه دواشن بیشتر کرد و هم خطورش زیاد شود و چون
 قوی ضعیفتر شد باشند و برخلاف چون مرض جدید بود و ضعیفی در قوی
 نمیداد باشند و بصورت بتوان دفع سبب او را نمود خطورش کمتر خواهد بود
 احتلاما بیکه در روز عارض مزاج را در و خواب کنند

عارض

اسباب عارضی که بواسطه جلق و جماع زیاد و عذوبت مخصوصه و رانها
 آلات تناسلشان زیاد نموده است نیز از اسباب این مرض است و گاه عارض شوق
 از پیوست و از افراط مسهلات ردی و از وجود کرم در مقعد و دیکه بواسطه
 اسفرو و مستقیم برای اینکه کل این اسباب مورث تحریک و تشنج عین منی میگردد
 و گاه سبب سببی بود که تحریک کنند در مجرای بول و این تحریک از آن مجرای
 کذب عین منی و او دفع منی نماید مانند تخیال حشفه و او را من من مجرای بول
 مخصوص در قطعه و ذی و هم عارض شود از ضعف شدن بدن بواسطه روزه
 گرفتن و شب بیداری زیاد و غصه و فکر زیاد در چیزهای عشق آمیز
 علاج اول باید دفع سبب غوغا که از رفع کردن پیوست و کرم مقعد
 و بیدار دیکه بواسطه جلق کردن تخیال حشفه و غیره بزدی دفع مرض شده و هم
 چنین باید و در نمود اسباب محرکه را و کتابهای عشق انگیز بخوانند و باز آن
 و اینجا که سبب عذوبت بود گاه گاهی جماع کنند و در روی قوشک کاهی با موی یک
 پهلوی بماند و مرض مشغول شود و حرکت نماید و غذاها و ملائم بخورد و غذا بپزد
 و اشربه الکلی صرف نماید شکم را بپشت دهد و مثانه را در و دخیال کند و اینجا که
 آلات تناسل تحریک زیاد دیکه باشد و تریطال استعمال کنند و هم چنین نافع است
 لوپولین یعنی جوهر عشقه اینجا که مرض قدیم بود و مرض ضعیف شده باشد باید
 استعمال نمود مانند اعذبه خوب و شراب و دهن و شرب اشربه بسیار سرد و
 در آب سرد و با آب دبا و شستنی بیضه و سایر آلات تناسل با آب سرد و معطر
 اما له با آب سرد از مقعد و آب سرد نیز نافع است که بوی گرم بزنند و گاهی
 حاجتی حاصل کند که نمیتوان او را بلا واسطه اعذبه قوی داد لهذا باید شوری
 نمود با آب گوشت اقسام میگو و وزغ و لاک پشت و شیر کاه و خور و زن و برای

و هم عارض گردد از خوردن غذای بطی الهضم و چیزها نیکه ماده غذا بشان گویا شد
 چنانچه در بعضی شهرهای مخصوص بسیاری از سرپاها که غذای پدیدانگند
 و بزرگ درخت و غیره تغذیه کنند بنفع شکم هلاک شوند و سبب شیریدن میگو
 جوانی را که با فراطرزدن تناول نمود شکمش عجزی ضعیف شد که ده مسای
 حالت طبعی او شد در اینصورت هلاکت می رسد و باشد که این مرض موروثی بود و
 ترشح بخار بیشتر شود در اغلب علل عصبانی بخاری غذا و در علل عصبانی دیگر
 مانند مالخولیا و اختناق رحم و هم عارض شود از مصرفات نفسانی و
 این مرض هم وقت حاصل نمیشود از ورم آلات بخاری غذا و هم در ورم معده
 و امعاء گردد و لیکن بیشتر عارض شود از ورم صفاق بخصوص ورم صفاق
 وضع علی وان نفی که در حرم طبعی می شود و یکی از علامات مخصوص او
 چنانچه مونسبولی نموده است ربطی با ورم امعاء ندارد و سهل است که از تعفن
 و تعریق این هم نیست و هم عارض گردد چون سنگی در امعاء بهم رسد یا از خارج نشدن
 بخار یا آنکه خردی در ترشحات بنوعی طریقه نشتر بخار را اکنون بدست نیاورده ایم و لذا
 ایم که هم چنین مترشح میشود یا آنکه در میان خون موجود است و بعد در سطح غشاء
 مخاط نشتر میکند پس با واسطه ترشیه نموده است بخار را که جلد جذب کند از سطح غشاء
 مخاط بخاری غذا نشتر نماید

حل ترکیب بخار و قتی که مقدار بخار زیاد باشد بالتساوی در جمیع محای غذا
 بود و لیکن اغلب محدود خواهد بود در اعور و قولون و ترکیب بخار مختلف
 شود باعتبار محل او و باعتبار حالت مزاجی شخص و هر معده مرکب است از هوای خا
 و مقدار زیاد یسید کوبنیک در امعاء و فاق مخلوط است از نر و هیدژن
 و اسید کوبنیک و در امعاء غلاظت بعلاوه بخارات مذکور یافت میشود و نر
 کوبن

کوبن و هیدژن سولفور و هیدروژن اکسید در این مراتب آخری پیدا نمیشود و مقدار اسید
 کوبنیک زیاد تر شود هر چند بمقدار نر و بکتر شود و در امعاء و مایه ای او مرکب است از نر
 و هیدژن و هیدرژن سولفور

در ادب حاصل از بخار عموما اجتماع بخار در امعاء و نر کسالت و قرار شکم شود بطین
 برآمد که در بعضی که از پر و سپون صوت طبل حاصل شود و از فشار شکم با سرفه قوی ها
 از کل و مقعک خارج شوند که بحسب بو و مختلفند چنانچه ریاح غیر از کل را که از ریه
 ترش و بوی تخم مرغ کندیده را دارد و گاهی هم با آن غذا ترشید که خارج شود و ریاح
 غیر از مقعک متعفن و خروج آن گاهی بخودی خود است و گاهی بواسطه فشار
 مذکور و چون این بخارات خارج شدند نفخ و درد شکم خفت پذیرند و اینجا که ریاح در
 امعاء محبوس شد و در صورت علی حده کردند که اسامی آنها با اختلاف موضع مختلف میشوند
 و نیز مختلف کردند باعتبار کثرت و قلت شان هرگاه در معده مجتمع شد و در بعضی
 کشته تقصیر عسر گردد و در هان در عارض شود محل معده برآمد و طبعی گردد و بعضی
 نشیئات و اوجاع در آن پیدا شوند و چنان نماید که اثر به مشروب یا اثر فم معده
 میکند و گاهی طبعی قلب غشی دست دهد و اگر باد در امعاء جمع شود و حجم شکم
 شود و صدا شنیده شود بصوت طبل و از اینجهت است که این مرض را استسقای طبعی گویند
 چون شکم را لمس کنند حلقهای مروده محسوس شوند و بعضی اصوات از اسکتا
 استماع شوند و بعضی اوجاع نیز در بعضی احساس شوند که موسومند بقولنج و می
 کاهی اب امانه تواند داخل امعاء شد و از فشار امعاء آلات مجاوره خود را بعضی
 علل حادث شوند مثلا از انبساط قولون سطحی بعضی بعد از عارض شود و
 از فشار او به حجاب حاجز ریه بالا رفته مورث اضطراب و عسر التنفس و نیز
 مورث هلاکت شود و از فشار او بر مثانه مورث عسر البول دست دهد

و نیز دیده شده است که از فشاران بر حرم و مهبل مورث قوا آنها گردد

لذی و انقباضات بیان میکند نفخ با پیچیدگی که عارض شده بود بواسطه فشار و برید
خاصه ها نظیر و کاهی در یک محل بود و گزید مثلا اگر در اعور بادریک یا در و در
دقاق بود مشکل بدوری از بطن محسوس شود که موجب و متحرک است و کاهی قراقرز را
بهم رسد پس از آنکه مدتی در یک محل بماند و یا حالت باقی ماند از دهان و مقعد مانند ترجا
باد فوج خارج شود و یا حالت مذکور و اطباء هیضه را پس گویند در این صورت مواد قریقه
هم تواند با بخار خارج شد و باشد که ریاح واقع در معده جذب شوند و ماکثره اند که
در این فرضی جذب ریح شاید مهلك باشد ولی کو با خطری نداشته باشد معده و امعاء که
زیاد منقبض شوند باشد که منقبض گردند ولی این اخراج دیده نشد مگر وقتیکه الت
نرم با غنا غرا با بی بود عود مریض زیاد است

تشخیص مریض زیاد شدن صدای شکم بواسطه قرع معلوم کند که سبب بزرگی شکم
اجتماع رطوبت نیست و نیز بواسطه برکوسون و نگاه کردن تمیز داده شود عمل اجتماع بخار
شدت صوت بسته بر زیاد بخار نیست چنانچه در وقتیکه جدا از امعاء و معده زیاد کشیده
نشده باشد از قرع نمودن صدا بلند تر از وقتی است که خیلی منته شده باشد همیشه
تولید بخار در معده دلیل بر ضعف عمل انقباض است و اینجا که این تولید بعد از وضع حمل
باشد باید حدس بر و در مریض صفاق وضع حمل زنند زیرا که اغلب نفخ شکم اول علامت این
مرض است و اگر در او بل حجابات حاده این نفخ شکم بر و زنند باید بطیب منتظر حای
تفویذ شود و اگر در او صبح المزاج شکم نفخ کند دلیل است که در موضع از موضع
مجرای غذای معی بهر سبب است خاصه در حوض اسفل ان

تقلقه العرقه گذشته از این که از ترکیب جزا بخت خطری حاصل نشود ولی چون زیاد
شود با خطری است و خطر جمیع امراض معوی و صفاتی را زیاد کند خاصه ابلا و سو

درم

و در مریض صفاق و تفویذ را

علاج باید از غلبه بر طی الحضم مثل از کدند و ناسانه احتراز نمود و شراب قوی نوش
خاصه بکنه او را و بعد از اکل غذا از خستگی و فکر و هر چه عمل حضم را تاخیر اندازد و باید احتراز
کرد از خراج باید پیش نیاشد و قدری حرکت لازم است و آنها که مبتلا بسوء هاضمه باشند پس از
غذا مشروبات عطره نوشند از قبل جای وقوه و نفع و غیرها و از جوهرهای عرق احتیاط
نمایند و پراهن پشمی پوشند و در التبروی شک کنند و استحمام در مهله عطره و مپا بچو
کنند و اینجا که سبب ضعف معده و امعاء باشد مقویات مثل بادیان و فستقین و نفع
پودنه و در این چینی پوست نارنج و غیرهم بکار برند و اگر سبب ورم مجرای غذا باشد
ادویه مذکور مضر خواهد بود بلکه ادویه ضد ورم نافعند و اینجا که سبب عصبانی
باشد فعالان یا حرکتی یا فزون ادویه مذکور و مستعمل دارند و گذاشتن اشپاء حاد
بالفعل یا بارده بالفعل بخار مجتمعه را دفع کند و اینجا که سبب پیوست فراج باشد مسهل
باید بکار برد هم چنین در ورم صفاق و تفویذ و اماد و پشه و بجزا به مانند کل
سفید و منبری و ذغال و غیرها بی اثرند مگر اینجا که انبساط شکم بواسطه بخار اسید کربن
باشد منبری منفعیت خواهد کرد و در این صورت هم امونیاک از خوردن و حقنه کردن

انفع از منبری است

در حیوانات نشو از من و قتی که نفخ شکم خیلی باشد بخصوص اجتماع ریح در امعاء
باشد مصلی در مستقیم کنند و تا قولون فرو برند و بعد چند متقال ابر را و زنند
که چشمهای میل شود از این عمل ریح زیاد خارج شود و اگر این عمل کفایت نکند سرایت
و باید از منبصل کنند و مصل وسط را بکشند تا ریح خارج شود البته با این طریقی
دفع خواهد شد و باشد که هیچیک از اینها به نفعی در ریج ندهند و حالت منبری
در این صورت با نرد کار بسیار نازک سوراخ کنند و این عمل را نکند مگر وقتیکه

محتاج باشند و هیچ در آلات و مران دم واقع شده باشد موافق نوشتهجات بعضی از اطباء
مانند مادکنی و البوم و غیره ها که میفرمودند که بمرسد بواسطه دخول بخار و الت
دوران دم خاصه در قلب را منقبضت یا مرک دفعی است یا آنکه در ابتدا وجع شدیدی
در قلب میسر شد تشنج در اطراف پیدا شده بعد از چند ثانیه شخص مریض هلاک شود
تشریح مرضی تغییر در آلات بدن پیدا نشود مگر آنکه بطن ایمن قلب منقبض گردد بواسطه
بخار که از پرکوسپون صلی از آن احداث شود یا آنکه از معك بالقیحوف که پوز هوا
باشد احداث میشود و خونیکه در این بطن ایمن است قریب و کف داده و منزعج است
بالجایهای بخار به و این علامات مذکور چه در جبهات و چه در جبهات معات ^{مست}
باعلاماتیکه بر وزن نماید در حیواناتیکه در وریدها آنها هوا از ق کند باد را شامیکه
هنگام عمل پدی هوا در وریدها آنها داخل شود وجود بخار را نمیتوان عمل نمود بر تجربه
مستدبر که از این مریضهای دفعی حادث شدن بخار در قلب حکمی بلا واسطه فصدت
و مدت ربع ساعت خوفی تیره مخلوط باجایهای بخاری خارج میشود و در ^{همیشه}
از اشخاصی که بدن مریض موند علامات تعفین در بدن ظاهر نبود و در خون ^{هم}
هیچ اختلالی پیدا نشد پس معلوم است که این بخار در حال حیات منعقد شد
طوبقه حصول او این است که هوا بهین قسم که از شعب قصبه داخل شریان و وریدی
میکرد و در این قولی اعتباری نیست و چنان مینماید که هوا بخصوصا سبک
مینکد در خون و بریدی بمقدار زیاد است و بواسطه حالت مخصوصی در مریض
که هنوز همیشه مجهول است از خون جدا میگرد و ضعف خارج یکی از اسباب مستعد
این مرض است که با حصول بخار در خون سبب حرکت فوری است بعد از توقف الدم ^{نخ}
حکما در انسان و حیواناتی که از توقف الدم هلاکت میسر شود بخار در قلب و ^{عروق}
انها پیدا کردند به صورت چه هوا با بخار در داخل عروق حاصل شود و چه در ^{خارج}

بواسطه


بواسطه او در داخل بدن کرد و چون بقلب رسید فوراً شخص هلاک شود و این
مرک بواسطه قطع فوری حرکت دم و رجعت نکردن او است از شریان و ^{بزرگ}
و بطن ایمن قلب که بواسطه هوا منبسط گردد و حرکت ببقید و دیگر خون داخل ^{نشد}
در نفخ مجاری بول و آلات تناسل تا حال بدنه نشد که غشاء مخاطی مجاری بول تولید
بخار کرده باشد و هر وقت که در اینجا بخار یافت شده از جای دیگر منتقل شده
و هوا خارجی نادر است که در مجاری بول داخل شود بواسطه بلندی و انحنا
و تنگی مجاری بول و باشد که در عمل میل کردن پس از آنکه او را در جمعه در میان
خارج کرد بدین مقدار از هوا از سوراخ میل کردن داخل فضا شود و در ^{حین}
ادرا کردن از مجاری بول خارج میشود و بخار نیز هر وقت از مجاری بول در
پایزن هوا خارج شود دلیل بر این است که یکی از آلات بول مخصوص فضا ^{است}
مستقیم باینکه از حلقهای امعاء دقاق به سبب بعضی از زنان در بعضی از ^{جدا}
صدای زیاد باکم یا بخار از ریهشان خارج شود و این صدای مینامند او و غمجه
و این صدای واقع شود در ریهها بیکه مهبلشان کشاد و گشوده بود یا در آنها که ^{چون}
بند دارند یا بخار خارجی یعنی هوا در هنگام جماع داخل میشود و در اینقسم ^{میشود}
که هوا در رحم هم داخل و هم خارج شود در ریهها بیکه مهبلشان ناسور دارند
هیچ يك از این حالات بخار از غشاء مخاطی آلات تناسل ترشح نموده است بلکه از
خارج داخل شده اما باشد که چون عنق رحم مسدود گردد در خود رحم بخاری
تولید گردد که او استسقاء طبعی رحمی نامیده اند و این علت را دو قاعده مشهور
فرانسه انکار کرده اند و این علت که در هنگام خلاء رحم بسیار نادر است ^{در حین}
حمل و اندکی بعد از حمل پیدا شود خلاصه در وقتیکه قطعه از جنین یا خفیم یا خون
مغلظه در رحم بماند و متعفن شود در اینوقت رحم باندازه مقدار ^{مقدار} هوائی

manat.wikihema.org

که در او میباشند بزرگ شود و از پیکوسپون صدائی اشکار پیدا شود و یک بخار متعفن که گاه گاهی هم از شعله چراغ مشتعل گردد و خود بخود با ان فشار بر روی مهبل خارج شود و خروج این بخار را سان شود و چون انگشت را به مهبل بر روی عنق رحم را از خونهای مغلطه که در وسط او است پاک کنند و بعد از خروج بخار رحم که ضعیف شده که کو بحالت خود رجعت کند

و عموماً فری متری که بواسطه اسباب مذکور فوق بصر سپید می آید که با ضعف مریض و بروز علامات عصبانی که شدت و ضعف آنها بسته بمقدار هوای قاع مجذوب است و بغیر از حالات مذکور بگونه فری متری اصلی و کتب نوشته شده که در اینجا ترشح بخار از خود غشاء مخاط رحم است و این علت بروز ترشید خاصه در زنان است که ترشید باشند و رحم بزرگ شود بهمان نسبت که در محل و بعضی از علامات مجهول در محل نیز بروز کند و باشد که طحت هم جبر شود که مرض مشتبه گردد و محل و چون پیکوسپون نماید صوت طبلی احداث شود و چون انگشت به مهبل برسد و عنق مثانه را بیافشارد هند معلوم شود که ثقل رحم کمتر از حالت حمل است و گاه مقدار جزئی با کلی بخار از فرج خارج شود و باندازان شکم کوچک شود در این صورت خروج بخار می کند با صدائی طول باینقسم که زنان را که خیال استنجد اشتند چون بجهت با هفتم برسند باین فرج زیاده بیخارج شود که شکم بحالت طبیعی رجعت کند و هم علامات مجهوله حمل مفقود گردند

تشخیص مرض مشتبه شود با حمل و استسقای رحمی و استسقای طبلی از تمیز داده شود بواسطه بلوتمان و صداهای خصی و چنین وسبب بودن و زن و صدائی اشکار از پیکوسپون در استسقای رحمی و در هر دو جایگاه بزرگ شدن



رحم بواسطه مواد صلبه باره باشد صوت پیکوسپون که راست و از استسقای طبلی تمیز داده شود باینکه این صدای طبلی در معبر امعاست و حلقه های معاء و قاع بخوبی تمیز داده شوند و علا و لمس مهبل می نماید که رحم بحالت طبیعی است تقدیر المعرفه بخودی خود و خطا است

علاج منوط است بزوال چیزی که مانع از خروج بخار است چنانچه بعد از وضع حمل و قطع خون متعفن که عنق رحم را مسدود ساخته بود بوسیله فرو بردن انگشت به مهبل خوف از عنق رحم باید ساخت و بعد میل لاسطیک به عنق رحم داخل نموده زرق از ملاء ملین و کلور فرود رحم کنند و در این عمل شکم نمایند و شکم را به بندند و اینجا که مریض اصلی باشد باید عنق رحم را وسیع تر در رف غشاء در جوف جمیع اغشیه صفا قیه بخار یافت شده است و حصول اعضا اغلب پس از مرگ اثر تعفن بوده و گاه در جوف حیوة حاصل شده در این صورت هم نادر است که این بخار از خود غشاء ترشح کند بلکه حصول اعضا یا از ترشید موله ترشح است یا از پدید آمدن جوف صفاق است بخارج کردن بالی است که بالطبع هوا با بخار دیگر در آنها میباشند مانند ریه و مجاری غذا در بخار صفاق مدت زیادی خیال الهیاء بر این بوده که در استسقاء طبلی حصول بخار جوف صفاق است و در اوائل مانده هفدهم عیسوی حکمی از ترشید بدن محقق ساخت که این اعتقاد باطل است و وجود هیچ فقط از معده و امعاست و حکم مذکور معتقد اند که صفاق هیچوقت بخار ترشح نمیکند اگر چه بعضی از اطباء این قول را رسانده اند و برخی مثلاً بیان کرده اند که در جوف صفاق بخار بوده و مثلاً ایشان ثابت نمیکند که این بخار از خود صفاق ترشیده است بهر صورت اگر حقیقت دانسته باشد که صفاق ترشح نمیکند تاکنون مثلی صحیح بیغل و غش در دست نیامده است

در رفع غشاء مجلی قلب مرضی است بسیار نادیر از ملاحظاتی که تاکنون نوشته شده وجود
بخار همیشه همراهی میکند با تشنگی طویب و از برای این مرض و علامت نوشته اند یکی صد
طبیعی در موضع قلب دیگری صدای توجع و غلبان که از ضربان قلب احداث میگردد و این
صدای بسیار شبیه است به اسب و در هنگام حرکت در آب

در سینه اغلب در غشاء جنبین بخار متراشیده ملاحظه میگردد و اغلب آن بخار بواسطه جوف یا
ثقبه ریوی است و گاه دخول و بالا و اسطه و خارج بواسطه جراحت جدار صدر یا پاره پدید آید
یکی از اشیاء بطبیعی به بدن مخصوص بمعد است با غشاء و به هم چسبیدن فرض نموده اند که در وقت
متراشی در جوف غشاء و به مانند خون و سرم میتوانند تجزیه بشوند و بخاری از آنها جوف
آید بالاخره بندرت خود غشاء و به باشد که بالا صاله ترشح بخار نماید و گفتگوی ما در این
مبحث از این نوع اخر خواهد بود و در مجلد ثانی که از ثقب غشاء جنب گفتگو خواهیم کرد و
از سایر اقسام او نیز ذکر خواهد شد و هیچ شکی نیست که غشاء مجلی نه با جنب بالا صاله
میتواند ترشح بخار کرد و این ترشح در هنگامی است که این غشاء مستور شده باشد و
بقول لایک ورم حاد نزدیک بان هنگامی که رطوبت میخواهد ترشح نماید در همین جوف ترشح
بخار معلوم شود بواسطه انبساط صدر و بلند و زیاد شدن صدای روشن و معدوم
شدن صدای تنفس در موضع غلب و اینجا که بخار با طویب مرکب باشد از حرکت صدای توجع
مسموع گردد و اینجا که مرض ساده باشد چندان خطری ندارد و لی چون مرکب باشد با ناسه
و به بواسطه آنکه دفعه مقلاری زیادی از هوا بجوف جنب اخل شود و مرث اختناق گردد
و چون بطور ساده تاکنون معدودی ملاحظه شده و تقارن و علاج او را نمیتوان بیان نمود
چه همیشه حصول او در ابتدای ذات جنب مرکب با ذات الیه است و باید در

علاج این امراض کوشید که بخار بخود جذب شود

تمام شد

بسم الله الرحمن الرحیم

امراض سیمی ریهائی هستند که منبج شوند بواسطه دخول اشیاء سیمی در بدن از یک از مجاری
طبیعی و غیر طبیعی چنانکه صخره را زایل یا جفا و بکلی معدوم نمایند بدون اینکه علشان جوف قلبی
باشد و این اشیاء نامیده شده اند سم یا زهر

سموم با بحالت صلبه اند با بحالت رقیق با بحالت بخار و عدد آنها بسیار است بطوری که
جمیع اطباء دانسته اند که اینها از هر قاعده و رسمی نمیتوان مرث نمود ولیکن که در یکا
چند است و از قبیل آنکه تغیری داده است توتیتی که هر قبول کرده اند و آن توتیتی
قرار است که سموم را چهار نوع کرده است و تمیز این انواع بواسطه اثری است که آنها
در بدن می نمایند اول سموم محرک و دوم سموم مخدر سیم سموم محرک بخار و چنانکه
مقتضی این تقسیم این را بخان و سایرین دارند که علشان در بدن بهم نزدیک است و
باز میباید شخص را از اینکه کمتر مکرر کنند و باید اقرار کنیم که سموم از یک نوع
علشان در بدن مختلف شود بواسطه اختلاف مقدار و بواسطه طریق دخولشان در
بدن مانند آنکه در بیان املاح سرب که در مرتبه سموم محرک نوشته شده است و
دیده که بعضی از جذب شدن اثر ثانوی از آنها بطهور خواهد رسید

اغلب از سموم داخل بدن میشوند بواسطه مجاری غذا و بعضی از روی غشیه
خاطی دیگر و برخی از روی جلد بخصوص وقتیکه بشیره نداشتند باشد و بعضی از روی
جراحات و از روی غشاء طمانی بمرجهت پس از دخول سم در بدن از آنها با در
موضع است که تحریک و تحریکات کنند مانند ترشهای تند با آنکه در موضع
نمیکنند و جلد بشته اثر در موضعی دور از آن موضع خواهند که مانند انقباض
بعضی از سموم علشان مرکب است که مایه توهم التي میگویدند که ابتدا با حجاب
میشوند و بعد انجمن از آنها که محک و موشو همان عمل را در موضعی دورتر از

موضع اول ظاهر میکند مانند ذرات حج و بعضی دیگر عمل میکنند در اعصاب بدنی آنکه
 در موضع تحریک شد یک نمایند مانند کچله و تنباکو بالآخره بعضی از مسموم هستند که
 پس از دخولشان در بدن ابتدا اثر میکنند بخون و ترکیب و امراض باغ و فاسدین
 مانند مواد برخی و سستی در هرهای حیوانات از قوای بدن که معلوم میشود که اکثر آن
 مسموم جذب میشوند و در وجود مسموم جذب و در بدن بافت نشد بود و بعضی از اطباء آنکه
 در جذب هستند و اخلاقی هم که اقرار میکنند فقط از تغییر علامات افعال بدن عمل
 بر جذب میکنند اول که است که اغلب مسموم معدن برادر اکثر آلات و خون
 و در سر خود و قرار از برای مامورین اطباء و بوفی و قانوق کذا در اغلب مسموم
 ایشان در بدن بلا واسطه پس از دخول آنها است در بدن و در قنار آنها حلال و شایسته
 و بعضی اوقات هم میشود که رفتارشان در بدن مبرک و در آنها نیکو کار کرده اند
 این رفتار ثانوی یعنی بطور از همان را در خطا اند زیرا که چون در محیط جبهه و سرب
 گفتگو خواهیم کرد این اثر از آنها خواهیم دید که بطور مبرک و مایه هم اند و در این
 وجود آن مسموم بطی الاثر است که قد ما قائل بودیم که در یکوقت معینی موثر هلاکت می
 کشند و اغلب اوقات اختلالات احشائی خیلی شدیدی را و تغییرات التي را که در
 شان بطی بود و دفعه شدت میافت و موثر هلاکت میشود چون نمیشد
 بواسطه اثر سستی بطی العمل میکردند محال است که بطور عام علامات اراض سستی و
 اختلالاتی که از آنها در بدن مبرک بیان نمود و علامات آنها را بجهت است که
 در بیان انواع علامت آنها کور داشت همین قدر میگوئیم که اغلب اراض بطی و در ما
 و نخاعی میتوانند مشتمل بر اراض سستی گردند علامت آنها ثقل و ایلا و وس و وبا و
 صفای و قولنج کبدی و قولنج کلبه و بعضی از اراض عصبانی و نفی الدم و ماغی
 میباشد و لی از اطلاعات قبل و مقایسه علامات و رفتار آنها میتوان حقیقت
 حرف را

مرض را فصد و هرگاه مرض ممتدی که کرد از تشریح مرضی بخوبی نمیزداده و
 شد اینجا بیکه هیچ قسم نمیزداده نشود باید مواد مستفرغه و بالآخره کسند بطور
 شیمیائی
 علاج اولاد و هنگام از برای علاج اراض سستی معین کرده است یکی آنکه لطیف زفا
 کمی بعد از خوردن ستم یا این مرضی حاضر کرده و بیم آنکه خیلی در خبر شود و در هنگام
 اول باید حمایت نماید عمل سم را از بدن کردن و از بدن و از ضرب کردن او را
 خنثی نمودن که هرگاه سم در الت غده داخل شده باشد مقدار سرن پادی ابقا
 با مخلوط با روغنهای رقیق بخوراند و تحریک قی کند از غده کردن کهات با
 از استعمال موی مانند انتمون و سولفات و ورنک و از آنها بهتر است که گوانا و هرگاه
 تشنج عضلات و با خواستن در بعضی مانع دخول و با جلق شود باید مبلری را از زمین
 داخل معده کنند و هرگاه تشنج صورت با فکین مانع خارج شدن مواد بودند باید تلیمه
 معدن و آبکاری بکنند که در ابتدا معده را با آب بار و غن کرده بعد بیرون کشند تا بحد
 بداند سم باقی نماند در معده اینجا که سم در مستقیم بود بواسطه حقیقه ساده با سهل
 خارج سازند و چون در سطح خارج بدن باشد با در روی زخم شستنی پاک کنند
 چون در انقباض تر اخبر از سم مخصوص بواسطه جذب است باید این جذب و اتعوب
 انداخت از نهادن عقی می مابین موضع و قلب و اما دکنند جو بان خون را از فضا
 بموضع و خیلی خوب است نهادن بجات و موضع اشاره و بیم آن است که سم را
 خنثی کنند بواسطه جسمی که بتواند آن سم را بحدی بکشد یا مرکب با او شود و جسم دیگر
 بوجود آورد که موذی بدن نباشد و این جسم نامیک شده است و باقی با ضد سم
 در بعضی از اراض سستی که حاصل میشوند بواسطه مواد متعفن و زهرها حیوان
 و بر مگر خود را اگر چیزی پاد و اف و در دست نباشد بوی خنثی کردن آنها تا

سوزاند و از برای اینکه داغ مؤثر باشد باید جمیع سطح جراحت را با یک ضمامتی
بیسوزانند این قواعد مذکور را پیروی میشود و هر هنگامیکه طبیب باین
مرض پیابد و هم در صورتیکه علامات عمومی بروز کرده باشند اما در صورتیکه
طبیب باین مرض وقتی پیوسته که انحراف جذب نشد از بیم بواسطه قیاسها
از بدن خارج شده باشد باید مدافعه نماید ان اختلافاتی را که از جنس شک است
عارض شده اند اینجا که بروز مرض سیمی از خوردن یک مخلوطیست که مرکب باشد از
سموم چند شرط اول خروج آنها است از بدن با استعمال قی و مسهل و بعد تریاق هو
از آنها را استعمال کنند هرگاه دوسم یک دفعه خورده باشد باید و تریاق مخصوص
انها را استعمال داشت بشرطیکه دواها یکدیگر را مخدوم نکند و در این صورت باید
فقط همان تریاق ستم شد بدلیل العمل را بکار برند و باید اقرار نمود که کار طبیب در این
صورت مشکل است چه بواسطه آنکه بد رستی نمیتوان فهمید که چه مخلوطی خورده
و چه بواسطه آنکه همیشه طبیب نمیتواند بفهمد که آن دوسم چه عمل در میان هم کرده
نوع اول از اراضی سیمی که از این سیم و سوزان سموم محرک آنها هستند که متورم
سازند و تحریک میکنند اسناچه که با آنها مجاور میشوند و اغلب از این سموم عمل
شان فقط موضعی است و بعضی پس از جذب عمل با نوری نیز دارند و بعضی از این
سموم هستند که بیک مقدار معینی محرک اند ولی چون بمقدار منقسمی خورده
شود با از جلد و سر به داخل بدن نرودند عمل دیگر در بدن نکند چنانچه در امراض
و سوز خواهد بود

امراض سیمی و سوزان و فوری و بد و مملو جمیع این اجسام محرک و محرقت چنانچه
هرگاه فسفر داخل معده شود میتواند موثر تورم او گردد و نیز که این معدن با
هوای موجود در معده مشتعل شده میسوزد و تبدیل میگردد و با سید فسفر

و

و یک جن او که جذب میشود اثر زیادی میکند بر اعصاب و این مرض را که میاغلب قیاس
و جمع شدید در محل معده احساس میکرد و علامت عمده فقدان قویست و هرگاه
مرض را باین حالت ببالا کشند بواسطه عرض تشنیه خواهد خورد و در کارخانه آنکه
فسفر بکار میبرد بعضی امراض شایع است چنانچه در کارخانه های کبریت و فرکی سان
اغلب از عمل جات مبتلا میگردد و بمرم شعب قضیه آنکه بهر فرجه عظم فک اعلا
و اسفل چون بد معده داخل شود تبدیل میگردد و با سید هیدریدیک و معده را متورم
و نرم و مجروح کرد اند هیدریدات و ویتاس بمقدار زیاد همین اثر را دارد علامت
تھویج قی و دفع شده بد عطش مفرط و غشی و تشنج است و مملو میگردند اند بحسب
اختلاف نوع یا غوطه شدید و با نرف الدم در حلی

علاج اینجا که سم فسفور بود تحریک کنند از غده و استعمال اینها که از او بعد
معده را نرودند از آب جوشیده که قدری نیوی داخل کنند تا غشی نماید و تشنیه های
فسفر را و همچنین طور رفتار نمایند اینجا که سبب بد با بوم بود فقط و سر به بعضی
نیزی نشاسته استعمال کنند و از برای و کلونوز بقصیل درستی بدست نیاید
است فقط از برای علاج اول بطوریکه از برای علاج بد مملو میگردند نشاسته
از برای نانی اب یا ضایع بعضی بهتر است

امراض سیمی اصله از تشنیه های غلیظ قویه تشنیه های سیمی بود و نوع اند و غشی که بعد
درازده میباشد از نشان موضعی است که تحریک و تحریق میباشد از این قیاس است
اسید از یک هیپو از یک کلرید یک سیدر یک تیزاب طلائی هیپو فسفریک و فسفریک
فوری در یک اسید سولفوریک اسید لولفر اسید لولفریک و بعضی دیگر بعلت
اثر موضعی یک اثر دیگر هم بواسطه جذب از آنها در بدن دارند و آنها هستند
اسید اسکیک و اسید ارسنیک و اسید ارسنیک در میانیکه ما میبینیم منطوق

ان اثر سببه حاصله از امید سولفوریک و اسید از نیک است که پیش از سپارین در پله^{مشق}
 از امر اضطرار حاصله از توشهها نیکه عملشان فقط غریک و تحریق موضع است
 علاوه بر توشهها در اشیا صلبه از این توشهها بملاکت می رسند در وی ناممل مخصوص در
 روی لجهای آنها بعضی لکه های مشاهده کرد که اغلب لون آنها دلبیل میشود بر
 توشی که خورده شده است چنانچه اگر آن توشی جوهر کوکود باشد آن لکه ها مراد ی
 سیاه رنگ اند اما وقتیکه اسید نیک باشد لکه ها زرد رنگ خواهند بود و گاهی
 از اوقات همین لکه ها مشاهده کردند در وی دندان وجود دهان و مری و هب
 موضعی که این توشهها بر خورد نمایند تغییری در حالت بهم رسد که آن تغییر نسبت به
 شبیهائی توشهها خواهد بود چنانچه این انساج که زرد رنگ شد اند تبدیل می
 شوند بماده چربی یا صافی که بسیار که قابل تعین اند و هم چنین یافت میشود
 در جوف ان انساج بعضی بخارات مخصوص ازت و اسید کربنیک و در اغلب ان
 مواضع بواسطه مجاوزت هوا بعضی اختلافات و ریز حاصل میگردد که مخاطها
 و حلق و مری سرخ و سیاه و شقاق و جراحت در بعضی از مواضع هم میسراند و در بعضی
 از جاها ماده سفید رنگی نمودار گردد و در معده و اثنا عشر نیز بعضی اختلافات
 بهر سبب که زیادای آنها بسته به زیادای توشی خورده شده و غلظت او است چنانچه گاهی
 از اوقات بسیار بند جمیع صفات و ریز شد بد معده و اثنا عشر را که مخاطها قوی
 شد در بعضی از مواضع سیاه و نرم گشته شید میشود بماده چربی و پوشیده میگردد
 از غشاء کاذب و در بعضی از مواضع ملاحظه کرد در صهب و ثقب و باشد که این
 تغییرات در جن اعلا امعاء و دقاق ملاحظه کردند چنانچه عجبی است که بعضی اوقات
 اختلاف زیاد مشاهده نکرد و در معده و مستقیم و این دلیل است بر اینکه^{سم}
 بزودی از امعاء دقاق عبور نموده است و هم مخاط امعاء محفوظ شده اند
 بواسطه

بواسطه وجود مواد رقیق که از میان آنها عبور کرده است اگر عرض حرکت رفان
 طولی بعد از خوردن توشی باشد معده و امعاء جمع شده هزال میبایند و همیشه
 کوپک میشود و غشاء مخاط سفید و ضخیم میگردد و مری نیز تحول بهم میرساند
 و استخوانها شکننده میشوند
 علامات در فم و مری و اشتیاق صلبه توشی غلیظ میخورند در همان ان احسا
 میگردد و طبعی سوزان در دهان و وجع شدید و در حلق که سرایت میکند و
 گشاید میشود تا معده و در همان وقت عارض میگردد و مواد مخمریه گاهی
 و اغلب زرد رنگ است و خلق را میسوساند و بوی اجز که ریخته شود میجو
 و گاه آن تور نشل را قوی میکند و بلع محال میگردد و فوق و عطش مفرط عارض گردد
 و بزودی قولنج شدید و شکم متنفخ گشته اسهال خونی عارض شود از ابتدا علائم
 عمومی شدید بزرگتر گشته نبض سریع و صغیر و غیر منتظم گردد و تشنه عارض
 گردد و بدن پوشیده شود از عرق سرد و لخته و لخته در لجه افتد و کیود گردد
 و چشمها کور افتاده سیمای تغییر کلی هم میسراند در جوف دهان شقاقها میسراند
 و اغلب اوقات باره مرادی رنگ مشاهده کرد که مخاط زرد و قرمز با
 تراش بسیار و بسیار موحج است و در مری موقوف شود و حس عسرت و
 تنگی در صدر پیدا گردد در چه این علامات مختلف شود بواسطه مقدار
 توشی مشروب و در چه غلظت او چنانچه اگر مقدار او از نیک مثقال کمتر
 بود علامات محدود شوند بد دهان و حلق و مشاهده نکرد در مری و حلق
 بسیار موحج و باید ملاحظه نمود که چون مقدار توشی خورده شده کمتر باشد
 مورت حد و ث وجع بسیار شدید میگردد و حال آنکه اگر مقدار توشی زیاد باشد
 وجع بسیار کم خواهد بود و این برای آنست که در صورت اقل توشی همان

مورث و سرم و بود داشتن بشیر میگردند که غلط بودند و نه شد لهذا حشش زیاد میگرد و در صورت
 ثانی تسخیر بکلی سوخته شده و در حس کردن و معلوم است که در میان این دو حالت
 بسیار روی خواهد داد که محتاج به بیان نیست در حالتی بسیار شدید مریض
 شود در پنج شش ساعت و گاه تا سه روز هرگاه از علامات اول مریض بمرگ نرسد
 علامات و سرم دهان و حلق شدت نمایند بواق زیاد و صد گرفته شود و سرم حلقوم
 بهم رسد و وری که ابتدا محدود در دهان و حلق بود سرایت نماید بمری و معده و با
 دقاق و هرگاه باز مخرقه بمرسید باشد تا از هر هضم جدا شده بپفتد و افتادن آنها گاه
 از اوقات همراهی کند با نزف الدم در این صورت بعضی از مریضی علاج میشوند و برخی بخلاف
 فی و اسهال عارضشان گردد مدافعی که در میان مواد مستغرق بعضی غشاهای کاذب نمود
 شود که چون جوف آنها را بدمند شپه کردند بمری یا معده و اغلب اوقات افتادن غشاء
 کاذب همراهی نماید باشد بد شدن وجع مخصوص از خوردن مشروبات اکثر این مریضی
 چون نمیتوانند چیزی بخورند و هضم کنند بواسطه قوای بمرگت میرسد و برخی شفا
 مییابند ولی زمان نقاهت طویل خواهد بود و بیشتر اینها بیکه چاق شده اند مدام
 العمر بعضی اختلالات در آلات تغذیه آنها میماند مانند اغلب مبتلایان میگردند بقل سوز
 هضم و وجع عصبانی معده ترشی کو کردن و تیزاب بیشتر که جذب شوند و طبا تا کون اونی
 که از جذبات آنها میپاشد باشد هلاک خطه نکشته

تسخیر بواسطه علامات مذکوره و ملاحظه دهان و شناسائی حالات سابقه غشوات
 مشبه نمود مسمومین ترشی را در عدم قول مریض بخرید کمپای طبیعت او را واضح مینماید
 که چه ترشی بوده است

تقلید المعرفه خطو بیشتر است هر قدر مقدار ترشی خورده شده بیشتر و معده خالی
 بود و چون ترشی را بخواهیم بخورند خطویش کمتر از آن است که بعد خورده باشند از برای

اینکه

اینکه در صورت اول حکما گستر خواهد خورد

علاج اینجا که اثر ترشی فقط بد دهان و حلق باشد که بعد ترسید باشد باید معالجه و سرمها
 و حلق کرد و هرگاه بعد ترسید باشد و طبیب هم زود ببالین مریض باید و چنان فرض کند
 هنوز در معده مقدار سری از ترشی باقی است باید ترشی را خنثی نمود از نوشاندن آب زیاد که
 در او مقدار کمی از ترشی مکتس مخلوط کرده باشند و هم چنین مستعمل است محلول بسیار
 رفیق کربنات و پلاس و هم محلول رفیق صابون و هرگاه که هیچیک از اینها بدست نیاید
 همان آب خالص زیاد بدهد این معالجه مستعمل است با چند ساعتی بعد از خوردن ترشی
 هم اینکه چند ساعت گذشت بخصوص اگر مریض فزایدی کرده باشد این معالجات غیر از
 آنکه منفعت بخشند مضر خواهند بود در این معالجه ضد و سرم مثل قصد موضعی را عمو
 و اشربه ملعبه بنوشانند و پرهیز از غذا دهند

امراض سمی مورثه از ترشیهای مریضی یعنی آنکه هم مریض و محرق موضع مجاور باشند و
 هم پس از جذب در آلات دیگر ترشید سر قسم از این ترشیها و ایدان نمودیم یعنی اسید اکسلیک
 و اسید ارسینیک و اسید ارسنیک

مریضی حاصله از اسید اکسلیک اسید اکسلیک در وقتیکه غلبه بود اغشبه معده و اونی
 و مجروح نموده محلولی را قیاسی از آنها حاصل کنند و اینجا که منبسط از آب باشد در موضع
 اثری ندارد ولی همیشه مورث بر و ترکه های مریض در داخل مریض میگرد

علامات در مریضین حیات و جمعی سوزان در معده و قهقهای سبزه سبزه و هم خونی و نیش
 ضعیف بمرسانند و اغلب غیر محسوس گردد عرق سردی بدن را فرا گیرد ناخنها سبزه شود
 در بعضی از مریضی حس حرکت غلی و خدل مرت در اطراف مریض بد بعضی مبتلایان بیالنج کردند
 در دیگران تشنجات بر و تر کنند و بزودی مریض بمرگت میرسد یعنی در یک ساعت یا در چندین
 دقیقه و اینجا که اسید اکسلیک را منبسط خورده باشند اولاد ترشخاع او کنند و بعد بقلب

وان اشخاص بجلالت رسند بواسطه اختناق بابواسطه غشی که چه بوضوح پیوسته است که اسید
اکسید جذب میگرد و وی تاکنون در هیچ مرتبه با صلبه بدن او را نتوانسته اند پیدا کنند

علاج چنان است در میان پزشکها مذکور شد

علامات و نشانه‌های مرض اسید اسید اگر چه اغلب در مصنفین این نوع امراض مانند از قبیل
و غیره ذکر نموده اند اشخاصی که از این ستم بجلالت رسیده بودند هیچ علامت و سرم و غش
پادری جاری تغذیه آنها نبود و بعضی دیگر که در میان بسیار جنونی بوده است و این
بسیار نادر اند و تقریباً همیشه در مسموهین اسید و سنبو ملاحظه میگرد که سطح داخلی
معد و امعاء قرمز و سیاه و مجروح شده اند و اغلب هم مشاهده کرد و باره سوخته و
رنج سخت و گاهی هم همین علامات در جری و حلق مشاهده کردند و گاهی هم ملاحظه میگرد
بعضی از اینهای سفید رنگی که ملصق شده باشند بخاطر معد و حاصل شده از ماده چربی
که ماده شده باشند با باخراش و گاهی نیز مشاهده کرد و غشاء کاذب در جوف معد و
امعاء قلب و ریه عموماً پیخون شوند و این خون اغلب سیاه و قوی و لایع است و حادی
اسید امر سنبو است و هم اسید و سنبو یافت کرد و در آلات عمده بدن بخصوص در آلات
مشرخر و انالبتکه صاحب عروق بسیارند و اختلاط اسید و سنبو با خون مانع میگردند
شدن او را

علامات و نشانه‌های اختصاصی که اسید و سنبو بخورند در جبین خوردن طعم بد احساس
نمیکنند و طبعی که احساس سنبو یا سنی نیست با قدری قابض ولی اگر چندی ستم در دهان
و حلق بماند طولی نمیگذرد که شخص احساس میکند حواریت سوزانی در موضع و بزودی
وجع شدید و معد و عارض شده عطش مفرط و وی هدهد و قوع و سبک و سوزان و خون
بهم رسیده قوی و لایع میگرد شکم با نفخ کند با کشید و اسهال عارض کرد که مواد خاکی
و خون الود و متعفن بود و طولی نمیگذرد که باین علامات مولد مینشود علامات عمومی آن

افزیم

افزیم پس از جذب بسیار اعضا چنانچه نبض که در ابتدا بواسطه ورم معد و امعاء متغلی بود
منتظم و متواتر و غیر محسوس گرد و ضربان قلب کوچک و در هم شود طبع قلب و غشی و
و عسرت در نفس میسر شد و در بعضی علی الاطلاق اخراج بزلی غلیظ و خون الود کند صورت
افزیمه و کبود و چشمان کبود افتاده و اطرافشان سیاه شود جلد سرخ و پوشیده شود و
های سیاه و عرق لایع و در کمر وی نه قطع شود و در میان او اسید و سنبو پیدا شود و
مضطرب گردد و دو صداع میسراند و در بعضی نشانه‌های جنونی با عمو میسراند و در بعضی
یاد و چند اطراف مفلوج شوند بعضی مبتلا به جذبان با اغشاء شوند و در بعضی تا هنگام
مرگ مشاعر باقی مانند این حالت از یک تاس و سوز طول کشند و در میان نشانه‌های شدید
با غشی در بعضی بجلالت رسد اینجا که مقدار ستم زیاد بود در بعضی فقط در چند ساعت بجلالت
رسد و بدن شبیه شود ببدن اشخاصی که بمرض و بمره باشند و بعضی از اشخاص در ابتدا
کم شفا مییابند که حواریت بدن بکشته نبض متغلی شده و سایر علامات و لایع شوند و
شفای کامل حاصل نشود مگر پس از زمان طویل و هم در چند مرض تا چند سال خشک با
قوی با بر عسرت در بعضی از اطراف شان باقی میماند از قریه که مگر کور شد معلوم میگرد
که اسید و سنبو یکی از سمومات قویست که گاه حواریت یک ده یک کندم او و شرعاً
ضعیف گردد و نیم کندم او و مرتب حصول علامات سمیه مینشود و از یک نادر و کندی
مهلک است هم بواسطه اثر محرقش و دالت و هم بواسطه جذب و اثرش در قلب و
علاج وقتیکه طبیب بیا این مرضی برسد که تاثر اسید و سنبو خوردن باشد با
تحریر یک کند از غده بلهات و چندین بار با صالهای بسیار که یک مثقال سنبو
اکسید و فرهاد را به خشک با نیزی هیدراته و یا چنانکه موسیو بون شاد حکم کرد
است از هر وی اینها بنوشانند و لی بمقدار سز پاد اینجا که طبیب بعد از چند ساعت
بیا این مرضی بد که سم با معاء داخل شده باشد باید قویا و اینگونه کور استعمال کند

و بعل او چند قاشق روغن کوچک بنوشانند و چند امال علیین کنند تا ستم فروزد توان
 بدن خارج کرد بواسطه قهقهای زیاد و اسهال متواتر و نرمانی که از هضم خورده ستم
 گذشته است طبیب چنان میفهمد که در آلات تغذیه ستمی نیست باید بدفع علامت
 عمل که مانند بگوشت چنانچه اگر تنفس شدید و نبض غلیظ و صلب باشد فصد کنند و
 چون قوی ضعیف شده باشند دلك با دوپه هر که کنند و ضماد خود را بکار برند و شمع
 ذرا در معده اندازند و مقویات و منعشات بنوشانند چون از قبله محقق نمود که جن
 اعظم ستم جذب شده از کلیتین دفع میشود باید اشربه مدره بنوشانند تا بخریدگی در
 اسید ارسینوپان نمودیم برای سایر مواد مرکب از او مستعمل است مانند سولفور
 و ارسینیک و اسید ارسینیک و ارسینیات و ویتاس و سود و ویتور و
 نظیر و فو و غیره

امراض سمی مخصوصه از قلیای پتاس و سود و شو و بریت و امونیاک و کلورید
 و مانیک و جگر که در متورم و نرم میسازند و جرح و متقوی میکنند معده را
 و اغلب از این مواد بخصوص پتاس و سود و امونیاک مجرب و پیشوند که میتوان و جود
 آنها را در بعضی از آلات نمود

علامات مسمومین ادویه قلیای احساس طعم اد مراد و حرارت شدید در
 کتند و وجعی شدید در شکم همسید و قی خون الود عارض که مواد مخدر در روده
 زمین بخوش بیایند و کاغذ ابی را بر آن قور نسل بر گردانند سپمان غیر کلی حاصل نمائ
 جلد سرد و نبض ضعیف شده تشنجات چند عارض گشته مریض هلاک گردد و با اختلا
 ادویه قلیای علامات چندی غیر از علامات موضعی مذکور بهم رسد مثلا اگر
 سم خورده شده بوییت باشد تنفس موقه میایستد و فلج جزئی عارض گشته مریض ج
 و حو که میماند و اگر ستم جگر که در باشد از دهان بوی تخم مرغ کند یا خارج شود

ذیبا

ذیبا که این نمک بواسطه تشبههای معده تجزیه گشته بخارات همد شدن سولفور
 متصاعد کرد و بکبریت تجزیه شده در دوی غشاء مخاط مرسوب کرد و در بعضی
 اوقات مقدار این مجدی خواهد بود که شخص دفعه بجلالت مرسد و اغلب از این علامت
 ۳ ساعت بجلالت مرسد شویر که در میان سمومات مذکور شده است نادر مکر
 یک نمک ضعیفی در آلات تغذیه و لی از جذب او یک خداری در آلات بهم رسد از
 بروی غشی و دوار سردی بدن و بطو نبض که در متقال نیم الی سه متقال شود
 اغلب مورث بروی این علامات شده است

علاج اینجا که دوی خورده شده سود و ویتاس و اهل و اما نیاک باشد باید
 سر که که در و نلت با سر ریح ارج اخل کرده باشند بنوشند و قتی که دوی خورده شده
 اب نرا ده باشد که نمکی است از کلر و ویتاس و سود و تحریک کنند بواسطه اشربه
 و بیاض البیضی و اینجا که سبب بریت باشد سولفاتهای محلول استعمال کنند تا
 مانند سولفات و سود و سولفات و ونیزی و اینجا که سبب پواد و سوفی باشد
 یعنی جگر که در باید مقدار زیادی اب بنوشانند و یک قاشق کلر مرقی بنوشانند
 و تمهید و جبر ترشی بخوراند که بخار هید سولفید و یک متصاعد شود و هیچ تریلی
 از برای نوشاد رو نراج سفید و اکسالات و ویتاس نیست مگر اینکه باید قی نمود
 خلاصه بعد از قی دفع علامات موضعی کنند بواسطه ادویه صند و نرم و از برای
 عارض شدن پختی و پختی اشربه و باید منعشات بکار برد مانند اطر و الکلی قوی
 درین سیم حاصل از املاح انتیمون که در داخل مسموم اند شمرده میشود و انتیمون
 قی و برد انتیمون و سوفی و در و لی چون انتیمون قی بسیار مستعمل است اغلب بواسطه
 او است که مردم مسموم میگردند

علامات تشریحی انتیمون غشاء مخاط معده و معال متورم ساخته سرخ و کبود

میکرد اند و مایه بر و زنبورات میکرد که گاه منتهی میکرد و گاه غلبه و غلبه با و یک
تغییری در پنج ریه بهم میرسد که یا بخون بکشد یا طحال را منتهی بپا^{نیمون} از^{نیمون}
که هم تحریک موضع کند و هم پس از جذب در ریه اثر نماید
علامات و زنبورات از خوردن انتمون احساس طعم معدنی در دهان شدت
در معده بهم رسد و قولنج و نفخ شکم بهم رسد اطلاق زیادی روی دهد بعضی صغیر
کشته سیمان تغیر یابد و جلد سرد شود و بزودی عسر النفس عارض شد و وارد^{شیر}
اعضا بهم رسد غشی و عرق روی دهد مقدار کمی که انتمون مورث علامات سیمی^{کشد}
مختلف میکند از حیثیت آنکه شخص صحیح المزاج است یا مبتلای بمرم است چنانچه در
اشیاء و مزاج از پنج^{نیمون} انتمون اکثر مورث و زنبورات علامت خطر^{نند}
کرد و حال آنکه صاحبان و مرم از سه^{نیمون} مرتبه از انتمون زیاد تر است و
تحمل کند

علاج وقتیکه مسموم بانتمون قی کند باید تحریک قی نمود از دغدغه لحاظ و
بزودی مطبوخ ماز و یا پوست کنه کنه زرد که ماکرم که از سی^{نیمون} لجهل درجه حرارت
داشته باشد بنوشانند و اگر این ادویه بهم نرسد ریشه یا پوست یا چوب^{نیمون}
قافضی را لجه نموده بنوشانند زیرا که انتمون با دق مرکب شده جسم غیر محلول
حاصل میکند و قتی که واسه حال زیاد بود که قوی را تحلیل میرد^{نیمون} اش به سرد و ترش
با ابهای مجز و تر پاک از دهان یا از مقعد بواسطه حقنه استعمال کنند و بعد از
و مرم بزورند اینجا که در او مرم انتمون بمقتل زیاد استعمال شود و مورث زوال
قوی گردد و شراب و الکل و اطو بنوشانند و بدین^{نیمون} لک نمایند تا تحریک قوی
اطباء ایتالیا یعنی پیران را زردی که فتر ع ادویه خلاف منعش بود میگویند
که در این مرحله تر پاک هم باید استعمال نمود ولی سابقین استعمال او را
جایز

جایز نمیدانند مگر در حالتی که زوال قوی همراهی کند بلق و اسهال موسوی و نطو نمود که مانع^{نیمون}
توان امتین تر هست بعضی جوهر اسکا^{نیمون} و قلع و زری
امراض سمیه و سمی و نکبات^{نیمون} طلا و نقره و کلات و دادر و تیرات و در زمان و هدر و کلات
دوین و سولفات و در زمان که در طب مستعملند میشود که موثر علامت سیمی^{نیمون} کوه ندان
مواد مایه نورم معده میکند و بعضی هم غشاء معده را خورده و سوراخ میکنند
مانند تیرات و در زمان که هرا این ادویه مورث و زنبورات علامت موضعی که از استعمال
ادویه محرق بزور میکنند میشوند و جلا و هدر و کلات و دادر تحریک زیادی
الات قاتل و دماغ میکند و از فیلا نموده است که سولفات و زرنیک میکند از غلبه
پس از جذب شدن در دماغ داد نه بواسطه و مرم موضع

علاج در ابتدا باید ادویه را بواسطه قی از معده خارج نمود و علاج اثر سیمی^{نیمون}
بسته بدای مستعمل است چنانچه از برای کلرد و دادر فقط ادویه و اش به ملین^{نیمون}
و بوضع و مرم کوشند از برای شراب و زرنیک خیلی زود قدری آب نمک دهند و از برای کلرد
در دق و سولفات و زرنیک شرب بنوشانند از نجسبات از فیلا معلوم شد است که
با ان دو نمک ترکیب شده جسم غیر محلول عمل می آورد

در امراض سمیه حاصله از مواد سمی استعمال اخرفهای مسی را شرب یا خا^{نیمون} دلیلی است
اشیاء صریح از او مسموم میکند و چه از اکسید و کوپو و چه از املاح کوپو را اغلب
مسموم کردند بواسطه اکسید و کوپو و کوپو و کوبیات و کوپو که حاصل میشود
نورهای حرک و سفید نکرده و بجا و رت هو و کاهی شخص مسموم میکند بواسطه است
با اکسالات و کوپودی که حاصل میشود در وقت لجه غذا و با غذا مخلوط میکند و بعضی
شرب بنها و خیار تر بنها که برای^{نیمون} نیک بعضی از املاح مس را با آنها میزنند باشد که
مورث بزور علامت مرم سیمی گردد و دادر لخل شدن هدر و زردی بدن اجتناب

مس مورت بر وزن بکوع قولنج میگرد که مستی شده است بقولنج مسی و اغلب دپله میشود
در آنهاییکه مس کار میکنند و چون این مرض در جبهه اول عرض میسر است ابتدا از آن فکر
مینمایم

در قولنج مسی متصل میشود بوجع شدیدی در شکم مخصوص در حوالی ناف که از فشار
بشکم آشد میگردد و اغلب شکم کشیده است اینوجع همراهی کند با عطش و کمی شهاد
تقو و ق صفراوی و اغلب اسهال عارض گردد که همراهی کند با یخ و مدفوع با باری
باینتر کوفی است قولنج و حرارت بدن زیاد شده نبض متلی گشته صدام واضطرار
و وجع قطن عارض گردد و در بعضی خسته و بیقوت گردد از قرار مذکور هر لخطه میگرد
جمع علامات ورم شد بد با خفیفی در مجرای غذا خاصه در امعاء دقاق و رقتان اینرض
بسیار قصیر است که بندرت از هشت روز تجاوز نمیکند ولی عودش زیاد است
بخصوص هرگاه در بعضی و یا بر هواها و مسدود استنشاق نماید چون معلوم شد که اینرض
بکوع ورم امعاء است باید فقط معالجه او را نمود از استعمال اشربه ملعبه و حقن
نشاسته و ضماد کم و حمام فاتق و غیره انجا که می شد باید باشد فصد نماید چون شکم زیاد
کشیده و وجع شدید باشد چند بار زلواند از نند و قدری تو بالجهت تسکین وجع بخورد
در مرض مسی اغلب از مسموهین مس سببش خوردن استات و اسلات و کوبیات و
اکسید و کوئو است این املاح معده و امعاء را متورم و متقرح و هم منقوب سازند
بعلاوه مجذوب شده در جمیع بدن بخصوص در کلیه وادران یافت شوند

علامات آنجا که زنک مس خورند طعم تند و غصصی در دهان میسرانده احساس
خفگی در گلو کنند او و غمائی زنند که طعم مس از آنجا احساس شود تقو و ق عارض
شده شکم کشیده و وجع گردد و قولنج شد بد عارض گشته اسهال رویدهد و مدفوع
اوسباه و خون اود است و عطش مفرط عارض گشته نبض صغیر و جلد سرد و تقصیر

بهم

بهم رسانده ضعف بر بعضی غلبه کرده تشنج در اطراف بهم رسیده بعد از چند ساعت باز تحت
تشنج زنند در بعضی جهلاکت رسد چه در میان غشی چه در میان تشنج انوقتیکه شخص مسمو
گردد بواسطه خوردن غذائی که در میان ظرف درست سفید نشاء طنج شده باشد
بعد از نشاء یا بانه ساعت از خوردن غذا احساس صدام و کسالت و ضعف نمودن تشنج
در اطراف بهم رسد تقو و ق و اسهال روی دهد نبض صغیر و سریع گردد و چون املاح
بم بعضی رسد با آنکه مقدار هم خورد شده کم بود شفا بوج باید ولی مدت نقاهت بسیار
طویل بود بواسطه قولنج و وجع معده و اسهال که در اغلب دوام کند که در حقیقت
املاح مسی شخص را جهلاکت میسرانند هم بواسطه ورمی که در آلات غذا آرنند و هم
بواسطه اثر یکدیگر بعد از جذب در عصاب و قلب کنند

علائم آنکه شریط اول را بجا آورده اند یعنی آنکه سم را بواسطه قه خارج کنند
اندکاه با حقن البضغ هند که با اعتقاد از فیلا فقط قیاق مس است و سولفورهای مطبوع
مانر و فند که قیاق مس پیدا کنند با اعتقاد معلم مذکور هیچ اثری ندارند
و سوسو بشارت در این اواخر فریدوی از قیاقات مس خوانده است که در میان
عسل یا در میان اب سه یا چهار برابر بوسم خورده شده استعمال کنند و همین معصفت
معتقد است که غبار آهن را با غبار روی یکدیگر بدهند و میگویند که فصد
غبار آهن و روی اثر یک متقال استات د کوئو سر تا بل میسازد و انجا که
طبیعی بود رسد که سم از معده گذشته باشد باز باید اب بیاض را بیاضی را و
حقن ملعبه بکار ببرد بعد برفع ورم و اعراض دیگر کوشند

امراض سمی حاصله از سرب املاح سرب بمقدار زیاد که خوردن تشنج مورت و
بعضی در معده میگردند و هیچوقت غانفر با وجوحت در آلات بهم میسرانند
و علامات بسته بد جبهه ورم حاصله است که احساس طعم عفصی اثری در

وخلق بمرسد و جعی در معده بمرسد فواف و مخوع و ق و قولنج و گاه یوست و گاه سها
 بمرسد سیمای غیر که چشمها کو دافتند و اطرافشان سیاه شود و بجا گوید و در بعض
 صغیر شود در میان هذبان با تشنج یا غشی اندر رسد
 علاج بعد از شرط اول سولفات و سود با سولفات دو بنیز دهند که املاح سرب
 تبدیل کند به سولفات سرب غیر محلول و هم چنین گفته اند که بوسولفور و فربید
 فواف املاح سرب است و ط محقق نشده است و این قسم مسموم با املاح سرب بسیار
 نادر است و ط سرب معد نیست که اغلب مورت امراض تبیه میکند و ط این امراض
 نه بواسطه ورم التي هستند بلکه بواسطه اثری هستند که این معدن پس از جذب شدن
 در اعصاب میماند و آن امراض عبارتند از اوجاع عصبانی در شکم و اطراف و
 و انما و تشنج و فلج اما پیش از آنکه این علا را بیان نمایم بجهت است که تحصیل نمایند چگونگی
 املاح سرب داخل بدن میشوند و مورت بر وزن امراض میکند این امراض بر وزن
 میکنند و بر اشخاصی که مدتی زیاد مجاور باشند با املاح سرب مانند عملها که
 سفید اب شیخ و سرخ و نقاشها و رنگ ساها و اشخاصی که حوض فجاب میریزند و
 هم چنین بافت میشود ولی کمتر در عمل با سرخانه و سفید کردن و شیشه سازان و شیشه
 سازان و چینی گران و صفاران و آنها اگر چه مبتلا باین مرض میکنند ولی استعداد
 شان کمتر است از مردان و سن شباب و در آنست که ضرر و بهر و کثافت بوی استعدا
 می افزایند و دخول و راهای سرب بر بدن اندر و محل است یکی از پود یکی از
 معده و امعاء چنانچه اگر اطافی را تازه نقاشی کرده باشند و شخص در آن اطاف بخورد
 و نقاشهای روغن کان مخصوص چون در اطاف بسته و کرم کا و کند و عملهای سفید
 اب شیخ و سرخ بجا آید که مجاور سرب با نفس میکنند مبتلا شوند بقولنج سرب و از مجاور
 تغذیه داخل بدن میشود و در اشخاصی که بنوشند آب را که چندی بجا و ت هواد

طوف

طوف سرب مانده باشد و با آنکه بنوشند شراب و سایر شرابها که مردار سنگ و خلش
 کرده باشند و آنها بیکدیگر بخورند شربین الا که از کرمات و د و پلج بزرگ زده باشند
 و هم جذب میشود از معده و امعاء بواسطه استعمال و راهای سرب بخصوص سوزن
 د و پلج این سرب در بدن گاه بسیار سریع است چنانچه در یک شده هست اشخاص
 فقط بکشد سراطاق تازه نقش شده خوابیده و علی الصبح مبتلی بقولنج سرب شده اند
 و ط اغلب بطی است که بعد از چندین سال مجاورت بهوای سرب مبتلا با این مرض
 گریه و در اغلب این اشخاص از پیش میتوان ملاحظه نمود که سرب کم در بدن
 او اثر نمیدارد که در حقیقت این علامات را علامات مقدمه مرض میتوان شمرد که
 علامت جات کارخانه سفید اب شیخ و سرخ طول نمیکشد که رنگش باخته و هزار بابلی
 بدنشان سرخ شود و جلد مخصوص جلد صورت زرد کم رنگ و حتی جلد گوش و بطون
 مجاورت اجسام را احساس نکند و چندان وجع بهم نرساند و خون بی رنگ شود
 و مقدارش هم کم گردد و بلبولش مانند آنکه در انی کم گردد و ط سایر مواد صلیبه
 بحالت طبیعی باقی ماند و قوی بالنسبه کم شود و در اغلب یک طعم شیرین با عفت و در
 دهان پیدا شود و دهان متعفن گردد اگر چه عموما لثه سخت است در بعضی و غش
 افتد و بزاق زیاد شود با قدری نازک شود خارش بهم رساند و بند مورت سمیت
 از اندیش برداشته شود و در اغلب این اشخاص در اطراف اندامها بقدر و طاسه
 میله می شود و این کی بودی همه لثه احاطه کند و گاه سرب بجا طالب و و چند
 دندان نماید و این کی بودی بواسطه حاصل شدن سولفور و پلج است با این قسم که چو
 عبار او در دوی دندان و لثه گذاشته شود با بخار هیدروژن سولفور که آن
 بیماری غذا مقصود میشود ترکیب مییابد و این رنگ را میتوان در دوی لثه و دندان
 دستی بعمل آورد از دخیل چند قطره اسفاد و پلج سرد و خاها و بعضی از مصنفین

این رنگ را علامت مخصوص از سمیت سرب دانسته اند ولی نه چنین است این نیست
 مگر علامات فقط که بیانی دلیل است بر اینکه دندان و لثه با سرب مجاور شده اند ولی
 این علامات بسیار خوب است از برای روشن کردن طبیعت بعضی از اعضا
 هنگامیکه مقدمه مرض را ندانیم و گذشته از همه جمیع بدن این اشتیاق را میتوان عیادت
 کوک که بود نمود که هرگاه آنها را در حمام کوکوی بغیر کنند جمیع بدن مخصوصا بخاها نکه
 بدهند است سرباخن هاشان سیاه کرد و این علامات مذکور را ملاحظه میکردند
 در اشتیاق صبر که فقط متصل مجاور با سرب مثل اشتیاق در خا نجات سفید شمع
 و در سایرین که همیشه مجاور نیستند این علامات ملاحظه نکرد و داشتی صبر که این علامت
 سمیت در اعضا پیدا میشود مدتی مشغول کار خود خواهند بعد دفعه بکوان علل سرب
 بر و خواهند نمود و این علل بر و نکرند اغلب در هنگامیکه ان اشتیاق هنوز مجاور است
 و گاه مدتی بعد

تولید سرب عبارت از مرضی است که متصف میشود بوجع شد بد و شکم
 که گاه گاه شدت کند ولی چون فشار بر شکم دهند ساکت کرد و در هر حال که با تھویج
 و قه سبز رنگ و بیوست مزاج و تشنج و اطراف بعضی اجزاء دیگر
 نادر مرض قدما هیچ شناسائی از این مرض نداشتند اول کسی که از او ذکر نمود
 در زمانه هفدهم عیسوی بود و بعد از آن معلّمین این دو مانده اخیر شناسائی
 اوجد و جهل نموده رساله ای چند را برین صحت نوشتند که اگر بعد از آن هم خوب
 تطویل خواهد شد

تشریح مرضی در آلات تغذیه بهیچ تغییر مرضی نمیکند و ولی در ثلث از مرضی تقریبا
 غشای مخاط قدری خشک شده و بعضی از مواد داخله امعاء که بنز خشک شده
 باشند با و ملصق گردند

علامت

علامات باشد که این مرض ابتدا بر نغمه بود ولی عموما علامات مقدمه بطوریکه سابق ذکر
 کردیم بر و ز میماند که با آنها اضافه میشود و جمع اطراف و کی اشتیاق با سفیدی زبان و
 مزاج که روز بروز ترا شدت یابد و مواد مدفوعه سیاه رنگ خواهد شد چون مرض عارض
 و جمعی شد بد با خفیف در شکم عارض کرد که محل او اغلب در حوالی ناف و گاه در شکم بالا و گاه
 در شکم پایین است و باشد که در چند نقطه از این محال بود و هم باشد که از شکم سربایت کند
 بالاف تناسل و این وجع گاه مبهم و گاه بسیار حاد میباشد اگر چه متصل است ولی بفواصل
 بمقاعه بجدی شده نماید که مرضی از وجع ان عاجز شود چشمها را که گرفته صورت چینی
 شد فریادهای حول آنکه بر او درد و بخود پیچد و وضعهای عجیب قریب بکبره شاید جمع
 خفت یابد و اغلب بر وی شکم خوابند و مشت خود را که کرده بر شکم دهد چون بکلی از علا
 مخصوصه این مرض این است که وجع از فشار رجعت یابد ولی آنکای آنکه این خفت حاصل شود
 نباید آنکه فشار را بتواند و با سرنامل نمود بلکه با جمیع سطح دست بمالمت و قدری شکم
 فشار آورد و باین طریق اگر فشار آوردند تقریبا دو ثلث از مرضی را قدری وجع تسکین
 یابد و در يك ثلث از مرضی شکم قدری فرو رفته و کشید شود ولی در سایرین بحالت طبیعی
 ماند و کشید شکم دیده شود بخصوص در امراض شدت و این علامت علامت کوی با بواسطه
 عضلات شکم است که بالطبع نخواهد فشار بر اجشاء نماید تا تسکینی در وجع حاصل شود
 جمیع مرضی مبتلای بیبوست گردند و در سرب و جمع اعضا تھویج عارض کرد که در هر حال نماید
 باقی و بعضی مبتلا شوند به اذغ و غواف ولی زبان پاک و گاهی سفید رنگ است عطش
 گاه هست و گاه نیست و اشتها همیشه مفقود است دهان متعفن و در این همیشه که و گاه
 مویج و اغلب مرضی مبتلا شوند با وجع مختلفه مانند صراع و کشیدگی مویج بند بصر
 و تشنج با وجع اغلب در اطراف سافل و کتر و اطراف عالی و گاه در قطن و تقریبا يك
 مرضی مبتلا شوند بحسب خفگی در سینه با وجود جمیع این علامات حاد و موارث جلد

علامت

نباید قرات بنض با بحالت طبیعی با قدری سطو بهم رساند ولی مرض بسیار ضعیف و نحیف
 گشته قوی فانی گشته خواب از شدت وجع و اتصال او سر و ندهد
 این قولنج باشد که مرکب بوده بایک علت دیگر سرب که بعد ذکر خواهیم نمود و با بامرضی دیگر
 که هیچ مناسبتی با مرض سرب نداشته باشد
 و قرات و دام و انتهای مرض و قرات این مرض بسیار پیچیده است اگر چنانچه بحالت
 خود گذارد بعد از چند هفته و دام هیچ مبدل بدفع شدن نخواهد داشت ولی چون معالجه
 کنند بوفدی بطرف کرد و باشد که بعد از شفای کامل و باز عود کند و بعضی مرضی
 پس از چندین عود مفلوج شوند و اینجا که مرض ساده باشد هرگز منتهی بمرگ نکند و ولی
 بعضی از ترکیباتش مانند علل دماغی سرب منتهی بمرگ خواهد شد
 تشخیص اگر چه پیچیدگی او علامات مذکور فقط مخصوص این مرض نیستند ولی چون علامت
 مذکور و داملا خطه کنند بخوبی نمیزانند این مرض از سایر علل دارد خواهد شد زیرا که هیچ یک از این
 بطنی همه این علامات که ذکر میکنیم در آنها پیدا نمیشود و از وجع شد بد که گاه شدت
 نماید و از فشار بر بدن هیچ وقت شدت نیافتد بلکه ساکت شود و هر اهی کند با پیوست
 و قراتی و عدم حی چنانچه که در قولنج مسی و وسنطار با مشاهده کور و اسهال و هیچ گاه
 نفخ و وجع که با فشار مدت باید از ورم ساده و ده نیز تمیز داده شود باینکه هر اهی
 با وجع خفیف که از فشار شد بد شود و اسهال و حی و هم چنین حی نفخ و تعب بسیار وجع
 شکم که از اندک فشاری شدت باید تمیز دهند این مرض را از ورم صفرا قولنج ابل و سرج
 وجع شد بد و پیوست و قی باشد که بقولنج سرب مشتبه کرد و ولی قولنج ابل و سرج همیشه
 ابتدا از دفعه و موقی است و هر اهی کند با نفخ شکم و حلقهای روده که پر شده اند از ترش
 بالا آیند و در اخر مرض مد فیه بقی مبدل بپرازشند و از تعب بسیار و عرض حی تشخیص
 داده شود از قولنج سرب که اینها وجود ندارند در قولنج کبدی و کلبه بواسطه شدت
 وجع

وجع و قی عارضی و عدم حی در ابتدای مرض باشد که مشتبه با این مرض گردد ولی محل وجع در
 شراسیف این در قولنج کبدی و در قولنج کلبه در کمر و عرق و قرات در قولنج کبدی و قی
 ادرا و سرب است وجع به ضغن و بالا و قی به ضغن ها و عارض شدن وجع بقی و سرفه
 نیز بقی و در هر دو مرض تمیز آنها را از قولنج سرب بوفدی خواهیم داد و از اینها اینکه
 بیشتر بقولنج سرب کردند اوجاع عصبانی آلات تغذیه مانند وجع عصبانی معده و وجع
 عصبانی امعاء زیرا که در هر دو وی این مرض وجع شد بد یعنی در اوجاع عصبانی و قولنج
 سرب عرضش بقی است که از فشار تسکین یابند و هر اهی کنند با قی و پیوست و عدم
 حی و قی را وجاع عصبانی معده و امعاء پیوست کمتر و مد فیه بقی رقیق و بکی است نه
 و سرفه و وی و شکم کشیده نمیشود بلکه اغلب برآمد شود بواسطه جمع شدن باد و نفخ و
 جمله کرم وجع که بقی بوفدی نیز بقی و کلا و و بعلا و از مقد مات اطباء آن
 طبیعت مرض حاصل خواهد شد
 نقدی العرفه مرضی است خطیر بواسطه شدت وجع و هر اهی که در قی و علل دماغی
 و منتهی شدن شریف
 علاج از برای این مرض ادویه زبادی مستعمل بود که امر و زبانی اصلها معلوم شد
 و قی شده اند مانند ادویه ضد ورم و محلات و سماکو و کچوله و اجهای کور و قی
 سفید و شربتهای کبریتی و قی و امرو و زرد و نوع انرا و پاست که بسیار سفید
 و مستعمل اند بکی ضد سرات و دیگر قی و حجاب چون قی و اسهال و عرق و ادرا که
 اینها و میتوان فردا استعمال نمود با با هم و مبنای معالجه مشهور شربطه پیر
 مفی و مسهل و معرق است و الان هم اغلب از اطباء آن شیخ را بعینه استعمال میکنند
 و زرا و اول فلوس یا تمر عر کم اب هزار گرم انیمون مفی کنند صبح با شام آوند و برای
 سایر اوقات روزی مطبوخ کباب و صبح بعلا از خوردن و وایک اب مال مسهل نماید

باین طور سنا هشت کرم اب پانصد کرم سولفات دوسو هفتاد کرم شکر با کربن سید
دو کرم جلب یک کرم و سه عشر و عصر اما له آنودم یک اب مثلا و روغن کدو و ۲۵ کرم شکر
قرمز ۳۱۴ محجون تریاک ۴ کرم انبون یک کرم حب سا زنده شب بخورند و روز ویم
ادبیطبعی اب مقدس اب پانصد کرم انبتون پنج کرم مطبوخ معرق و اما له مسهل صبح و
اما له دیگر عصر چنانکه گفته شد

دو ز نیم مطبوخ معرق و مسهل بر قود و اسکان باین نحو که مطبوخ سنا و مطبوخ کباب
از یک پانصد کرم و معرق ساده و اما له مسهل صبح و اما له آنودن عصر
دو ز چهارم مسهل مشهور و مسهل نفاشان صبح با شام که سنا هشت کرم اب و
پنجاه کرم شربت الو ۱۴ کرم غبار جلب یک کرم و سه عشر و بعد از آن بنین معرق
بنوشانند و عصر محجون تریاک

دو ز نیم مطبوخ معرق و مسهل و اسکان و مطبوخ معرق ساده و اما له مسهل و عصر
آنودن و محجون تریاک

دو ز هفتم صبح مطبوخ معرق ساده و مسهل بر قود عصر اما له آنودن و محجون تریاک
در این معالج در روزهای اول حریض در هر چهارم و نیم میتوان شروع
به بخور آب و کم زیاد کنند و بطریق معالج این مرض امر و نزد میان اطباء اذینفر است
چون مرضی مایل بقی داشته باشد و زبان باره و در بود در ابتدا معی مسهل دهند با بنطو
انبتون و دو با سه کرم سولفات دوسو و پست و پنج کرم اکوان و واکار نکند با ق
واسهال کم او رد عصر باد و اب اما له مسهل کنند اذ این قرار سنا پست کرم غبار جلب
چهار کرم غسل شصت کرم اب پانصد کرم و در همین بین شکم را بپوشند از خمداد کرم
و عصر یک باد و کنند تریاک بخورند و هرگاه قبل بقی نباشد از ابتدا مسهل قوی که در
شریطه ذکر کردیم بدهند و بجوز مسهل قوی مستعمل است و دو با سه قطره و روغن فلفل

کدر

که در درد و حب بخوراند و هرگاه عمل روغن معی شود با آنکه پس از دو سه ساعت هیچ کار
نکند یک قطره دیگر در یک حب بنوشانند و این مسهل را دو با سه سر و ز بخوانند و اگر
قولنج هم واکداره باشد و بعد از این هر روز صبح نیم قطره در یک حب که است که هرگاه
عصر کاری نکند یک اب اما له نکار بر بند و چون تسکین و جمع طول کشد باید چنانکه
شد معالجه شریطه را بکار ببرد و بر بنی غذا نمیدهند مگر وقتی که جمیع و جمع واکدار
و پیوسته دفع کرد و چون عود مرض زیاد است باید همیشه متوجه شد که عمل شکم بجا
طبیعی باشد و هرگاه اندک پیوسته عارض شد بنودی دفع او کنند و طبیب باید هیچ
از استعمال این مسهلات قوی نکند چرا که هیچ توری در اوقات غذا وارد نمی و بر
چنانچه در شرح مرضی ثابت شده است و بعضی از اطباء بر آنند که چون و جمع زیاد
بود بهتر آن است که اول به تسکین او کوشند و بعد رفع پیوست کنند و این اشخاص
نریاک را از و کنند تا چهار بخورند بعد از پنج در ۲۴ ساعت استعمال کنند که چون دفع
و جمع شد کاهی پیوست خود بر طرف میشود و اغلب باید مسهل را استعمال نمود
سابق حکما و اطباء بر آنند که استعمال مسهلات انفع است که چون رفع پیوست
کرد و جمع بکلی ساکن گردد بعضی سوال کرده که آیا در وقتیکه و جمع شد یک باشد
میتوان بواسطه کوفرم مرضی را هد هوش نمود که قدری از کوفرم بروی شکم
و قدری بنوشانند و گفته اند این نحو معالجه و جمع را تسکین میدهد و طبع
نمیکشد که دو باره عارض میگردد لهذا باید همان مسهلات را بکار برد
در اوجاع سرفی اطراف و بدن قبل مذکور داشتیم اشخاصیکه مبتلی میشوند
بقولنج سرفی بعضی اوقات مبتلی گردند با و جاع و غیرها باشد که این اوجاع بر ق
کنند بدون قولنج و بر این اوجاع بیشتر است در اشخاصیکه سرخ میشانند
و حال آنکه اینها بیکه سفیدات شنج بعل می آورند اغلب مبتلای بقولنج گردند

علامات و قبلة این اصجاع با قولنج همراهی نکنند مدتی شخص مبتلی بخسنگی صخره
و خدر در موضعی مبتلا شده و بعد عارضی گردد و جمیع کاه مانند جمیع کوفتگی و کاه
مانند جمیع ناخسی و کاه مانند جمیع خرق است و این اصجاع اگر چه متصل اند ولی
بفاصله های چند شوت کنند بخصوص هنگام شب و در حرارت مرخت خواب
و ساکت گردند از فشار بر عضو و اثر برودت و هرگز همراهی نکنند با جمیع حرارت
و تغیر لون جلد و محل آنها اغلب رفاصل بزرگ است و چون در غیر مفصل بود
در عضلات منقبضه خواهد بود و این اصجاع موجب عسر حرکت گردند و بسیار مشاهده
میکرد که بعضی از عضلات بخصوص عضلات ماهیچه با سخت و متشنج گردند و این
اصجاع اگر چه مانند اصجاع عصبانی میباشد ولی بطور آنها از معبر اعصاب حرکت
نکنند

وقار و دوام و انتهای آن و قنار این اصجاع بسیار بمقاعده است و دوام آنها از چند
روز تا چند ماه است چون بحال خود گذارند بعد از چندی دفعه شوق و دانه
عود و بتدریج جمیع یک عضو را فرا گیرد و هرگز مانند جمیع مفصل تغیر محل
ندهد که از یک طرف بطرف دیگر رود و باشد که متشنج شوند بفلج عضو و کاه بر توپی
مرض توام خواهد بود و بعد از چندی جمیع رافع شده فلج باقی ماند و انتهای این مرض
چندانست مگر در وقتیکه بویکب هم رساند و در تشریح مرضی هیچ تغیری در آلات دیده
نشده است

تشخیص مشتبه کرد و جمیع مفصل مومن ولی تمیز ده شوا از اینکه متحرک
نبست و دواش کمتر است و چون در مفصل بود هرگز هیئات مفصل تغیر
نیابد و چون جمیع در عضلات بود بخصوص در عضلات که در صدر تمیز و
خواهد مگر از حالات گذشته مرضی چون اغلب این اصجاع عارضی گردند
در عظام

در عظام و شبها شدت کنند مشتبه گردند با اصجاع کوفتی ولی عدم انزاستر بعضی بلند و
پستی استخوان و سایر علامات کوفت و حالات سابقه مرضی که املاح سرب در دست مبتلوی
علاج اغلب راحت رافع این اصجاع را میکند و نافع است استعمال حمام کوکوردی
افزون برای آوردن خواب و آنجا که پس از یک هفته باین قسم علاج رافع نشود چند مشتغ
در ادیج انداخته و باینکه مرفین به بندند و آنجا که با قولنج همراهی کند معالجه قولنج را نمایند
چنانکه ذکر شد

در علا دماغی مورث از سرب کاهی از اوقات املاح سرب اثر کنند در دماغ و مورث بود
بعضی اختلالات گردند و آنها را منقسم نموده اند بسه نوع اول هذیان و دوم تشنجی سیم اغانی که
این سه نوع با فردا فردا و بر و بر کنند با مرکب با هم شوند

تشریح مرضی در اغلب مرضی تغیری در دماغ و نخاع دیده نشود و بعضی یافت شود که بامداد
های دماغ پهن و بیکدیگر فشرده شده اند و کوبه های آن بسیار که هویدا است بقسمیکه سطح
دماغ کو با صاف شده است و جرم دماغ قدری نرم در رنگ و هرگز پر خون نیست بلکه
اغلب همچون میباشند قوام دماغ اغلب بحالت طبیعی و کاه بیشتر و کاه کمتر است و در انقباض
اخیر بانگشت مانند خمیر چسبک و در بطون دماغ هیچ رطوبتی دیده نشود و جوهر آنها بسیار
کوچک گردیده شدن برآمدگی های دماغ مینماید که دماغ در جوهر خمیر فشرده شده است
و اینواضع میگرد چون یک یا چند ثقبه در مجمره بنا بند که جرم دماغ داخل این ثقبه ها گشته
و کاه هم از سطح ظاهر مجمره بالا تواند و چون خمیر را بر دارند و ام الغلط را بر دهند گمانند در یک
میشود که او منبسط شده است بطوریکه او را با دوا نکشت و با مفاش نمیتوان گرفت

و چون او را شرط کنند میببند که جرم دماغ از میان بتندی خارج شود و هم
کوچک شدن نخاع و دماغ دلیل بزرگی است بر عظم جرم او لهذا معلوم میگرد که دماغ
در پرت تری شده است

علامات مقلده باشد که مرض بغضه عارض گردد و الاغلب پیش از بروز مرض بعضی علامات ظاهر گردند از آن قبیل است صلاح پیشانی با کله سر باد و سر و سینه با سبای حمای عت بنض اضطراب عکس خلد رت و حس حرکت غلی و اجاع اطراف و بعضی دفعه عارض گردند نزول آب سیه و درد و ثلث از مرضی این مرض همراهی کنند با قولنج سرب و در یک ربع عارض شود و قبله قولنج خفت با فقه مرض و دیشفا باشند

علامات چون علامات مختلف گردند باختلاف صور مرض تحصیل علامات را جدا جدا در هر صور میجو اهم نمود

گاهی از اوقات هذیان اصرام و بروز فقط گفتن سخنها یا لاطایل و الاغلب هذیان غضبی است که در مرض دامن زدن و خش می دهد و لباسش را پاره میکند و میزد و مردم را میزند و بد گوشت میکند و در بعضی احوال لوزیون و هالی سبنا سبون جسم میبرد و این هذیان بصورتیکه با همیشه بطور اتصال است و گاه گاهی شدت نماید ولی همیشه کامل نیست که گاه کاهی میتوان از مرض جوابهای درست و صحیح شنید و بعضی هم میگویند که جمیع الم خود را بیان کند که شبیه میشود بچون مشعری و در هر هنگام شدت هذیان بکلی عقل را از دست میدهد که شبیه میشود بکلی با جنون غضبی و بعد از آنکه مرض يك يا چند روز و ام نمود در بعضی اضطراب ساکت باشد مرض بخواب سرود و بعد از پنج الی دوازده ساعت بیدار شود عاقل بدون آنکه از مرض خود هیچ بیادش باشد و در بعضی مرض بکلی رفع شود پس از بیدار شدن و در هر حال پس از چند روز و بامر علامت سابق عود نمایند و در بعضی عوارض شود در هر حال شدت هذیان و بعضی که مبتلای به خیالات واهی میشوند خود را بکشند و در اغلب فتی که در بعضی تشنج با

اغما دوم صورت تشنج با صریح عروض تشنج بدون مقدمه است برخلاف صریح که همیشه قبل از عروض تشنج و غشی يك تصاعد بخاری در مرض میشود و تقریباً در يك هفتم از مرضی تشنج داری همراهی این

این و در هر روز و در صریح متفرقه شود بواسطه و ام زیادش که در این مرض و ام چند ساعت و در صریح فقط يك باد و دقیقه است خلاصه بعد از بروز و در شخص بچسبند که جمیع هها بدن ثانی گردن و چشمها برقرار شوند بدون هیچ تشنج و و ام انقباض که در صریح و دقیقه پیش نیست در این مرض تا چند ساعت است و پس از آنکه مشاعر بعضی حس بر گردد جمیع عقلی برود و مراجعت نکنند و در مرض که چیزی بیادش نمیآید سبای حمای عت میسرانند و نیز در پاهایشان افتد که نتوانند ایستاد و اشیا خارجی را بصریت گیرند و خیالاتشان میجو کم کرد و کلامشان غسیر و بیکی گردد و بعد از نه دقیقه یا چند ساعت حمله ثانی روی دهد و این حمله همراهی کند با تشنج که صورت مرض دفعه قوز و پیچش کشته در هر حال قوزی صورت بند بل گردد و بدن مبتت و اگر ایستاده باشد دفعه پیچند مانند جسم بچان بدون اینکه داشته بماند و بروز و جمیع بدن کشیده شوند و در اطراف مخصوص در اطراف عالبه تشنج خفیفی عارض شود ولی هیچوقت دبدک نشود از حرکات بیقاعده که تعبیر هکافی میدهد و اغلب اوقات این کشیدگی بدن که شبیه است بکرنه از طرف بدن غلبه خواهد داشت در انقباض صورت يك شکل غریبی میسرانند که گوشه لب زیاد بیک طرف کشیده شود و خفیف بسته یا کشوده مانند چشم برقرار باد و راست و جمیع عضلات صورت تشنج گردند و گاه زبان در میان دندان مانده پاره شود و دهان کف کند و باشد که این کف خونین و او مرده گردن پر خون و صورت بنفسی گردد و تنفس قصیر و عسر گردد انقباض تشنجی بقای حرکات عضلات و رخاوت آنها در این صورت تلون صورت تبدیل شود تشنج بیاختگی و جلد پوشیده شود از عرق و اطراف بکلی از حرکت افتد و جلد تشنج گردد اگر چه حشر عوی برنگشته است ولی حمله مرض تمام شده است و و ام این حمله از چند دقیقه بیشتر نخواهد بود و در بعضی از مرضی بعد از چند دقیقه تشنج تشنج حشر مراجعت کند ولی عقل میجو میماند اگر چه مرض میتواند بعضی چیزها را احساس کند

و جواب بگوید و عموما خیال خود را بداند و اگر نشاند و حرفشان درست مفهوم نگردد بعضی
 از آنکه بپوش آمدند مضطرب میگردند و فحاشی میکنند یعنی بخون شوند و در بعضی
 خیالات بدبهم میگردند و این اضطراب و خیالات بدبهم میرسد و این اضطراب و خیالات
 بد بعد از چند دقیقه الی چند ساعت بطرف شود و بعضی از آنها عمل دیگر عارض گردد
 اشدا از جمله اول و بعد بفاصله عملها که شعله داخل بهم کنند و بعضی از آنها عمل دیگر
 از اوقات تشنجات بقدری بیفایده اند که اسطول معلم بنویسند میگوید که در این مرض
 جمیع اقسام تشنجات دیده میشود و عروغن مرکب اغلب بواسطه عروض علامات خفگی است
 گاه بفته و گاه بعد از اغما طویل با قصر است



سیم صورت اغما

منظور از گفتگوی مذکور از آن اغما است که از ابتدا بروز نکند نه از اغما بلکه از
 دیگر منتهی شود در زمان اول حسن بکلی تمام نشد است که میتوان گاهی او را بواسطه محرکات
 بحال آورد و بعضی جوابها از او شنید و از آنجا که میدهند از احساسات خا
 که از گذشته هیچ اطلاع نخواهد داشت بنفوذ تنفس حتی ندرند و بعضی بار می راحت
 و سبب مانند کسی است که خوابیده باشد که گاهی بیدار شد و از زندان شکایت کند
 اضطراب در مرض بصری که از اینطرف با نظرف غلطه و بلند شود بروی و در آنوقت نشینند
 و در اینجور حالت چشمها بکلی بسته با آنراست در صورتی هم که چشم گشوده باشد بعضی
 چیزی بینند که حد و متسع و بجز حرکت خواهد بود بدین هیچ علامات دفع کرد نه چنانکه
 پنهانی مراجعت کند و در بعضی با شفا کاه کند بدون آنکه جواب بگوید و بعد بعضی
 سوالات جواب ناقص دهد و که اقوام و دوستان خود را بشناسد و حال آنکه
 بخاطرش نمی آید چنان داند که از خواب بیدار شد است و اول چیزی که احساس میکند
 و کسکی است این سه قسم از مرض میتوانند فرموده و بروز کنند با منتهی آنکه بگوید

صورت

صورت تشنجی بیشتر از صورت دیگر و صورت اغما کثرت از سایر بر وزن نماید
 دوام تشنج مختلف است باختلاف صورت مرض چنانکه حالت هذیان چون متواتر بود باشد
 که تا پانزده روز طول کشد بدون آنکه منتهی بمرگ شود و حالت تشنجی از چند دقیقه تا یک
 هفته دوام کند و حالت اغما نیز دو تا ده روز
 عموما در این اراض بسیار عرق میکنند چه در صورتیکه مرض و با بر دگر جانهای
 کار کنند و چه دوست از انرا عمل کشیده باشند
 انتهای مرض چون رویشنا بود اغلب شفا کامل است و گاه منتهی بفلج اطراف با حواس
 چشم و آنها که مبتلا بصورت تشنجی گردند بهیچ وجه مستعد بصری نگردند
 تشنج مرض این اراض دماغی را از سایر اراض دماغی نمیتوان تمیز داد مگر بواسطه
 سابقه مرض و ابتلای او در زمان پیش بقولنج سری با وجود قولنج در حال بعضی
 علامات اگر چه مخصوص مرض نیستند و حال مخصوصی دارند که باید ملاخطه نمود
 از آنجمله نزول آب سباه و حالت دوار شود و در بعضی اوقات و این علامتی که نموده
 نزول آب سباه است و این نزول آب صعب و مخصوصی دارد که بفته بر و زرف
 هم رفع شود و دوام او دارد و از ده ساعت تا هشت روز است بطو نبض اگر چه در
 اغلب اراض دماغی یافت میشود و از ابتدای او را مهاد دماغی می است و حال آنکه
 در علل سرد دماغی بطو نبض بدون می است
 مقدمه المعرفه بر خط است چنانچه اقلان نصف از مرضی بملاکت و سند و صورت
 تشنجی خطوش بیشتر از سایر است و هر چه طول مرض بیشتر شود خطوش کمتر میگردد که
 نادراست بعد از هفت روز مرض بملاکت می رسد و آنجا که کردن خشک شود و
 بعد از جمله بحالت طبیعی برنگردد و حکما مرض بملاکت رسد
 علاج تاکنون اطباء قاعه درستی در علاج این اراض بدست نیاورده اند

فصد که شرح مرضی فائده از برای او ننموده است در عمل هم ضرر کرده است و هم چنان
استعمال آب سرد در سردی و در صورت اغما نافع است که موی سر را تا شنبه صبح و پنج
بهره سراندازند و در صورت هذیان نافع است که از شانزده الی بیست قطره لوانم
سید تم در یک ربع ابله استعمال کنند مرض بخواب رود و از خواب سالم بیدار شود
و مستعمل است سولفات و کین بمقدار زیاد و او به ضد تشنج مانند اطهر و سنبل
الطیبه و اقویه و غیره بعضی از اطبا استعمال میکنند معالج شریطه را ولی تجربه معلوم
که چون احرار دماغی سرفه با قولنج همراهی کنند این معالجه هیچ فائده نخواهد داشت
و موسیور تیریسلی آنکه فهمید هیچ ادویه در این مرض مفید نیست قرار داشت باینکه هیچ
دوا استعمال نکنند و از قرار بیکه مذکور نمودند از هر مرض یک نفر بمالکت رسید
و سایرین شفا یافتند ولیکن خوش بختی ما باین حد نبود و در شش نفر باین قسم
خواستیم علاج کنیم هر شش مردند

در فلج سرفه اغلب اوقات دخول سردی در بدن صورت فلج جزئی با کلی میگردد
و این فلج اغلب در حرکت و بند سرت در حس است
تا بحد مرض اگر چه از قدیم الایام مذکور داشته اند بعضی فلجها را که منتج شده بود
از قولنج و طبیعت عرض مفهوم نشد مگر در ماهه هجدهم مسیحی پس آنکه اراض صغیر
از سرفه شناخته

علامات تشنجی هیچ تغیری در بدن بهم نمیرسد مگر آنکه اگر دوا می در او پیدا شود
عضو مدتی بیک حرکت بماند هزال در عضلات انقباض میسرید و جوف عروق تنگ گشته
و بند اعصاب نازک گردند

علامات نادر است که فلج کامل بود یعنی در جمیع بدن واقع شود و اغلب محال
بیک صنف از عضلات و هم باشد که محدود باشد در یک عضله یا در بعضی از
بل عضله

یک عضله و اطراف غالبه بیشتر از اطراف ساقه مبتلا گردند و باشد که هم اطراف غالبه
و هم ساقه با هم مبتلا گردند تقریباً همیشه عضلات منبسطه مبتلا گردند و هم عارض
در عضلات صوت و مرضی که بتواند هنوز بروی پایا بایستد بپلوزند و روی
باشان و حرکاتشان بطور اطمینان نیست ساق در ان شان منقبض است و در ساق
فلج عضلات منبسطه و اطراف غالبه در وقتیکه بکلی مفلج شده بد رازی بدن افتاده
گردند و آنجا که محدود باشد و چون این فلج جزئی در عضلات منبسطه مشت و انامل
مشت و انامل منقبض گردند و در بعضی بتواند چیزی بگیرد و حال آنکه حرکت بازو و شانه
عبای خود باقی است و گاهی لبها مرتعش شود زبان بصورت حرکت کند و بصورت تکلم
کند و گاه لکنت در همه حرفها پیش پیدا شود و هرگاه فلج در عضلات حلق هم بهم رسد
صدافانی شود و فلج عضلات بین الاضلاع اگر چه بسیار نادر است ولی چون عارض
گردد بزودی مرض بواسطه احتیاق هلاک شود

مصر بدن در یک بیستم از مرضی فانی شود و این فانی حواله اغلب در جلد و گاه در آلات
نمونه شود در این مرض بعضی از عضلات با یک جن از عضله بواسطه الکتریکیت
نیاید و حال اینکه در بعضی از عضلات این حرکت باقی است و این یک نکته عمده است
که باید در نظر باشد زیرا که عضلات تیکه بال الکتریکیت بیک حرکت نیاید فقط عضلات
که در سرفه را هلاک کرده است و آنجا که فلج عام باشد و مدتی دوام کرده باشد عضلات
هزال یابند و آنجا که فلج در یک صنف از عضلات بود فقط همان عضلات هزال
یابند و باین واسطه ترکیب غریبی در عضو پیدا شود از پستی و بلندی و ان عضلات
که مفلوج نشده اند چون عضو را بطرف خود کشند منقبضش سازند بخصوص
مشت که گاه قبض محذی است که اوتار و عظام مشت از جای خود حرکت کنند و
آنجا که فلج در موضع چندی عارض شده باشد اختلال در عمل تغذیه بهم رسد

mandu.wikihema.org

tarikhema.org

وضعف عارضی گردد و شخص باریک گردد و عمل هضم مختل گردد نفخ در اطراف بزرگ
در کبد و تر و خندها و هرجا بیکه در وقت خواب بزین عمارت کند غایب از اجلا حاصل
کند بواسطه نفخ با مرضی بخته مرین بملاکت رسد
دقا و بود و ام و انتهای مرضی و فقا را بمرض بطی و تند بچای است اینجا که جمیع اطراف
مبتلا شوند ابتدای بروز تر شد در اطراف سافل خواهد بود و وقتی هم و شفا
کدام در ابتداء شفا از اطراف سافل است و چون کل اطراف سافل مبتلا شود
انقباض مرضی از اعلا یا سفل است یعنی از ان بیا و شفا نیز شروع از ان کوه بیا
نیز رود و اینجا که اطراف سافل بکل مفلوج شده باشد اقل عضلات منقبضه شفا با
بند بعلیه بود بلخل بعلیه بود و خارج بعد عضلات منبسطه و و ام مرضی از چند
روز تا چند سال و هم تا مدت العمر است و شفا با قدام است یا با قصور و این
صورت اخیر فلج در عرض قولنج شدید تر شود
تشخیص مرض تشخیص مرضی از سان است چه از شناسای سابقه مرضی و از بابت محل
مرض و اغلب عرض مرض در عضلات منقبضه و عدم علامات داله با اختلال دماغ و نخاع
و کسب مرضی از سابقه اراض سر و خط و پیشتر است زیرا که اغلب علاج نمیشود و خط و پیشتر
میشود هر چه فلج پیشتر و قدیم تر بود فلج عضلات تنفس خط و پیشتر است زیرا که
مرضی از و خفه گردد
علاج معالجه شریطه بکار نباید مگر در وقتیکه مرضی که با قولنج اینجا که مرضی ضعیف
باشد غذاهای مقوی و کثیف و آهن و شراب خوب بکار برونند و بدین با و در هر که
و معطل و دلا کنند و نفول اب سرد در موضع نخاع و موضع مفلوج کنند و استقام
در اب سرد با و اب کوردی و اب آهنی صبیعی یا مصنوعی نمایند و نافع است خوردن
استر بکین که شروع بکنند از بیک دهیم کنند و کم کم مقدار را و از باد نمایند تا آنکه
معنی

بعضی نشی در عضله مفلوج حاصل شود و با مقدار هرگز آید و کندم در ۲۴ ساعت تجاوز
نمایند و هم مستعمل است استر بکین بطور اندر مبدل یعنی تحت جلدی و مقدار این
هم از ده بیک کند است تا و کندم تا و قتی که علامت تشنج پیدا شود و میتوان این
طریقه را فرد فرد یا با هم بکار برد بعد از استر بکین انفع از او و بهجات الکطن
است بخصوص سوزن زدن
اسباب عارضی گردد در مواضعیکه سابقه اراضی سر و عارضی میشدند و طریقی
همی وقت از ابتداء نیست بلکه منبسط گردد از مرضی و بیک که سابقه ذکر کردیم مخصوص
از قولنج و مخصوص از قولنجها بیکه خفیف باشد و هم طریقه معالجه اغلب مورت فلج مگر
مانند استعمال اسپد سولفوریک و حمام کوردی
امراض سمی حاصله از نیش مانند املاح سرب املاح نریقی نیز و نوع اثر در بدن
یکی اخلاقی هستند که بر و زیشان بخته بواسطه دخول مقدار زیادی از ماده سمی در بدن است
و بعضی دیگر بر و زیشان بطی و حصولشان از دخول بخارات این معدن در بدن و یا
از استعمال ادویه نریقی است بمقدار منقسمه و این امراض تا بی چهار سال یکی بعد از دیگری
در عشر ذیق و سوء القینه ذیق و سبیلان ذاق
در سموم شدن از او و به ذیق مخصوص آن و اگر اشک بیک از قوی ترین سموم معدن است
مان جز از مجرای غذا که ملصق و ملاقی گردد متورم شوند و سیاه و چرخش ساق
سطح ریتین متورم شوند و در وی قلب ساط سیاه نمودار گردد
علامات از این قرار است که خزه تنه و عقی در دهان بزرگ شود و کوفه شود و هم
و وضعیکه سم بخورد نموده باشد و جمع شد دلی بهم رسد مانند دهان و حلق و
سری و معدله و امعاء و قمع و قی خونین و اسهال غوطه گردند و خستگی زیاد در مرض
تکرر شد و حرکت قلب بطی و عمیق شود که بعسرت احساس میتوان نمود و نفخ صغیر

mandar...
tarikhem.org

tarikhem.org

و غلی و خبیطی گردد و تنفس بطی و جلد سرد گردد و گاه غشی و کاه تشنج عارض گردد و در بعضی جلد
مفقود میشود و اگر در آنجا با بکی قطع گردد و در بعضی نعل و بسیار موی جمع میشود از سر و سر
پاد و بیدار و هان و باد مشق و از یک این چهار روز و در بعضی جلد لکنت رسد و اغلب از مرضی
مردن مشاعرشان باقیست و در برخی اعما عارض شده که بستران گفتگو کنند و از علاهای
مذکور معلوم میگردد که دارا شده و او عمل است اول موضعی دوم عمومی که فتوح میگردد
علاج چون در ابتدا بیابان مرضی رسد چند و انداختن مرغ در میان لب از چند اسکان
بنوشانند و اگر تخم مرغ مکن نشود مقدار زیاد از طبیخ بر فطون با آب و ج یا با خالص
بمقدار زیاد میتوان استعمال کرد آب سفید تخم مرغ و در این مرض هم مفی است هم نافع که در آن
بخش به میباید و از تریاق دارا شده است بر توفور و در هر هیدرانه که حاصل میگردد
دو فو و دو سولفور و مرکور و هم از تریاق است براد نیم آهن با مخلوطی از براد آهن
و روی و هم مستعمل است بر توفور و دو تن و لیکن با اعتقاد از قبل این تریاق اخیر بعلا
اینکه اثر چندانی ندارد میتواند خود بنویسند خط و زیاد شود تریاق و مرکور و دو سولفور
مرکور و بدو و مرکور و پرت اکسید و دوت اکسید و مرکور چون عملشان مانند
عمل دارا شده است علاجهشان هم بطور مذکور خواهد شد

میانور و مرکور چون از موضعی اش خبیطی گردد و از عویش خبیطی زیاد است معالجه اش هم مختلف
میگردد که آب پیاض البیاضی اش را در پی باید و او را در غده بلعوات و از نو میباید
اب کرم و بعد رفع و برم کنند و در مسموم میانور و مرکور بر توفور و دو سولفور
و فو و دو ی نباید استعمال نمود زیرا که دارا شده است با ابید بسیار که سببش بیشتر
از میانور است حاصل خواهد شد

در این امر حاصل از فو و دو ی بخار نریق در بیدار با آن استعمال خوردن او به نفع است
چنانچه قبل از آن نمودیم این امراض چهار قسمند و برم دهان و بقی سابق در و برم
نمودیم

نمودیم در اینجا بیان میشود هیدرانه و در عویش و بقی و سوء القبه و بقی
در هیدرانه عبارت است از یک نوع در دهنم با اکثریاتی که بر و میبندد و در بدن این
استعمال نریق چه از داخل چه از خارج
علاجات و از نظر اول چنان میباید که رنگ جلد قدری کاهی شده است و چون موضع
در دوشانی زیاد زیاد با بالوب ملاحظه کنند نمودار کرد و در حبابهای شفاف بسیار
که همراهی کنند با حرارت و حکم موضع و بر و زبانشان اغلب در قطعه اعلی فانی بران و خفن
و شکم و بند مرت در جمع بدن است و این تریاق بر و دی رنگشان بلخته و مفقود گردد
چه بار بر و زبانش و چه بد و زبانش او هرگاه استعمال نریق را نکرده باشند کسالت و
و جوی عارض شده حکم و حرارت جلد شدت کند و سطح جلد ناهاوار گردد و ایند رجه از
در و زبانش و اگر هیدرانه در تریاق میباید در بر و زبانش اول بسیار شبیه است به شجره که
لکهای مستغرق با هم جمع شد قطعههای شکل بهم حاصل کنند و هر حبابی تا بزرگ
سه سنجاقی گردد و در و زبانش چهارم بشیر شروع بر و زبانش کند و هر که کند با وجع کلونگی
شوند بر و زبانش بشیر کام و حلق و این بر و زبانش بشیر و بر و زبانش تریاق باشد که چندین
تاریخ کرد چون نریق استعمال نریق نکند و هم باشد که منفعی شوند بر و زبانش
دیگر که منصف میباید نوع روی این مرض را با بطور که حرارت ملین باید کرد حلق
و لوزین مویع شوند لون تریاق است و غوائی کرد صورت متورم شده تغیر کلی
در سبها هم رسد جفین خستگ شده بیک چشم را پوشانند و عدد تریاق زیاد
و حجم شان بزرگ کشته بوی متعفن پیدا کنند لثه بوی ماهی متعفن و در و زبانش
از و زبانش باد هم است و حجم آنها بزرگ مانند آنکه در اسکا و این است که
دست میتواند مثل دست کسی بپند و این بر و زبانش چندین بار است که حجم شان
هر دفعه کمتر از دفعه دیگر است و باشد که نامدی جلد خشن بماند و ناخنهای پفند

این صورت اخیر بنفص ضلب اضطراب و عسر النفس و سعال و وجع در سر و خلق بهم رسد
و باشد که فتیحه می کند کرد

تشخیص این مرض مشتبه گردد با اگرهای مادی از او مفروق شود باینکه عده ^{بیت}
بیشتر و در مواضع چند میباشد و همراهی کند با ورم دهان و خلق و از اینکه بتواتر
متعفن و بر بزش بشود از روز چهارم الی هشتم است

علاج چون عرض مرض بواسطه استعمال زینقواست علاج ترک زینقواست و
غسل بماء باره و استحمام در ماء فاتق و مسهلات بر فاق و اشربه حامض و چون حج
شد بد بود تو پاک دهند و باشد که فصد با مقویات لازم کردند

و عشره ذبیقی عمل جالبه که ذبیق بکار می برند باشد که مبتلا شوند بر عشر اطراف که کشف
تقریباً پنجاه سال است

علامات و قیاس بر این مرض اغلب تدبیر می باشد با بنظر که عمل در ابتدا ملا حظ
میکنند که دستش در دست بفرمان نیست و قوتش کمر شده است کم کم مور مور در رانها ^{سید}
و بعد رانها هم میسازند و همین ملا حظ در اطراف سافله هم بتدریج ملحوظ میگردد و گاه ^{عشره}
بجای شود که با دست هیچ کار نتوان نمود این مرضی صور نشان باخته قوتشان کور ^{عضله}
شان رخو گردد و تکلم عسرت بهم میسازد بعضی مبتلا شوند بلرهای کوچکی که در شقیخ
عارض میگردد و در دست راه نتوانند بروند و اغلب محتاج بعصا و تکیه گاهی شوند و
شدت مرض در اطراف عالی به پیشتر از اطراف سافله و ابتدای مرض هم پیشتر از اطراف
عالیه است و اینجا که رانها زیاد بود عرض نتواند چیزهایی بد هان بود بدون آنکه از
پروند و هم گدازتن اشپاء صلیب هم بد هان مشکل گردد بواسطه آنکه نمیتواند ^{استیلا}
هدایت کند چنانچه بد میشود از این بد بختان در صورتیکه پرستان نداشته باشند
مانند چهار پایان اخذ غذا را با دهان کنند

زینقا را بنفص هر روز و زینقا را بدو است و حرکتش بسیار بطی است نادر است
که نهانش کمتر از ده ماه باشد اگر مرضی ترک کسب بخودش نکند عود عرض بسیار خواهد
بود و هر بخودی خود مستحق خواهد شد

تشخیص بعد خواهیم دید طریقه تمیز از ان قطرب و بواسطه سن مرض و کسب
و عشره ذبیقی را از رانها پیری بسجولت تمیز میدهم
فقدمة المعرفة خطر است از جهة اینکه مرض عسر العالج است

اسباب نادر است که عارض شود از استعمال ادویه ذبیقی ولی دیکه شده است
بخصوص چون زینقوا را از خارج مستعمل دارند و اغلب عارض گردد در ران عملها ^{بیت}
جوه بسیار منقسم شده بکار میزند چه بواسطه حرارت چه بواسطه سحق و صلابه مانند
میلان سائران و اینه جیهو کنها و باره مطر سائرها و غیره و در زمستان از تابستان
بیشتر مبتلا شوند جمیع آنکه عملجات در کاهها بسته کار میکنند

علاج باشد که از ترک کسب بخودی خود رفع شود ولی بندرت فقط علاجی
که مستعمل است معوقه اند مانند بود در حینی عشبه از نوات و سونپال حمام
سوء القنبره ذبیقی اشخاصیکه بواسطه کسب کار یا بواسطه علاج در تحت
اشرا ملاح ذبیقی مانند کاه میبتلا گردند بیک سوء القنبره مخصوص چنانچه در ابتدا رانها
باخته و عضلات رخو و جمیع اعمال بدن بصرت ناشی و جاری گشته صورت متعفن و
لثه ها بومد و نرم گشته و بزودی خون الوه شده و مرجع گردد و دندانها سست گشته
بدون اینکه هیچ قرحه در رانها بسد بفتند و عظام فلکین نرم شوند و فیرین خون کم
گردد که چون از بدن خون خارج گردد و خوب غلیظ نشود و با پنجه مرض مستعمل گردد
به نرفالدهای پسیو و باها منتفع شود طبعش قلب و تنگی نفس و غشی روی دهد ^{اشقی}
که گردد عمل هضم مشکل شود و اسهال عارض گشته بر منعضه عرض افزاید و گاه جانی

عارضه کرد که هر اشی که بالبت نبض و گاه مرضی که با عرض بعضی از علامات
عصبانی که بعلاوه مرعشه سابق الذکری سببای حماقت و کمی عقل یا جنون سببای و غیال
واهی یا تشنجات گردد چون استعمال ادویه زیدی باشد و قمار مرض بسیار سریع است
ولی در سابق اوقات رفتارش بسیار بطبی باشد و باشد که منتفی گردد و بمرک
علاج مقویات دم است مخصوصا آهن و مثل دسطنیخ طپ بکار بریند بنظر اولی
اهن بر او بیچیم دارد و علاوه استعمال نمایند اشربه مرقه و پوست کن کنه و غذاهای مقوی
و سته ضروری بر او باید خوب حفظ کرد و از برای هدایان جنونی نافع است استعمال آتیا
چنانچه در جنون خمری مذکور خواهیم نمود

در اراض سیمیه حاصله از غبار شیشه و مینا و غیره بعضی از اشخاص خطر خونی
شیشه را بطور اغراق نوشته و مذکور داشته اند و بعضی دیگر در این مینا و لی
بدیهی است که قطعات کوچک شیشه میتواند اغشبه آلات غذا و اهرج سازند که
اگر در بدن نه افتر ستمی است بلکه از باب اثر موضعی است و گفتگوی مادر این مطلب
فقط علاج است که چون طبیب الین این اشخاص رسد شرط اول خارج کردن غیبا
شیشه است از معده بواسطه چی چون هم آن هست که در حرکات تشنجی معده
قطعه از شیشه بر جدا را و فرود و حلقه را باید پیش از استعمال مقی مقدار زیادی از یک
چیزی که قابل ان باشد که شیشه خورده شده و احاطه کند که هنگام بخورده شود
یا معاطن شکر که در دیر بعضی بخوراند و مواد مستعمله نان و لوبیا و سبب زینی و
غیرها است

در اراض سیمیه حاصله از نباتات محرکه سیمیات محرک نباتی مانند جلب و عصا و بوق
و فریون و سلاب و غیره سبب مورث با عرض قولنج و وق و امهال و اغلب علامات که از
خوردن سموم محرک معده فی حاصل میشد میشوند در علاج باید اشربه بنیاد ملعبه و
بیاض

بیاض البیضی بنوشانند و در ابتدا بواسطه مقی آنها از بدن خارج سازند و بعد از عرض
در دم بدفع و ترکوشند

در اراض سیمیه حاصله از سیمیات محرکه حیوانی

در اراض سیمیه حاصله از سیمیات محرکه حیوانی و در اراض سیمیه حاصله از سیمیات محرکه
تشیخ حیوانی آلات متورم و سببای که در کاه رطوبتی خونی در میان آنها
تو شیخ کند و در میان مواد طوبی در امعاء یافت گردد قطعاتی کوچک سبز یا زرد علاه
برای که بنیست مکرر غبار در اراض سیمیه محرکه غباری که داخل بدن شده باشد یکی از
الآت تناسل و ادرا و متورم و غشای کاذب بهم رساند و گاه دیکه شده است که ذکر
غافرا با گرفته جدا گشته یافتند

علامات در ابتدا طعم تند و تیز و تلخ و سوزان در دهان پیدا شود و عطش شدید
و وجع شدید در موضع معده بهم رسد و بعد این وجع سرایت کند به جمیع شکم و هر
کند باقی و اسهالی که گاه خونی بود اغلب از مرضی احساس کنند و وجع و حرارت در
ممانه و مجرای بول که هر اشی که با سلسل بول و حبس البول و ادرا که قطنه قطن خارج
کرد و خون الود و مخلوط است با غشاء کاذب و در بعضی سطی بران سیم عارض شود
که عبارت است از تحریک دائمی یا مبلجماع و در برخی پیری یا سیم یعنی نفوذ و غی
و موجب بدی مبلجماع و در اغلب این اشخاص نبض سریع و حرارت بدن زیاد گشته
و در بعضی هدایان و تشنجات کوازی نمودار شود و در برخی غشاء و اغشاء حادث
علاج در ابتدا سم را از بدن خارج کنند از دغده باهات یا نوشانند مقدار
زیاد از اشربه مهوع و رفع ورم کنند بواسطه فصد عمومی و موضعی و غیره و از
برای بعضی علامات مخصوصه است که علاج مخصوص دارند چنانچه از برای رفع
تحریک آلات تناسل و ادرا و کافور باقی پاک باهم با کافور فقط بکار ببرند چنان

مالیدن و چه از خوراندن و چه از مالیدن و آنچه که قوی قابل شوند منعش است بجا
 برند مانند شراب و اطروغی و غیره
 دوا را می سمبده حاصل
 از مسویل و سایر صدهای کوچک از خوردن مول اغلب و قات بعضی علامات می
 بروزمینا بد و بروزمینا این علامات عموماً بسته به صفت صدف نیست بلکه بواسطه
 استعداد مخصوص شخصی است و این علامات اغلب و قات چون علامات ثقل است
 که هر افعی کند با خارش جلد و ابتدای بروز این علامات سه یا چهار ساعت بعد از
 غذاست و گاهی باشد که از خوردن مول بعضی علامات نیز بروز کند که بعلاوه
 وجع معده و قی و اسهال و عطش و ضعف در مرض هر یک و اطراف سرد گردند و غشی
 و وی دهد و این علامات قات است که مورت هلاکت مریض گردند هنوز معلوم
 نشده است که حالتی در این صدها بهم رسد که مورت این علامات میگردند بعضی
 خیال میکنند که این جومات در ابتدای تعفین این اثر از آنها بروز نکند و می
 دیگر میگویند که باید آنها چیزی خورده باشند که انجیر مضر انسان است
 ستارهای در بانی با پارچه های مس که از کشته ها گهنه و از مس پوشیده آنها
 شکار کنند

علاج در ابتدا معی از افتخون و هوکا طوی کشید باشد که داخل معده باشد با
 اماله و هم مسهل برقی مستعمل است و بشری لب ترش نبی بنوشانند و از برای دفع
 علامات عصبانی اطروقه و غیره و بجا بکنند و بعد رفع و مریض کنند بطور
 در باب او مذکور شد

نوع دوم از امراض سمیه یعنی آنهاییکه عارض شوند از مخدرات بخصوص مریض حاصل
 از افیون و قهقهه املاح با ادویه مخدره بمقدار زیادی نوشیده شو
 مورت میگردند عارض ثقل سرد و دوار و حس ثقل جمیع اعضا و هذیان
 شدید

شدید یا ضعیف و تهوع و قی بالاخره اغما و مرگ و ادویه مورت به این نوع مریض از این
 قرارند ترپاک و مورت که در بسته است و گاهی جیلی و بنز الیج و قاقور و بلا و ندر
 شوکان و غیره چون علامات اینها همه مانند هم اند پس این علامات را که از خوردن
 افیون ذکر میکنیم بود بکار نیندیشی میگردند و ان مقدار را افیون که مورت برقی
 علامات سمیه میگردند مختلف میشود از حیثیت صحت و عرض و از حیثیت سن و
 هیدرپوسنک را زینش بعضی حالت خاصه شخصی خیاخیر دیکه ابریزد که بعد از
 خوردن نیم کندم ترپاک حالت نکو طبعم در او بهم رسد و گاهی یک خود ترپاک
 مورت هلاکت شخص نیز مرگ شده است و یک باد و قطره لودام نیز میتواند طفل
 جدید الولاده و اهلک سازد و جذب ترپاک از وی جلد با بشه شده باشد
 تعبیرات تشبیهی دیتین پر خون و کمر صلا کردند و عروق دماغ متسع و پر خون
 شوند و جرم دماغ خونین شود و از ام الرقی و طبیعتی جمع گردد و خونیکه در عروق
 عظیم میماند سپاه و رقیق است و یک بندرت سود که بسته شود اما خندان قوام
 نخواهد داشت چون در خارج ملاحظه شود

علامات بمقدار کافی بروز میکند علامات مسی مانند ثقل سرد هذیان و
 و زیاد شدن جمیع حواس و هم در آلات تناسل و جلد گرم و نبض قوی و سریع
 گرد و وحکه شدید در جلد احساس شود و گاهی هم بعضی مورت در او
 بروز کنند و بعد حواس فانی شده مریض خواب رود چنانکه از تشنگی و از نفس
 در خواب باشد پس از آن پیدایش احساس خناریت و خستگی و کوبیدگی اعضا
 و ثقل بر اس و عطش شدید کند و چون این مقدار زیاد شود قی با تهوع
 عارض و دهان خشک شود و عطش و بیوست مریض روی داده تشنگی
 کمر با فانی گردد مریض بجهوش افتاده و چشمهای تشنگی و پر خون و

اغلب حد قد منقب و با حرکت و گاه عربی و پیر که شود و اطراف پیر و حرکت که باشد و تنفس گاه ازاد
 و اغلب مشکلی و با صدای بیک بیک شود و صورت باخته و گاه بقیع شود و منقب عربی و صلب
 و بطی و گاه صغیر و سریع شود و جلد سرد و از عرق پوشیده گردد و بعضی از مرضی گاه متمد و
 متشیخ شوند و حرک عارضی که در درجین اغما یا با بر و نر علامات اختناق و انجا که متشیخ
 گردد در ابتدا حریر احسان نماید حرکات خارجی را و بعد کم کم تشنج را بد و در اینوقت
 احساس کند که شدید و در جلد و هر چه کند با عرق باید و نر عرق باشد و عموما اغلب
 که هلاک میگردند از تشنج تا دوازده ساعه پس از خوردن ستم است و عموما چون بآن
 ساعت بگذرد متشیخ نشا که در علامات موثره از عرقین مثل ترپال است که ذکر شد هم
 چنینی است اما لاجرم عرقین بلا دانه و نا توره موثره اغلب بر و نر علامات مذکوره میگردند
 ولی بعضی علامات مخصوصه و غیر مخصوصه هم دارند اما علامات مخصوصه و مدام انتفاع
 حد قه است و علامات غیر مدای عرق بعضی از علامات عصبانی است مانند فعد
 صوت و حرکات تشنجی و هذیان بد و نر تب که اغلب خوشحال و بیجی حرکت کنند و گاهی
 اوقات هم چون غصبی است ولی بد و نر علامات کثری سبون و مانعی که گاه هر اهی کند با
 هلو سبنا سبون سامعه و با صره و هیلر نون و این علامات متشیخ شوند بنای قوی
 و گاه چندی با رفتن الی هم آیند و در اغلب این مرضی اسهال دست میدهد و مبه و مله
 گاه مهلاک است و اغلب مرضی که از خوردن او شفا مییابند تا چند هفته مبتلا بد و نر
 ر عشره و احتلال غل بصیر خواهند بود

علاج در ابتدا برودی می از انقبون با سولفات و در نر با سولفات و دو کوئین
 بدهند تا سم خارج گردد و هر گاه مدخلش از مقعد باشد اما که کند ازاد و پیر مسهل
 و بعضی ترپالات برای ترپال نوشته اند مثل ماز و تعقیب بد و محلول برم و
 کلر و کافور و ادفلا نموده است که اگر مطبوع و قیق از ماد فراد از محلول ترپال
 بپزند

ر بزند پسوی حاصل خواهد شد که ستمت و کمتر از ترپال خواهد بود و بدین واسطه بران
 شدند اطبا که در ابتدا محلول غلیظی از ماز و با فون خورده بنوشانند و لی خود
 از قبل امصر است که در ابتدا بواسطه بلیمه انچه ماده رقیقه که در معده است خارج
 سازند و انقبون و در مقدار بسیار کمی از آب بنوشانند و هیچ اشربه بر مرضی نهند
 زیرا که انجا از محلول کردن ترپال جذب او را سریع مینمایند و همین حالت را نیز
 دارد ترشهای معدنی مگر بعد از خالی شدن معده از سم مذکور و کافور و قهوه
 منو ترپال نپسند و طاهر و نافعند قهوه بجهت اینکه تحریک میکند دماغ را و ان
 حالت بختی بیرون می آورد و خوب است که از ابتدا بنوشانند و از کافور اما که کند
 بعلاوه اینها اگر شخص موی مزاج باشد و خون میل بد مانع کرده باشد و فصد
 بگردن نافع است و انجا که علامات اختناق باشد دلک سخت بجلد نمایند و تنفس
 مصنوعی بکار ببرند

مرضی حامله از ستمت اسید سبنانیک و یک اسید سیانید ربک یکی از سموم است که
 بمقدار بسیار کم و بسیار زود از خلی قوی در بدن دارد که گاه دفعه بلا فاصله بکشد
 می رساند که هر گاه یک قطره او را بکشد دهند بعد از دو یا سه نفس کشید می میرد
 بغیر از تشنجی رفت خون و پر خونی اغلب احشاء بخصوص ریه و ام الغلیظ و
 نعش اکثر بوی بادم تلخ میدهد

علامات انجا که حرک خوری نباشد و از عارض شده مرضی دهان در زیر لب و کند و
 عسر النفس روی دهد بعد پهموش شده حس و حرکت فلج گردد و حدقه برفرا و کپک
 و متسع شود و تنفس مشکل گردد و کفی خون الوداد دهان جاری گردد و نبض صغیر
 و سریع و جلد سرد گردد و فلکین بهم ملتصق شوند و گاه بعضی تشنجات شدید رود
 دهد و بعد از چند ثانیه الی چند ساعه در میان اغما جهلاکت رسد و انجا که

که منتهی شفا گردد مشاعر بتدریج رجعت کنند ولی تا هشت ساعت دوا را واضطراب
عسری در محل قلب باقی ماند

علاج از تجارب معلوم شده است که کلر تریاق اسید سیانید ریزک است که بک
جز کلر تریاق غلیظ را در چهار جز آب مخلوط کنند و اسفنجی را بد و الوجه کرده و زیر
پتی و دهان و روی شقیقه ها و دخیلین بگذارند و آنجا که کلر بهم نرسد بک جز است
در دوازده جز آب داخل نموده بطریق مذکور استعمال کنند یا در روی جلد مخصوص
شقیقین بمالند عمل اسونیاک در اینجا بطور تریاق نیست بلکه بطور منتهی و محرک
اعصاب و همچنین واسطه نافع است ریختن آب سرد در روی سر و نخاع و هر چه آب
سرد تواند انفع است و بعد مانند دایره بگردانند و بوی سر گذارند و آنجا که میل
بسر باشد ذلول نافع است معلوم که هرگاه هم هنوز در معد باشد باید بقی او را خارج نمود
و آب معطر حب الفار و سیانور و در کورد و یکاسم و بادام تلخ بمقدار زیاد آن اسید سیان
بند ریزک را دارند و بقسم مذکور فوق باید معالج نمود

در اثر سمی اشربه الکلی اثر سمی الکلی بوسیله نوع است اول مستی
دوم جنون خمری سیم احتراق بلا واسطه

در مستی از خوردن اشربه الکلی عرق دار سرعتی فوق العاده در دوا و اثرش دم
دیده بدن گرم گردد عرق جلد و تشنگی بول زیاد شوند مشاعر با قوت و جلدی ناشی
شوند و یک خوشی در شخص بهم رسد و بد رجه بیشتر مشاعر و خواهش ضعیف بهم
رسانند و مستی شروع کند که علاماتش مختلف گردد باختلاف شخص که بعضی با
حرف نریند و شغف کلی بهم رسانند پهموده و جفناکونی آغاز کنند و برخی خنک شود
و خاشی کنند که گاه مانند جنون غضبی از آنها صادر شود و جمعی غمگین شوند و
مالخو لیا گیرند و در میان این شدت قوای نفسانی قوه عضلات کم گردد و شخص
تواند

تواند حرکت نماید و در اغلب مقعوع و قی عارض شود و قوی بکلی تمام شود و شخص
رود و آنجا که مقدار اشربه نوشیده شده زیاد باشد این خواب بسیار شبیه خواهد بود
با غما که صورت سرخ و بیخشی و چشمها بوامه اطراف حرکت بنصر عرض و بطی و صلب
گاه منغیر و سریع گردد بک از دهان و گاه انجمیع بدن بویا کل اید و بعد از تشنگی
پانزده ساعت در بعضی از خواب پیدا گردد در حالیکه خیالاتش بهم و خود را شناسد
و خسته است و عطش زیاد دارد دهان پیروز و اشتها مفقود است و نادانست
که شخص در میان مستی بملاکت نرسد و در تشنگی دیک شود یا برین خون در
و جرم او پاد را مین و گاه ملا خطه کرد و جمیع علامات اختناق ولی در اغلب ملا
شود مگر علامات میل دم بدماغ و همیشه بوی عرق از بینی است تمام شوق این
دلیل واضحی است که اشربه الکلی پس از جذب در دم ماغ او کند و خون کاهی رقیق و
کاهی غلیظ و الکلی است چون مستی مکرر شود قریب گردد و مشاعر نقصان یابند و سر
در اطراف و زبان و لجه بهم رسد و قوت کم شود و در اغلب جمیع علامات فلج عمو
متراید بهم رسد و بعضی مبتلا شوند با وجاع و تمدات و تشنجات صرعی شکل و عمل
هضم تغیر یافته شخص هزال پیدا کند و بعضی برانند که شخص مبتلا گردد با سق
و عرض برایت و اغلب مبتلا شوند بجنون و مستی یکی از اسباب خود کشی است چنانچه
کار بر نموده است که از متولین بر آسن آنها تیکه از سنه ۱۲۱۲ الی سنه ۱۲۱۴ مسیح خود کشان
را کشته اند بک ریح شان اشخاصی بوده که همیشه مست بوده اند
تشخیص تشنج عرض اغلب اسان است که از مقدمات و از بوی عرق دهان
در بعضی با سانی تمیز داده میشود و هرگاه در بین مستی سکته عارض شود جمیع علام
نتر خون بدماغ منبسط میشوند در آن هنگامیکه میبایست علامات مستی رفع
باشد

کرد و در اشتیاق مجروحین همراهی نمیکند نه با رعشه اطراف و نه با رعشه شفتین
و نه با عسر حرکات و از ابتدای فلج مجانبین نمیتوان تمیز مرض را و مگر بواسطه رزق
خارجی مرض که فلج مجانبین عارض بر و نکند بعد از سقوط عقل و مشاعر و فساد
مرض بطی است و حال آنکه جنون خمری بر و نرشد و فی بطور حاد و بعد از شرب
زیاد بود و هم دوامش خیلی کم است و تمیز این مرض از مستی تریاک و سموم سلا
باین است که فقط تحریک و جنون از خوردن این ادویه موقتی و در ابتدای بلع است
و طولی نخواهد کشید که مرض بحالت اغمای سکتا افتاده هلاک خواهد شد یا با

افتد
تقلید از غیر خطری ندارد مگر پس از تکامل حمله ها که انوقت منتفی گردد و جنون و فساد
عقل و وقتیکه اضطراب زیاد و سیمای متغیر و فرغات نبض از صد تجاوز نکند و امید
شفای بطور فوری شود و در وقتیکه مرکب شود با ورم و ماغ با امین
اسباب در هر بلادی که اکثر خمری پیشتر متداول است بر و نرشد و نیز پیشتر
بخصوص در فصل تابستان و در مردان از سن سی تا پنجاه و از شراب بنده
این مرض عارض گردد و اغلب بسبب عرق و خشی عرق است

علاج اگر بر و نرشد بعد از یک شرب مفطر فقط بوده است باید آنچه در معده
موجود است با عانت قی خاچ نمود و آنجا که مبلدم بد ماغ و نبض قوی و سایر علائم
ورم هویدا باشد فصد و مسار و ادویه ضد ورم بکار برند و تریاک ملایم معرفی
که دوا میزند این مرض است ولی گاه منفعت نخواهد کرد و منظور آن تریاک دفع خطر
و او بردن خواب است و باین ملاحظه باید هر نیم ساعت یک گندم نجق کنند تا آنکه خواب
بیاید و هم چنین نافع است استنشام کلو فرم و پیچوده است اینکه بگوئیم که در
حین حمله نه بخود افتد و نه بر بیض بلکه مرضی را محکم نگاه دارند

در احتراق بلا واسطه انسانی عبارت است از آتش گرفتن با سوختن بدن با کل بدن
انسان که سبب و بیک حالت مخصوص حرکات باشد که تاکنون ناشناس مانده است
این سوختن بدن که چند بار دیده شده است غالباً در زنان پیر با سمن دائم الخمر بوده است
و بعضی اشخاص چنان گمان کرده اند که در این صورت جمیع بدن بخصوص غشای مجاری
متعلق میشود اند از اکل و در آنجا ترکبات تازه حاصل میشود و بلکه یک نجار قابل
از ان آلات متصاعده میکرد که بخودی خود آتش میگیرد با آنکه سبب اشتعال آن بخار
یک برق الکتریکی است چنانکه هر کس میداند در بعضی اشخاص باندک اصطفاک حاصل
میکرد و بعضی دیگر مانند یک دانه برود و پودت مران چنان خیال میکنند که بر آتش

اینکه احتراق در بدن حاصل میشود لازم است که بدن مجاور گردد و بر خورد
نماید با یک جسم دیگری در حالت اشتعال و گویا هم جمیع بر تری اقوال این قول
باشد زیرا که اغلب اشخاص سوخته بطور مرده گویا یک بودند با یک جسم مشتعل
مانند نیم سوخته و چراغ و چوبوق و ذغال بر آفرینند و غیره بصورت اشتعال
اوقات در اشخاص محترقه بلا واسطه همیشه بعضی آلات یافت میشود که نسوخته اند
و این اجزاء از سرف اطراف میباشند و میسایند بکلی سوخته و باقی نماند مگر
یکماده چوب و صلب مانند دوده متعفن با ذغالی سبک و با دهنیت و بوداد
و آتش این اشخاص با سباب خانه سرایت نمیکند ولی دیوارهای اطراف پیشتر شوند

از یک دوده ضخیم و حوب و سپاه و متعفن
مرقا احتراق بسیار سریع است که از یک الی سه ساعت با فتنهای سوزش میرسد و بعضی
از اوقات این احتراق جزئی است و این احتراق بخصوص مشاهده در مردان چنانچه
میان شده است اشخاصی که مثلاً دستشان مجاور گردد بد با شئی مشتعل و بر روی
و جمع سوزانی در او بر میسد و سرخ گشته و مشتعل گردد بد با شعله که بر و نرشد

درختن ابروی و جوشش شعل بجا و اینکه دفع اشتعال نماند زیاد میکند و برای دفع کردن او بعد از چند ساعه آن عضو را در میان آب بسیار سرد نگاه دارند که پس از آن بک سوختگی که باز زیاد و وسیع در آن محل خواهد ماند

در هر مرضی که از سولفات و کتب جوهر کنگنه که در اغلب امراض نافع و یکی از ادویه غالبه است باشد که چون بمقدار زیاد استعمال کرد مورث بعضی امراض می شود و هلاکت کرد و موسوس می گردند و مله بسیار اندک قریب ده نخی سولفات در کتب وارد معده شکی کردند بعد از زمانی چند سیمای حماقت در او بهم رسیده و ای اینکه لابد بود که دست و پای خود را فراخ گذارد و الایه بملو می افتاد و اتساع در حلقه بهم رسید و حرکات تشنجی عارض گشته در اغما هلاک شد از این فقار و علامت معلوم میشود که اثر او در مری که اعصاب بوده است

از تشنج مرضی دیده شد که رتبین بخون و کبدی با ستری شده اند و خون نرم و غیر قابل تخلیط بوده است و بعضی اوقات در اشخاصی که با آنها از بیست الی سی نخی و کنگنه استعمال کرده بودند ثبوت این تجربه سکی را کردند و برون علامت چون بطور مختلف است پس درجه مرتب ساخته اند

علامات درجه اول صداع و اضطراب و مستی و اختلال با صره و اغلب کوی است که این علامات در بعضی اشخاص بمقدار منقسمه مستعمل معلوم کرد

درجه دوم هذیان و تشنج و قلیج جزئی و گاه بقین بواسطه تعبیر دم علامات درجه دوم برون کنند و در بعضی بول الدم ظاهر شود

درجه سوم جمیع قوی فانی حس و حرکت تمام منصفی نهایت حاصل شود و عرض در اغما افتاده باشد که هلاکت مرسد و آنها بیکه این خطر بیکه در حالت نقاهت شان بول کود و اغلب شان در جمیع عمر کو رو و کن بمانند

در این

دوا
علاج در ابتدا باید بواسطه قیاحت از معده است خارج نمود و بعد تحریک بدن کنند اثر نه منعته معطره و دلا خشک جلد بخصوص مری معده و اطراف را در هر مرضی حاصل از اسید کو سوبه چون تنفس نمایند بخار بر که خارج می گردد از کوفت اهاک پزی و از خجهای انکو را بخورما دار در حالت جوش مبتلا می گردند بحالت خطیره که پیش در هنگام اول اسید کو بونیک خالص در حالت دویم مخلوط با انزوت و بخار الکال و علامات عارضه اضطراب قلب و دوار و طینی و اختلال با صره است که بعد شخص بدون حس بینند و بعضی از این اشخاص می برند در حالت جمیع علامات اختناق و در بعضی مری فقط بواسطه دماغ است و برون مری قبل از فانی تنفس است و باید دانست که خطر اسید کو بونیک نه فقط بواسطه آن است که این بخار غیر صالح تنفس است مانند آنکه پیش منقلب خیال می گردند بلکه او را اثر سیمی هم در بدن می پاشد چنانکه لو از برون اول این مانده نموده و سایرین بعد از او منقسم اند لو از برون نموده بود که هرگاه و نخی را در آب بپاشند و برون الی ده الی ده و انزوت ساعه مبتدا نیست نرنده کند و حال آنکه اگر اسید کو بونیک داخل آب می گردند از این نخی تا هشت و هفت دقیقه هلاکت می رسد و بعد او میتوان گفت که بخار انزوت و هیدژن که فقط غیر قابل تنفس اند حیوانات پستانداران ان ششالی و انزوت در فیه می کشند و حال آنکه همین حیوانات در میان بخار اسید کو بونیک در یک تا سه و نیم هلاکت می رسند

علاج برون شخص است بمیان هوای سالم و استعمال نمودن انچه در سمیت بخار فعال بیان خواهد شد و نوز یک با این مرض است هر وقت که عدد زیادی از اشخاص در محل تنگی بدن و آنکه هوای آن محل را تجدید کنند جمع شوند در انصورت انزوت هوای انجا فرق نیاید و طمقل از بادی از اسید کو بونیک و بخار حیوان

حاصل میشود و عمل اسید که بویک شد بد میشود باند که مقدار اکسیر انجلی که
کرد و دو و چهار روز بیشتر میگوید

تا پنج از این مقوله نیست مثال زیاد گذاشته است و این بد بختان در ابتدا عطش
و اضطراب زیاد بهم رساند مبتلایان کردند و عسر النفس حاصل کنند و جمیع
سینه طبش در قلب بهم رسد که ماورد و جمیع علامات اختناق بجا آید و علاج
بطور قبست که در ذیل ذکر خواهد شد

مرض سیمی حاصل از بخار ذغال از ذغال خوب در هنگام اشتعال خارج کرد و یک
مخلوطی از آن و هیدروژن کوپونه و اسید کوپونیک که مقدار در بخار اول در ابتدا
اختراق اکثر بخار باقی بخواهد در اخر بیشتر خواهد شد

علامات تشنج از کشیدن بدن مشاهده کرد و جمیع علامات تشنج اختناق با
خواهند شد و فقط در اینجا همین قدر میگوئیم که هرگاه مریض تشنج حاصل شود لوله
قرمز است و حال آنکه اگر بنا بر عارض شود لوله خون سپاه خواهد بود و نفس این
اشخاص در متعفن میگوید

علامات هرگاه تشنج داخل شود بخت در میان هوای که حاصل شده باشد از بخار
ذغال دفعه بجا آید رسد باد و امر و قطع نفس و اشخاص میگویند که مرده شده باشند
در اطابقه اشتعال ذغال باشد در ابتدا ثقل سر بهم و سانبند بعد صلع و حس فساد
بر صد عین بهم رسد و در ولین عارض تشنج میفرماید بخواب بهم رسد و بزودی
با صرغ غفل شده عسر النفس و طبش عارض تشنج حس فساد و مرخلف قص بهم رسد
و بنف سر بر و قوی کشته میماند با تشنج و قوی و عمل هضم مختل میماند و بزودی
مریض با غما میفتد و در اغلب ادرا و بر از زیاد دفع شوند و صورت گاه تشنج
و اغلب باخته است بالاخره تنفس در و بر آن دم منقطع کردند و در بعضی هنگام

مرکز

مرکز بعضی تشنجات شدید عارض شود و در آن عضلات در روی نفس غمد و قوی
باقی ماند و ان اشخاص بیکه شفا یابند بک کسالت بسیار شدیدی نامند و در آنها
باقی ماند که از هیچ نوع اختناق این نوع کسالت عارض نکند که بدن خنک
مبهم و جمعی شدید در سر بهم رسد و اغلب صلع میروند که تا چندین ماه بماند
و بعضی اشخاص هستند که من از شفا یافتن هم میل فرمایند و تشنج پس از
دسامت و برخی عاجز شوند از بابت حس و حرکت و مشاعر و باشد که تشنج شود
بفعل بواسطه بروز سکنه

تقدیر المعرفه بسیار خطرناک و خطر زیاد شود هر چه مقدار ذغال بیشتر
فضای منزل کمتر باشد و حالت سستی و خطر مریضی افزایش یابد و از علامات بروز
تشنج و دفع بول و براز بدون اراده دلیل بر شدت مرض است

علاج بعلاوه آنچه های که مستعمل است در عموم اختناق بعضی هستند که مخصوص
در این نوع مستعمل اند از انجمل گذاشتن مریض است در هوای بار و ریختن آب سرد
متصل بصورت او که آب سرد اگر ریخته باشد خیلی بهتر است دمیدم بروی او
بریزند و چون تشنج که دلیل بر رجعت نفس است روی دهد و تشنج بر
موقوف گردد و آن حرکت و امواتی بمانند و حجامت خشک در اطراف بدن بکند
و اینجا که میل دم در احشاء بود استفرغ دم کند منعشات و می که بعضی از
مصنفین مستعمل میدانند اغلب مضرات است بخلاف حقن مسهل و برای وجع
و صلع که بعد از مرض باقی ماند و لوله های منصفه مستعمل دارند و هرگاه باد
دفع نشود بک یا چند مسمع در آن ریخته بکار آورند

در اخر کلام اینقدر میگوئیم که طبیب به تشنج باید عمل کند و بسیار مصر باشند
چنانکه دیده شده است اشخاص بیکه بحالت صحت برنگشته است مگر بعد از تشنج

موانعت چون بخار کویک مانند بخار ذغال است و صورت همین علامات مذکور
میگردد لازم نیست که از او چیزی بیان شود

در مهیت کاز جراح اثر سمیت کاز جراح کمتر است از بخار اسید سولفیدیک
ولی بیشتر از اسید کوبونیک است و بیشتر بواسطه وجود اکسید و کوبون است که
در او میباشد زیرا که هیدژن بی کوبینه و کوبور هیدژن و سایر بخارات که در
او هست اثرشان کمتر است از اثر اسید کوبونیک و بخار جراح میتواند بمحلات برساند
هر وقت که مقدار او بالنسبه بجهتیک بازدهم شود اثر او اول در درمغ و اعصاب
و بعد در آلات تنفس است که در ابتدا عارض شوند صراع و واد و تهوع و ضعف
کثیر بعد بواسطه بکلی فانی شدن حرکات تشنجی و فلج حس و حرکت بهم رسد و در آخر
عمل تنفس مختل گشته و بعضی از برون علامات اختناق هلاک شود

در تشریح مرئی در تشریح دیده میشود که جرم دیره بسیار قریب است و خون سیاه و
مخلوط است با کبود مغ و او رده نخاع پرخونند و یک قدری خون نشتر کنند و
نخاع و مخاط آلات تنفس پر خون و یک کفی خون الودین نماید دهان و حلقوم و قصبه
علاج در درجه اول اثر به محرکه و حقن مسهل و بعضی مصرفات جلدی بکار
و برون علامات مبلدم و اختناق دلیل اند بر استقرار خون و برای تحریک حیات
و رجعت تنفس بکار برونند آنچه را که در عموم اختناق بیان خواهیم نمود

نوع سیم از اراض سیمی در اراض حاصله از سموم مخدر و محرک
در اراض حاصله از این سموم مشاهده میشود هم علامات عصبانی و هم علامت
موضع بخار با سم

علامات تشریحی بسته اند باینکه نوع از علامات ولی شدت آنها بیکه نسبت
که اغلب یکی از این دو نوع شدید تر خواهد بود که این سمومات در ابتدا در موضع
اثر کنند

اثر کنند و بعد جذب شده تغییر در خون و اعصاب خطر تر پیش از علامات موضعی است
زیرا که اغلب سبب هلاکت میگردد واد و پیر که اکثر مورث برون این اراض میگردند نسبتا
دائریکین و بعضی قاعدهای سیمی است

علاج با نظر بقا است که اول سم را از فعد و امعا بواسطه متقی و حقن مسهل دفع
دویم باید رفع علامات عصبانی نمود بواسطه اثر بلب تش و اله و امونیاک و مطبوخ
قهوه و تغبیل آب سرد بدین اسم دفع کثیر سیون و ماغی نمایند بواسطه فصد و غیره
چهارم رفع ورم موضع نمایند بواسطه واد و پیر ضد ورم چون برون علامات
در جمیع این نوع سموم بیک نوع نیست لهذا این ادویه را بچند نوع قسمت میکنیم
نوع اول عبارت است از غنصل و خربق و سورخاچان و تیناکو و زرد پالاق و اسام
شوکران و خورنهره و صذاب و سبافورد و پد و غیرها

این سموم متورم میسازند موضع را مانند سموم محرکه و تغیر میدهند خون
اعصاب و سر به دامانند سموم نرکوتیک و علامات مورثه آنها از این قرار است
واضطراب و فریاد و هذیان و تشنج عضلات صورت و فك و اطراف و حلقه
باضیق گردد بامتسح و باشد که بحالت طبیعی بماند و نبض با سرعت و قوی و قسط
بابطی و صغیر و غیر منتظم و جمع در موضع معده و تهوع و قی شدید و اسهال و گاه
در میان اضطراب شدید بغثه بکنوع حالت مستی روی داده و در بعضی بچاقی داده و بیک
قی نکند و این علامات اگر کلشان در یک شخص بریز نمیکند ولی علامتی که بریز نکند
بیک بکلی رفع نخواهد که دوباره عارض شود مانند آنکه در سایر سموم از این نوع
خواهیم دید

علاج بطریق است که مذکور شد
نوع دوم مرض حاصل از استریکین است ولی چون هرگز مقدار استریکین بمقدار

نخواهد بود که مورث ورم معده و امعا گردد و جمیع علامات منحصر خواهند بود بعلامات
عصبانی که تمده شدیدی در بدن بهم رسد که مایل بخلف گردد و کزان صورت ^{ست}
دهد و عشاء و حرکات تشنجی در اطراف بهم رسد و فتیحی گردد و بکزان خلقی که بدن بچرخد
و نبض صغیر و صورت متفحج و پر خون شود و حریر نوزد یک بشود که خفیه گردد و این علامت
باشد که نسکین بامند با بکلی بچرخد بشوند ولی حمله دیگر برود ز کرده مورث هلاکت
شود و اینها باشد که به پنج و شش برسند و بفاصله هفت یا هشت دقیقه گاهی
که زو گاهی بیشتر تشنج هلاکت رسد و در تشنج یافت شود که ترسپون و به و غایغ
و در مرض ستمی حاصل از استر یکین با کچول و بعلاوه معالجات فوق باید به پدید آمدن
تنفس مصنوعی بالوله یا دهان و از همین نوع مرض حاصل از بر سپین و بیش و
با قلا میشتونیاک و غیرها و هم از این قبیل است که فور که اگر بمقدار زباد خورده شود
مورث فرجه شود و پس از جذب موجب تشنجات کوازی و سردی بدن گردد و
مریض باختناق هلاکت رسد

نوع سیم مرض حاصل از فارجهای ستمی در بعضی مواضع مذکور داشته اند که
گاه عمل قارح منحصر است بعلامات تحریکی و ورمی و گاه بعلامات عصبانی و غلب
اوقات این دو علامت با هم ترکیب شوند چنانچه چند ماعین از خوردن سم کسالتی
عارضه گردد و جمیع در موضع معده بهم رسد و بچالی دست دهد و تهوع عارض گردد
و عارض قهای متعفن عارض شود و حسن خفگی در کلوسید بشود و اسهال روی دهد
و این اسهال گاه چنان شدی باشد که شدید شود و با و نبض صغیر و غیر منتظر و
سپمانت غیر باید و عرق سرد بر بدن نشیند و در بعضی هلاکت بان عارض شود و در بعضی
اغوا تشنج و از زنده الی ۳ ساعت هلاکت رسد مرضی در آنها نیکه شفا بیابد
تا چند هفته علامات ورم در اموات تغذیه باقی ماند و آنجا که فقط همان علامت
عصبانی

عصبانی برود و زمانمند در بعضی بیهلاکت رسد و زو علامات دماغی که تشنج شد
و هلاکت عارض گشته متعفی گردد به برود زو علامات سکنه

علاج مانند آن است که قبل از آن نمودیم بعلاوه کوپا مطبوخ مان و و دبق و باق این سموت
نوع چهارم در سمومات مصلی م این سموم عبارتند از سمومیکه چون جذب
شوند تعقیب کلی در خون دهند و مورث برود زو این نوع علامات که خند که قدام
علامات تعفین مینامند مانند غشی و ضعف و نرفا لتهای پسپو و غانغرا با و
غیره و این سموم عبارتند از مواد حیوانی در حالت تعفین و از کود و سکل و زو تره
ناخوشی گرفته و بخار چاههای مبال و زو حیوانی و و پودس یعنی بریم های کف
و سالک و غیرها

مرض سیمی حال از ورم و مواد حیوانی متعفن در بدن مواد متعفن حیوانی بسختی ^{خل}
بدن میشتوند گاه مانند بخار داخل بدن میشتوند از عمل تنفس و استنشاق و گاه از
معده بطور غلا و گاه از جلد برهنه شده از تفرق اتصال او مانند آنکه هنگام
تشریح کردن طبعی خود را بخرج مآورد

اول بخارات متعفن و معلم بزرگ موسس و ترین در ترکیب و پودر دو
شامل در فراسد بران شدند که بخارات متعفن حیوانی هیچ ضرری با انسان و
بدن او نمیرساند ولی این بخارات اگر چه در اشخاص فوقی البینه و خوش غذا اثر
معالومی ندارد اغلب اوقات این بخارات مورث علل خطیره میگردند چنانچه
همه روز میبینیم اشخاصی که چون چند روز متوالی در اطراف تشریح مینامند شی
شان کم و سایر علامات ورم معده و امعا بهم میرسانند با آنکه میندلا میگردند
با سمعال متعفن و قبل بدیم که همین بخارات حیوانی مورث برود زو و سناط
شدید و و با و تنفوس و غیرها میگردند و آنجا که این بخارات بمقدار زیاد و

در مکان محدودی متصاعد شود و شخص فتنه بان مکان داخل گردد و فی الفور بهر وگاه اشتغال
که استنشاق این بخارات را کنند فتنه ببرد با آنکه ضعف و کسالت زیاد و عارض شود
که بسیار در دفع شود و با فتنه شود و بر وجهی شدید و عرق و بی تابان قسم مرد و لازم است
ان اشتغال صیقل بدهد و بر بودن با این بخارات هیچ وقت افراط در اغذیه و اشتغال نکند
و غذاهای خوب خورند و آن محلی که باید مجاوران بخاد باشند هواش را زیاد عوض کنند
و او به ضد تعفن در آن مکان بگذرانند و چون احساس کسالتی کنند از آن مکان برفت
روند و دیگر داخل آن محل نشوند مگر پس از شفا و کمال و از برای دفع آن کسالت و
بعضی علل خفیفی که از استنشاق این بخارات عارض میگردد و دیگر از آن مکان و غذای مسکن
خوب اغلب کافی است و گاه لازم میشود استعمال مسهل بر وفق و مقویات و از برای
ضخیره و بیم مواد متعفن که بطور غذا وارد بدن شود

این نوع سمیت زیاد و بیک میشود و رانجاها بیکه گوشت دوزخه مخصوص گوشت خوک
مخورند و در طریقه حصول سمیت این گوشتها را اطباء متفق نیستند بعضی گویند که سبب
سمیت تعفن است که در گوشتها بهم میرسد و برخی بگویند که چون این گوشتها و در
طروف مس با سر بنگاه میدارند ملک ملج معدنی حادث میگردد که مورث سمیت میگردد
قول اول اقوی است بجهت اینکه اغلب علامتها برونز میکنند مانند علامات تعفن
دم اند و همین اراض حاصل شود و رانجا که ماهی دوزخه بخورند

علامات چهار ساعت بعد از خوردن غذا احساس جمعی در محل معده گردد و نفخ و
ق و اسهال عارض شوند و بعضی از اوقات علامات شکمی روی ندهند ولی حالت
عموم بدن بهم خورد و باین طور که ابعاد کم شود و حلقه متسع گردد و در عارض
و صد اگر فتنه شود ضعف بهم رسد و طیش قلب و غشی و در هفته دویم شخص
رصد

علاج ابتدا بواسطه انتمیون و ابیپکا و با مسهل سیم را از معده و امعاء خارج کنند و بعد
اشربه اطردار و معطر بنوشانند و انجا که علامات و رمی در معده و امعاء پیدا شود
اشربه نیم توش و مصرفات جلدی بکار برند و حالت عمومی بدن اذن نمیدهد که ادویه
ضد ورم بکار برند و انجا هم که خیلی لازم بشود باید بسیار کم استعمال نمود

سیم مواد متعفن که وارد بدن شوند بواسطه تفرق اتصال
خط متعفن حیوانی از این بجزی پشته از اسام است و این مواد داخل بدن گردند
در وقتیکه انگشت مجروح گردد در حالت تشریح بدن متعفن با آنکه بواسطه کار و با
چکال با استخوان که ریم با خونابه الود باشند

همین علامات بر و ز می نمایند و هر گاه بیکه چون دست شقاق با جراحی اشتباه
فریبند در مایع متعفن مانند آن طریقه ای اب که قطعی تشریحی در او بوی خفیف
گذاشته باشند با آن ریم و خونابه که از بعضی حوضها جاری میشود مانند ورم صفرا
وضع حلی

علامات اغلب اوقات علامات موضعی خواهند بود که در محل جراحت با شقاق
دکه و رمی پیدا شده بچک نشینند و بعد بجای او باری بسته میشود که مدتی شفا
نیابد و اغلب هم پس از بهبودی بک صلابتی در موضع باقی ماند که سالها دفع نکند
و در هوای گرم کو چکتر میشود و در هوای سرد شدت تو کرد و در بعضی اراشها صحت
ماده متعفن جذب گردد و مورث ورم عروق و غدد جذب گردد و در برخی حمه
و با فتنه و با عارض شود و در بعضی باز و فتنه شود بدون اینکه در ظاهر علامات
و رمی ظاهر گردد و شبیه شود بنفخ حاد چنان میباشد که سبب این نفخ ورم و ریهها
عمو باشند

علامات عمومی علامات عمومی که در این مرض بر و ز می نمایند باشد که فقط منوط باشد
شکل

بشدت علامات موضعی مانند و اخس و فلتخونی که عارض شوند و بتحرک می دهند بان
وق کنند و اغلب اوقات بروز علامات عمومی بواسطه عفونت خون است و شدت
این علامات اغلب نسبت معکوس دارند با علامات موضعی چنانچه اغلب اوقات
علامات موضعی منحصراً بروز می نمایند و عارض می شود و علامات که در اقسام
و متبج شوند و لیکن متبج می مانند بقتل عارض می شود و علامات که در اقسام
و کسالت زیاد می نمایند عارض می شود و علامات که در اقسام
حمای قهقونی ملوک می شوند بروز نمایند و زبان خشک شده و بواسطه متعفن کردن
و بعضی اوجاع در بعضی عضلات و فواصل می رسد و در بعضی از نقاط بدن فحشها
بر می مانند آنکه در ورم و سردی و در شمشه دیک میشود و بروز نمایند و در میان
اینجالت آنک زبان باادی نمیک و بروز از یک الی سه هفته در بعضی جهات رسد و بعد
باشد که در بعضی شفا یابد و در این صورت هم هنگام نقاهت بسیار عسر و قوی در قوت
کنند و هزال در بعضی زیاد از اندازه خواهد بود و باشد که این مرض و فساد خیلی سریع
بود که علامات خطر به تنیدی بروز نموده و بعد از چند ساعت دفعه و قوی شود
و رفع گردد چنانچه مویسبو کوپل خود مبتلا گردید که در ۸۳۵ هکامیکه تشریح
ذکر را که از ورم صفاق وضع حمل کرده بود و منجمد اجام دست راست خود را گذاشت
مخرج کرد و بعد از بیست و چهار ساعت وجع ضعیفی در زیر بغلش بهم رسید
و حی شد بد با صلا ع و قی و وجع قطن و ضعف زیاد عارض شدند و بعد از دو
ده ساعت و لجمیع این علامات خفیف شده بطرف گشتند و لی در این وقت یک
حمره خفیفی در روی کتف بهم رسید که محل و دماند و نزود بطرف گشت و لی با حق
این خفت مرض مصنف ملوک را یکماه بسیار ضعیف و لون بدنش زرد مانده بود
این مرض بسته به بروز ورم و سردی و بروز عروق جلد به نسبت زبان که علامات

ملفوظه



ملفوظه مادام حیات و جستجوی تشریح نموده اند که هیچ تعبیری در آلات و اشراف هم
نمی رسد و گذشته از این خود خون را هم چه مادام حیات و چه بعد از مرگ که امتحان
علی الاطهار با خون مرده و یک چندان فرق نداشت
علاج هنگامیکه شخصی در هنگام تشریح با در موقع دیگر صرح می رسد باید قدری
بالا تر از موضع داد و در هر محکم به بندد و از موضع عقد تا جرح برخلاف حرکت
خون و بریدی فشار دهد و این عمل را هشت الی ده دقیقه بکنند و گاهی هم
دستش را برین شرباب بکشد که ماده متعفن را آب ببرد و بعد با شمع بپسند و اغلب
از اطباء میگویند جرح را با بئترات در زبان یا گاه آنتیپون بسوزانند و در انگلیس
میکنند و روغن طوبان تین و محلول زلیج سفید و لی این ادویه چندان معلوم نیست
و بهتر است آهن داغ یا پوستیک دودین بخصوص در وقتیکه نعش متعفن شد
باشد و از این عمل بدل می نمایند زخم صمغی یا زخم ساده یا زخم سوخته و یک
بیم نظرها ی موضعی و عمومی نیست اما اینجا که در ابتدا داغ نه نموده اند و علامات
در محل اول جرح با نقاط دیگر از بدن بروز نموده اغلب از اطباء معالج ضد ورم ضمایم
که فسد نموده و ارسال علق بموضع کرده ضماد کوم ملین انداخته اند همین اثر روغن
نمایند و لی این معالجه بجهت یکی از علامات مرض است یعنی ورم موضعی و هیچ
اثری باصل مرض یعنی بان اسم جذب شده نخواهد کرد و برای این لازم است که
او را در هر کجا که هست خراش کنند یعنی در میان عروق جلد به متورم و بران این
باید ان عرق متورم را بضع نمود و کشود و بعد با آهن سفید شده یا آتش کوی
دودین بسوزانند و هرگاه با وجود داغ علامت تعفن بروز نماید ادویه که در
دویم ورم و سردی و جذب بریم ملوک می رسد مستعمل اند
از کوبیسسم و قتی که از شکل مخلوط باشد با مقداری از کوبیسسم استعمال بشود

بجای غذا مورث مرضی خطر کرد که مصنف باشد باید بر وزن تشنجات با غانغرا با
 اطراف لهذا او را منقسم کردند بد و نوع یکی از کوپسیم تشنجی و یکی غانغرا با
 اما از کوپسیم تشنجی چند روزی چند هفته قبل از بروز مرض يك اضطراب
 و تشنگی و کوفتی در بدن بهم رسد و احساس حرکت غلی و تشنجات در اطراف
 ساقله نمایند و اغلب از مرضی صراع بهم رسانده مالخو لیا حاصل کنند و اشتغی غیر
 شده و بعد تشنجات بروز کنند که صفت آنها مختلف است که گاه بسیار شدید است
 بحاله صرع با کف دهان و حرکت تمدوی متواتر اطراف و رزک بنفشی صورت ^{بعد} و
 باختکی و بویکه شده زبان از دندان و در بعضی تشنجات گوازی است مخصوص در
 صورت و خلف و در بعضی عرض تشنجات مختلف است و منته محض و نادر
 اغلب يك تشنجی است در عضلات قابضه اطراف که آن چند نفر آدم بر قوت او را
 بخوانند بحالت طبیعی بیاورند ممکن نیست در این صورت مرضی احساس
 وجع ناخس و حرارت سوزان در آن اطراف نماید که بسیار شکایت نماید و گوی
 و در فاصله حله ها مرضی خسته و کسل شده صراع و دوار و لختن بهم رسد و در
 جنون غشی روی دهد و برخی با غافقتند و در بعضی با صبره ضعیف با فانی و با
 کرد و در سایر اعمال بدن اختلال ملامی بهم نرسد و در بعضی حی عارض کرد و
 در بعضی نیست و در بعضی اشتها بحالت طبیعی و عمل هضم ^{مثلا} بهم است و بعضی
 شوند بوجع معده و تهوع و قی و اسهال و مرضی جهلاکت کرد و باد در میان یکی آن
 عملهای تشنج و با باقمای قوی و فلج و آنجا که منتهی بشفا شود بتدریج فاصله عملها
 زیاد شده و خفیف کردند ولی بعضی از مرضی مداوم الحیات منعقد و با صبره هم رسد
 بعضی تمدات با فلج جزئی در بعضی از عضلات یا بر عرشه در اطراف بهم رسد
 و دام این نوع مرض از پانزده و در ایام سه ماه است

در از کوپسیم غانغرا با ^{اندا} این شکل از کوپسیم با لبه هنگام منقسم شود
 در هنگام اول احساس کسالت و کوفتی در اطراف بهم رسد خواب راحت و ^{مصلحت}
 کشته و جع در قطن و ساقین بهم رسد حرکات تشنجی و غلی و سوزش در ساقین
 و پاها بهم رسد این هنگام اول از هشت الی پانزده روز و دام بهم رساند و با شد که
 هیچ نمودار نکرد و در هنگام دوم انموضع که باید مبتلا کرد و مانند دستها و پاها
 موجب کشته و این وجع بواسطه حرارت و در شبها شدت نماید و بعضی اوقات
 بر وقت در انموضع بهم رسد که همچو جبه تسکین نیابد و گاهی اوقات در آن
 محل در ابتدا انامل بود با فر من رزک کشته طاول بهم رسد و متعجب و متعجب شده
 سریع و صغیر کرد
 و در هنگام سیم وجع موضع بکلی بطرف کشته عضو ملامت غانغرا با کرد و گاه
 این غانغرا با خنک و گاه تر است که صفات این دو را در مجت غانغرا با بیان خواهیم
 کرد و غانغرا با و رز بروز تر قوی نموده و بیدار رود و بان جزوی که باید شتر
 نماید وجع ناخس بهم رسد بنفشی کرد و با شد که جمیع يك دست یا یک پا را احاطه
 کند
 علامات عمومی نسبت مستقیم دارند با وسعت غانغرا با یعنی هر چه غانغرا با ^{بیشتر}
 علامات عمومی بیشتر چنانچه نبض صغیر و ضعیف کشته جلد سرد و پوشید شوق از
 عرق لریخ و زبان خشک و قوی فانی کشته مرضی جهلاکت رسد و در آنها ^{شد}
 غانغرا با بنوعی محدود کرد و شفا یابند از جهلاکت کردن عضو مرده و در بعضی با
 که رفوع مرضی در هنگام دوم بود که سردی عضو و رزک بنفشی و نفخ موضع ^{طرف}
 شده عضو گرم و لون و حجم بحالت طبیعی برگردند و دام این نوع از ^{کوپسیم}
 از سه الی چهار هفته است بدون آنرا فانی که لازم است برای جلا شدن ^{قطعه}

مرده والنباام جرحات

تشخیص اگر فقط ملاحظه علامات مذکور و انما این محال است دادن تمیز
مریض زیرا که علامات عصبانی عموماً در نزد با سبب امراض عصبانی و علامت
غانغرایانی هم عموماً در نزد در سبب امراض غانغرایانی که طبعاً بد است که
درای تشخیص از حالات مقلد مریض اطلاع یابند و بفهمند که مریض از غلو
بالر کومدی صرفی کرده است و اینجا که مریض بطور و بانی باشد سهولت تشخیص

بهم رسد

تقدمه المعروف بسیار خطر است اینجا که برو مریض صریح باشد همیشه محال است
و خطر نوع غانغرایانی بسته بزبانی غانغرایانی است

اسباب بعضی از اطباء حاشا کرده اند اثر او کو را و بعضی مانند لبنیه عطف کرده
اند این مریض را با اثر رفوس و رفوس طریم و لیکن تجارب متاخرین مانند تسیر و
و غیره بوضوح رسانده اند و اسکلکو کونه سمیت دارد و ثانیاً اینکه هرگاه او را بخی
اگر کو را بخواهات بدهند همین علامتیکه در انسان برو می کند در آنها هم
خواهد که که چهار پان چون چند ی از آنها بخی رند پاها و گوش و عم آنها سرد
سرد شده غانغرایا که در در طریور فقا نشان بپند و در بعضی حماقت و مستی
بروز کند در برخی تشنجات هم رسد و برای اینکه او کو در انسان و حیوانات
این اثر را نماید باید چندی و بمقدار کافی صرف شود و الا اثری از سمیت بر
نخواهد داشت و باین واسطه چون او را بطریق دوا استعمال میکنیم اثر سمیت
مذکور ظاهر نمیکرد و لازم است که طبیب اگاه باشد از اثر او کو برای آنکه هرگاه
لازم کرد که مدتی این دوا استعمال نمایند عصاره مائی او را بکار برند نه خود
او را زیرا که در عصاره ای جن دوائی او کو باقی میماند و چون سمیت که دهنی است

ثابت

ثابت از او جدا می گردد و اگر کو طبیب بطور و بانی برو زمیناید و در آن بلاد بکه غالباً
میخیزند و همیشه عارضی گردد در فقر و در آن سالها بیکه با آن زیاد بسیار که زیاد
میشود اگر کو در سببها و سببها می شود

علاج استعمال نموده اند مسهلان و مقی و معرقات و مد حرارت برای خارج کردن
سم از بکی از این مداخل و هم چنین بعضی از اطباء فصد نموده و بنمایند و فی فصد
فادع است فقط در صورت عصبانی و اینجا بیکه نبض منطی بود و در سبب مواضع
استحکام بما قوت نموده و افیون بمقدار زیاد دهند تا اینکه مریض آرام شود و بخوابد
و در صورت غانغرایانی بعلاوه قیاح باید ضماد بخوراند اخته تحریک موضع نماید
و واسطه در ک با او دویه حرکه و حشاشین معطره و مقویه و چون غانغرایا برو
کند باید صبر نمود تا محدود شود و بعد بخمال قطع افتد و او دویه مقویه بنوشاند
بلا کر عبارت از مریضی است که متصف می گردد به و زرا و بطیم در این
از بدن که بر حسب عادت مکشوف است که هر اکی کند بعد از چند ی از پرو و ز

بعضی علامات عصبانی و اسهال و منتهی کرد و عموماً بمرک
علامات از برای این مریض سه هنگام میباشد هنگام اول گاه و در مریض
بقتیه و بد و ن مقدمه است و گاه با مقدمه است از قبیل کسالت و کمی اشتها و
تفویع و اسهال و صلح و در مریض صورت عموماً ابتدای مریض در اول جهاد
که دیده شود در آن مواضع از جلد که حسب العاده مکشوف و مجاور با اشعه آفتاب
است مانند پشت دستها و پاها و ساعدین و قص و گاه جبهه و وجبه لکها
از بطنی حوشی قرمز رنگ برو مریض نمود و خارش با سوزن سوز را موضع هم
و گاه در روی لکهای بعضی جابجا نمودار شوند که معلومند از حرارتی
باقری من رنگ و بعد از زمانی مختلف و غیر معلوم گردند و بیشتر این موضع

سبوس پختند و باشد که بدن اینک علامات و سری در آن مواضع هم رسد بشر
 انجاها که در خشک شده و بعد پیفتند و در هنگامیکه این علامات بر روی
 کنند مریض غناک و کسل تمیل گشته و از روپن بهم رسانند و در بعضی حساس
 و جعی در فقرات خلف و اطراف بهم رسد و باشد که این اوجاع بعد از مدتی از
 بروز از بطن عارض شوند بخصوص در آن اشخاصیکه خود را در اوقات باده
 نکند بهم صورت در این هنگام عمل هضم مختل گردد که اشتیاقی که گشته بود
 عارض شود و گاه پیوست و اغلب اسهال عارض گردد بعد از آنکه این علامت
 مدتی اشتداد یافتند و قوف بهم میرساند و بعد از آنکه بهبوط کنند و بعد
 بتدریج که میگردند که اغلب تا اواسط تابستان بکلی بر طرف میگردند و
 اغلب جزئی اشتدادی در فصل پایانی بهم رسانند در زمستان بکلی بر طرف گردد
 و این متاثر که که عموما در و سه ماه است باشد که دو سه سال طول کشد و
 در بهار ایند همین علامات مذکور از نو بطوری که دو میگردند بروز نماید
 باز تقسیم مذکور دفع میشوند باین قسم از دوالی چهار سال متوالی در آنوقت
 که مرض بدرجه دوم رسد مریض مجبور گردد که از شغل و کسب خود دست
 کشد

هنگام دوم در آنوقت سوزنات جلدی از حالت جوشی یعنی از بطن پیفتند
 و در جلد بعضی و زبکول یا پستول بهم رسد که چون خشک شوند باز بپای
 باکم فنجی حاصل کنند و جلد خشن و زرد رنگ شود و بشرو فنجی گشته شکافها
 پیدا کنند و مانند فلس پیفتند که جلد زردی شان شفاف و قرمز ظاهر شوند
 و گاه این تعبیر جلد شبیه گردد به تعبیری که در لیک طبعی حاصل میشود و
 بعضی از مصنفین تشبیه کرده اند جلد پلاکوی را بخصوص جلد انگلستان را
 بنیچ

به بنیچ و از در این هنگام علامات جلدی همچوت بکلی بر طرف نمیشوند و چون بارها
 پیفتند در جای انها يك از مدای باقی ماند مانند اثر سوختگی و در این هنگام علامت
 عصبانی نیز اشتداد یابد که وجع فقار و اطراف شدت کنند و ضعف عضلات
 بیشتر شود و روشن ناخاطر جمع و حرکت دست ضعیف و پیوت گشته زبان و
 فک مرعشه بهم رساند و حواس کلا مختل گردد که حس جلد کم شود و نقل سامعه
 بهم رسد و چشم کم نور گردد و در بعضی امب لبوی یا دب لبوی با همدا
 بهم رسد و این اشخاص بسیار غمگین شده حافظه شان فانی گردد و بعضی مبتلا
 هذیان و جنون غضبی گردند و در بعضی مالهو بهم رسد و اغلب مایل شوند بخون
 کشتن و اختلال عمل هضم نیز اشتداد یابد و اغلب مبتلا گردند باسهالی شدید
 که او نیز بضعف مریض پیفراید بنض صغیر و ضعیف گردد و متصل ضعیفی عارض
 گردد که گاه بگاه بدن نظم اشتداد یابد و زرها از طشت پیفتند و انها بیکه حمل داشته
 باشند سقط کنند و در بعضی طشت سفید نمودار شود و در بعضی زردی
 دمی نمودار گردد در این هنگام مرض باشد که علامات جلد در زمستان نقصان
 یابد تا در بهار اینک از نو شدت کنند و علامات عصبانی و اختلال
 در عمل غذا هیچ نقصانی بهم نرسد

هنگام سیم در این هنگام علامات مجدداً اشتداد یابد که دیگر شفا ممکن
 نخواهد بود و حکما منتحی گردد بمرک بعد از زمانی زنجار یا کوبه و در اغلب قول
 زبادی عارض گردد و دوماش دست دهد که اطراف انها مفلوج گردد و فنج
 شود بنض صغیر و غلی شده زبان خشک و سپاه گردد و گاه لثه متعجب خون
 الود گردد و بخصوص در این هنگام که در جلد های فنجی و کثیف و نفرت او برند
 عارض شود و باید دانست که فلج این مرض بسیار شبیه است بفلج مترابله و بواسطه

انتهای مرض در درجه اول و اوایل درجه دوم باشد که شفا یابد و غالب
منتهی بمرگ خواهد شد یا بواسطه مرضی که با او مرکب شود بابتی خود بپلک و یا بواسطه
خود کشتی و یا بپدید آمدن این اشخاص خودشان را میکشند نه از شدت و نه بجهت

مرض بلکه بطور ارادی و نادانی و از بی شعوری

دوام مرض نادر است که کمتر از دو یا سه سال دوام نماید در هنگام اول باشد

که چندین سال طول کشد در هنگام دوم و هم زمان بزیادی عجالت و قوف باقی ماند که
دید شده است از ده الی شصت سال شخص مبتلا بوده است

تشخیص با هیچیک از امراض جلدی مشتبه نمیشود مگر با الکلیتری که هر گاه کند بابتی

بثورات امر بطبیعی در پشت دستها و اختلال در عمل هضم و اعمال عصبانی در این وقت هم

از رفتار مرض رفع شبهه خواهد شد

نقله المعرفه خطیر است که چون بد درجه دوم و سوم رسد علاج بدین نخواهد شد

سبب اسباب بسیار می مانند شعاع افتاب و هوای خشک یا رطوبت و کثافت
و خستگی و غصه و فقر و کوشتهای غم خیزه و شراب و آب بد و غذاهای خام و نان

سکندر و شکر و آرد و روغن و غیره از برای این مرض قابل شک اند که هیچیک را اصل
نیست و چیزی که از همه محققتر است ذره است زیرا که در هر جای که اغلب خوراک

ذره میباشد این مرض بطور اندک مشاهد میشود و در انجاها هم که در قدیم
از این مرض فستاقی نبود چون ذرا عترة در آن بلاد کووند طولی نکشید که این مرض

هویدا گشت و از اسباب مستعد من طفولیت و شباب است و مردان پیش از
از زنان مبتلا شوند و در شهرها نادر بل مخصوص هات است

علامت جمع مصنفین نمیکند اندک هیچ دوائی از برای این مرض نیست و انجا که
علامات غلبه دم بود کمی فصد و چند مسهل بدهند و اکثر روزها استجمام در آب

فاتر

ناتوانی که خیلی منفعت از او دیده اند که تسکین در علامت عصبانی و اختلال عمل هضم

خواهد داد و بهترین چیزها عصاره مستر و برتر است که غذای خوب بر مرض دهند و

چون ضعف بر مرض مستولی شود املاح جدیدی واد و پیر و بکار بوند

از چهار مبرز چندین نوع انجیره بواسطه تعفین مواد او و اثر کیمیائی ان انجیره با هم حاصل

میکرد و از انجیره است هیدر سولفات و کوبیات و مونیاک و اسپید سولفید و یک و

از نر و اسپید کوبونیک و بخار امونیاک و گاه هیدرژن سولفور و طالع غالب در ذات

بخار چهار مبرز بواسطه سولفید رات و مونیاک و اسپید سولفید رات است

که در میان کناسهای فرانکستان مشهور است و مستعمل است اطلاق هم بان دو

هائلیست که ذکر شد و هم مرضی که از این دو منتج میشود علامتیکه از اثر انجیره چهار مبرز

حاصل میشود مختلف است هم بواسطه مقدار انجیره متصاع و هم بواسطه استعمال در

شخصی که گاه عمل که داخل این چاهها میشود دفعه افتاده و هلاک میشود و طالع غالب هلاک

بواسطه بر در جمیع علامات اختناق است که هر گاه کنند با بعضی از علامات عصبانی خفا

در ابتدا احساس شود و جعی شد بد در محل معده و مفاصل و راس احساس شقی و شک

بسیاری در حلق که هر گاه با تجمع و پھوشی و در بعضی هذبان عارض شده و

تشنجات در عضلات صورت بخصوصه عارض گردد و بعضی از مرضی فریاد مخصوص

کنند که ان صوت کناسهای فرانکستان شانه لولپت نامند یعنی از نرسب و چیزی

نکند و که علامات اختناق بروز مینماید و گاه بر و علامات احشاق از ابتدا می

است بدون اینکه هیچ علامات عصبانی نمودار شود که صورت کبود گشته کفی خورد

از دهان جاری گردد و قلب بدون انتظام ضربان پیدا نموده و تنفس صبر و عسر و تسبیح

بکلی فانی گشته و در بعضی از عملها بر و علامات بطور مذکور نیست فقط علامت

بروز نمایند مانند آنکه شخص در هوای غیر قابل تنفس باشد مانند از نر و اسپید

مرضی حاصل از چهار مبرز و راه فاسل انجا

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

بجای میماند

کوبنیک و کوبیات و موبنات و انرا بن معلوم میشود که هلاکت فقط بلا واسطه فقدان
هوای قبل تنفس است و حال آنکه در مواقع مذکور فوق سبب حرك اترسمیت هواها
سولفیدرات و غیره است و باین سبب است که نفس انحرافی خیلی نرود متعفن میگردد
و خون انهار قبی و سبز رنگ و در جمیع احشاء پراکنده اند این اختناق نه تنها در کنا سها
عارضی شود که در چاه مبرن بجهت تعمر و تخلیه و فند بلکه عارض شود هم در اشخاص سبک
نرزد بمواد مبرنی که خارج او چاه شده است و بخصوص عارض شود در هوای لب
و حار و در انجاها که داخل بشود باقی ماندن سوادیناتی و آب سستشوی خانگی
سمیت در هنگامیست که سر چاه را بکشایند و مواد صلبه او را بهم نزنند و در وقتیکه
چاه مبالا اخلای میکنند انچه که از او منضا عده میشود مورث هلاک اطفال نادره تولدی
میشود که در آن نوزد بکی باشد

علاج بوفدی علمه را عریان کرده در میان هوای آزاد بگذارند و بمالدند و بپرویی
بدنش خاصه در صورتی که در آب سرد که دریا باشند و حقن مسهل بکار دارند و بسیار
تعریف نوشته اند او کل که هم تحریک بدن نماید و هم اشیاء ترش و سوزنی که از
جذب شده است بر هم زنند و بعضی از اطباء بواسطه تحریک زیاد کلاب نمک بکار
که لثه را بادا لود نموده بدم بینی حررین نکاهند و هم اینکه تنفس مراجعت نمود و بعضی
حالت بلع بهم رساند چیزی دهند که فکند و در میان کنا سها و سم است که اول چینه
قاشق روغن زیتون با ساو روغن نباتی بخوراند و چون آنان مجموع نمودار شود یک
کپلاس عرق دهند ولی انهمون بهتر است و بعد موافق حالت حررین انتر به منعش با
حامضه و با خند تشنج بکار برند و نادر است که فصل لازم شود و انجا که در مجرای
آب و معادن و چاهها و غیره اخف میشوند چون انچه انجاها بسیار شباهت دارد
با انچه چاههای مبارز بکولانم نیست که مخصوصا از انجا که بکنیم علامات و
علاج

و علاج انجا بنی نیست که ذکر کرد بد

امرا بن سبب حاصل از هر حیوانی و بن عبارت است از نشه و طبیعتی در بعضی از حیوانات
در حالت صحه و که ان و طبیعت گذارده میشود در یک نخرن مخصوص و بکار میرود از
برای دفع و حمله ان حیوانات و حیوانات سم دار انجا را کویند که صاحب این سم باشد
که او را در اشخاص انسانی داخل کنند پس از پاره کردن با گردن ان ننج و از دخول
این سم در ننج انسانی بعضی علامات موضعی و بعضی عمومی بهم میرسد که در هر حالت
شان مختلف است و گاه بشدت نیست که مورث هلاکت میگردد و باین حیوانات
عبارتند از افعی و مار و زنگی و بعضی حشرات

مرز بنی حاصل از هر افعی شخصی را که افعی بکند احساس و جوی شدگی
باسوزش نماید و این وجع بسرعت تمام از موضع ملذذ و جمیع ان عضو سرایت و
عضو متجمع و بنض سریع و صغیر گردد اضطراب و ضعف و عسر النفس عارض گردد و با
عرق سرد و اسهالی صفر اوی و دی دهد و لون جلد بر قانی گردد و بعد از ان یک یا چند
روز موضع گردیده شده بچسب کشته لکهای سپاه ایکی موزی بهم رسانند و بطوبی
انزجوج جویان بهم رسانند و گاهی نقطه غائز را بی بهم رسانند و رفتن این علامات
و بادا با که سریع است ولی نادر است که منتهی عرک شود و فوتی ناکه و نادره از شش
هزار امتحان در نغم افعی نمود بران است که عرک کمتر از یک صدم است و بصورت
ذهر افعی در تابستان قوی تر است و مزاج ضعیف و ترس بر خطور مرضی او فایده
گردن افعی قریب پیشتر است از سایرین و سبب بروز علامات مذکور بواسطه
شدن یک زهر مخصوصی است که در درد و نخر نیکه واقع شده اند در قاعه و دندان
فک اعلا است و این دندانها که منتهی و متحرک میباشد مجرای در مرکز شان هست که
زهر ان مجرای دار جوج شود و هرگاه سم افعی را پس از کشیدن انچون خشک

کنند و در طرفه هان بنده نگاهدارند که هواد را و اثری نکند تا مدت دو سال هم
 اثر دارد که ذکر شد
 علاج ارسطو و سبب حکای قدیم معتقد شده اند بر مکیدن محل جراحت و از آنجا
 کسیکه جراحت را بملک خود نیست اگر چه ابد هان خود را هم بلغ نماید ولی عموماً در جراحت
 یک عقدی در بالای جراحت نموده و اگر ممکن باشد موضع را در زیر حجامت گذارند و
 جهل میکنند که سم داخل شده در جرح و ضایع سازند و از برای این کفایت میکند که
 چند قطره امونیاک در جراحت ریخته و بعد از آن با دایره قلعی را در دهانه کرده بروی
 جرح گذارند و بعضی استعمال میکنند بطاس محرق ولی هر دو به محققه که طیب بکاد
 بود لازم است که بعضی بسوزانند تا هیچ سستی باقی نماند بخصوص آنجاها که علامت
 بود و زکند و بهتر آن است که در ابتدا شکافی صلیبی در موضع بنمایند تا داخل خوب
 کند و در همان وقت اشربه منعش خاصه امونیاک بنوشانند و بعد مقویات مخصوص
 شراب خوب بنوشانند

در مرض سیم حاصل از زهر از آنکه از جمیع حیوانات سم دار خطر این بیشتر است که گاه
 پیش از مشخص هلاکت مریض در چند دقیقه در میان ضعفی زیاد و حرکات تشنجی
 اغلب بعد از کوبیده شدن ضعیف و اضطراب زیاد و بهر سبب نبض سریع و غیر منتظم
 گشته صلا و در اثر حرکات تشنجی روی داده عطش مفرط عارض گشته تشنجی و اسهال
 و عرق سرد زیاد پیدا شود و لجهای جراحت بکود و متعجب گشته و بزودی جمیع آن
 عضو منتفی و سپاه گردد و بعد پی تشنجی و الکی موز و نفخ لدم پس بود را اغلب آن
 اغشبه غلطی بهر سبب حس بدن فانی شود و از ده ساعت الی پانزده روز اغلب
 متعجب هلاکت و سند در انواع نادری که مرض متعجب تشنفا میگردد علامت عمومی
 خفیف ترند نفخ لدم پس بود عارض نمیشود و کبودی لجهای زخم کم است و عموماً
 در روز

در روز هفتم جمیع خطر هار رفع شوند ولی ایام نقاهت طویل و ضعیف زیاد است
 و عوی اغلب این اشخاص بزود و بعد از حرکت اغلب از احشاء بخورند
 علاج اغلب اطباء میگویند که اگر موضع کوبیده شده آنکشت دست یا پا باشد بزودی
 قطعش کنند و چون در میان موضع بکوبشت باشد بواسطه شرط مد و رخی که
 در اطراف آن زخم کنند کوبشت آن عضو را بود داشته موضعش را داغ کنند ولی
 اگر داغ را خوب بکنند کوباکافی باشد و از برای علامات عصبانی بکار بوند که
 کند و سبب مقویات و منعشات را ی ضعیف مریض استعمال کنند و بعضی از حکای
 انگلیس نافع دانسته اند اسید ارسنیو و ارسنیک و دیتاس را در داخل استعمال
 در امراض سیم حاصل از زهر حشرات از آنکه بعضی از حشرات الارض مانند
 ذنبور و ذنبور عسل و عقرب و هم رتیل سمیت دارند اما کوبیدن ذنبورها
 چون این حیوانات بکنند اغلب پیش آنها و گاه پیش با حیا بزنند و در جراحت
 بمالد و جعی سوزان در موضع بهم رسد نفخ و تهیج پیدا کند و جلد که متعجب شده
 عموماً سفید میماند و گاهی سرخی حمزه میماند مگر در موضع جراحت که یک
 صلابتی بهم رسد بخصوص اگر پیش در زخم مانده باشد و عموماً این علامات
 خفیف و بعد از چند روز بزحودی خود بر طرف شوند ولی دیکه شده است
 که بواسطه کوبیدن یک ذنبور مرده اند و حرکت با بواسطه ترس و غشی بوده و با
 بواسطه اشخاص و وی المراج و غائر ابا ی موضع و یک نفر که ذنبور بکاشش پیش
 کام و خویجی متعجب شد که داه نفس کشیدن مسدود گردید شخص هلاک شد و عموماً
 حرکت عارض نمیشود مگر آنجاها که چندین پیش زنبور رسیده باشد چنانچه شخص
 دپله شده است که کل زنبورهای عسل یک کدوی بر او حمله آوردند و در آنوقت
 کوبیده است

manat. tarikhema.org

tarikhema.org

علاج موضع اتعسبل بابا مویاکی با آب سرکه و ندهین بعضی روغن هانما^{شد}
و جستجو باید کرد که بیشتر در زخم مانده باشد اگر مانده باشد شریح و روی موضع
صلب کرده بپوشد و پیرود او رند

اما غریب در ممالک معتدل و سرد خطی ندارد ولی در بلاد گرم باشد که
مورث بروز ضعف و کمی و در عرشه و تجمیع و جمع موضع گردد و گاه بچک
این علامات شده بود که مورث هلاکت کرده اند و علاج مانند آن است که در
مبحث افعی ملک آور شد

اما رقیب قد مامدی توان بودند که هر که را و قبل بکند مبتلا بمرض غریبی گردد
و انمرض این است که شخص مایل شود متصل بر قصد و انمرض را طران طیسیم مبتلا^{شد}
ولیکن حال محقق شده است که از کونین این جوان جز بعضی علامات موضعی
خفیف چیزی روی نپندهد و طران طیسیم وجودی ندارد

امراض حاصله از ویروس عبارت است از رطوبتی که مترشح شود بحسب اتفاق
در بین مرضی بدون آنکه بتوان او را تمیز داد و بدست آورد و همیشه مخلوط است با باد
با غلط با باد رطوبتی مائی و با با خون و چون ویروس مجاور شود با بدن سالم در اینجا
مورث احداث علامات میشود مشابه و بیک هیچ که اثر آخرین آنها تولید همان مرض
خواهد بود بقسمیکه این امراض ابدا لا باد باقی میمانند و از اینجا معلوم میشود
مابین ویروس و سم حیوانی و در انمرض از جمیع امراض ویروسی گفتگو نمکنیم
زیرا که بسیاری از آنها را مجبور بودیم که در مبحث دیگر بیان نماییم مانند ابله
و کپن و سرخه و اسکارلاتین و غیره و در اینجا بیان ما مختصر خواهد بود
به رات و پوستول ملین یعنی طاول روی و شرابون یعنی ذغالی و مرغی
مشمه و فرسن یعنی آهن با سراجیه و سفلس

یعنی

و از بعضی کلمات عبارات است از مرضی ویروسی که با انسان سرایت میکند از حیوان
نوع حیوانات خصوصاً از نوع سگ و این مرض مخصوص متصف میشود و در همه دنیا
از رقیب مایعات و تشنج عضلات تنفس و ریختن آب هان اختیاری مدای
و اغلب بروز زخمها تشنج و چون از مایعات یکی از علامات مدای این مرض است
و سم شده است هیدرزی یعنی تومور خوانند ولی چون تومور از آب و لبساک
از امراض ملا حظہ میگردد هر وقت که بخواهند از هیدرزی این مرض را بنمایند
باید که صفت رقیب را در اخروش بیاورند که هیدرزی و رقیب خونک شود
طریقه بروز این مرض در انسان این مرض هموقت بخودی خود در بدن انسان
بروز نمیکند و همیشه با انسان داده میشود از حیوانیکه مبتلای باد است و این
حیوانات اغلب از نوع کافیس است از قبل سگ و گاو و در بابه از نوع فلیس^{شد}
بر و بروز دپلنک و شرب بخصوص کوبه ولی تاکنون معلوم نشده است که حیوانا
دیگر مانند نوع شتر گاو و قاطر و الاغ و مرغهای خوانکی که میتواند
این مرض در آنها از سایر حیوانات مد کوره قبل در آنها بروز کند بتوانند این
مرض را با انسان بدهند و هم چنین تاکنون دیده نشده است سرایت این مرض
از انسان با انسان دیگر ولی از تجارب جریندی صاحب بیه شده واضح گردیده است
سرایت این مرض از انسان بسگ و سرایت این مرض از حیوان با انسان با واسطه
لسع است و با واسطه و خوردن آب هان آن حیوان است و بر روی هر تفرق
انسان تاکنون دیده نشده است که فقط از بروز خوردن آب هان حیوان و این
بر روی جلد با بر روی غشاء مخاط که بشیر از وی آنها برداشته نشده است
شخص مبتلای بمرض کوبه ویروس حیوان دیوانه در آب هان آنها است و معلوم
شده است که هیچیک از رطوبت دیگر مانند شراب و مرغی و در آن و خون با از اجزای

صلبه او که متصل بسبق بالات بدن انسان مایه این مرض خواهند بود و باید واجب هان
 حیوان دیوانه اگر غده بزاق مانند آنکه قدام خیال میگردند تشنه نمیکند بلکه
 جویان او از فحاط هجاری هواست و جمیع افرادی که از حیوان دیوانه طبع
 شوند مبتلای این مرض خواهند شد و اولاً يك ثلث از آنها معاف خواهند شد و
 این بواسطه اتفاقات خارجی و این اتفاقات گاه بواسطه آن است که و بر روی
 چون بدن رسد بواسطه به بیرون اید و حذب تشنه و با آنکه چون شخص ملسو
 لباس نرپادی پوشیده باشد دندان حیوان لاسع میدان تا بر مسخ خشک و باک
 میگرد و موسوی که پلو بدن است که و بر وی حیوان دیوانه در سرانست
 اوش بر طرف ملسو و موسوی برود بدن و این که این نقد ادا فابل شود بدن
 که اوش و بر وی حیوان دیوانه در هر صراحتی بتدریج کم و طوی نمیکشد که بکلی
 تمام میشود و موسوی برود شمعین کرده است که هرگاه از سه یا چهار حیوان تجاوز نکند
 تمام میشود

هنگام کون مرین همیشه قبل از دخول و بدو سر بدن با بر وی این علامات مرض
 يك زمانی میگذرد که او زمان دهنکام کون میگوید و این زمان بندرت کمتر از پانزده
 و زیاد تر از چهل روز نخواهد بود ولی شده است که کمتر یا بیشتر باشد چنانچه مدتی
 میگذرد جوانی که در صبح روز غریبی اشرار سگ جاری ملسو شد و در آن روز نرپا
 نرپادی خورد چند بار جماع نمود و در همان شب علامات مرض بر وی نمود و با شدت
 ولی انجاها نیکه کون مرض زمانش طویل باشد که چندین ماه بلکه یکسال طول بکشد بیشتر
 دبد به پیش و بعضی بران شده اند که در روز سیم هنگام کون المی هم يك طاولی در ظرف
 بند زبان بر وی مینماید ولی از قراری که حال معلوم شده است این طاول قصه است
 که باید فراموش نمود

علامات

علامات و رفتار و دوام و انتهای مدعی شده اند که در ابتدا ای این مرض بعضی علامت
 در عمل لمس شده نمایان میگردد و چنانچه هرگاه جراحات التیام پذیرفته باشد و با
 پاره میشود با اختلاف لون پیدا میکند یا آنکه جمعی در موضع حاصل شده از الجابت
 مواضع سرایت نماید و اگر هم این قول اصلی داشته باشد بندرت بر وی میکند و در ابتدا ای
 مرض احساس صدای نرپا یا اگر شد بد شده خواب بر طرف باکم شود و وقتی هم که مرض
 رود بواسطه بدن خوابهای بسیار مضطرب میگردد و اغلب از مرضی مهموم و مضطرب
 شوند و در بعضی يك تحریکی میسرید که کم حوصله و بر حرف شوند و جمیع مرض احساس
 وجعی شد بد در بعضی از مواضع بدن نمایند و اشتی که شده بغیر سرعت میسراند و
 این علامات از رد و الحشش روز و ام میسراند و میتوان این دهنکام اول مرض نامید
 و در هنگام دویم و سیم و غیره از آب میسراند و حس خفگی و بستگی در حلق میسر
 و هنگام بدن آب با در وقتیکه با غنا حکم بنوشیدن ادب کنند صورت بسیار متغیر
 شود که از بشیره معلوم شود توهم او و بعضی از مرضی بده شده اند که بعد از آنکه چند
 اصرار در ترس آب و نجسیدن او کردند بالاخره طرف ابو بخت گرفته و نزد يك دهن
 شان میبرند اما همینکه چند قطره از آب حلقی آنها رسد بخواسته در همان ان و به نشینند
 و احساس يك خفگی نرپا در حلق نمایند که نتوانند تنفس نمود بواسطه تشنه که در عضلات
 بهم میرسد و این ترس از آب چنانچه درجه ملا خطه میگرد و و گاهی بحد بست که مرضی
 تواند که نداب را به پند و نه صدای او بشنود و هم از نظر فیکه در او آب بوده است
 و هم بهم میسراند و بعضی اشخاص را نمیتوانند بخورند ولی تحمل بد نش را میتوان
 بطوریکه گاه ممکن است استیام بخورند و بعضی اشخاص را نمیتوانند بخورند
 و لیکن شراب یا آب گوشت و غیره را بنوشند و هم دبد به شده است شخصی که با وجود
 ترس نرپا از آب نان که باب منزه نداب او را میگوید و در بعضی از مرضی این ترس

از آب موقتاً بر طرف شود و این مرضی از باد و از درد و شنائی و از سردی و از هم دارند و این
 شان خبیث است و کوفت بهم می رسد و کوفت و پوچ حرف می شنوند و در اغلب هذیان و هلاک
 سبب بهم می رسد و در برخی جنون غضبی عارض می شود و بد کوفت کنند و می
 شوند بدند و کوفت و وزن و دیگران را و اولاً از مرضی با محبت شوند چه با قوام و چه بر
 خود و در بعضی این علامات همراهی کنند و زنان با نام فومانی یعنی میل زیاد به جماع و در حین
 ساطع پادشاه چنانچه یکی از این مجانی دیده شد در ۲۴ ساعت سی و فوج جماع نمود خلاصه
 اشکال آن نفس بیشتر شد و گاه گاه بواسطه تشنج عضلات موقتاً قطع شود و در این صورت
 چشمهای مرضی خیره و صورت باخته و کوفت و سیمای و هیبت پیدا شود و کفی لریج با نف متوالی
 از دهان خارج شود و بعضی سریع و صغیر گشته و حس خفگی و بسته شدن در سینه و حمل
 معده بهم می رسد و عطش مفرط و خراج پس می رود و بالاخره عسر النفس شدت گرفته و ملائم تف
 کند و فوق عارض کشته تشنج عارض می شود و عارض این تشنج با الاسباب است با از این
 خورد هوا و باد و از ریه و است چشمها فرو رفته و باها و اما کوفت گشته و مرضی فوراً
 هلاک شود و از سردی و شدت تنفس و نام این هنگام دو بیماری عموماً در سر و زناست
 باشد که بگویند و از بود با نایب و زویر طول کشد

تشخیص و تفریق از آب و عسر نفس و تف متصل چون هر سه جمع شوند و دیگر تشکی
 در تیز مرض نخواهد بود و فقط ترس از آب اگر چه در غیر این مرض خبیث نادراست بروز
 کند ولی به تنهایی تیز مرض را نمیدهد زیرا که در اغلب امراض عصبانی مانند اختناق
 و حم و صرع و بعضی ورام اغشبه و مانع و در سموم محرک و غده و در مزمنها با وجود
 تیز بودن مرض از حالات سابقه مرض با ساد می شود و مشککتر از همه وقتی است که تشنج
 ملسوع گردد و از سرگی که حاد نباشد و تشنج خود را بخواهد و تشنج کند و تشنج کند که تشنج
 و هم بیشتر و بیرون این علامات در اینجا است که فقط از ترس است خبیثان طول می کشد

کشید

کشید که چند روزی پس از تسخیر شدن است یعنی آنکه هنگام کوفت و بدنه می شود
 علامات هنگام بروز نمیکنند و بعلاوه هر اهری اختلال اعمال تنفس و تف ملائم نکند
 تقلب المعرفه چون و اثر عارض شد تا در چنین فهمید آنکه که غیر قابل علاج است
 ولی طبیب باید چیزی دارد که میتواند نکند و او عارض شود و خطور مرض کمتر میشود و اینجا
 که زخم کمتر و وای مستعمله از برای بر طرف کردن سم قویتر بود و هر چه از هنگام
 تسخیر تا وقت استعمال و پیشتر گذشته باشد و زخم عمیق تر و متعدد و بدو دخل مرض
 بیشتر خواهد بود و چون تاکنون معلوم نشده است که سم در چه وقت جذب شده و در
 بدن اثر می نماید لهذا بر طبیب لازم است که هر وقت بیالین مرض اید و وای ضد سم را
 بکار برد

علاج برای آنکه نکند از این مرض عارض شود باید تجویز نماید که سر را در موضع
 و قبل از آنکه جذب شود صنایع سازند و اینجا که تشنج حاضر باشد و هنگام تسخیر باید
 عقده بالای موضع نماید و بهتر است که در روی موضع حجامت کند تا سم جذب
 نشود و در همین بین داغها را بروی آتش گذارد و چون سرخ شد نداید و داشته بر سطح
 جویم بلکه اطراف او را هم داغ کنند و باید وقت نمود که داغی جمیع مواضع دندان کش
 و تا تماس نماید و هر خراش جزئی هم که در بدن و سینه باشد آنها هم باید سوخته شود
 و اینجا که موضع بطوری پاره شده باشد که خوب سوخته نشد ممکن نشود باید بر یک
 بود و بر د و با بنوا سطر است که اغلب بطنی و انگشت و یک دست و با اغلب بر یک
 اند و اگر طبیب حاضر تشنج مکرر بعد از التیام یافتن جراحت باید آن موضع را بشکافد
 داغ کند و بعد از آن داغ مستعمل است کوسبک و بین و اینجا که شک داشته باشد
 که میتوان دیوانه است باز داغ لازم است و چون تاکنون معلوم نشده است که تشنج
 از انسان هم با انسان سرایت میکند یعنی آنکه سرایت نکند تشنج هم هنوز معلوم

نیست و بواسطه این تا خواهر جمعی اگر انسان مبتلا به این مرض هم کسی را بکشد باید ^{ضعف} دماغ نمود و چون مرض ظاهر گردد و دیر زیاد است حال کرده اند که غذاها استفرغ دم و بلبان و قریب و مشک و کافور و جند و سم الفار و زهر پی و سنک و جهم و زهر و امونیاک و جوهر کینه و اسید سیانید و یک و کلر و غیره آمیبا شدند و هر این ادویه به مقدار زیاد باید مستعمل شوند و هم بکار بزنند الکل و بسته و کندن افحی و اماله کردن آب و روغن و چون این مرض بسیار خطرناک است هر کار در معالجه بکنند جاد و باید امیدوار شویم شاید شخصی عالم و ای مخصوصی بجهت این مرض پیدا کند

مرض ^{بسیار} حاصله از شک خادستوار در چه حالت سک و بوانه میشود و سک های که میگویند دیر بوانه شوند در ابتدا مهموم گشته کم غذا بخورند و یک تغیری در رفتارها بهم میرسد و بعد از آن خانه که بود فرار میکنند و میزد و در بعضی در حالتی که سرش را بر زمین میزد باشند و بوق شگ باشند و در همان حالت فالش میکنند و باهاش پویشید شده است از کف و انسان با حیوان دیگر که بجلا و در باید میبرد و لی خود بخصوص جستجوی کند که کسیر پیدا کرده بکزد بلکه جلوا و هر چه بخورد میبرد و از حیوان برمی آید که کج خلق است نه اینکه غضب داشته باشد و از آب فرار میکند ولی بقدر انسان و حرکت و بدن از او گاه گاه قطع شود بواسطه حرکات تشنجی عضلات و بعد بجهت میزد در بالا و کم نزدیک خط استوا و هم چنین در نزدیکی قطب سکها بندرت دیر بوانه شوند و در اواخر بهار در ماه جوزا و سنبله از ساپورا و قات سکها بیشتر دیر بوانه شوند و گفته اند سک حیوانه میشود بواسطه غذا های متعفن و از کم خوردن آب و کم حرکت کردن و از جای رطوبتی خوابیدن و از جماع نکردن ولی اغلب اوقات سک دیر بوانه شود بدون اینکه بک از این اسباب موجود باشد چنانکه دیده شده است از جمیع کردن جمیع با بعضی از این اسباب در یک سک حیوانه نشاء و سک همایکه

دیر بوانه

دیر بوانه کرد بد باید بکشند و اگر شک در دیر بوانگی داشته باشند حبس کنند تا خوب شود و با بپر در همان حالت

در طاول روی این مرض علتی است ستمی که داده میشود با انسان از بعضی حیوانات خانگی و متصف است بیک ورم غانغریایی در جلد که بندرت بغشاکها سرایت کند

طریقه پرور این مرض نادراست در شهر مخصوص پرور میباید در دهات خانه در فصل گرم و قریب در جایگاه پست و مرطوب آن و بعد از سالها نیکه با آن زیاد دیر بوانه که با بواسطه در نشود مگر علوفه ضایع شده که چون حیوانات خانگی آن علوفه را بخورند مبتلا شوند با مرض طاعونی و غانغریایی و دیده شده است که فقط در هوا بسیار کم بدون وجود یکی از اسباب مذکور مرض بخودی خود عارض شود و حیوانات بهر حال در تحت اثر اسباب مذکور با و قتی که این حیوانات از زیاد شدن خسته کنند مایعات بدن آنها بخصوص خون و نیز در آلات حلیه یک ماده مخرب بهم رسد که چون بخورد نماید بدن انسان و جلد او مایه پرور طاول روی خواهد کرد بد جلد و چشم این حیوانات هم با سانی این مرض را با انسان میدهند و هم مدت زیادی ماده مخرب را در میان خود نگاه میدارند چنانچه بعد از استنشاق مکرر و باد دادن و تغیری که در کارها خجالت برای دست کردن آنها با آنها میدهند اغلب برای بر طرف کردن ماده مخرب کافی نیستند که بعد از چندین سال میتوان این مرض را با انسان بدهند و با وجود این اغلب طبایا بر آنند که از بخورن و خوردن گوشت این حیوانات آسیمی بدن انسان نوسل و لی چون بسیار دیده شده است که چون گوشت حیواناتی را که از شرین مرده اند بخورند یا سبب عرق طاول روی و با مرض تغنی غانغریایی شده است لهذا لازم است که هیچوقت گوشت این حیوانات

خوردند و انفراد مذکور معلوم میشود که پرو ز این مرض با باید در اشتیاقی باشد
 که همیشه با این حیوانات مجاورند و مادرانها نیست که از باقی ماندن آنها کاه میکنند
 چون پشم و غیره و از صنف اول شمرده میشود شبان و کله داران و قصاصها و نعل
 بندها و زرد عین و از صنف ثانی شمرده میشوند دبا عین و پوست تراشها و نماد
 ملها و پرو ز مرض همیشه در محل است که مجاوران پوست خراب شده است
 و همین مرض میتواند با واسطه نیز سرایت کند بدین انسان مثلا هرگاه مکی که در
 آن موضع فاسد نشسته بعد روی جلد انسان نشیند مورث سرایت خواهد شد
 و پرو ز این مرض بیشتر در حیوانات غلف خور است بخصوص کاه و هم دیده شده است
 در سگ و خوک و مرغان خانگی این مرض از انسان با انسان دیگر نیز سرایت میکند ولی
 هیچ وقت در انسان بخود بخود بروز ندارد
 علامات از برای این مرض هنگام کوف است یعنی از اول بخورد ماده مخرب بدین
 انسان تا اولین بروز علامات مرض و امتداد این هنگام از یک ساعت است تا بیش
 دوز و کاهی بیشتر هنگام اول که ابتدای مرض است متصف میشود بی و جز
 موقتی در موضع بخورد ماده مخرب و بزودی را موضع جایی بقدری از آن در
 نمودار میگردد که با خود پاره شده با مرض از خاراندن او پاره کند و یک رطوبت
 دقیق رمادی از او جاری گردد هنگام دوم بیکانه صلب که یکی عدسی شکل است
 هیچ برآمدگی از ضخامت جلد بهم میرسد و هیچ تغییر در لون جلد پدیدار
 نشود مگر در روی حباب مذکور که لون جلد بکوبد باشد و غارت شدت کد و مرکب
 گردد با حس جراثیم و سوزن و جلد اطراف حباب متعجب و کشید و براق کشید
 هاله در اطراف نقطه مرکزی ظاهر شود و این هاله قرمز رنگ و باشد که بلون پاک
 بود و در اطراف این نقطه بعضی طاولها بهم میرسد که بزودی بهم متصل شد
 یکی کرده

یکی کردند و محتلی گردد از رطوبتی قرمز رنگ و کال و و این وقت آن نقطه سرخ
 مرکزی رمادی گشته جمیع علامات غائز را در او بهم میرسد و دوام این هنگام
 از چند ساعت تا چند روز است هنگام سیم این نقطه غائز را باقی منبسط
 گردد چه از عمق و از سطح و هر چه پیش رود یک هاله تاز به برآمده بد و رافهم
 میرسد و با نفو اسطر چنان نماید که نقطه غائز را باشد در عمق است و موضع
 خلد شده است و تقبل گردد و جلد آن موضع کشیده شده بعضی خطوط قرمز رنگ
 بهم میرسند که کشیده شوند بجانب غد و جدا به و تا این مرض موضعی بود که
 هیچ علامت عمومی نداشت و از این بعد چون مرض رویش باشد غائز را
 محو و د شده و بعد از چند روز از نقطه غائز را باقی ببقی و اعلی غائز را
 از پیا د نماید و علامات عمومی خطره بروز نکند و این علامات مانند علامت
 ادی نمک و آنک تر یک حی تیغی نیست که هنگام چهارم مرض خواهد بود و با
 دانست که هنگام مرض همیشه بخود مذکور نیست که گاه بجای سیرج السیر است
 که چهار هنگام از هم تمیز داده نشوند و مخلوط هم اند و با آنکه دوام هر یک
 از این هنگامات موقتی و بسیار کم است که در هیچکدام و با نیست و چهارم
 ساعت با غائز را پای و وسیع و علاوی نمک با آنک تر یک شخص بجلد اکت
 میرسد و کاهی اوقات بواسطه معالجه یا از قوت طبیعت مرض بزودی محو
 گشته و بنگام دویم با سیم نمیرسد و دوام این مرض تا افتادن جز جز از و
 نزد ما پانزده روز است و هنگامیکه برای التیام جراحت است پس از
 افتادن انجر مرده اگر غائز را زیاد بود باشد که از کثرت مریم قشر شده
 شخص بجلد اکت میرسد
 اشخص صفات این مرض بخصوص از وجه دوم بحد واضح است که هیچ

manat.wikichema.org

tarikhema.org

جلدی نمیتوان مشتبه نمود خاصه احمر و فلفخ و نیا و دمل و آن تر آکس و کزیدک

عقرب و پشه

تقدیر المعرفة مرضی است خطیر مخصوص آنجا که وسعت غانغرا یا زیاد بود و

چون محل طاول سر با کردن بود خطرش زیاد تر است از سایر مواضع بدن

علاج برای محل و کردن غانغرا یا و خراب کردن ماده سستی میباشد آنجا که مرضی را

بیرون آورده با سوزانند و بختن در داغها محرق دین و آهن داغ است و هر یک از

اینها را که استعمال میکنند باید تا آن مواضعی که طاول رزده و هاله دارد بسوزانند

و اگر طبیب قوی تر رسد که غانغرا یا حاصل شده باشد با طاول آنجا که رزده را بر دارد پس

از آن بسوزانند اگر چه غانغرا یا وسیع بود و در این صورت اخرویتوان او را محقق

نمود از آنکه دور تر آید و سر را بسوزانند با محرق وین با اینکه یک جزیره در اطراف

مرض بهم رسد و بعد موضع را بسوزانند از او پاره مقوی مانده کنه کنه واد و پاره

معطر و مستشوی با ابهای عرق و کافوری معلوم است که طبیبان برای

ترکیبات مرض و علا مات عمومی ادویه کافیه باید بکار برد و از برای حفظ

صحت هیچیک از اجزاء این حیوانات نباید شدت نزد و باید پوست این حیوانات

پاره پاره نمود با سوزانند و بدن آنها نیز فن غود که طمع مردم از آنها قطع شود

و هرگاه دست یا بدن الوده شوند باید زود دست را با آب صابون یا آب

شراب را بسوزانند و اگر خراش یا جرحی عارض شده باشد موضع را بسوزانند

سوز روی عبارت است از مرضی که عموما متصف میشود بپیر و نهادهای

بوامد کیکی داشته باشد و بسیار صحت و موجد بود و بد و ریش ها که

رنک بسته شود و در حرکتش جابجایی هم رسد از رنک بنفشی که بزودی پاره شده

و بجایش غانغرا یا سیاه رنک شبیه بدن غالی نمودار گردد و بواسطه همین لون

سیاه غانغرا یا است که او را موسوم نموده اند به شریبون یعنی غالی و شریبون بود و نوع است

یکی طاعونی که در مرض طاعون همیشه مرگ است و مذکور شد و دیگری غیر طاعونی که در این

فقط از او گفتگو نمائیم و بر وزن این مرض در همان اسباب است که در طاول روی مذکور

شدند یعنی آنکه سرایت میکند با انسان از مجاورت و بر خورد با خون پاکوشت و

سایر اجزاء حیوانان که از خستگی یا از امراض شریبی مبتلا شده باشند این مرض همیشه

هر احوال میکند با علا مات خطیره شبیه بانکه در درجه چهارم طاول روی مذکور شد

مانند اضطراب و ضعف و هذیان و غشی و ماده شریبی سخت و صلب و همراهی کند

بروز جابجایی با طاول بنفشی که در زیران طاول دانه است صلب که بزودی سیاه شده پس

گردد و در اطراف او یک دانه سرخ رنک بپرسد که آن دانه کرم و سوزان است و غانغرا یا

بزودی سرایت نماید هم بسطح و هم بجو و بخلاف طاول روی که در جلد و غشاها

محدود میباشد شریبون روی بعضی از اعضا و عروق و اعصاب و غیره این سرایت میکند

و هر چه غانغرا یا منبسط گردد و حرکتش نرم گشته و متعفن شده بریزد

و قاتل این مرض بسیار است که اغلب مرضی در ۲۴ ساعت بمرگت رسد و عموما

دوام مرض آنزد و ناچار مرگ و نراست و بعد مرگ منتهی تشفا گردد و بیمار میمیرد که

مشتبه گردد طاول روی است زیرا که سبب بروز هر دو یکی است یعنی از حیوانات

با انسان سرایت میکند و هر دو از امراض غانغرا یا هستند که بزودی بمرگت میرسانند

و علا مات عمومی نیز در هر دو مرض مشاهده و طریقه سرایت شان هم مثل هم است

و بعضی گفته اند که شریبون حیوانی گاه مایه بروز شریبون مایه بروز طاول روی

از این قرار این دو نوع از یک مرض خواهند بود نه دو مرض مختلف و اختلافی که دارند

اینست که شریبون باشد که بختن بر وزن نماید بدون سرایت با انسان از حیوان و طاول روی

باید که از حیوان با انسان سرایت نموده باشد و شریبون از ابتدای بروزش مرضی است عمومی

و حال آنکه طاول روی مدق موضعی مانده بعد عمومی میگرد و شربن در هر جای بدن میتوان
 بود و نکند و حال آنکه برون طاول روی در مواضع مکتوفه بدن خواهد بود خود ماده در
 شربن منصف پیشو با برون لکه سیاه در وسط و هاله قرمز در دور و حال آنکه در طاول
 روی تھج زبادی در ماده موجود است

علاج باید مرکب ماده و داغ نمود با با اهن سرخ با اکسینیک وین با کلو و در فزیک و بعد
 از داغ بوی و وضو ملعب اندازند با پوست کنه کنه و با جرم شراب مخلوط نموده بمق
 ضما و کنند و بعضی ند هین با روغن زیتون را جابجا دانسته اند چون شربن از ایندا مرعی
 عام باید بعلاوه علاج موضعی معالجه عمومی هم نمود از دادن پوست کنه کنه و شراب
 کافور و انجا که امتلا در معده باشد مسهل بر فوق و استفرغ دم چه موضعی و چه عمومی

مضرات

در فتنه ماد موضعی است همانی که عارض شود بواسطه داخل شدن سم مخصوصی
 انسانی از حیوانات بک سم مانند اسب و خوک و طوطی و غیرها و از صفات مخصوصه و
 رنگ مخصوصی که هر ای کند با قشع ری خون الود و بمقداری زیاد و برون جابجا
 و بی در روی جلد و گاه ماده های ری با غانغزانی

تعبیرات تسری بعد از حرکت اختلالات زبادی در بعضی از آلات ملحوظ گردد مثلا
 در جلد ثورات چندی مشهود گردد مانند داغهای کلی رنگ و حجامت و تھج جلد
 در بعضی از مواضع و در مواضع دیگر جابجای ری و حجم مختلف و امان و جلد
 انجا مخرج و ضخیم و گاهی اوقات غانغزانی شود و این اختلال باشد که سرایت کند
 بغشاء لحمی تحت جلد و یکی از علامات مخصوصه این مرض در جوف انف است که
 مخاط جوف او پوشیده شود از مخاطی هر مادی و ری که مخطط گردد و خون و خون غشاء
 که قومن و پو خون است ضخیم و برآمده گردد و در بعضی جاها ملاحظه گردد و بعضی در

امدیها

امدیهای زرد رنگ کرد که با از هم جدا و با مجتمع اند و بر یک موضع و حجم انجا بقدر سر سنج
 باد اند از در پی نیست و چون این داغ را ری ند معلوم شود که انجا حاصل شده اند از
 و چون این داغها نرم شوند مورث جرمی مد و منتظم گردند که غشسان صاف و
 براق باشند و این جراثیم بزرگ شوند با بواسطه نمو خود انجا مخرج با بیجهت آنکه در اطراف
 جرم از همان سواد پیدا شده بزرگ نماید و بعضی از مواضع غشاء مخاطی نرم و
 غانغزانی شده بفتند و غضاریف و عظام بینی که برهنه شوند پرخون و متفجر بود
 و خضبه الانف باشد که مشغوب شود و این اختلالات که اغلب محذ و دند در جوف
 انف گاه سرایت نمایند بعد فهای بینی مخصوص بصید فهای اسفل و هم سرایت نمایند
 بعظام جبهه و فك و هم این اختلالات ملاحظه شوند در جوف خلفی کام و جوف خلق و
 در لوزین و زبان و کام و بینی جابجای ری می مشاهده شوند در مکی و حلقوم و این
 جابجای ری گاه مجدی زبانی و تھج شوند که مورث تنگی مجاری هوا و اختناق گردند
 و همین اختلالات دیده شوند در قصبه و ریه و در اکثر مواضع کبدی شوند و بند
 مشاهده شود که در بعضی اطراف متورم شده است بخصوص در نزدیکی محل
 و غانغزانی با این مرض همیشه همراهی کند با ورم و رید و ورم غدد جلدیه در صورتیکه
 سرایت او بلا واسطه باشد و مشاهده شود و ما میل زبادی در عضلات مخصوص
 عضلات اطراف و هم ملاحظه گردد و در بعضی از مفاصل

علامات انجا که سرایت مرض با واسطه باشد علامات مقدمه مانند علامت
 غالب ابراض حاده است مخصوص حبات مانند کسالت و کوفتگی و تشعیر و علامات
 امتلاء معده و بعضی و جاع مخصوص و اطراف خاصه در این مرض ضعف زبانی است
 و در بعضی شکایت کند از صداع و اغلب مبتلا شوند با سهال و انجا که سرایت مرض
 بلا واسطه باشد یعنی اینکه از زخم بواسطه فقر اتصالی وارد بدن شده باشد و

بعد از بروز علامات موضعی است مانند حمه و ورم عروق جلایه و بزرگ شدن
 غده جلایه و بروز این علامات موضعی هم بعد از دوازده هشت و نهمین است
 و بیم بیدن است و گاه بروز از این مرض بخت در میان ستر لجه مزمن است بصورت
 پس از بروز از اجاع عضلاتی و مفاصل مثلاً بایند و نبض محلی و بدن کم شود
 این اجاع که در ابتدا بزرگترین علامات مرض است بسیار شبیه است بوجع مفاصل
 حاد و باین واسطه همیشه اطباء هم او را وجع مفاصل خیال کنند و این وجع که در ابتدا
 در همه مفاصل است طول نکشد که محدوده در چند مفصل بزرگ میگرد و در آن مفاصل
 شدت زیاد بهم رسانند از استعمال جمیع عذرات هیچ تسکینی نیابد و بعد از چند روز
 در یکی از این مفاصل مویج باد صوری برت بگورم حمه بجهر سپاه که پوشیده شود از جفا
 و لکهای غانغراپائی و این حباب بسیار و جین خشک گردد و با شدت که منتهی شود بحج
 و این جراحات بسیار مایل اند به بزرگ شدن و حتی اگر چه باقی است ولی نبض از
 امتلاء افتاده فقط زبان سرخ و قاعه اش را به داو گردد و اسهال اگر در خارج نباشد
 پیدا شود و تقصیر مریع و با اضطراب شود و هوا بصورت از جوف بینی عبور کند و مرض
 از بینی نکل نماید و سرفه کوچکی خشک و طول حاصل شود و راههای مبدیلاف و سوز
 بطبات احساس گردد و در این بین که غانغراپا زیاد میشود لکهای قوی من حادث میشوند
 در بعضی از مواضع بدن که اغنایی منتهی شوند بغانغراپا و از بینی يك مخاطی چرکین
 و رقیق نر در بارهای لویج و خونین زیاد متعفن جاری شود و هرگاه در این بین
 جوف بینی راه را خط کنند دبله شود که مخاط او قوی و با جرح است و باشد که
 میان دو بینی مشقوب گردد در جلده صورت و اطراف حبابهای عجمی و دانههای غانغرا
 از نو نمودار گردد و قنار غانغراپا در صورت اسرع از سایر مواضع و در هر دو غشاء
 لحاف تحت جلد بجهر رسد که اغلب محدوده بود و هم چنین ویم موجود شود در میان
 غشای

عضلات و از حصول این بیم تغیری در اوان جلد بهم نمیرسد و ضعف مرضی در این هنگام
 زیاد میگردد و خیال مرض کنند بطور یقین و خواجهای هولناک و هذیان عارض شود
 و تقصیر مریع و سرفه زیاد و نفث غلیظ از دهان خارج و نبض سریع و صغیر گشتن
 خشک و مپیاه گردد و حلق مویج و نقاط غانغراپائی در کام بهم رسد و اسهال شد
 نموده و عفونتش زیاد شود بول و براز بی اختیار جاری شود و هذیان و اغما با متصل
 با متوالی گردند و مرض بوی نماید و هلاک شود
 و تا در تمام و انتهای پس از آنکه مرض عارض شد و قنارش بسیار سریع است
 و با شدت که مقدمه مرض طولانی گردد چنانچه بعضی از مرضی دبله شده اند که هلاک
 یکماه یا شش هفته مبتلای و کسالت و بعضی اجاع بوده اند بعد از آن مرض دفعه
 بشدت تمام بروز نموده است و تاکنون انتهای مرض هلاکت و عرک بوده است و
 دوامش از باز نوزدهالی پیست روزی است و چون سببش از ستر لجه بود رفقا شش
 خواهد بود که از پنج الی ده روز از انتهای هلاکت رسد
 تشخیص در صورتیکه سرایتش با واسطه باشد در ابتدا مشکل است تمیز داد
 که غلبه و شدت بعضی از علامات او را با اراض چند مشتبه نمایند چنانکه شدت
 او اجاع عضلاتی و مفصلی او را مشتبه نمایند با او را م مفصلی حاد و گاه بواسطه
 تشعیر و حتی و سرفه و وجع صدر طبیب بخيال اراض صدری اندازد و اینجا که از
 ابتداء موضع وجع کل باشد بخيال ورم حلق افتند و چون ابتداء بروز صدری
 دوار و ضعف و اسهال باشد چنان خیال کنند که مرض تبفویید خواهد بود و
 او اسط مرض بسیار سپید گردد به تعفن مری منتهی و تشعیر با ورم و سردی
 هیچیک از اراض مذکور بلکه هیچیک از اراض انسانی هم نمیکنند با ورم تشعیر
 در فخرین و جویان مرطوبات مذکور از بینی با ورم تشعیر و جلد و هم تشعیر

مرضی این بتورات وجوہات در پنی وخلق ودمامبل در عینله ان صفات مخصوصه هستند
و ط چون بتورات وجوہان از پنی در او باطل من وجود ندارد چاره دیگران برای تشخیص
باید بدست آورد از طریق برون مرض و حالت سابقه مرض

نقل المذموم باخطرتین مرضی است که انسان مبتلا میشود زیرا که تاکنون دیده نشد
که منقش بشکافود و ط چون در اسبها کاهی منقش بشکافود و باید خیال نمود که در انسان
هم ممکن است شفا حاصل شود

اسباب عارضه که در انسان بواسطه سرایت از حیوانات بکستی و لیکن موسسوسه
نقل میکند از شخصی که برون مرض کو با در او بدون سرایت بوده است و تاکنون این
مرض ملاحظه نشده مگر در مهران و کالسه چپان و طاران و نرا و عین و سواران
بعضی در اشتباهیکه با اسبهای شمشه بجا و ر بوده اند که سبب سرایتش دخول
بریم جاری از پنی حیوان در زخم دست آنها بوده یعنی آن سرایت بلا واسطه در او
بروز کرده ولی اغلب بمرایت با واسطه است و امر و نه معلوم شده که این مرض از انسان
هم با انسان سرایت دارد و هم از انسان بان حیوانات بکستی نیز سرایت کند

علاج معالجه که تا امر و نه اطباء کرده اند از این قرا و است فصد عام با موضعی
و مقوبات و کل و دها و منعشات و املاح زینتی و معوقات و مسهلات و غیره
و تاکنون از هیچیک از این معالجات بهره برده نشده است و طبیب معالج خود بخود
در انتخاب معالجه

در سراجیه حاد عبارت است از مرضی مخصوص با سبک رقار و ن با حاد است
با مرض و شفاخته میشود بواسطه برون زهاده های متعدده در معبر عروق و غل
لمفاطیک و این مواد بپیم نشینند و اگر این بیم را بکوبند یا مایه برون زمین مرض
خواهد شد و یا مایه برون شمشه و حاد گردد که شمشه و سراجیه در حقیقت

اختلاف

اختلافی با هم ندارند زیرا که برون و سراجیه شان بیک نوع است و فقط فرقی که هست در محل
مرض است که در شمشه اغلب جو ف منف است و حال آنکه در سراجیه اختلافی در جو ف منف
ملاحظه نکرد

علامات در ابتدا برون کنند بعضی علامات موضعی شبیه بان علاماتی که دیده شود پس
از خیر است تشنجی مانند ورم عروق جذابه با ورم بد و تبخیر و وجع در غده جذابه و اسهال
موضعی همراهی کند باحی و باشد که منقش بشکافود و در این صورت چندان فرقی با سراجیه
نخواهد داشت و ط چون جمیع بدن متعفن گردد و بتورات نریادی در بدن نمودار گردد
که اغلب منقش بجا نغز با شود و شبیه بانکه در شمشه حاد مذکور گردید و این علامات تا
که برون زمین پیدا از هفته دوم تا هفته چهارم فرق میدهد و برون سراجیه را از سراجیه عرض
تعبیه در این صورت منقش کرد و عرن

تشخیص جوین پنی و برون بتورات در جو ف منف غیر فیه اند شمشه حاد را از سراجیه
نقل المذموم اگر چه مرضی است برون خط و چندان مهلك نیست مانند شمشه
علاج علاج موضعی مانند آن است که در جرج تشنجی مذکور شد و علاج عمومی
مانند شمشه است

در شمشه و سراجیه من من که در حیوانات ذوالخافه عارض میگردد
در انسان کمتر مشاهده شده بود در سراجیه عیسوی موسسوسه بود در ساله و جوین
مرض را در انسان واضح بیان نمود و آنچه در این دو مرض متشابهیم اغلب نقصان الحکم
فقره اول در سراجیه من در انسان متصف میشود برون و مامبل
و ورم عروق و اوجاع مفاصلی و عضلاتی و سوء القیه و اغلب منقش میگردد در شمشه حاد
و این مرض متواتر نماید و نه نماید با هر که کند با شمشه من من رقار و این مرض همیشه با سراجیه
نیست بعضی اوقات بعد از سرایت بلا واسطه در ابتدا علامات موضعی از قبیل علا

و در عروق با فلغی و یا بر نر کند و گاه علامات موضع هیچ نمودار نشوند و دفعه علا
عومح ظهور کنند مانند تب شدید بطور اتصال یا کفایت و یا در متصل صداع شد
وقی و هذیان و بعد از سه الی چهار روز از این علامات فانی با خفت بایند ولی در بعض
از نقاط بدن دما میل چندی برور کنند و اغلب ابتدای بروز مرض واضح و آشکار نیست
چنانچه بعد از آنکه شخص با حیوانات مبتلا باین مرض مجاور شد کاهکاهی احساس مینماید
اوجاعی در مفاصل یا در عضلات اطراف ششیه با جاعی که در ورم مفاصل مزمن عا
میکرد در این هنگام قوت مرض کم گردد و از فرجهی او بکاهد و بعد از یکماه یا شش
هفته مروع کند و بروز دما میل و بروز دما میل اغلب در موضع است که در ضربه
با و مرید است و اغلب بر خوشان در اطراف خاصه در اطراف فاصله مخصوص در جهت
انقباض و این دما میل بدون وجع و از ابتدای بروز متواجند که اغلب چون شخص صبح
بیدار گردد بدون آنکه در شب هیچ احساس وجع کرده باشد در یکموضع از بدن مشاهده
مینماید و قلی مواج و اغلب این دما میل همچنان سرعتی که حاصل شده اند مجدداً
گردند و بندرت این دما میل در تمام بدن متواجند و مایل فلغی و یا بر نر است
چون این دما میل را بکشتاید رطوبتی که از او خارج شود فساد است که در دم سالم
باشد و اغلب ریحی است رقیق و سردی و خون الود و کام خون خالص و چون این دم
و یا بسبب خون بکوبند در آنها شمشه یا سراجیه بروز خواهد کرد و عده و حجم این دما میل
مختلف است و نیز کمتر این دما میل که تا بحال دیده شده است صد مثقال در یک
و یا این حجم خیلی در است و قاعه این دما میل خوب محله و نیست و غده لفا
در سراجیه مزمن انسان برخلاف آنکه در اسب و خومبتلا نمیشود مگر در او
مرض و در طبعی از مرضی که اغلب بروز مرض در غده زنجیر و کشاله دان است
و همیشه منتج میگردند از ورم عروق موضع یا از دملی مجاور و تجمیع این غده زنجیر



نمیشود

نمیشود و چندان وجع ندارند و نیز و جذب میگردند و اگر هم جذب نشوند بندرت متحرک
گردند پس ورم غده لفا بیک از علامات مجزیه در انسان نیست و این دما میل هر گاه
ضعف عدم اشتیاق و چون دما میل متعدد بروز کنند بدرج قوت مرض هم نقصان یابد
بواسطه نقصان قوت و وجود اوجاع عضلاتی و مفاصلی مرض مزمن را بماند و اغلب در
محل ماندگی و اسهال روی دهد و این دما میل بعضی جذب گردند و بعضی کشته شده بماند
مریم از آنها خارج گردد و در بعضی مواضع هر گاه بکشد بکشد جلد و در بعضی مواضع
بدل شقی بقدر در اینجا لثه زنجیر یا در جلد خشک شود و قشر بر مکرر روی دهد و
حمی و بروز کند و در بعضی سرفه خشکی عارض گردد و در بعضی از مواضع صدر و جع پیدا
گردد و شبها عرق کند بدون آنکه هیچ اختلالی در در بدن پیدا شده باشد و بعد از چند ماه یا
چند سال در تحول میبرد ولی اغلب اوقات در بین این مرض مرض هلال شود بواسطه بروز
حاد و گاه سبب مرگ ترکیب این مرض خواهد بود یا شمشه مزمن و یا مرگ انتهای ملامی این مرض
نیست و با اعتقاد موسسوتربوی در روزنامه علمی شش نفر نوشته شده است که شفا یافته اند
دوام دوام این مرض بسیار است که از چهار ماه کمتر و از سه سال بیشتر نیست
فقره دوم شمشه مزمن شش مزمنی تغییر میکند در جوف انف در شمشه حاد که در نمودیم در
مرض مزمن بدیه میشود و با اعتقاد حکیم مذکور مشقوب شدن قصبه الانف مخصوص به مزمن است
هرگاه در شمشه حاد قصبه الانف را مشقوب بیند بواسطه این است که شمشه حاد بود
در میان شمشه مزمن بوده است یعنی اینکه شخص را مبتلا بشمشه مزمن بود و قصبه
او مشقوب شده بود و در این بین شمشه حاد و مزمن و کام و قاعه زبان و لوز زنجیر و کام
رخی مبتلا شوند بجر احمی و مادی باشد که کام مشقوب کشته جوف دهان و انف بهم دراید
کنند و همین جوارحات شود که در جلقوم و قصبه او بروز کنند و باشد که این جوارحات
جمع جوف قصبه را گرفته و شایسته بر شعب او نماید ولی این جوارحات بخودی خود التیام

mandanlibrihema.org

tarikhema.org

پایند و خطا تا آنکه پس از التیام پیدا شود غصون زیاد حاصل نماید و با بواسطه قصبة الریه
کوتاه کرده و بعضی از حلقهای او از حالت مدوری بقتند لهذا مجرای هوا در يك یا چندین نقطه
تنگ گردد و در خود ریه نیز بعضی لکهای سیاه ما و ائهای خون مشاهده کردند و هم در تحت
جلد و در میان عضلات مواد ری می رسد که هر اچو کند با سر می غطام و تجمیع غده لمفاویک
علامات و رزقات غالباً بر روز ششمه مومن ابتداء نیست بلکه در میان سر اجیه مومن
کند و اینجا که بالیده باشد سر اجیه همیشه با واسطه خواهد بود که چون شخص چیزی عجاویر با
با سر اجیه کرده احساس کسالت و خستگی و ضعف و اوجاع شد بد در اطراف و مفاصل و
نماید ولی این علامات دوا می خواهند داشت که بروی بر طرف شوند و بعد مر فخر شک
عارض کشته کلو مویج شود و صوت خستوی که در اینجا که بروی عرض در میان سر اجیه باشد
او هشت الی شانزده ماه بعد از بروز سر اجیه و جوی در قصبة الریه بروز نماید صوت تغییر
باقیه بعد فانی شود پس از آن صد خستوی کشته بینی گرفته شود چون در یکام و در بعضی
مرضی و جوی در پنج بینی پیدا شود و چون بینی را تخلیه کند با خون بیرون آید باغیاط مرادی
و ری و گاه با رهای خشک و گاهی از اوقات چون جوف انف را ملاحظه نمایند بعضی حلقها
پسند و گاهی مشهور شود که قصبة الانف منقبض است و همچنین چون دهان و حلق و حلقوم
ملاحظه کنند جراحات مذکور سابق را ببینند و باین علامات افزوده کردند اغلب علامات
که در سر اجیه مومن مذکور نمودیم مانند وجع مفاصل و عضلات و اسهال و هزال و غیره
جميع علامات سوء القیبه و گاهی از اوقات ششمه مومن پنهان ماند و مشاهده نکرد و مگر
علامات سر اجیه مومن و ششمه شناخته نشود مگر با تشریح
دوام و انتهای مرض دوام ششمه مومن و طول از سر اجیه مومن است که
دیدن شک آمدت شش سال دوام کرده و در این بین حالات مرضی گاه شدت و گاه ضعف
نماید و انتهای این مرض همیشه بمرک است

تشخیص

تشخیص سبفلس فری فقط مرضی است که میتواند با ششمه مومن مشتبه گردد که
جراحات بینی و کام و حلق و اوجاع اطراف و دما میل و سوء القیبه در هر دو مرض بالسا
دیده شوند و جراحات بینی چون از سبفلس باشد جراحات او فرق از جراحات ششمه
دارد و جراحات سبفلس عجمی و عظام بینی را و می ساخته فانی بسیار و جویان بینی در
سبفلس کم و بسیار متعفن است و جراحات سبفلس حلق از آنکه عقیقان و مادی اطراف
شان برآمد و سخت و راست بود که اندک با سانی نیز داده میشود از سایر جراحات و
عظام سبفلس که همیشه هر اچو کند با بروی از گوش تو زوی او ستون و شدت نماید
در هنگام شام و هیچ شباهتی با وجاع ششمه و سر اجیه ندارد و همچنین مواد صمغی
مشابهتی با دما میل سر اجیه ندارد

تقدمه العرفه این مرض بسیار بخطر است و خطری خلی بیشتر از سر اجیه مومن است
که سر اجیه مومن اگر گاهی منقبض نشود و ششمه همیشه منقبض میگردد خواهد شد
اسباب سر اجیه و ششمه مومن عارض گردد بواسطه سرایت چه از اسب چه از
انسان و از سرایت سر اجیه مومن و ششمه
و بالعکس و ام حالت کون عرض از سرایت بلا واسطه و با واسطه مختلف میشود که
صورت اول هر یک از چهار روز بیشتر سرایت نمیکند و حال آنکه در صورت اخیر از
برای سر اجیه مومن از پانزده روز الی سه ماه است و از برای ششمه مومن باشد که چند
سال طول کشد

علاج از معالجات موضعی در سر اجیه مومن مستعمل است آهن داغ و زرق با
کارد و دود و شراب و جوف دما میل و همچنین مستعمل است زرق در جوف انف
از این نسخ که آفت دو قصه اب نیم مثقال و ازاد و پرموئی مستعمل است دید و زرق
سیم و اینهای کوکری از برای شرب و استحمام و مقویات مانند کنه کنه و آهن و از

سینهها چته خوردن نوع تترك وغيره و غذاهاى مقوى

حفظ محل لازم است اطلاع دهند اشخاصى كه خدمت اسبان مىكنند
از خطر سرلجه و شمشه و اسبان سرلجه و شمشه و تيمان كنند ملكى نكند بدانند كه همچو
در دست و پا شان نبست و اكوابا التى كه الوده بيم شمشه و سرلجه باشد خود را همچو
سازند بكنارند از زخم شان خون نريزد ايد انگاه باهن يا با دين موضع را بنجيد و
نمايند كه كه ديك شده است كه كتر از يك ساعت كفى بوده است از بوى سرلجه و
دست با صور نشان الوده كه در زخم بوفدى خوب بشوئيد و در طول بخوابند و هم نما
ملك هلكم غذا دادن و متوجه شدن اسب و نيز در طول همچو وقت غذا بخورند و اسب
اين كونه حيوانات هر بصر استعمال كنند

در سبب بعضى امراض حياى سببها عبارت از امراضى هستند مخصوص
عارضى بكوند از بيم مخصوص بكوند چون بموضع مخصوص از بدن و صند موثر بكوند
بعضى از اختلالات مخصوص در موضع كشته و بواسطه جذب در جميع بدن اثر كنند
و بواسطه اين دوا كه يكى موضعى و ديگرى عمومى است دو قسم عده در اين مرض قابل
شدند اول سببى بدوى و ان عبارت است از جميع اختلالات بلكه عارض ميشود در
جواهر با بيم و قسمت دوم و ثانوى با موانعى نامند و انما اختلالاتى هستند كه

بروز نميآيد چنانچه بعد از اختلالات بدوى در نقاط و مواضع مختلفه بدن
نا رنج مرض در اول بروز ان مرض اختلالات بسيار است بعضى بپايد كه ان مرض
از بيم بوده است و انرا ان اشخاص هستند كه ميكوبند مرض جذام كه در قديم
داشت تغير يافته انقبض و اكوفه است ولى اغلب از اطبا اين امراض سببى را از امراض
جديد ميدانند و اول بروز او را در ۱۴۹۶ مسيح ميدانند و ان حكما
اخر هم بعضى پايانده اند و برون را در هنگام عاصره و با قشون فرانسه است

برنج

و برخى پايانده اند كه هر اهان كرسنوف كلب كه بكنى بنا را پيدا كود از بكنى بنا او رند بصرى
اگر ان مرض در قديم هم بود شوعش در همان پانزدهم عيسوى شده است كه در ۹۱۴ م بطول
پيلهيك بروز كود بطور بسيار خطر و مهلك كه علامات عمومى و خارجى شديد تر از علامت
موضعى بودند و اين خطر مرض را ابتدا برونش با اعتقاد اغلب از طريقه معالجه بوده است
در بيم سببى اكر چه سرلجه بيم سببى در هر كس واضح و اسكا است ولى
ابتداى مانده برون هم بعضى از اطبا وجود سرلجه او را نكار كودند اما احرى تر كسى بكوند
اين اعتقاد را نيز با اعتقاد عامه سرلجه بيم سببى مخصوص انسان است ولى
و نر با سطون ميكوبند كه بيم كوفى را بيمون كوپيك جوان بچا مبتلا شدند و بعد از ان
ميمون با انسان ديگر نر كوپيك انهم مبتلا كوديد و در اين او خور موسو بكوند و بيم كوفى
بكوند و خور كوش كوپيك انجوانا مبتلا شدند و بعد از بيم انما بخود كوپيك خور كوش
مبتلا كوديد و موسو كوپيك برون و ميكوبند اين دو معلم را از اينكه احتمال كلى ميرد كه بيم
كوفى را كه زخم اين حيوانات گذارده اند بجهان حالت در زخم بلق مانده بوده كه بعد
جواحان ملكوره بعينه همان بيم را پيدا شده با انسان دوباره كوپيدند و مبتلا كوديد
و با حال ديك نشده است كه در اول بروز ان مرض بچه خور بچه شرط بود ولى ان مرض
بران است كه ابتداى بروز نشود و آلات تناسل بوده است و هم با بواسطه است
سرلجه و برون سببى را همانند سا برونشها با و بيمى كه ان موضع ترشح ميكند
توان جدا نمود و چون برونش بكوند و بعد از چندين روز كيون ان موضع را همچو
ميكند و در مدت كوتاهى شخص نمي تواند او را بد بكونى بدهد ملك بطور ارش بطولى
كه در اين بين او را متولد ميشود ولى چون جواحت عارض شد ان جواوت سرلجه
بديكوان مينمايد

دوم كوفى هميشه بيم نفع است و اينكه گاهى شديد و گاه ضعيف است نه از بابت حقيقت

در دانت دیم است با جودت در دانت دیم بسته بزیاده و کمی او است بلکه بسته با
 استعداد در اجزای شش چنانچه بعضی اشخاص دیکه شود که هیچ استعداد با ابتلای
 این مرض ندارند چنانچه اغلب اشخاص کوفتی جماع کرده و مبتلا شوند و در بعضی
 هم این عدم استعداد موقتی است و اغلب هم علم بوزن در کسانی که با مبتلا
 با این مرض جماع میکنند بواسطه اتفاقات خارجی است که مانع میشود مجاورت بریم
 و جذب او را بعضی از حکماء باینکه با وجود اختلاف زیادی که در اجزای جماعی
 هست طبیعت آنها یکی است مثلاً در آلات تناسل اگر ماده بر مخاط سرایت کند موثر
 قوی و آتش و یک طرفی بر می سپارند بجهت رساندن سوزنک نامند و در اینجا که
 موثر چند جرح است که در کوفت خوانند اگر چه آن دو مرض بواسطه صورت ظاهر
 و بواسطه علامات تشنجی فرق زیادی از هم دارند ولی اغلب هر دو را یک مرض میدانند و
 هرگاه این دو مرض را حالت خود گذارند بعد از چندی ملحوظ میکرد که علامات تشنجی
 در مواضع دیگر بدن بهم میرسد که سببی چون یکی از این اجزای آنها نیست و یکی
 دیگر از اطباء بخلاف معتقدند بود و در بعضی که یکی سوزنکی دیگر کوفتی گویند و
 محال است که این سرایت سوزنک کوفت عارض گردد و از سرایت کوفت سوزنک و
 منظور در اینجا سوزنک ساده است یعنی سوزنکی که با جرح کوفتی مرکب نباشد و
 بر یکو بریزد که این حالت اعتقاد اخیر است چون و بدو در اجزای جماعی غالباً از آلات
 تناسل میسران میباید لهذا اغلب اوقات سرایتش بشخص مساوی از جماع و در آلات
 تناسل است ولی میشود که در مواضع دیگر هم بروز کند از این خود در مواضع بریم
 سیفیلیسی مانند مقعد و مستقیم در ملوچین و دهان و گوش و حلق در اشخاصی که
 بوسه و کنار بجا نمانند و در رستیان و پها در صورتیکه طفل شیرخوار مبتلا شده باشد
 در سیفیلیس بدوی این مرض بر سه نوع است اول مثلاً در دیم بلان

یعنی

یعنی سوزنک سیم بوزن یعنی خیارک
 شانکار پی سیفیلیس یعنی کوفت بدوی یعنی عبارت است از تفرق اتصال در یک موضع
 از بدن که حاصل شده باشد از بخور و یا از کوبیدن دیم سیفیلیسی و این تفرق اتصال
 چون اغلب بواسطه جماع سرایت کند لهذا در مجرای اغلب عارض گردد و در سر حشفه
 در روی پوست ختنه و خندق و در حشفه و پوست دکر و بیضه و در زنان
 مخاط ابتدای فرج یعنی لب بزرگ و لب کوچک و در داخل مجرای و گاه در غشوی
 و در سایر بدن چه در زنان و چه در مردان در هر محلی که مجاور شود با بریم کوفتی
 ابتداء مرض عموماً از سه الی هشت روز بعد از جماع ناپاک کوفت بنای بود
 و امیکند آمد و باشد که هفت هفته طول کشد و گاه در عا ساعت و این مدت را هنگام
 کون مرض نامند و بعضی از اطباء نیز معتقدند که چون دیم کوفتی بدن در سید الفون
 جذب شده و فرج را فاسد سازد و بعد علامات موضعی کوفت بروز کنند یعنی
 آنکه این علامات موضعی نتیجه اثر بریم کوفتی در بدن است و مرضی است ثانوی
 و یک موسیور بگویند این اعتقاد را رد مینماید و هم زمان کون را هم قابل نیست و
 میگوید اثر بریم کوفتی در موضع مثل عرق است و تجربه نموده است که اگر با بیشتر
 در موضعی از بدن بگویم همان آن موضع سرخ گشته و طوبی در او بجهت و بر می
 گردد بدو و آنرا که هیچ فاصله در قوای بروز علامت بهم رسد و لهذا میگویند آن
 زمانیکه از هنگام جماع تا بروز علامت موضعی بهم میرسد از اینجهت است
 که بریم کوفتی در وقت بیشتر رنجته میشود و بواسطه خراب کردن و تا رسیدن بجلد
 زمانی لازم است پس از بریم کوفتی با اعتقاد موسیور بگویند اول بطور محلی در موضع
 او میگذرد تا اینکه آثار مخصوص خود را بر او ظاهر نماید و موسیور بگویند بر سه
 و بگویند این را میگویند که اولاً فرق است مابین کوبیدن دیم با بیشتر و سرایت او

باجا و درت و ثانیاً چون هنگام کم کردن در جمیع امراض بر وی میباشند باید در این فرض هم قائل
شویم و نیز بعضی اطباء بر آنند که زخم کوفتی در ابتدا نیست مگر مرضی موضعی و برخی دیگر آنرا
از ابتدا عوارضی دانند

در بقعه در بر زخم کوفتی همیشه بیک نخ نیست و اغلب از ابتدا بیک نقطه قوی می
رسد قدری متعجب بودیم که در جمیع سوزان با حکم همسانه بشیر بلند شده و طبیعتی در
او نشکند که بوقدی که روی کرده و بستول شود سپید به بستول آید و در این
بیکان و مادی بهم رسد که هرگاه این باره را بداند بپیش از حصول باره طاول
پاره کند مشاهده کردیم که جراحی که بر روی این سطح و عمق منبسط گردد و گاه
جمیع حشفه رفته گاه داخل گردد و آنجا که بخوردیم عموماً منعی باشد شقاق دارد و اگر
این هنگام اول یعنی هنگام حصول بستول دیده نشود با عارض نشود که در این هنگام
ان تفرق اتصال تغییر صورت داده جمیع علامات زخم کوفتی بهم رسد و اعتقاد
و بگویند این است که اغلب زخم کوفتی از ابتدا بطور جرح است و بر میزند و هم معتقد
که گاهی ابتدای بروز زخم بطور مل که مثلاً اگر بر یک کوفتی بعد زخم زلوف برسد
اینکه با اطراف و لب زخم بخورد کند لب زخم هم امه ملتحم گردد و در عمق ملکی
کند که چون ان وصل را بکشایند جمیع علامات زخم کوفتی در او دیده شود

این جراحات اغلب بیک یا متعدده اند و حجم آنها نسبت معکوس دارد و باید آنها
و گاه چند جرح با هم جمع شده بکی شوند

علامات و رفتارشان در
بدن که بر زخم نماید علامات مخصوصه او عموماً از این قرار است تقریباً در
عمق او که در روی غشاء الحافی است صلب و ناهوار و پوشیده شده است از
لب مابین شپیه بپای زخمهای و بفتراکی و مادی رنگ است غشاء کاف
ان که

ان که جلا کرد نش ممکن نیست و اطراف زخم صلب بود شده است بطور عمودی یا قدیمی
و نیز این اطراف زخم دانند و در است و مخاط است از لب هاله قرمز شپیه به منبر می
از این زخم توضیح مینماید که قوام و خون الود است و چون بر موضع مجاور بر خوردن موثر
بر و زخم دیگر گردد چون ۱۴۹ دفعه در ۵ دفعه زخم کوفتی با صفات مذکور ملحوظ
هو ذیل نام صفات او را بخوبی نوشته است لهذا موسوم گردید است بکوفت هونطری که
بغیر از شانکر هونطری که بپند و زخمهای کوفتی مخصوص منصف بشو با لب صلابت و عرق
شیخ که بعد از اطراف و جمیع زخم پیدا شود و بلان صلابت زخم داشته باشد که است باینکه
بک نصف نخودی در زخم زخم گذاشته باشند و گاهی از اوقات این صلابت بسیار کم و
در سطح ظاهر زخم میباشد و در سطح شپیه است به حسب که از لب پوست اهو محسوس
که دیگر این قسم صلابت و صلابت پوست اهو نامیده است و در این صورت هرگاه
طبیعی درست ملاحظه نکند زخم کوفتی با سانی مستند گردد و بیک خواش ساده و اینضلا
زخم کوفتی که عموماً هم در اطراف و هم در عمق میباشد باشد که محدثی گردد در همان
اطراف و شپیه گردد و جلقه و چون زخم کوفتی بصورت دیگر بر و زخم نماید لهذا
دو نوع دیگر فاکند که یکی را ساده و دیگری را پیچیده نامند و کوفت ساده ظاهر نمیشد
مگر بیک جرح سطحی بدون صلابت که او را از زخم ساده نمیتوان تمیز داد مگر بواسطه
وجود تجمع غده جذبه مجاور و رفتار این نوع جراحات بطوری است و منتهی گردند خواه
غیر از خود و خواه از استعمال ادویه که به حاصل کردن لون مادی و صلابت عمق و
اطراف و از این نوع است شانکر الوه یعنی زخم کوفتی بلند شده که در میان زخم بکنج
دخوی نمیشد و بالایی باید بدون صلابت در اطراف و بدون تجمع اما شانکر پیچیده
ان نوع زخمی است که صلابت نداشته باشد و در عمق و بعضی احوالی که در مادی
شود شپیه بر زخم تعفن مریض خانه و با آنکه بعضی کوشتهای و خود داشته باشد که زود

الود کرده و در این نوع زخم کوفتی اطراف جراحت متنفخ است نه صلب گاه مویج و گاه بدو
 وجع است و این زخم را کال نیز نامند اند و بر آنکه در هر موضعی که بر او زکندان نیج و از ابل ساق
 و گاه این زخم از یک طرف بخورد و از طرف دیگر التیام یابد در این صورت او را سرب و بنوا
 و گاه باشد که این نوع زخمهای کوفتی در یک موضع و یا در جمیع سطح او مبدل بغائر یا شود
 و عرض این غائر یا نه بواسطه شدت و نرم است بلکه بواسطه فراخ مرض یا حالت موضع است
 و در عیال است که از این نوع زخم خارج میگردد و دقیق و خون الود و بسبب جراحت و مسرت
 مانند سایر دیم کوفتی است و این جراحت با از اول بهین صورت بروز کند و با شنج کردن
 از شاکل صلب و این اقسام زخم کوفتی نه بواسطه کفایت دیم است بلکه از استعداد مخصوص
 شخصی است چنانچه بعضی از اوقات دیده میشود که زخمهای کوفتی ساده منتهی گردد و بر
 شد بد با غائر یا نه که در بعضی مرکب اعمال عجز افراط مخصوص افراط در اثر به الکلی شود
 و هم چنین زخم کوفتی باز دیده میشود بواسطه سوء حفظ صحیح و صلابت زخم کوفتی یکی از
 علامات است که جمیع اطباء مذکور داشته اند و با اعتقاد موسیو و بدال بر وزن صلابت با بر وزن
 جراحت با هم است یعنی فاصله مابین شان نیست ولی موسیو دیگر بر آن است که بر وزن خلا
 در میان هفته اول تا هفته دوم است و هرگز پیش از دو روز دیم احساس نمیکرد و هر
 زخم کوفتی که تا انتهای هفته سیم صلابت بهم نرسد و بگو صلب نمیشود و هم چنین موسیو
 دیگر میگوید که چون صلابت در زخم بهم رسد دلیل بر آن است که مرض خارجی شده است
 جراحت عارض میگردد و در جراحت و در غشای لحمانی و با اعتقاد موسیو دیگر محل مخصوص از
 شعریه های جلایه است و زخم کوفتی ۴۴ دفعه در صد دفعه هر چه خواهد نمود باخبار آنجا
 که مرض خسته نشده باشد و زخم کوفتی در روی پوست خسته بمرسد یک تعجب و ورمی
 پوست خسته بهم رسد که مورث فیمون زپ یا با و فیمون زپس گردد
 اینجا که جراحت واقع شده باشد در نزد یک مجرای بول بواسطه ورم ورم و تنگی مجرای
 انسداد

و انداد بکلی عسر البول عارض گردد و باشد که مورث ورم مجرای بول و با ورم شیت
 ذکر و بانغوظهای مویج گردد در زنان جمیع علامات مذکور با اختلافا تیکه بدیم دیم
 در مردان ملخو طبعی گردد و اغلب هر چه کند با تعجب و ورم فرج با جریان رطوبت و زخمها
 فادیه و نیک باشد که لب بزرگ و کوچک و مشقوب با بکلی معدوم سازند و اینجا که محل
 عنق زخم باشد مویج نخواهد بود و با اعتقاد موسیو دیگر بر آن است که زخمهای کوفتی و
 هنگام است هنگام اول که هنگام نماید و هنگام ثانی هنگام حرمت هنگام اول شروع
 انوفی است که سبب آن گردد مانند دیمی باید تا انوفی تیکه دیم قابل گویند است و ورم این
 هنگام از یک الی چهار هفته است و هنگام ثانی شناخته میشود با نکه هاله و در جراحت
 ابتدا بر طرف میگرد و اطراف زخم میخوابد و بر وی زخم میسپند و عمو جراحت پاک
 میگردد و پوششید میشود از آنهای لحمی و انوفی شبیه میگردد این زخم کوفتی یک
 زخم ساده و نرمی که از او حاصل میشود ساله و غیر مرست و انوفی جراحت با برامک با صلا
 با فریفته و باشد که بتدریج بکلی بر طرف گردد با ما دام العمر باقی ماند و اینجا که زخم فادیه
 با غائر یا نه بود محل جراحت همیشه سفید و ناهوار با فریفته ماند در زنان مرض باشد
 که قنبر ات زیاد بمرسد و لیکن چون سبک تر پس حاصل شد یعنی جراحت التیام یافت دیگر
 عود نمیکند مگر آنکه سرایت تازه بمرسد و باشد که منتهی گردد به ناصور ادراری و نیک
 شدن مجرای بول و التیاق خسته و غیره
 تشخص سطحی مرهای و ناهوار صلب یا اطراف صلب و مد ورم و راست
 با اطلاع از حالات سابقه مرض و بعضی اختلا لیکه هر چه کند با جراحت بخوبی تمیز
 کوفتی نامید همد و بعضی جراحت کوفتی هست که بواسطه نداشتن علامات مذکور
 بخصوص صلابت مشتبه گردد با جراحت ساده و هم چنین در وزن دادن مرض اصل
 مرض را مایه اشتباه طبیب میکند و زنی که بهترین هم جراحت کوفتی است باشد

mandanlibri.com

اثر نکرده بلکه جراحات را برتر کند در این صورت چاره نیست مگر آنکه از برهم جرح
در خود مرخص بگویند تا تیز مرض اده شود اگر چه بعضی از زخمهای کوفتی است که قابل
ببستند یعنی اثر نکرده اند با اعتبار موضع جراحات کوفتی یا بعضی از امراض مشتبه کرد
چنانچه تحت اختیار و فرج باشد که مشتبه شود با زخم موضع کوفتی اینجا که در رگ
پستان باشد مشتبه کرد و با شقاق ساده و مدوری و صلابت زخم که هر دو گونه
با بزرگ شدن غده و بزرگ شدن زخم مثابه بال طفل رضیع دفع اشتباه نمایند کوفت
مقعد بواسطه غصون طوایف جلد در این موضع که زخم اغلب لموبل میگردد مشتبه کرد
با شقاق ولی هر دوی بودن زخم و صلابت و عدم وجع بخصوص وقت دفع براثر تیز
مرض دهند و اینجا که محل زخم در مستقیم بود تمیز نتوان داد مگر با عانت ایندفعه
محل زخم در زبان و لبها باشد جمیع علامات مخصوصه این جراحات را دارند و هر
کسند با قیج غده تحت فك و یا هیچیک از امراض دهان مشتبه نگردد مگر با جراحات
و طبقه تمیزان در جلد اول بیان کردیم
تقدیر المعرفه کوفت یا شقاق و کال و سرفی و بنویسند اختلالی که وارد
می آید خطوشان بیشتر است و کوفت غایترا با خطوش کمتر خواهد بود و اغلب هم
حصول غایترا با دلیل است بر تمام ترقی مرض که چون آن قطعه مرده بپفند مشهور کرد
جراحی ساده که برودی التیام باید زخمهای ملط خطوشان بیشتر از غیر ملتب است
زیرا که هم در بر تو معالجه میشوند و هم صلابت و لیلی است و مزاجی شدن مرض
علاج ارمقیم معلوم شده است که میتوان کوفت را ساقط نمود هرگاه از ابتدا
موضع را بسوزانند یا بپزند و سوزاندن با سنک جهنم بر بپزدن و همان زیرا که
که از او حاصل میشود اغلب کوفتی میگردد
با اعتقاد موسسور بکوره که تا پنج روز بعد از جماع ناپاک من زخمیکه بر فکند
ابتدا

ابتدا با سنک جهنم خوب بسوزانند و بکورد مزاج خواهد ولی اغلب از اطباء و دین
قول را میکنند بجه صورت لازم است که با سوزاندن هم بعضی معالجات مخصوص
کرده شود
طریق معالجه چنانچه بعد از جماع ناپاک در موضعی از آلات تناسل جراحات
دیمی بهم رسد بدون اینکه صبر کنند تا ششوی مرض اده شود باید طاول و یا برغ
و غموا و را با سنک جهنم خوب بسوزانند و موسسور بکوره بگوید برای پنهان دافع
شود باید که سطح سوخته شده ضعف سطح مجروح باشد و اینجا که ممکن نشود یا این
بسوزانند سقط مرض خواهند کرد اگر چه اغلب اطباء سنک جهنم برای سوزاندن
میکند اما موسسور بکوره بگوید آنرا و سطحی است و غائر نیست و غیره و این را براد
توجیح میدهد بعلا سوزاندن با آب سرد یا آب خطمی که قدری سفید است را داخل کرده
باشند بشویند و قدری شرب خشک بر او کنند تا از دانه و از دانه الی ۴۸ ساعت بماند
و هرگاه جراحی حاصل گشته است با سوزاندن از برای سقوط مرض بلکه از
آنکه و امشکم شود و هرگاه دریم داخل غده دی شک باشد که مایه صلابت انموضع باد
کشته باشد که چون کشاده شود جراحتش کوفتی گردد باید شکافت و خوب سوزاند
و هرگاه از سوزاندن اول و دوم علامات زخم کوفتی دفع نشد باید مکرر نمود تا
جراحی ساده شود مگر در صورتیکه سوزاندن موثر و نرم شد بد کرد و اگر
سوزاندن چیزی حاصل نشود با آنکه نتوان سوزاندن اینجا که زخم چندان متورم نباشد
و در نری چند بار با شراب معطر بشویند یک شرب را در میان شراب بر کرده بود
به بندند و اگر از این مستشوریم کم نشود موسسور بکوره با سرکه دبی با محلول و
مثقال طوطوات و و فرطاسیک با ۵۰ مثقال آب بشویند و هم نافع است شستن
با محلول چهار مثقال نبات در سه مثقال آب و اینجا که زخم مویج باشد بجهین محلول

اخر قدری توباک اضافه کرده بشویند و وقتیکه جوارحت رو بالنبام می افشانند و جرات
 و انتظم میکنند از اینکه هر جا گوشت زیاد می خورد و بوی بد با سبک جهم در ش
 نماید انجا که ورم شده باشد ضماد و حمام و زلود و زردی یکی زخم بکار بندند و
 اگر فیض قوی بود فصد نمایند و جهد کنند در دفع ترکیبات مرض و بعضی
 کوفتی هستند بد و ن اینکه زیاد متورم باشند موم جمع میکنند و رفع آنرا
 می نمایند با سوزاندن زخم که اثرش از اخمد و خمد از بیشتر است و انجا که زخم کوفتی
 بمعالجات مذکور رفع نشود مشمع در آید و بوی او اندازند با فقط غبار در
 بروی زخم و بخت بعد از ۲۴ ساعت بطور سابق با شراب و غیره بشویند و اگر آن
 هم رفع نشود بخمر و بن استعمال کنند و در این زخمها بکه عسل العالج است قبل
 از آنکه این معالجات شده بکار بکنند بهتر است که بمعالجات مخصوصه رجوع
 نمایند که زخم و ابار و غن زبقی می بندند و سوسولیم بنوشانند اگر چه اغلب در زخمها
 کوفتی بواسطه معالجه موضعی علاج میشوند و بعضی از آنها هم خارج میشوند و
 همیشه باید ادویه زبقی استعمال نمود که هم جوارحت را زود چاق میکنند و هم مانع
 میگردند از بروز امراض ثانوی

دوام علاج زبقی معلوم خواهد شدند از نرود التیام بافتی جوارحت بلکه از رفع
 شدن صلابت و بعد از ادویه زبقی برای رفع صلابت نافع است ادویه بد واد
 شستی از محلول نوشادر و از برای دفع فیوزیس و پاراتی فیوزیس که کاه عارض
 میشوند اگر چه خوب رفع نتوان کرد باید شکافی در پوست ختنه نمود و کاه لازم
 شود نمودن ختنه و انجا که محل زخم در ثقیه مجرای بول باشد فتنه داخل مجرای کنند تا
 مانع گردد از تصاق مجرای با جهم و اگر زخم عنق رحم یا عنق مجرای باشد این مجرای
 بوند و بطورهای مذکور علاج کنند و انجا که در مقعد باشد باید دفع سبب

بلن

بلن نورانی یعنی سوزنک عبارت است از سبیلان رطوبتی ری از مجرای بول
 مردان و از مجرای زنان این سبیلان باشد که بر و زشتی را بجهت بود و طالع غلبه از کوفتی
 از سبب است و پودس سبیل پس با اثرش بعضی مواد محرکه سوزنک منقسم میشود
 سبی و غیر سبی واحد و صفت و سوزنک مردان و زنان
 نایع مرض بنا به اعتقاد کی که در بار سبیل پس داشته باشند هیچ شکی نیست که
 سوزنک هم از قدیم الام بوده است چنانچه از احکامات موسی در تورات
 معلوم میشود و هم در بار حفظ صحت حکم مینماید بر اینکه هر کسی که از مجرای بول
 جریان مینماید مسری است و باید از او احتراز نمود با وجود این بعضی از
 مصنفین مانند اوپید و اسپرک که سبیل پس بکی دنیای میداند این مرض
 مذکور از موسی را از امراض فزله میداند و میگویند اول بر و زشتی سوزنک
 در سبیل پس میوه است که تقریباً چهل سال بعد از بر و زشتی سبیل پس
 که در آن هنگام بعضی ورا یکی از علامات سبیل پس داشته اند و بعضی
 مرض سبی مخصوص قائل شدند و برخی ورم ساده مخاط نامیدند
 سوزنک حاد مردان علامات نشر مخاط مجری بول یکی یاد از کوفتی
 پر خون و قرمز با کبود رنگ گشته در بعضی مواضع ضخیم و قابل الاستیلا
 گردد و غده مخاط نیز چون گشته صلب گردد و سبیل پسهای مورکانی
 نیز قرمز گشته کاه بر کتی حالت طبیعی گردند و کاه کوفتی و باشد که مسک
 و مغفور گردند و کاه مرض مجدی سطحی است که پس از حرکت هیچ علامتی
 از او باقی نماند و بعضی اوقات ورم مجدی شدید شد که از مخاط تجاوز
 بغشاء تحت اذ کرده و در اینجا مورث بعضی انهای صلب گردد و این
 داغهای صلب شده کاه هیچ برآمدگی از جوف مجری بهم نرساند و

در جوفش جمع شد برای دفع او متشنج میگردد در ابتدای مرض افزوده شود هنگام شب
نعوظهای شدید و متصل و این ابتدا بیشتر شود قتی که مجری بول متنجج و صلب گشته
نمواند با شنج اسفنجی همراه نموده نمند دکر در در اینصورت مانند بندی شود و ذکر
بطرف اسفل خم کند در اینوقت سوزنك را سوزنك بندى كویند در سوزنك اعم
از آنكه شدید بود با خفیف همیشه يك رطوبتی خارج گردد كه كبت و كیفیت او مختلف است
و در ابتدا رقیق و سفید رنگ مانند رطوبت مخاطی با صفاق است و باشد كه خون
بود و باندازه كه ورم نمونماید آن رطوبت غلیظه و سفید رنگ با زرد با سبز رنگ
شود این رطوبت بی بو و گاه متعفن است و شباهتش بپیم بیشتر از رطوبت مخاطی
است و گاه مجدی محرك است كه بهر جا بوز خورد مورث ورم و جوارحت انقباض شود
مقدار او در ابتدای مرض بسیار كم است كه خارج نكرد و مگر از فترت و ذكر از عقب
دو بقدام و از رز نشن الی ده مقدار او زیاد گردد كه مرض لا بد گردد باینكه خود را
پیوشاند از آنكه شلو امراض نثود و در این هنگام است كه رطوبت سفید باز
باسبز گردد و لون زرد و سبزی رطوبت بواسطه این است كه ریم مخرجه غلظه گردد با
مقدار كمی از خون كه نشتر در مجری نماید و باشد كه خون خالص خارج شود و مقدار خون
عموما بسیار كم است لیكن در بعضی اوقات مخصوص در سوزنك های بندى مقدار
زیاد گردد و این جریان خون كه هر كوی خطری بواسطه شقاق باخوق مجری بول است و
مقدار رطوبت مخرجه عموما نسبت مستقیم دارد با شدت ورم و باشد كه ورم بسیار
شدید بود و رطوبت بسیار كم خارج گردد و این قسم از مرض را اطباء سوزنك خشك نامند
در این نوع از مرض عموما باندازه كه ورم كم میگردد بوقدر رطوبت مخرجه افزوده گردد
و انجا كه مرض ضعیف بود مریض سالم است و میتواند بكارهای خود بپردازد و انجا كه
شدید بود مریض عارض گشته اشتیاق خواب كم كرده و این مریض هیچوقت شدید نخواهد شد

دفع

دفع اول و دوم مرض حدت مرض از يك تا چهار هفته يك حالت میباشد و بعد از
باخطا گذارد كه نعوظ كود غیر عسر گردد و وجع در هنگام ادرار خفت باید و احسا
نشود مگر در اول و احوال ادرار و مقدار رطوبت مخرجه كم شده شپیه گردد بیک مخاطی لایح
كه لایحای مجری را بپیکد بكم ملصق نماید بالاخر در زمانى مختلف بكم خشك شود و طعنا
میتوان گفت كه زمان خشك شدن رطوبت مخرجه از سه تا شش هفته است و باشد كه
چند ماه یا چند سال طول كشد در اینوقت مرض بحالت ازمان رسیده است كه بعد گفتگو
خواهیم نمود رفقار مرض غیر منتظم است كه باندك چیزی شدت و ضعف حاصل كند گاه
بعوضی آنكه مدت درجا خفت پذیرد و دفعه ساقط گردد بواسطه بروز بكم ضعیف در جلد مانند
بروز حیات ثورى و جمای این بكم همراهی كند با عرق فراوان و این مرض باشد كه بدن
معالجه فقط بواسطه راحت دفع گردد

نكس و عود مرض بعد از معالجه شدن اغلب مرض نكس نماید و از افرط در غذا
و زود جماع كردن و هر چه شخص بیشتر سوزنك شده باشد بیشتر قابل كود و بر ابتلاى
این مرض و این اشخاص يك حماقتی بهم رسانند كه سبب سوزنك های بعد از همان
اول دانند اگر چه فاصله مابین دو سوزنك چندین سال بوده باشد اگر چه این اعتقاد
ان نیست كه در مدت كفتگو نمائیم ولى در حضور مریض بقدر امکان نباید و قول او نمائیم
تا آنكه بولك دامنی از زن بكه در اخواب او مشاهده كرده بود بحال خود باقی بماند و بپایند
ناچین این مرض كه بزودی میتواند دوباره مبتلا گردد بد اگر با دلف مرضه بخوابد و هر گاه با
همان مرتبه از او مبتلا شده بودند بخوابد مبتلا نخواهند كود بد و حال آنكه اگر يك دو ماه
جماع نكند انوقت پیشتر از آن بخوابد باز مبتلا گردد

توليدات مرض دفع سوزنك میتواند موانع حاصل كند از تركیبات زیاد و
مادر اینچا دكى میکنیم اعطای را كه سبب شان خود مرض است اول نرف الدم مجرى و نیم

و سرم غدد و ذی و مثانه و کلیه سیم غد کوی چهارم و سرم بیض پنجم و سرم عروق آلات
 تناسل ششم و سرم بعضی از اغشیه مخاطی هفتم و سرم مفاصل
 نوزدهم مجری اینمض یکی از اتفاقات نادر سوزنک است و عارض میگرد و عرق
 خود با از جماع و در اشتها صبه که مبتلا باشند بسوزنک بنده و قصبه را خواهند بپخت
 و است نکاه دارند بهر صورت این نوزدهم همیشه خفیف و خود بخود مسدود گردد
 و سرم غدد و ذی و مثانه و کلیه اینجا که و سرم سرایت کند بغذا و ذی احساس شود
 نقلی در شریح و مقعد و زیاد محتاج شود به تخلیه و عمل خروج بول عسرت بهم رساند که اغلب
 بول نتواند دفع گردد و چون مبل اندازند از غده و ذی نتواند کرد و چون با انگشت در
 لمس کنند بزرگی غده محسوس گردد و اینو سرم باشد که منتهی شود بپیم و حصول و ملل اینجا
 که و سرم سرایت کند بمثانه و جمع و ریز بوشکم پیدا شد که بیچ و عسر البول عارض شد و ذی
 و دو مبل باد را و بهم رسد و بندد و سرم سرایت کند به کلیتین و در انقباض و جمعی
 در محل کلیه بهم رسد که از فشار زیاد گردد و بعضی تغیرات در کلیت و کیفیت او را
 بهم رساند که در و سرم کلیتین ملن کور گردد بداند
 و سرم غدد کوی در سوزنک کاهی از اوقات این غدد متورم شوند و عرق
 یکی از این غدد از طرف چپ یا از طرف راست و سرم کند و علامات او در مریست با
 و جمع شد بد و در شریح که از لمس و اصطکاک شلوار اشتداد پدید و در موضع و املا
 احساس شود بد و ن تغیر لون که از لمس در عمق و الت پکاده محسوس گردد و بیضی شکل که
 انتهای بزرگش بجانب مقعد بود و انتهای صغیرش مجا و راست با بصل زد که در مجرای
 ماده از نیک لویپا تا نصف کو و است و موضعش در طرفین خط وسط است و در
 بعد که و سرم از غده مجا و نر نماید جلد قوز کشته و ماده بزرگ و نرم گردد و اغلب
 برآمدگی آنها در مجری بول حبس البول عارض شود



و سرم بیض پنجم اغلب اوقات در سوزنک بیضتین متورم شوند و عوام الناس
 میگویند در این وقت سوزنک به بیضه ریخت و و سرم بیضتین اغلب در او خور سوزنک
 و وقتی است که سرم بسیار کم شک باشد و سبب محصله این و سرم بیوست خارج و صدمه
 خارجی و راه رفتن و عدم بیضه بند است و بیشتر چون و سرم بیچ عرق بول رسد و
 و سرم بیضه گردد و بیضه چپ بیشتر از بیضه راست مبتلا گردد و سرایت و سرم از مجری
 بول به بیضه گاه مجهول است و گاه بطور انشا است که و سرم از مجری نثر کرده تا با نامنع
 رسد و اغلب و سرم در ضمیه بیضه است و عموما یکی از بیضتین مبتلا شود و باشد که هر
 دو مبتلا گردند اعم از اینکه ابتلا ی هر دو یکدفعه باشد یا بتوالی و سرم بیضتین هر گاه
 اغلب یا بر پیش رطوبت مائی یا خون الود در غلاف بیضه و یا بواسطه احساس گردد
 تجمع و شفافیت در ضغن چون این رطوبت و پیش نماید عموما ویم سوزنک کم شود و این
 بواسطه انصراف ماده است از ذکر به بیضه و این و سرم بیضتین هر گاه بیضی شد بد
 در الت که منتشر شود تا که و گاه ملاحظه شود فواق ذی و سایر علامات فوق مختصی
 و سایر علامات اشتداد پدید بخصوص در وقتیکه بیضه یکی از مجری خارج نشد
 و به ضغن نرسد باشد یا در شکم باقی مانده باشد و اغلب اوقات انتهای و سرم به
 تحلیل است که رطوبت مترشح در غلاف بیضه جذب گردد و بعد خود بیضه اگر متورم
 بود بحالت طبیعی رجعت کند و بعد از آن هر ضمیه بیضه خیلی باریک کوچک شود و گاه ملاحظه
 ضمیه بیضه صلب باقی ماند و بندد و منتهی گردد بپیم
 و سرم عروق آلات تناسل کاهی از اوقات مشاهده کرد در رشت
 ذکر بعضی خطوط قوز نرنگ مواج که حاصل شک اند از و سرم عروق جذبه و بندد
 دیده شد است بندهای صلب موجه که هر گاه کند مفتح پوست ختنه و حشفه را
 صیغاید که این و سرم و رید مهلك نسبت و بندد و غدد کشاله ران موجه و

متبعی کردند ولی نادراست که خیال را کامل حاصل کرد و اینجا بنگه خیال شود نادراست که
 متبعی بریم کرد و باید بقطر داشت که گاه زخم کوفتی در مجرای بول بر فرزند در اینصورت
 سوزنک میباشد ولی باطن زخم کوفتی است و یکی از اسباب تشنج بر بول خیارک است
 ورم بعضی اغشیه مخاط ^{است} ورم چشم یکی از ترکیبات بر خطر سوزنک ^{است}
 و مخصوص در پله شود در ریهستان و در هوای رطب ورم ملتحمه گاه بطور معمول
 ولی اغلب بواسطه رسیدن ریم سوزنکی است بچشم و اغلب ورم این چشم ^{است}
 است و باشد که در چشم با هم مبتلا شوند یا با انفراد و در این مرده علامت
 بسیار شدید و رفتار مرض خیلی سریع است که اجماع شدید با عرض شده ملتحمه
 متبعی و قرمز گشته جفن منقلب بخارج یا داخل گردد و از ملتحمه رطوبتی ^{عریض}
 با سوزنک زیاد شیب بریم مجرای بول جاری گردد و جمعی عارض شود و در انتهای
 ۱۴ تا ۱۶ ساعت شخص میتواند که بر پشتی بواسطه کرد و رت قرینه با بواسطه نرم
 و پاره شدن قرینه و خارج شدن رطوبات چشم و با آنکه ورم سرایت بر سایر
 اغشیه چشم نموده بهم ملصق نماید آنها را و بعضی اغشیه دیگر در مخاط ^{شد}
 جوف بینی و گوش میتواند مبتلا یا پنهان گردند ولی تاکنون محقق نگشته
 در اشخاص ملوط غشاء مخاط مستقیم مبتلای بهین مرض گردد
 ورم مفاصل بعضی اوقات در اشخاص سوزنکی و جمعی در بعضی
 مفاصل مخصوص در مفصل زانو عارض گردد و عروض اینو جمع اغلب اوقات بد
 سبب ظاهری است و گاه عروضش از اثر هوا و پروت است و یا از خستگی
 و فشی زیاد و هنوز معلوم نگشته است که ورم مجرای بول چگونه سبب ^{ملتبس}
 بر ورم مفاصل و این ورم مفاصل سوزنکی فرق دارد ورم مفاصل با اینکه
 در این مرض ورم انتفاکش کمتر است چنانکه در مفصلی که عارض شده است
 همانجا

در اینجا باقی ماند و بمفصل دیگر انقباض
 در علل منتهی از سوزنک ^{است} علامت منتهی از سوزنک هستند تنگی مجرای بول و بزرگ
 شدن غده و ذی ورم مزمن مثانه و بزرگ شدن باهزال بافتن پیضتین و سبلان منی و
 فانی شدن قوه باده و تولد بواسطه اینکه مجری منی بسته شده باشد یا اینکه بسبب التهاب بعضی ^{جای}
 مسدود شده باشد و با آنکه مجری منی مخوف گردد و بطرف خلف میل نموده منی بماند و برود و گاه
 بعد از رفع شدن ورم و تمام شدن ریم و جمعی در مجری پیدا شود شیب با و جماع عصبانی و
 بندرت ظاهر گردد علامت سبب سوزنکی و در اینجا باید ذکر کنیم که اغلب صنفین برانند
 مانند آنکه سابق ذکر کردیم اصل مرض بر ورنه های کوفتی در داخل مجری بوده است و با سوزنک
 مشتبیه شده است
 در انواع سوزنک ^{است} هر سوزنکی که در مردان عارض شود مسری و سببشان جماع ^{معد}
 بود و گاهی اوقات سببش بلاجهت است و در اینوقت چنان میباشد که سوزنک بسته عروض
 عمومی شخص با علامت مجهول رنجته الت و بکدر است چنانچه در پله همیشه عروض سوزنک و سبلان
 بریم از مجری بول در اطفال دفع در هنگام پیرین آمدن دندانها و در بزرگانی که مبتلا
 باشند بوجع مفاصل و تقریر و دستا و با این نوع سوزنکها گاهی بطور اید میک ^{جی}
 نموده است و گاهی عارض شده است از ضرب و ضغطه مثل میل زدن و جلق و ضرب خاد ^{معد}
 و جماع زیاد و گاهی عارضی گردد از خوردن و نوشیدن چیزهای مخصوص چنانچه ^{معد}
 کرد در مردمانی که شراب جو خورند مبتلا گردند بسوزنک و باید دانست که این نوع سوزنکها
 نادراست و اغلب بسبب عروض اجماع و دخول ماده مسریه در مجری بول است و در
 مردان و بعضی اشخاص دیگر شود که در ایشان بقسمی است که چون با زنگهای حایض ^{چنان}
 طمعت سفید مجامعت کنند مبتلای بسوزنک گردند ولی تاکنون معلوم نگشته است
 که سوزنک این اشخاص قوه مسریه را دارد یا نه اما معلوم گردیده است که همیشه ^{ست}

موضع و از او هیچ علامت سیلی با غیر منتهی نگردد و سوزنك اصلی که مسری است همیشه باید بطور سیر است بود نکند و در اینجا چنانکه سابق گفتیم بعضی از اطباء ماده اول را با ماده سیلیسی یکی میداند و فقط فرق در صورتش قائل اند و برخی دیگر ماده او را غیر از ماده سیلیسی قائل اند و میگویند که آن کوفت عارض غشوی ملوک کوفت و آن سوزنك ملوک سوزنك الالنجاکه زخم کوفتی در جری باشد چگونه میتوان تمیز داد آن سوزنك و این مسئله است بسیار مشکل و بقول موسیور بکورد طبیعت محض در اینجا بیشتر از شرط و تبحر الحی او است و اغلب با خون و قریب سوزنك است و برای یقین بهتر است که از شرط و تبحر محض بخود مرض بگویند اگر زخم کوفتی بدون امد معلوم است کوفت است و الا سوزنك است

تقدیر لغوی موضعی خطی نسبت و خطی بهم میزنند و قبلیه ملحقه چشم مبتلا شود با آنکه غده و ذی و مثانه متورم گردند

علاج چون کسی مویک جماع ناپاک گردد باید در غده به و اشهر احتیاط زیاد نموده غذا کم خور و شراب و عرف و آن شراب که بخودی خود میتواند باعث سوزنك گردد مانند قهقاع و غیره هیچ ننوشند و راه بسیار کم دهند و تحریک آلات ننمایند و آب و حمام داخل نشوند و حتی طبیب در اوایل یعنی در ۲ تا ۴ ساعت بعد از جماع پیش مرض بمعالجه اید مالد در مقابل سقط مرض براید انجا که مرض شدید و مرض قوی المزاج باشد اغلب فصد او باز و یا سوزنك زلوی زیاد در شرح و کشاله دان و پشت و نهان نافع است نه از برای دفع مرض بلکه برای تخفیف مرض است و بمدد و علاج و در همین وقت از نفع لاده متعال کپا هو بخور دهند در شبان و زرعقله در تقسیم و از شش بخورده الی یک متقال منک جهنم و شش متقال و نیم داخل نموده زرق نمایند و این علاج اغلب در سه یا چهار روز به جمیع رطوبات متحرک و می خوشکاند مخصوص در آن سوزنكها بلکه جمیع کم باشند ولی انجا که وجع زیاد باشد و سقط مرض نخواهد کردید و چون مرض بکمال رسیده باشد که بیم سیلان داشته باشند این معالجه

معالجه سودی ندارد و هم چون بعد از سه الی چهار روز از استعمال این دوا دفع مرض نکند باید ترک این قسم علاج نمود و چون سوزنك بکمال رسیده باید مرض را حاکم کنید و استیحا در او بکرم چه بحسب موضع و چه بحسب همدن نماید و غذا کم و اشهر به ملعب بنوشند پیضه را بیالایند و چون حسی شدید و مرض مزمن مزاجی باشد چندین فصد متوالی نمود و انجا که ورم زیاد و وجع شدید و سوزنك بنده باشد زلوی زیاد و بشرح کشاله دان و پشت زرها و باید دانست که هیچوقت زلور بر روی الت نباید انداخت زیرا که ورم و زلور زیاد کرده و گاه موریث بروز حمره و عروق غانغز ایا گردد و هم لازم است که پس از زلور دادن زلور جای دهان او را بپوشانند که ورم سوزنك با انجا بخور و پیچیده چون سوزنك سیلیسی باشد و ریش این زخمهای زلور بخورد هر یک از آنها پاک زخم سیلیسی خواهند شد و چون نفوذ زیاد و موجع بود در شب و بخورد کافور و یک بار و کندم توپاک با هم حقه نمایند و یا بطور حب بخور دهند و چون نفوذ الدم باشد و چون نادر است که این نفوذ الدم نادر است که بخودی عارض گردد و اغلب راشی اصلی که سوزنك بنده ای شته باشند و بخور دهند بند شراباره نموده الت را مرست نگاه دارند ان وقت فشار برالت دهند با او را بر روی سطحی گذاشته مشست بر او نهند و جری بول ایا کنند و موریث بروز نفوذ الدم شود و هرگاه این نفوذ الدم شدید و لازم معالجه باشد انوقت باید دستمال باب سرد الوجه را بر روی شریح و کشاله دان و الحرف الت اندازند و حقه از آب سرد کرده و اشهر به جامض بنوشانند و چون با پنجاه دفع نشود فشار بر جری بول باید داد و حبس لبول باشد کستر بکار بند و هرگاه دلی در جری بول بچسبند و او را بکشایند و بعد از شکستن حالت مرض و راحت مرض باید مقدار را اشهر بر اکرم نماید و استیحا و مریض را داند زیرا که او موریث نگاهدای سیلان بیم خواهد بود و از انرا بعد ضد سوزنك مانند کپا هو و کباب چینی که استعمال کنند و چون استعمال این

باید دوباره برگرداند تا ورم منتقل شود بحجری بول و برای این داخل میکنند بولی
که الوه شده باشد از چوک سوزنك و طامه سوزنك و طامه سوزنك و طامه سوزنك و طامه سوزنك
داخته اند

در اوجاع عصبانی شدید بحجری زلواندا نزنند و ضماد لودانم در بکار برند و بحجری
زرق محمد سر کنند و شمع ذرا سرچ اندازند و چون باد و په مده کوه دفع نکرد و الت
با شمع و با شلیم به بچند ولی نه انقدر سخت که مانع بول کردن شود
سوزنك مزمن حركه سوزنك مزمن اغلب منتهی شود از سوزنك حاد و باشد که
از ابتدا بطور از زمان بروز نماید

سبب و محل او معالجه بد و بقاء عك و پرهیز نکردن و خستگی و حرکت و جماع
ان میشود که سوزنك حاد مبدل بمنزمن گردد و فصل سرد و سرما و نمکی در جاهای
دطوبتی

BLANK PAGE

BLANK PAGES

BLANK PAGES

231

232

233

BLANK PAGES

BLANK PAGES

BLANK PAGES

BLANK PAGE

و غایت از این و غیره بظهور رسد در بعضی اشخاص يك استعمال مخصوصی است که
مرا ایشان خنازی پری با سر طائی باشد در این صورت زخم خنازی پری با سر طائی
شود و در صورت اول علاج مشکل و در صورت ثانی محال گردد
تشخیص اینجا محل آن نیست که صفات جمیع مواد هائیکه در کشاله ران مهم ^{سند}
بیان نمایند ولی لازم است بیان کنیم صفات مخصوصه مواد را که در امراض کوفتی
در این محل یافت میشوند چنانچه بعضی خیابرها هستند که برویشان بواسطه
سراپت بریم کوفتی است و بعضی دیگر فقط برویشان از سراپت و سرم است ^{بلکه}
اینکه چیز مخصوصی را بر سر نهاده باشد و برخی برویشان مجهول است و این
دو قسم اخیر را در امت که منتهی بریم شوند و هرگاه منتهی بریم هم شوند و ایشان
صری نیست یعنی اگر بگویند بموضع زخم کوفتی از او بروی نرکند بخلاف خیابرها
قسم اول که در ابتدا محل و بیک غده میباشد همیشه منتهی میگردد بدین بریم و بر
شان هم صری است
ملاحظه ^ش هیچوقت نباید که از برای که از برای تشخیص اینکه دریم خیابرها
است یا ساده و غیر صری بریم را بر بدن شخص مرض یا غیر بگوید زیرا که مایه اذیت است
او را مگر در صورتیکه بروی خیابرها قبل از بروی زجر احت کوفتی در اوقات تاسل باشد
که در این صورت برای علاج تشخیص لازم است و میتوان گوید
تقدمه المعرفة خیابرها آنکه هیچ میشوند از کوفت خطرناکند چه بواسطه زجر که
خودشان بهم میرسانند و چه بواسطه آنکه بعد از بریم شدن و باز شدن بگویند
کوفتی را حاصل میکنند و با اعتقاد موسیور بگویند چون خیابرها کوفتی بریم ^{نشدند}
نادر است که مرض مزاجی شود و برخلاف آنها آنکه تجلیل روند لیل محکم هستند
از برای آنکه مرض اثر مزاج نموده است

علاج برای بروز نکردن خیارک در بطن یا بد بکلی راحت کرده و هیچ حرکتی بکار نبرد چون
جماع و غوطه و هرگاه خیارک بروز نمود برای رفع او فواید چند نوشته اند مانند برف
و فشار و داغ و ادویه زینبی اگر چه اشیاء بارده بعضی اوقات سبب ثقل خیارک شده
است و کاهی هم انحراف او را کرده فشار بر اشیاء بارده و حجامت دارد و یا با بید
باشد که مورث و جمیع نکود و بعضی از مصنفین اشاره نموده اند بشرط تحت جلد
و خوش و داغ اهنی یا داغ دوائی و لیکر جمیع این معالجات در ابتدا بجا و همیشه
اگر موسسور نرود قاعده بهتر از اینها اختراع نموده است که بک شمع در آن بجای
بقدر یک پول سیاه بر وسط خیارک انداخته و در آتش کند تا یک مثقال در می شفت
ادجمل نموده لته از این محلول الوده کرده و او روی جلد پیشتر بگذارد و بعد از آن
ساعت که غشاء صفت حاصل شد آن لته را برداشته ضماد ملین و لودایم در بکار
برند و بعد از افتادن آن غشاء صفت اگر لازم بشود عمل را مکرر کنند و عموماً مالتی
نمیکشد که خیارک تحلیل میرود و چون موسسور بگوید چندان بجز از این طریقه نیز
فشار را ترجیح میدهد و چون اشاره خلافی نباشد ادویه زینبی بکار میرود از هنگام
هونی تا کنون جمیع اطباء صداند که تدهین و دغن خاکستری بر سطح انسی را بخاوند و یکی
و نرم بهترین طریقه استعمال ادویه زینبی است از برای جذب خیارکهای مغایر و
مرکب و هم این طریقه را احتسب میکنند خاصه در وقتیکه خیارک بوجع و پیورم باشد
چون بسیار از خیارکها از ابتدا صفات فلفلی و زرد دارند اولین معالجه ادویه
ضد ورم است که او سال علق نمایند و ضماد ملین بکار روند و استحمام در ماء
فاتر کنند و لازم است که زلور بر روی خیارک بگذارد و بموضع دق
باززدن او اندازند بخصوص چون ماده قریب باقی باشد و پس از آنکه ورم تسکین
بعضی از اطباء میگویند که بواسطه فشار او را منجذب نمایند و بعضی دیگر بابتشیر

و فلفل

بر خلاف آنچه گفته اند که او را خارج سازند اطباء ای تازی بعضی شرط میزنند و بعضی مانع
سورخ کوچک در خیارک کنند و بواسطه شرب دهن این ثقب را باز گردانند با سرم یا با
شیر و در این اواخر موسسور نه نوشته است که خیارک را با تروکار و یا با بیل و یکستانند
پس از خارج شدن سرم با محلول بعد با بنظر حق که آب مقطر شصت قطره و یک سی درق نماید
و موسسور نه میگوید با بنقاعده هیچوقت ورم حاصل غشوق و در چهارده روز جزا
ملکیم میگرد و بعضی از اطباء برای کشیدن خیارک محرقات بکار برند مانند بطاس وین
و غیره و بعضی دیگر آهن داغ را بر هر ترجیح میدهند و موسسور بگوید که چون
حدس زینم یا بیکه خیارک کوفتی است هر چه زد و زد کشایم بهتر است و هرگاه که در زین
جلد سرم زیاد جمع شده باشد و جلد سلخ شده باشد بهتر سوختن آن است با بطاس دین
و چون جرح صلب شده باشد شمع در آن انداخته و مالع زینبی بطور حب و بطور
استعمال کنند و بعد فشار بر موضع دهند و موسسور بگوید که در این قسم از خیارک که
مرض را فرا میبرد اند باد و به موضع کمتر بردارد بلکه اصلاح فرایج میکند و آنجا که مرض به
هیچ معالجه بهبود حاصل نکند و مرض مبتلای بسوالقنه مخصوصی باشد مانند خیارک
و سرطان دفع سواالقنه را نمایند

در کوفت فراخی

پس از آنکه ورم کوفتی جذب شد و داخل خون گردید
و ملق در بدن ماند مورث بروز علل چند کرد که اغما را کوفت ثانوی یا کوفت
مینامند و این علل که بسیار متعدد میباشد بروز نشان اغلب در جلد و بعضی
عظام است بطور شورات و جرحات و کوشش زیاد و در غشاء الحامی بطور قتل
متعدد و در اغشبه بعضی که متعجب بود یک بیم نشینند و در عظام که موحج گردند و
اکوستر و قروح بهم رسانند بالاخره سرم شوند و بعضی از اعضا و آلات هستند
که بروز کوفت ثانوی را اغما از سایر آلات و اعضا پیشتر است مانند لوز زین که

بزرگ شد و مجروح کردند و پختن که صلب کردند و عظیم واپس بغیر غنیه که شوا
 شود و چنان مینماید که سریم کوفتی مایه تغیر بعضی از آلات رئیس میگردد مانند
 و کبد و بعضی گفته اند که معد و کلبین و دماغ و عروق و قلب نیز از سریم کوفتی تغیر
 حالت بهم رسانند تغیر اینکه بواسطه کوفت در بعضی از اجزای جسم میرسد و قدام با
 با غرق نوشته اند بعضی از منافع در اطفال ناز تولد بطور خوب نمودند چنانچه
 موسیود و بوار نموده است که دریم کوفتی در جنین اسکار میگردد و بر وند و مایل چند
 در غده زانگ و موسیود و پول نموده است که دریم کوفتی در اطفال بخصوص ظاهر میشود بطور
 و مایل صغار در ریه و موسیود و بول نموده است بر وند و مل کوفتی جنین را در کبد
 او اگر چه طیب باید دقت زیادی در این تغیرات بکند و تاکنون درست معلوم نشده
 است که مرض کوفت چه تغیرات در اجزای بدن میدهد و بعضی باینکه کوفت خراجی متواتر
 اختلال اکثر اعضاء را میسر میسازد و در این تغیر در اجزای بدن هم رسد مانند هزال و
 ضعف و کمی دق و این علل بر وند و مل کوفت بواسطه تغیرات صلبه مانند جراثیم
 و عظم هریم که مورث دریم زیاد کردند و از بدن بکاهند و این جراثیم و عظم دریم چون
 مرکب شوند مدق با معالجه نفعی مورث بر وند و مل کوفتی که در هزال است
 و سید بدن بزرگ شد و لکهای سیاه حاصل کند و تهج در اطراف بهم رسد و ضعف
 در قوی پی حاصل گردد و این علامات چون جمع شوند با تغیر اینکه در آلات جسم رسد
 مانند سقوط بینی یا گوش یا موضع دیگر و خروج آلات از شکل طبیعی یک سبب میسر
 میدهند و برای اینکه کوفت خراجی گردد باید که دریم او جذب گردد و این جذب با اعتقاد
 موسیود و بوار نخواهد شد مگر در روی جراثیم و لهذا زخم کوفتی مقدمه لازم گرفت
 خراجی است و بسیار عارضه و منافع در این قولند و میگویند که دریم
 کوفتی بطور دیگر هم میتواند داخل بدن شده مورث کوفت خراجی گردد بد و ن آنکه

قبل

قبل موضع زخم شد و سریم جذب شود زخم کوفتی متعدد موافق قاعه باید زود نهی
 کوفت خراجی گردد و مل موسیود و بوار بر آن است که زخم کوفتی مناسبت با خراجی
 او ندارد بلکه صفت زخم را باید ملاحظه نمود که زخم صلب شد و جراثیم خراجی
 کرد و از آنجمله که صلب نشد باشد بمزاج اثری ندارد و چون جمیع اشیا صلبه زخم کوفتی
 میگردند و با حکم مبتدا بکوفت خراجی نمیشوند باید فهمید که این از چه داهست ایا با
 استعداد مخصوصی در شخص باید باشد یا آنکه بعضی اشیا خارج و داخله در اثری
 کنند یا آنکه دافع و دفع دریم کوفتی میباشد که یکی سرایت بمزاج کند و دیگری نکند و
 بر وند و مل بر این اعتقاد است و میگوید و دفع دریم است یکی موضعی و دیگری سرایت
 نوع اول همیشه مورث بر وند و مل کوفتی ساده میگردد و از نوع دوم زخمهای
 کوفتی صلب بهم رسد که اثر بمزاج کند و این اعتقاد را اغلب از حکما قبول نمیکند
 میگویند موسیود و بوار اگر خود شرف بد است که زخم کوفتی ساده مورث کوفت
 گردد یا اینکه بد دیگری سرایت کند ایا بد دیگری است و با اعتقاد عموم اطباء بر وند و مل
 کوفت خراجی در بعضی اشیا صواب است دیگر است گفتگوی زیادی در میان اطباء
 شده است برای آنکه بفهمید که دریم کوفتی پیش از آنکه خراجی شود از چه محل بد
 میگردد و بر این زیاد میگوید بجهت اثبات قول خود آورده اند که ما از کواخا
 میگذریم و فقط گوئیم که دریم کوفتی بواسطه او رده خاصه بواسطه عروق جدا به
 جذب گشته داخل خون میگردد و او را یک نحوی تغیر میسازد که هنوز معلوم
 نشده که چه تغیر داده میشود و بواسطه آن تغیر قائلان میگردانند که مندرجاً با
 در آلات بسیار بعضی علل بر وند و مل کوفت که صور نشان مختلف و لطیف نشان یکی
 باشد و اینجالت خون بنا میگذرد و مؤثر کوفتی را و شکی نیست که ماده سمی دریم کوفت
 تواند از یک مجرای از بدن خارج شود و باین واسطه است که همه اشیا صلبه در

کوفتی مبتلا شد و خوب معالجه نکند اندک کوفت خراجی مبتلا نمیکند ولی باید گفت که اغلب اوقات این عدم بروز کوفت خراجی بواسطه بعضی اتفاقات حادثه است و طولی نمیکشد که بعضی اسباب خارجیه بودی تحریک بروز نکند مانند آنکه بعد از امراض حاده و خستگی زیاد و اختلال مزاج و تعب زیاد و هوای کوفت خراجی بروز نماید یا اینکه اگر خون مبتلا در آن عضو کوفت خراجی هم رسد چنانچه در کام ساده منتهی گشته بود کام کوفتی و آنرا در پرت سوزد اگر سوز کوفتی بروز کرده جمیع آلات و انساج استعدادشان برای بروز کوفت خراجی بیک نفع نیست و نمیتوان بیان نمود که چرا بعضی انساج بیشتر مبتلا نمیکند و ولی هنوز مرض میکند که سرما را از آن کوفتی بروز این مرض میباشد و میگوید هر عضوی با نفعی که بیشتر مجاور با هوای خارج است مانند جلد و لوز قهقین و حلق بیشتر مبتلا میباشند و بعضی کوفت و بطریق هم که انساج واقعه در عمق بدن مانند ضریح و عظام مبتلا میباشند و نمیتوان این قول را مبنایند زیرا که چون این مرض اثر بعمیق کند ابتدا عظام غیر غایب است مانند عظام انف و ترقوه و زرد اسفل و غیره و هم جمیع سطح این عظام بیک دفعه مبتلا نمیشوند بلکه آنجور و شان که اقرب بجلد است در ابتدا مبتلا گردد بعد سرایت بسایر اجزاء کند ولی نباید چندان اعتماد بر این قول نمود و خلافاً باید به مبتدی در چنین که با وجود آنکه در رحم و در جاهای خیلی کم هستند که سرما با آنها اصلاً اثر نمیکند با این کوفت خراجی در جلد و غشاء مخاط است پس باید بدان شد که این انساج استعداد مخصوصی برای بروز این مرض است و برای این اختلاف استعداد انساج بر ابتلای کوفت خراجی که هویت و هنگام برای او قابل شده است هنگام اول و قوی است که بروز مرض این ظاهر است مانند جلد و مخاط که درجه ثانیه مینامند هنگام دوم و در وقتی است که مرض با انساج عمیق مانند عظام و غشاء بعضی و غیره سرایت کند درجه ثالثه نامند موسبور بکوفت طریقه بروز علامت کوفت خراجی را منتظم کرده و باین نوع بیان مینماید

بکاز

بکاز علامت ابتدا کردن شدن کلبوهای خون چون در آنی فکر نرود در همین وقت بعضی عمل می نمودار کردند جمیعاً و متفرقا مانند اختلال باصره و اجاع عصبانی و اجاع و ما طبیبی و اطراف که در وقت کم شدن در رخت خواب شدت کند علی که اغلب بیشتر از سایر بروز میکند و هیچ عدد واقع در خلف عنق و راس است و بعد در حلق و دیگر بروز کند و هیچ این غده بدون وجع است و هیچ وقت حجم زیادی بهم نرساند و بهر بیم نه نشیند و اگر هم بیم نشیند و عیش مسری نیست و عموماً برانند که طاسی سر و بدنش مود لیل است و وجود کوفت قدیم و طوسبور بکوفت بخلاف این بکاز اولین علامت این مرض میباشد و بعد از این جلد و غشاء مخاط مبتلا گردد که در جلد بعضی شوریات و در مخاط تغییر در لوزن میسرند و ناله های او بر نشود و بعد غشاء کاذب بروز کند و هر چه درض قدیم و شود این در نفع بیشتر مبتلا گردد و هر چه کوفت و این بواسطه سرایت غشاء الحافی نماید پس از آن نفع و عظام اثر نماید در اینکه کوفت خراجی مسری است بانه اطباء و فرقه شده اند و نظریه پس از او موسبور بکوفت در این ابن او آخرش اگر دان او برانند که کوفت خراجی مسری نیست ولیکن موسبور بدال در کتاب خودش مذکور میکند ملاخطاتیرا چه از خود و چه از سایر اطباء چون دشر و بول که دریم کوفت خراجی را گویند اند و زخم کوفتی حاصل شده و قلت عدد این ملاخطات مذکور میسراند که دریم کوفت خراجی اگر هم مسری باشد بالنسبه سرایتش خیلی کم است و هنگام کمون مرض یعنی آن فاصله که از هنگام اول تا بروز علامت هنگام ثانی بهم میسرند بسیار مختلف است بعضی اوقات جدی است که هنوز زخم حجت نیافته علامت کوفت خراجی بروز نمیکند و بعضی اوقات این چند ماه تا چند سال است و قاسی سال هم نوشته اند ولی موسبور بکوفت را این قول را قبول نمیکند و میگویند که پس از بروز کوفت صلب ناشی از علامت کوفت

تا نوی بروز میکند اینجا که دوام کون طول میکشد با اسم کوفتی در جای بدن میباشد این
مسئله مدق اطباء مشغول ساخت حال اعتقاد عامه بر آن است که در خون میماند
چنانکه زنبکه در حالت کون مرض باشد و حمل بود امر میتواند کوفت خراچی را بطلان دهد
و هم چنین در می که مبتلا باشد بکوفت خراچی بدون اینکه مرض را برین بدهد مایه انغصا
طفلی که در کوفتی ضعیف آلوده اند که طفل کوفتی میتواند مادر را مبتلا سازد و این مسئله
هنوز تحقیق نشده است

در کوفت اطفال تازه متولد چنین چون چنین مبتلا آید بدانشم کوفتی در مدق
طویل با قصه ظاهر گردد و اغلب چنین در ماههای اول حمل ملاحظه میگردد که در مدق
و هرگاه طفل سابق نشو و بوعاء وضع حمل برسد متولد میگردد با خراچی ضعیف و بد
لاغر و با علامات کوفت خراچی و باشد که بعد از یکماه این بعد از حمل این علامات
بروز کند و باشد که تا سه ماه هم بروز نماید و بعضی هم گفته اند که چندین سال متولد
در بدن مانده بروز نکند تا سن قبل از شباب و غیر از هنگامیکه طفل در حالت عیون
از مهبل یا بعد از وضع حمل مبتلا بکوفت گردد و کوفت در جبهه اول و خیارک هیچ
وقت در اتحاد پدید نمیشوند و اغلب بروز علامت کوفت در اطفال در جلد
مانند جابهای بر عجز و جلد پستی و اطراف مقعد و اطراف و اطراف دهان و
تاسل و گاه بروز خراش و خطا است که طفل میگردد بر کام عسر العالج که در
خون الود از مخاط انفجاری شود و شقاقها و جابهای در داخل بینی و پره بینی و گاه
بهم رسند و بدیه نشده است که کوفت اطفال در عظام و الباف و عضلات بروز
خلاف مردان احشای اطفال بیشتر مبتلا شوند چنانچه موسیو پول و دو بول
کوفت کرده است در ماصیل غده تیموس و موسیو و پول حمل بر همین مرض نموده است
در ماصیل کثیر که بروز در پستان کرده است و موسیو کوکوبار مذکور نموده است
کبد

در کبد غده زبیدی اطفال کوفتی اختلال غریبی بدین نوع که کبد بزرگ شود و دانه دانه و سخت
گردد و در بز چاقو صدا کند و دوماه کبد را از هم نتوان تشخیص داد و چون فشارش دهند
بعوض خون سرطوبتی نزد زنبک خارج گردد که یک لخته فیبرین بلا سطح در میان الت نمو
نماید و فشار بر سلولها و عروق او وارد او ریزد و مانع شوند ترشح صفرا چنانچه در هر از
این سرطوبت بسیار رقیق و بی رنگ است و موسیو کوکوبار حمل میکند که این اختلال کبد منتج
میگردد از درجه سیم کوفت اطفال و مانند آن مواد تحت جلدی است که عموما ان مرض را کمی
نامند یعنی موسیو سن سن مذکور نموده است بکنوع ورم صفاق در اطفال که سبب او را
سوزناج کوفتی میدانند و اگر قرار بکند مذکور شد معلوم میگردد که کوفت خراچی بطور ارادت
میرسد ولی اما این طفل میتواند پس از تولد این مرض را بوسیله بماد سرش بدهد باز در این مسئله
چنانکه در خود کوفت تا نوی فکر شد اختلال است و از زمان هونظر و پس از آن سرطوبت
سرابت میباشد و بدلیل و گزاید و بعضی دیگر بر سرابت او فالتند و اغلب از اختلال طبیعی غیر
طبیعی اطفال کوفت مانند سریم و بلاق و صفرا و غیره سرزند و خون و فنی و شبر و استننا
کرده اند و بر بیان میکنند و در بعضی دیگر از خون کوفت کوفتند و نیز بیان میکنند و فالتند که
باشند بکوفت بدون آنکه در ظاهر چیزی موجود باشد و طفل رضع بواسطه شبر او مبتلا
شده است و هم چنین از منی بطفل سرابت میکند مانند آنکه مذکور نمودیم در حافی که در
سرابت بز چنین را مبتلا سازند و نباید خیال نمود که کسی که مبتلا بکوفت خراچی شد
از کوفت در جبهه اول ایمن میگردد ولی با اعتقاد موسیو و پکوبار و دیگران کوفت خراچی
کوفت دیگر کوفت خراچی نمیکرد یعنی یک مرتبه ششخص بکوفت خراچی مبتلا گردد که اگر در نهانی
کوفتی در او اثر کند همان حالت موضعی باقی ماند و دیگر خراچی نمیکرد

علاج بندرت کوفت خراچی بدون دار فرغ میگردد ولی عموما علامات او را
کشته و بروز شدت میباشد و لابد باید او را به مخصوصه از برای رفع او بکار برد

هر چه دود زیاد و به ضد کوفتی استعمال کنند شفا از دود حاصل میشود و لازم است که در این
استعمال دوا مختص مبتلای به مرض حاد یا مزمن دیگری نباشد که دواي مخصوص کوفت
بر آنجا بود حالت حمل علاوه بر آنکه منع استعمال دوا نمیکند لازم میدارد که تعجب در
دوا نمایند برای آنکه مرض زود تر مدا و آماند که جنبین مبتلا نگردد و غیر از چند نفر
مردمان پنج کوا و بر عموم نام معلوم شده است که زینق و دای مخصوص کوفت
خارج است و میتوان اثبات نمود که جیوه وید و رو بطاسم فقط ادویه هستند که
دافع این مرض اند و بقدر امکان باید جیوه را از داخل استعمال کرد و انتخاب باید کرد آن ملخ
زینق را که بیشتر محلول است و اینجا که حالت آلات تغذیه مانع از خوردن زینق باشند از
داخل بدن کنند در این صورت انتخاب میکنند روغن خاکستری مضاعف را که
بر اطراف قد همین بنمایند و این قسم استعمال زینق علاوه بر آنکه موزی و کشف است
زود تر از سایر املاح زینق موثر است سیلان بزاق میگرد و هر ملخی از زینق را که انتخاب
نمایند در ابتدا بمقدار جزئی استعمال کنند زیرا که مقدار زیاد از زینق اثرش بر مرض
بیشتر است تا مرض و پس از آنکه لباقت مرض مزمن را به تحمل دوا نمودند کم مقدار دوا را
کنند و این زیاد کردن هفته به هفته است و وقتی که مرض رو بخوبی گذاشت و کوفت
شریت دوا را زیاد نکنند و مقدار دوا را باید نامرض بیک حالت است زیاد نمایند و اگر
مورث سیلان بزاق گردد قطع دوا کنند و صبر کنند که سیلان مذکور دفع شود و بدین
اینکه این اتفاق دیگر دست ندهد بهتر است که طریقه استعمال با ملخ مستعمل را تغییر
و در بعضی از جبهه با اشتیاق خارج عادی بزینق شده و دیگر مرض اثر نمیکند اگر چه
شریت و را بنظر آید در این صورت باید چندی دوا را قطع کنند تا تغییر ملخ دهند
و اگر جمیع املاح زینقی اثر در مرض نگردد میتوان دواي دیگر بکار برد که مانند کلرید
دوا را د و سود که در ابتدا سه یا چهار میلی گرم آنرا با یک غبارب اثری مخلوط کرده

برنج

به پنج دندانه و سطح داخلی مجنه بمالند و کم کم قدر شربت بیک سافتی گرم برسد و تا این
ملخ و هم چنین نفر و طلای سفید محلول است و چندان اعتباری ندارد و اگر تجربه
زیاد معلوم شده که بد و درد و بطاسم بهترین نایب ضایع جیوه است بشرط اینکه در درجه
سپ استعمال شود و قدر آید و را ابتدا از دود خود داده و هر ده روز و بخوبی بفرایند تا
مثقال برسد و چون مقدار بد و درد و بطاسم بالا رود تا حالت اشتیاع بدن ظاهر گردد
خسکی کل و زکام و سرخی چشم و سیلان بزاق و غیره معلوم است در این صورت باید
قطع کرد تا دفع علامات مذکور گردد و هر جا که علامات درجه دوم و سیم با هم باشند
موسسور بکوار معالج مرکب میکنند یعنی هم زینق استعمال کنند و هم بد و درد و بطاسم
و وقتی که بد و درد و بطاسم جیوه هر دو در بدن اثر نکنند بکار آمدن علایج نسبت مکرر
استعمال بعضی اشربه معرقه مانند مطبوخ غشبه صینی و ریش با آدام و غیره و چون اینجا
هم اثر نکنند باید تغییر اب و هوا دهند و بطرف گرم سیر بهتر است برون مرض را زیرا که
در هوای سرد کوفت عسر العالج تر است و دوا را شکنه بهترین دواي کوفت است و بعد
از آن بر نوبد و درد و حرکات را باین قسم که سوب لیمه هفت میلی گرم و فوایک سبزده میلی
گرم و رب السوسن پانزده سانتی گرم بکعبه حب سازند همه را و سردی از یک الی سه
از این جویب را بخورند و بی عود مردم بیشتر استعمال کنند لیکن در دوا نایب را که در
سی و دو گرم آن نیم کدم سوب لیمه است یعنی در شش مثقال نیم کدم مثلا سوب لیمه چهار
دلی گرم اب مقطر ده گرم الکله صفا ده گرم از یک قاشق قهوه خوری تا یک قاشق
اشخوری در شربت ریخته بخورند و بد و درد را ابتدا یک کدم تا شش کدم نیم
بکار برد و هنگام استعمال املاح زینق بکی از شراب و بان معرقه فوق را بن معول دارند
و اغلبا را با پر هنر کامل برین میدهند و لی هیچ لازم نیست اگر غلای مقوی صبح
شام مرض بخورد و دردی ندارد بخصوص اگر ضعفی در مزاج باشد ولی باید هیچوقت

افراط در اکل و شرب نماید و در کوفت اطفال رضيع بهتران است که بلبه ادر و پره نقيه
 خوراند شود و اگر شیر خواهر نباشد از پنجه تا هفت جلدی کم در شبان روزان سوبلیمه
 داد و هم مستعمل است استحمام سوبلیمه که در اول سه الی چهار روزه کم در این روزه
 پس از آن مقدار آنرا زیاد کرده طفل را در آن گذارند
 در صورت مختلف کوفت مزاجی چنانچه سابقه مذکور خواهد شد کوفت در این
 ولایت چندین اثر عوده تغییرات مختلفه در آنها بهم میرسد و برای تحصیل آنها مذکور است
 اولاً عللی را که در جلد و غشاء مخاط بهم میرسد که در جبهه دوم کوفت است و بعد از آن
 که دیکه شوند در غشیه و بعضی غشاء الحافی و عظام و نیمیهای بعضی که عبارت است از
 درجه سیم کوفت
 در بلال هوید یکی از علامات کوفت که بعضی درجه اول و دیگری درجه ثانی
 میدانند و جمعی مسری و قوی غیر مسری میخوانند با ساهی مختلفه نامیده شده است مانند
 طاول و لکه و طب و دانه چین و کوفت مخاطی و غیره و این طاولها عبارتند از برآمدگی
 عدسی شکل که در مواضع چند بروز کنند مانند پوست پیسه و شرچ و اطراف مقعد و
 کفل و در جانب اعلاى ران و در مخاط دهان و حلق و این دانهها که اغلب زیادند بزودی
 مواضعی که بروز کرده اند بعضی لکهای قرمز مسی که سطحش اچوب و تر باشد و بوی فتن
 مخصوصی از او بر آید بروز کنند و در اشخاصی که کثیف اند و در آنها که افراط در اکل و شرب
 کنند در این لکها شقاق و شکاف بهم میرسد رطوبتی رقیق و خوشی از او جاری شود که
 بر بعضی جراحت میفراید و در این وقت سوزش و خارش شود و موضع پلاشو و این لکها
 علی الظاهر چند قسم اند چون زیاد و در روی جلد واقع باشند چنان نماید که جلد تپید
 بخاطر شده است بدون اینکه هیچ تفرق انصالی در او حاصل شود و گاهی مجروح شده و
 این جراحت نیز بعضی اوقات پوشیده شود از غشاء کاذب و باشد که در روی
 کوفت

کوفت زیادى و بعد و این لکها که در روی شان کوفت زیادى نمیکند اغلب اطراف
 مقعد بروز کنند و در این وقت کند بلم خونده شود و هم در این موضع باشد که این لکها
 مجروح گردند و این جراحت که کوفت و طویل است مانند خط پوشیده و پنهان گردد
 غصون اطراف مقعد را بصورت نامیده میشوند و هم این لکها نیک گاهی در میان
 انگشتهای پا دیده میشوند شباهت دارد با این رگدها و این لکهای که در مخاط دهان
 و حلق بروز میکنند مخصوصاً آنها که در گوشهای لب پیدا میشوند سفید رمادی و
 زرد خون الود شوند و با سانی در روی آنها غشاء کاذبی مانند آنکه در خناق قنیم
 بهم میرسد و این لکها بروز و نوع بروز میکنند یکی آنکه اول زخم کوفتی بود که تپید بل میگرد
 بد در جبهه ثانی و دیگر آنکه بخودی خود بروز کنند در جلد و مخاط و این لکها گاهی بلاغ
 میمانند و گاهی بزودی رفع شوند و این اختلاف زمان کوپا از خود برضاست چنانچه
 ایشان را کثیف و دام لکها در آنها پیشتر است و وقتیکه این لکها محبت باندان سطح لکها
 برآمده است عمیق گردید و رفتن رفته بحالت اصلی عود نماید مگر موضعی که محروح شده
 علاج بعضی از این جراحت با لکها بواسطه معالجه موضعی رفع شوند و بعضی هم
 بدون معالجه محض بمرنگ شدن و رفع میگردند و آنجا که موجب باشد با مطبوخ ادویه
 ملعبه و ملین بشویند و آنجا که ساده باشد از محلول سولفات و سوزک با سولفات
 دو کوپور با سفید اب قلع و غیر بشویند و چون شقاق و خراش بهم رساند با سیراب
 بندند و اگر آن شقاق موجب باشد تر بال داخل کنند و بهتر است روغن کلم که بکثافت
 کلم را در شش مثقال روغن ساده داخل کنند و هرگاه با این ادویه جراحت نشود و
 تغییر نیابد با سوزن جفم یا غیر موضع را بشویند و چون محل این لکها و مخاط
 بود جز سوزاندن علاج موضعی دیگر نیست و در هر صورت پس از بروز
 ادویه ذبیق چنانچه سابق ذکر شد بکار برند

در اسبون یعنی روز یکم زاید و نیز اسبون عبارت است از يك نو مخصوص
 در روی غشاء مخاط و جلد که مجاور شده باشند باریک کوفتی چنانچه عموماً ملاحظه می
 کردند در روی خسته گاه و حشفه و فرج و مجبل و عنق رحم و اطراف مقعد و در ^{مستقیم}
 و دهان و در غصون کام و خود این نموها اغلب بدون وجع است گاه دسته دارد
 و دسته که بکلی چسبیده است بموضع و عدد و حجمشان بسیار مختلف است که گاهی
 یک باد و بیشتر بیک نشوند و گاه خیلی متعددند و باشند که در زنان جمیع ثقبه
 فرج و یک قطعه مجمل و امتی سازه و این نموها اغلب قرمز رنگ است سبهای مختلف
 دارد بعضی از آنها که دانه دانه دارند مانند دانه های تمسک و نوبت سبیه و روز کنند
 با آنها نام فرام بوانر داده اند و بعضی دیگر شبیه بنالبل و برخی که سطحشان شکافها
 و سفید زرد رنگ است همچنان بقدر تخم سقر است و بعضی دیگر دسته دارند
 که چون قند شکر باله اند از آن ساق اول چند شاخه جدا شود مانند کلم کل و باین
 شولفور نامیده شده اند و قتی که این نموها در موضعی واقع شوند که متصل ^{است} به
 خارج با آنها وارد اند و وقت بخت و دراز شوند مانند شرح و اطراف مقعد و
 صاف و بعضی بر یک بر یک شوند مانند تاج خروس و در همین مواضع بعضی
 آمد که های صلب و مد و بمرسند بدون آنکه هیچ تغییری در لون جلد پیدا شود آنها
 را کندن بکن نامند و اغلب این برآمدگیها بر و زشان بدون وجع میباشد بخلاف آنکه
 بعضی حس زیاد شود و موضع موجب گردد و در روی غشاء مخاط این برآمدگیها
 و طبعند و زرد و خونی گردند و همیشه چسبیده شده اند از يك مخاط ^{خلاف} بر می
 در روی جلد که خشک و سخت و گاهی زرد گردند و این برآمدگیها طولشان ^{است} زیاد
 و اغلب بدون معالجه رفع نشوند و گاهی هم رنگشان باخته شده و فرو ^{نشسته}
 بیفتند و بعضی گفته اند که این برآمدگیها بجا و جوت مسری هستند و ^{است}

ضعیف

ضعیف که تاکنون معلوم نشده است

تشخیص این مرض اغلب آسان است آنها را میگوید در اطراف مقعد واقعند
 باشد که بد که بواسیری مشتبه شوند و بطریقه تمیز را در باب بواسیر مذکور نمودیم
 و آنها را میگوید روی حشفه واقع شوند باشد که زحمت زیاد برالت داده بطوری که
 متورم سازد که خود الت از شکل و هیئت برگردد و در این وقت مشتبه شود با ^{است}
 و اگر حالت سابقه مرض هم کفایت بر تشخیص نکند بر طریقی لازم است که قبل
 از آنکه عملی کند چندی دوا ی ترینی برای حصول تشخیص بکار برد

علاج این برآمدگیها را باید بر طرف نمود با داغ یا با تیغ و اینجا که این نموها ^{است}
 در بر باشند اصول بر بدن است و در اینجا صریحاً میتوان اینها را با خطی است و باید
 از سقوط بهتر آن است که بیخ از داغ کنند زیرا که اگر نشوز اند اغلب و باره بر و ز کنند
 عموماً اما علاج دینی خوردن چندان اثری در این برآمدگیها نمیکند ولی همیشه ^{است}

اولاً نرم است
 در سبیلها آنها عبارتند از امراض جلدی که با اشکال مختلفه در تحت اثر کوفت
 بر سطح جلد بر و ز می کنند و این نوع از کوفت که از ابتدای بر و ز کوفت در ^{است}
 باسم پستول نامیده میشود البتة آنها را مژگانند که ساخت و بعد از آن و باین ^{است}
 و پیوست بهتر از او مشروح گردند و اینها منقسم شده اند و اقسامی که ظاهر
 میسازند و بدینجه منقسم بجهت نوع شده اند سبیلها های بون و جلدی و
 طاولی و جباب بر می و دانه و یا بولی و قشری و صفات عمومی اینها عبارتند از
 از یک رنگ قرمز مسی یا خاکستری می باشد که رنگ مخصوصی منصفین نمیتوانند ^{است}
 ولیکن از ملاحظه آنرا میتوان آنرا نسبت بر کوفتی داد و بواسطه نداشتن
 اسم مخصوصی موسس و کان ناد او را رنگ کوفتی نامیده تا با یک میل مخصوصی آنها را ^{است}

بجاء کردن شکل مد و بر تالشا انکه بندرت انها بصورت حادی بروز کنند بلکه
اغلب بروز نشان بطور ازمان است و اینجا نادراست که انها مویرت خارش کوفت
و بسیار مایلند بخرج شدن خامسا انکه غالب و قات بروز این کوفتهای جلدی
فقط از یک نوع نیست بلکه همیشه دو پاسه نوع از انها با هم بروز کنند سادسا
این است که اراض جلدی کوفتی شکستان با اراض جلدی غیر کوفتی متفاوت است
ولی در این دو صفت اخیر چندان نمیتوان اعتماد کرد
علامات مخصوصه هر يك از انواع سفلیدها
اول سفلیدهای بن موسی که نادود و نوع از این مرض را ذکر میکند اول در اول
کوفتی که متصف است ببرز لکهای قرمز سی بعد از آن که چون با انگشت فشار
دهند بعسرت رنگش تغییر کند و این لکها بروز کنند در بدن و اطراف حادامپه
در جبهه اول کوفت در شخص باشد و گاهی قبل از آنکه این لکها بروز کنند کسالت
و حمی عارض شود و گاهی هم وجع در اطراف و در محل با حاررت موضع و خشکی
و رنگ بنفیس مخاط و گاهی هم ملخوط کوفتی در روی لوزین و این
شوراث که یکی از اشکال نادره سفلیدها است باشد که موقتی و در چند روز
گذرد و جای او بگزینک رمادی باقی ماند که چندین ماه طول کشد تا بطرف شود
و عموما رقرار و بطی است و اینجا که بروز شد در او بلخ عرض کوفت باشد می
شود که در سه چهار هفته دفع شود ولی چون در او خورض کوفت بروز کند
افلا تا چندین ماه طول کشد و شکل و بیم از سفلیدهای اریتم و اندر است و متصف
ببروز لکهای بنفشه با قدر قرانی و کمتر باشد و این لکها مد و روی برآمد
و رنگشان مرهادی حاد و از فشار با انگشت بطرف شوند و منتهی شوند تا
فوری باند ریجی و بروز این بزه همیشه بدون مقدمه و محلش در اطراف خا
در بار است

در بار است و اغلب موقتی و بروز و فنا یابد و حکم است و و امثال اینها را
همیشه در اوایل جبهه اول کوفت ظاهر شود و یکی از ترکیباتی است که عموما در عرض کوفت
بروز کنند و چون محلش پوشیده است و هنگام بروز خارش و وجع نیست غالباً
مشهور نشود و چون در عرض کوفتی است که همیشه با او همراهی دارد یکی بروز شدن غلغله
عنق و دیگری در پیش مو از ملاحظه اند و باید جستجوی اریتم و اندود و از این قبیل است
و اغلبی های کوفتی که عبارتند از لکهای مد و بر بالونی مسی حاد که قطرشان سه الی چهار
سانیم قطراست و عده شان محدود و بفشار پتاما دفع نشوند و بروز کنند در روی بدن
و صورت و اطراف و گاهی همراهی کنند با جرخ خارش و منتهی شوند با تحلیل یا بپلسی شدن
دویم سفلیدها و رنگوبن عارضی و ان یکی از اشکال بسیار نادره سفلیدها است و متصف
شود که ببرز جیای مد و در متغیر مانند وریبل و گاهی بروزش بطور پاره است مانند
تجال و گاهی این جباها پهلوی هم بروز کرده شبیه شوند با کوما و این جباها همیشه از
قرمز مسی است و زمان حبابی بودن انها بسیار کم است ولی هنگام بروزش بیشتر
بادوام است و در وقت بروزش بیشتر لکهای در موضع انخاب بروز کنند مانند
مکول و هنگام بروز این جباها بعد از یک الی شش ماه پس از بروز مرض است
سیم سفلیدها و اینها هم بد و صورت اراض طاولی میشوند و بروز کنند یکی بام
فیکوس و دیگری روی پیا بام فیکوس کوفتی تا کتون و بک نشسته مکون در اطراف حاد و الولاده
روی پیا یکی از اشکال بسیار نادره سفلیدها است که متصف است ببرز طاولی عریض
اندک برآمده و مد و رو مخاط است از هاله مسی رنگ و معمولا است از رطوبت بسیار
که فشرک کشته و بار حاصل کند که در هر مرکز ضخیم تر است از اطراف و اطراف این بارها
که بنفیس است مجروح گردد و پس از رصحت پذیرفتن اثر جرحی گذارد که مدام باقی بماند
و رفع نشود

www.tarikhem.org

چهارم سفیدها پسند از بعضی حیوانات این شکل از سفید عمومیست دارد و عموماً بر روی
چندین سال پس از شغای علامات اولیه کوفت است و بعضی اوقات این پستیها
کوچک و مخروطی و قاعه شان سخت و صلب و لولوشان قویتر است و عددشان زیاد
و در پهلوی هم میباشد اگر چه در هر بدن برون میماند و صورت و پیشانی را بیشتر
فرایند و خیلی شباهت دارد با اکثر زئاسا و زئاسا و زئاسا و زئاسا و زئاسا و زئاسا
هرادی دارد که چون پفند در جای او یک سبک طریقی میماند و بر یک مکرر باقی ماند و گاهی
پستوها عریض و فشرده شده و منقبض در سینه و سر و قاعه شان سخت که محاطند از یک
هاله قرمز مسی رنگ و چون آن بار پفند در جای او جلد صلب با جرح و حس و گاهی از
اوقات این پستوها کوفتی بسیار میسر کردند با مینی که که لکهای عریضی قویتر شده و در
او پستوها متعدده بیرون آید و بزرگی یکدیگر ملحق میشوند و صورت برون را نشان
که در زبون با جرحی است دانه دانه و که اطرافش برآمد مانند زخم کوفتی است و
بارها محاطند از هاله مسی رنگ و گاهی از اوقات این پستوها خیلی عریض شده و بیشتر
با کتیا و برون این نوع مخصوص در اطراف است و غیره داده شده است از اکتمای ساده با اینکه
هاله و برون را اکتمای ساده قویتر از غوائی و در کوفتی قویتر است و بار که بسته شود
صلب و سیاه و مدور و خیلی ملتصق است بجلد و چون پفند بجای او جرحی دیده شود
مانند جرح کوفتی که چون این جراحات می پذیرند در جای آنها اثری ملامی باقی مانده
و گاه این پستوها در این ناخنها برون کرده ناخنها را فاسد نموده و پفند و اطفا لکند
شکر ماد را مبتلای بکوفت شوند و بزرگ کوفت اکثر در ناخنها شکل پستی و اکتمای است و
اغلب از پانزده الی چهل روز پس از تولد این پستوها برون کنند و فادار است که طفل
هنگام تولد جرحی با باره پستیول داشته باشد و آنجا که باین علامات متولد شود طفل
لاغر و صورتش کشیده و جمع کرده چنانکه سبای پیری از آنها برون دارد

پنجم سفیدها برون برون یعنی یکی از اشکال سفیدی است که اکثر دیده میشود
و هنگام برونش خیلی طول است نسبت بدرجه اول و متصف است بواسطه دانه های که
جوشان از سر سنجاق تا بقدر که در و بست و لون آنها قویتر و متفرق و با بطور مجتمع
کردند اگر چه در هر بدن برون نماید و اختصاصشان به بینی صورت و گوش است
بعضی از آنها تا مدتی بیک حالت میمانند و در حالیکه انوضع صاف و گاهی پستی
کند و چون سر و بشا گذارد اندازند فرو نشسته بعد برون شود و جای آن ملامتی بلون
مسی باقی ماند و بعضی اوقات این دانه که قویتر و منقبض و مروج است مجروح گشته از آن
ضخم پوشیده شود و جراحی که از آنها برون شد شبیه است بجرایان که از اشکال
حاصل میشود و در عریضی و عمق و اغلب با برون شدن آنها مانند برون بینی و گوشه
کردند و بعضی از این جراحات سطحی و مایع و اشکال مختلفه است
ششم سفیدها با بیل و ان متصف است بواسطه برآمدگیهای کوچک
برو سخت و صلب که هیچوقت مسطحی جرحی نکرده و با تحلیل رود بافتنی شود و برونش
و گاه در جای او یک کودی ماند که یک سر سنجاق در جای کبر و این کودی
پیر از چند ماه رفع گردد و این نوع سفید و قسم است یکی حاد که برونش در
کوفت اول است و متصف شود برون برآمدگیهای زیاد بلکه محاطند از هاله قویتر
که چون آنها محلول گردد بجم سطح عریضی مسی رنگ مشاهده کرد که در روی او
که گاهی بسیار کوچک است که رنگشان کمتر است و زئاسا این شورات بسیار کم که در
ساعت هر قدر باید برون کند و فقط در چند روز رفع شوند قسم دوم بواسطه
دغات شورات و زئاسا امتیاز دارد که حجم آنها عریض و شبیه است بعد
نموشان بطی و در جرحی است و برونشان در اطراف مخصوص در جبهه انقباض آنها
و روی آنها پوشیده شود از باره دانه های خشک که چندین دفعه افتاده و باز بسته شود

هفتم سفید فلسی این نوع متصف شود بر وزن قلیهای خشک و رمادی رنگ
 برآمد کههای کوچک مسی رنگ و بر وزن نماید بشکل جذام با پوسه بر پازیس و از جذام شخص
 داده شود باینکه لون این فلس بسیار نازک است و با بنواسطه بعضی از اطباء این را جذام پیا
 نامیده اند و از پوسه بر پازیس تمیز داده شود هم بواسطه رنگ مسی و هم بواسطه بر وزن
 سفید رنگند و هر فلسی بیست و یک نوع از این را سفید قری نامیده است بواسطه
 سختی و لون رمادی آن فلس بسته شد و این شکل ملاحظه کرد و بخصوص در کف دست
 کف پا که بر وزن کند بواسطه قاطی برآمده و مسی رنگ و مدور که پوشیده شود از فلسهای
 سخت و رمادی و ضخیم که در آن بعضی مکاف و شقاقهای مویج هم رسد و در دروش
 هاله مسی رنگ حاصل گردد

تشخیص مرض ثورات کوفتی یکی امراضی است که ناشناخته میماند و هم اگر اوقات
 بعضی ثورات را حل بر او میکنند و چنانکه مذکور شد بصورت جمیع امراض جلدی
 بروز میکنند و از برای تمیز آنها علامت مخصوصی نداریم و باید از حالات سابقه
 و از علامات لاحق و تشخیص و مرض را

نقد المهره چندان خطری ندارد و زود معالجه میگرد اما شکل فلسی و بوی
 معالجه میگرد و مشکل تو بر کوبی او مایه بر طرف شدن بعضی آنها چند

علاج بعلاوه معالجه داخلی از پرتوید و سردار شکن باید علاج موضعی هم نمود
 که اگر بر احوال نباشد حمام سولیمیک بکار برند که از یک الى دوازده مثقال سولیمیک را در یک
 حمام بکار میریزند و موضع را بشویند با محلول سولیمیک که دوغ خود او را در دوازده مثقال
 آب مقطر ریخته معمول دارند بار و غن کمال که یک در شش محلول کنند و بهین قسم می
 توان روغن پرتوید و در کوب بکار برد و هم نافع است و در شش ف و بن نافع است
 اب کوردی و قلیانی و تدهین بار و غن قطران و جراحات اگر مویج باشند مؤثر
 دوغ

tarikhem.org

دو غن و اندری تر باک داخل کنند و اگر مویج باشد با شرب موضع را بشویند و بن نافع
 که با آب نمک بشویند و نیز با سنک جهنم بسوزانند و با پادهای زیتونی به پوشانند و هم اگر
 ممکن شود زو بکار برند و ضماد اندازند و اگر رفقا و جراحات بسیار سر برنج و انرشتن
 با آب نمک باطنی و بد نایستد و سر نویت با سنک جهنم بسوزانند و اگر موی سر برنج
 موی را تراشیده با نعین در مزاج طلا نمایند

علامات کوفت خراشیدگی خراشیدگی اول و رخا دهان و در مخاط دهان
 و حلق ثورات چندی شبیه ثورات مذکور در جلد بروز می نماید و اغلب هم با ثورات
 جلدی مرکب میشوند و در مخاط دهان میتوان جمیع اشکال سفید را ملاحظه نمود
 بلات هوید چنانچه گاهی از اوقات ملاحظه میشود لکهای غیر منتظم و قرمز که مرکز
 شان سفید است بدون آنکه ورمی در موضع بهم رسد و اگر هم ورمی عارض شود
 بسیار خفیف است و دوام این لکها بسیار کم است و اغلب هم می کشند با سفید
 و یک نوع دیگر از کوفت مخاط دهان عبارت از برآمدگیهای بسیار کوچک که گاهی
 سریشان دانه دانه است و رنگشان تیره تر از خود مخاط است و اغلب مسی رنگ میماند
 مایل بر این اند که هلالی شکل بامد و ریاضی شوند و محلشان اغلب بر گوشه لب و
 سطح داخلی و است و باشد که در سطح داخلی رخساره با در غضون کام و خوبا و خرد
 کام عارض گردد و بیند ریت دانه شود در زبان و این کوفت شبیه است به سفید
 دانه و غده و انتهای آنها اغلب تجلیل است و باشد که از تحریک دندان با شقی دندان
 منتهی جراحات گردند و در روی زبان از اثر کوفت بعضی دانههای غیر منتظم و سکا
 با مخرج بلون قرمز با رمادی هم رسد که محلشان اغلب در نقطه و الحاف زبان است
 و باشد که مورت صلابتی گردد در زبان که بسیار شبیه شود با سقر و س و در

tarikhem.org

از دهان از آن کوفت بعضی جراحت بهم میرسد باین طریق که نقطه غائر باقی در حلق
 بالوزن بین بهم میرسد و این نقطه که در ابتدا قریب و الت قدری متعرج است در مرکز بین
 نقطه زرد رنگ است و شفاف و بعد از آن در وسط خط نرم و مجروح کرد جراحت حلق
 باشد که در وی لوز قریب بجای در حلق حلق و باد غرضون کام یاد خود کام حاصل
 شود و عمق این جراحت مرهادی باز نهد رنگ است و اطرافشان بومله و بربله است
 و از این جراحت بسیار کم است که ورم حاصل شود و هیچوقت موجع نیستند و قوت
 عسرت در بلع هم رسد و کلو خشک گردد باین واسطه مرخص هیچ اعتنائی بمرض خود نکند
 و در بعضی وجع شدید عارض گشته عمل عسیر با محال شود و صورت حلقی گردد بعضی
 اخلاط ریه و متعفن با نفث خارج شود و نفس مرخص بوی بدی حاصل نماید و کمی
 عارض گشته هزال هم رساند در این صورت باشد که وقتاً مرخص بطور سرسری
 که کام رخو با غضون او با عظم فك اعلى و اندام فقار عنق فاسد و بر طرف شوند و
 عموماً وقتاً ریه باطنی است و بعضی از جراحت کوفتی حلق بطوری بزرگ شوند
 مانند غائر یا و بعضی دیگر مانند سایر جراحت است و همیشه ریه و شان از
 جراحت جلدی اسرع است
 تشخیص از اطراف جواحت که بریده است و سطحی که سفید و ضخم و لونی که قریب
 بنفیس و مسی رنگ است و از کمی ورم و عدم وجع جراحت کوفتی حلق را از
 سایر جراحت میتوان تمیز داد
 تقدیر المعرفه جراحت حلقی کوفت بسیار خطر دارد که هرگاه کام رخو غرضون
 او را بر طرف کند بلع صورت عسیر را بر طرف کردند که صلا همیشه حلقی با انقباض
 و انقباض جراحت در کام عارض شود از دهان با نف همراه پیدا شود و چون در اندام
 فقار ریه

فقار ریه همیشه چوک نماید و تقریباً جمیع ضایعات که باین طور مبتلا گردد دهان را کورند
 و در این جراحت کوفتی انقباض انوقت که محل این جراحت در ریه بینی یا در قصبه الانف
 باشد با ساقی ملاخضه میگردد و چون در جوف صدقهای بینی در جوف بینی واقع
 شده باشد مشهود نگردد و ان اشتیاق شروع میکنند به نفس از ریه و چون کردن از یک
 ما از هر دو طرف و همیشه شکایت کنند از اینکه بینی گرفته یا پاست و در وقت
 بینی پاک کردن فی الحقیقه خارج شود غلیظ و ریه متعفن و خون الود و گاهی با بومله و ساه رنگ
 و شامه مرخص کم یا بکلی معدوم گردد و این علامات باشد که مدتی باین حالت باقی ماند و
 مرخص خیال اینکه مبتلا بر کام مرخصی شده است بطیب رجوع نکند و اغلب این جراحت
 بعضی علل دیگر میشوند چنانچه اغلب اوقات بدون آنکه عظام تغییر یابند یک سر نیز با
 با کمی از بینی سپلان میباشد که بواسطه بوی متعفن مرخص میشود و گاهی را که موسوم
 بکام جراحتی و گاهی از اوقات جراحت نغض و فهای بینی با بصدفها و گاه بعظم مصفا
 سرایت کند و آنها را فاسد نماید و عموماً سرایت این جراحت بعظام مخصوصی است
 که فاسد شده قطعه قطعه در وقت بینی گرفتن از جوف انف پیرون آیند و این ریه بینی
 و هوای که از او خارج میشود عفونی بهم میرساند مشابه بقطعات انسانی یا حیوانی
 که برای تشریح مدتی در آب کدازند عفونت حاصل نماید و چون جراحت بعظام
 مخصوص انف رسد از ریه احساس کم یا طاسیون گردد بعد عظام بینی فرو رفته
 چون پیچند قطعه اعلا ی بینی بهمین شد باین آید و بر عکس نقطه بینی بالا رود
 در این صورت اغلب اوقات جلد سالم و انجا که جراحت بجلد سرایت کند باشد که
 جمیع بینی فاسد گردد و فساد است که جراحت کوفتی بینی همراهی با کوفت در
 دیگر نکند و طیب همیشه باید از این ترکامهای مرخصی که رفع غلیظند
 و هر اهی میکنند با سپلان ریه متعفن احتیاط نماید

سبب جراحات کوفتی مستقیم جراحات کوفتی واقع میشود در جن اسفل معاً
مستقیم و مورث بسیاران هم میگردد و چون بواسطه این مقلع با از پیرون امکا
مقلع ملاحظه کنند صفات این جراحات مانند صفات جراحات کوفت حلق است
و اغلب تجمیع در غشاء مخاط اطراف و غشاء لحمی تحت آن بهم رسد که جراحات
شبه نماید با سقیم و بر و با این واسطه اغلب لطیفه بد است که استعمال او در
کند بجهت تشخیص و باشد که چون مرض را استعدا دو خارج سرطانی باشند
کوفتی مستقیم تبدیل گردد بجراحات سرطانی و اغلب جراحات مستقیم مایه نمونم زاید
و زخمهای دانه و شقاق اطراف مقلع گردد

چهارم جراحات مخاطات تناسل بعضی سبب افشای کوفت فراجی گردد
مردان و چه در زنان بروز میکنند که غشای مخاط مجری بول و فرج و عتق
و مجمل متواند منفر کوند و اینجراحات از جراحات کوفت بدوی تمیز داده
شوند با اینکه ورم اطرافشان بسیار کم و هیچ تجمیع در غده و جلد به هم نرسد
پنج جراحات مخاط حلقوم و صم چون جراحات کوفت فراجی در حلقوم و صم
الویه هم رسد اغلب مورث سلسل میشوند و برای تمیز این مرض باید رجوع نمود
بجلد اول در فصل ورم حلقوم با جراحات که برای اسباب مرض باید مقدر
مرض را فحید و حالت حالیه مرض را مشاهده نمود و اگر علامات سلسل در زینت هم
مرمد معلوم است که مرض سلسل فراجی نیست و همیشه در یک موضع از بدن
در حلقوم دهان جراحاتی که سببش کوفت فراجی باشد ملاحظه خواهد شد
علاج از برای جراحات دهان و حلق غرغره ملین با فحید و مقویه
قابضه موافق حالت مرض باید استعمال گردد و هم نافع است غرغره با محلول
داراشکنه و نیز با سنک جهنم بپزند و در کوفت مستقیم اما لکنند که با این تجمیع
نکود

نکود و بعد قبلا که از روغن زیتونی با فحید را الوده بکند زرد و در جراحات پنی زرد از محلول
داراشکنه کنند و با سنک جهنم بسوزانند و استنشاق کلل نمایند و از اندرون نیز ادوی
زیتونی بکار برند

و ررم کوفتی اغشیه نادر است که ورم کوفتی غبیه تنها باشد و غالباً با هم میکنند
بابک سفیدی و بیشتر پرویش در یک چشم است و عموماً مرض همراهی کند با وضع شد
در چشم و همان طرف سر بد و آنکه تعبیری در خود چشم بد شود و بعد با صرغتحل گردد
از شمعاع مخرج است و مردمک غیر منتظم شود و حرکتش کم باقی گردد و اغلب این شکاف
بعضی که در فطر اطولش از بالا بپایین واقع شود و در اطراف او مشاهده کرد بعضی
قرمز رنگ بامسی و کاهی از اوقات غبیه ملتصق گردد بقرینه یا با غلاف عدس بلوری باشد
که بعضی از دامایل صغیر در همان انهم رسد و بالاخر مردمک بکلی فانی گردد و مرض
اعی گردد و این انتهی نادر است و چون از ابتدا ای مرض معالجه کنند تبدیل به صرغ
میکردد و اغلب جرح از این چشم بان چشم دیگر سرایت کند
علاج بعلاوه معالجه زیتونی از داخل گردد چشم ورمی باشد فصد کنند و لو
بصدغ باین کوش اندازند و با شویبه و مسهل بکار برند و بعد متوالیاً شمع ذاب
بصدغ و پیشانی و خلف عتق اندازند و محالها را بار و غن زیتونی بپزند و هم نافع
نماید این بار و غن زیتونی چه ساذ و چه مرکب با بلادن و زین کوش

و ررم پینه کوفتی از اثر کوفت فراجی کاهی از اوقات متجمیع و بزرگ میشود و
این تجمیع با ورم پینه است که از اثر سوزنک باشد و این است که در اینجا ابتدا و
از خود پینه است که سنگین گردد بدون احساس وجع و ترشح منی نقصان پذیرد
و زرقار مرض مخصوص بطور اطفال است و هیچ فرق مابین این ورم کوفتی پینه با ورم
مرض ساده با سرطانی او نیست جز از حالت سابقه مرض و علامات لاحقه حین

مرض بصورت قبل از معالجه و بریدن پینه او و کوفتی بکار برند

علاج از داخل املاح زینتی و از خارج تدهین باروغن زینتی با پدی و ضماد محل
و فشارالت با شمع و باخلبون بکار برند

کوفت اغشیه الحاف نادر است که کوفت بغشاء الحافی رسد و چون سزا
نماید و اغلب رطوبات صافله است که بعضی طغای متفرق با جمع صلب و بدو و حج
ملحوظ گردد و جلد موضع اغلب مبتلای مجره گردد و در وقت اینها بطی است و بعضی از آن
و آنجا تجلیل رود و برخی بر می نشیند و در این صورت اخیر جلد قرمز شک نازک گردد و بعد
که و کشته و مشقوب شود و بر می خون الود و غیره را خارج کرد و در جراحه حاصل مسو
مشابه است بجراحات اونیفک و مانند آنجا عسر العلاج است و اثر جراحه با جراحه اغش
چسبیده با غشون نماید موضع را و این مواد باشد که سنوات کثیره دام کنند و بر وزن شان
نه تنها در غشاء الحافی اطراف است بلکه در غشاء الحافی تحت مخاط دهان و حلق هم
بروز می کنند

علاج چون این علامات اغلب همراهی می کنند با سو القینه باید او و بر خرو
مقوی و حمام قلبانی و معطر بکار برد و تدهین از املاح زینتی و پدی نمود و چون
توجه شود موضع را بکشایند

کوفت غشاء عضلانی و بعضی و عظمی بوزن کوفت در این انساج زما
طوبی لازم دارد و ظهورشان عبارت است از کشیدگی عضوی از اجاع عظمی از آن
بر پوست و اگر و ستون و چنانچه سابق کفتم علت کوفتی عظام اغلب در غشای است
که چندان پوشیده نبوند و سخت بوند مانند عظام مجره و ترقوه و قصبه کبری و قص
و نرند اسفل

فقره اول در علل کوفتی عضلات و اوقات اثر کوفت کاهی از اوقات در یک یا چند

عضله

عضله و جمع حاصل شود و مهم که در شب شدت نماید از حرکت و فشار و حرکت تنگی
ساق شود و عضله کوتاه گشته در حالت تشنج دائمی ماند

فقره دوم در علل کوفتی عظام اغلب از مرضی بیان کنند و جمع در طولی
بدون آنکه موضع مخصوصی داشته باشد و این وجه که ناضل است شبها شدت
نماید و عرض برای ارام کند ولی از فشار شدت نماید و باشد که مدتی اینجا
در عظم بماند بدون آنکه تغییری در رنج عظم دهد و گاه همراهی کند با چند پینه
بالا و ستون و این وجه از عرق النساء و سایر اوجاع عصبانی متمایز است باینکه
در عصب عصب آفت نیست و از جمع مفصلی متمایز است بواسطه بزرگی و شدت
در شب و بزرگی بدن و محل جمع مهم است و عضو حرکت طبیعی خود را دارد
مگر در و مسکه تغیراتی بهم رساند و بر پوست و شلخته می شود بواسطه ماده که
بروز کند در سطح عظمی که بکلی محذوف نباشد در لیس قدری خمیری بود و این مواد
باشد که مدتی بیک حالت باقی ماند و بعد با تجلیل روند یا کشته شوند و این
صورت اخیر طوبی خارج شود که بسیار شبیه است بیاض السیخ و بعضی از
اینها منتهی بر می گردند که چون کشته گردند قهقهه شان با نر بماند بواسطه آنکه استخوان
عنه شان بپضیع مانده و بر می گردیده است و اگر و ستون عبارت است از ماده که
بتوان محذوف شد و در سطح عظام بروز نکند و این مواد صاف با ماهی و خوا
بود و همیشه سخت میباشند و وقتی که در موضعی بروز نکند که خالی از عضله
باشد موجب عسر حرکت نکند بخلاف اگر در عظامیکه پوشیده از عضله
و چون در سطح داخلی عظام عرض بروز نکند بواسطه فشار بالات داخلی عظام
مورن خطرهای کلی خواهند شد مثل آنکه اگر و ستون سطح داخلی مجره موثر فلج
و فای عقل و شعور و تشنجات و غیره گردد و اگر و ستون محل مفصله موثر نزول آب

سپاه و حول و خروج مقله کرد و هکذا و رقاد اگر دستور بطور ازمان است و انجا
لا بقه دفع سوء القینه میکرد و ماده تجلیل مبروه و لا غلب با وجود دفع سوء القینه ماهها
باقی ماند و قرحه و ریم شدن عظم اگر چه بیشتر منتهی شوند ان پر پوستوز و اگر استوف
باشد که بدوی بودند و قرحه عظمی اکثر مشاهده کرد در عظام صورت و عظام قاعه
جمجمه در انوقت ملحوظ کرد ماده موجه که بزودی از فشار صدا کند و بعد استخوان
جدا شود چنانکه سابق ذکر شد و گاهی جلد موضع نیز مجروح و متورم کرد و عظم نرم
و قبله خیلی نباشد مانند بکریم متعفن و دایمی شود که مایه ضعیف خارج شد در بعضی
هلاک کند

علاج املاح زبیدی از داخل و خارج و استعمال اشمع در خارج نیز نه نمایند و انجا
بریم نشیند بکشانند و چون عظم نرم کرد بطوریکه در ساین نرمی شدن عظم
دفا کنند و مخصوص عظم نرم در او ریزند و خیلی نافع است بد و در دو بطاسم وید
دو فراموش کام

اما علاج قبل از وقوع تاکنون چیزی پیدا نشده که مانع از عرض انفرض باشد
شقی مگر آنکه مرضی از شفای خود و سری از جماع با دیگران کنند و اینهم که ممکن است
و طبیب را همین قدر میبرد که حتی القوه در زخم کوفت و سوزنک عرضی مانع از
جماع کند بهر صورت با وجود اینها اگر مرضی بخواهد جماع باید خود را پاک نگاه دارد
و قبل از جماع خود را بشوید و در محل عمیق نرق نماید و آب شستشو و آب نرق
هر دو باید اجهای کلردار را قلبائی با قابض نامعطر باشند و هرگاه شخص سالم بر بعض
کوفتی یا سوزنکی بجهت کند بعد از جماع باید ملاحظه کند که تفرق اتصال در الت
بهم نرسیده باشد و اگر جزئی خراشی به بیند با سنک جهنم بسوزاند و الت را با
اجهای قابض و مقوی بشویند و در فرنگستان مستعمل است یک غلافی از کاه

یا چیز

یا چیز دیگر که در وقت جماع بالت کشند و طایفه چندان مفید نیست زیرا که در هنگام
جماع با پاره شود یا از درون ماده داخل و سلبت نماید و در هر حال لازم است
از جماع خود را بشویند با اجهای کلردار و صابونی و اگر خراشی واقع شده باشد با سنک
جهنم بسوزاند و القوه بر بول نماید اما ماده از مجری بول دفع شود و اگر نزن حال
کوفت دیگر در مجله حفظ صحیح چنین بزودی املاح زبیدی بکار برد و اگر در چنین نوبت
زخم کوفتی در مجری رحم و مجل و فوج باشد با سنک جهنم بسوزاند ان مجاز برای
اگر سوزنک داشته باشد محلول غلیظ سنک جهنم بجمع مجل بماند و اگر برای
منع کوفت خارجی از ابتدای مرض املاح زبیدی بکار برند و هم ذکر میشود که در شهرها
عظام نرهای فاحشه و لجانک و که مبتلای یا نمرض هستند باید متفرق با در جانی
فران بول نری عبارت است از دانه های بدوی یا نوری که بزور کشند در آلات
خارجی قاسل و در مقعد و کشاله و ان و نیز بغل بطور پیچول یا پاپول که برآمدگی
های آنها از سه الی هفت میلیمتر و قطر شان از پانزده تا هجده میلیمتر است و
سطح آنها یک سطحی خون الود نشتر کند و عدد شان گاه زیاد و گاه کم است و همیشه
یک یا از آنها بزور کتی از ساین است و عسر العلاج قواست و او را ماد فران بول
نامند و در روی بعضی از آنها یک یا سه سپاه رنگ با فلسی بسته شود و در وقت
بعضی گوشت زائد نموناید بلون قرمز و دانه دانه مانند قوت و نمشک و بول
این شباهت است که اسم فران بول از زبان دانشد و اطراف این دانه اصلا بت بهم رسانند
و گاهی از وقت در روی آنها جراحتی بهم رسد و از جراحت رطوبتی متعفن و
خون الود جاری شود و فحیمد کرد و با مره ضخیم حاصل کند و این مرض میتواند علت
زیادی بیک حالت بماند بدون آنکه اثر در فرج نماید و باشد که بخودی خود
شود در این صورت ان کوشته از یادی بواسطه جرح است بر طرف و ان خیم آید

بماند و بندرت اش با لات عمیق کند و بعضی زوف و عظم و سد و بواسطه صفات
مخصوصه که وراست قنصل و خبلی اسان است و مقدمه المعرفة ان چندان
نلارد

اسباب این مرض بسیار است در اطفال و کینه و بروزش اغلب بلا واسطه است
و اگر چه در هر سنی عارض شود ولی در اطفال بیشتر از سایر است و سپاهان و
دور کهها مستعد تر است غرض ایشان از برای عارض این مرض و بخصوص عارض
شود در اشخاص ضعیف و صاحبان سوء القبه و به غذاها و بمسکنها و این
مرض است مسری بلا واسطه و بعضی گفته اند که مکرر و سیاه و هوم چون بروی
کوفی نشینند این مرض را بدیگران رسانند و بعضی گفته جز یک دفعه در یک شخص
بیشتر بروز نکند

علاج بعضی املاح زینتی بکار برند و برخی مستعمل نلارند و گویند چون
ضعیف بود اغذیه جیده و مقویه وادویه مره مستعمل نلارند بخصوص املاح
حدیدی و موسی کا نادران است که از داخل محلول سم الفان مانند لبلو
د و فلو بالیکورد و پیرسان بکار برند و از خارج پماد بونویایی بد و روغن
مستعمل نلارند و نیز موضع السونز آوند و استحمام در ماء فاتو و قلیانی و
نمایند و نیز نافع است حمام بخار و دوش و السلام تمام شد مقاله ششم
بات الوثری

نوع هضم ازده نوع امراض در تغیر تغذیه آلات بدن انسان

بلکنوع

بلکنوع از امراض هستند که نسبت آنها را نمیتوان فهمید مگر آنکه نسبت دهند
بتغیر یک در عمل تغذیه حاصل شوند اول تغیر در زیاد یا نقصان ذرات مستعمله
غذا ویم تغیر در قوام ذرات که بواسطه ان عضو یا ن شیج صلب تر یا نرم تر
از حالت طبیعی گردد ثالثا در تغیر تغذیه میتوان بقدری مختل کرد که یک عضو
با یک شیج یکی بر طرف شود پس این نوع امراض اقسامشان زیاد است و ما
ذکر مینماییم اول هیپریت روفی یعنی بزرگ الت مراد ویم او طر و فی بعضی
شدن الت مراد ویم اند وراسیون یعنی صلابت الت مراد ویم و امولسما
یعنی نرمی عضو را نیم غانغز یا ششم حرالت هفتم در بعضی علل که منتج
میکردند از امراض انواع فوق آنها عبارتند اول از تنگی و انسداد آلات هضم
ثانیا از انبساط و وسعت آنها ثالثا از اخراق و متعوب گردیدنشان

در هیپریت روفی یعنی بزرگ الت
هیپریت روفی عبارت از زیاد شدن تغذیه بزرگ التی هیپریت روفی بکار از امراض
است که خیلی مشاهده میشود و جمیع آلات بدن میتوانند مبتلای بدین مرض گردند
ان شیج با التی که مبتلای به هیپریت روفی گردد عموما حجم و قوام و وزنش زیاد
گردد و لویش با بحالت طبیعی بزرگ تر بکین تر بکارد و نکر از او است و شکل الت اگر چه
همیشه تغیر یابد و لاین تغیر بحدی نیست که بکلی از حالت طبیعی خارج شود و باقی
این تغیرات شیج داخلی الت بحالت طبیعی باقی میماند که عناصر تشریحی و
طبیعی مگر آنکه یک نموی حاصل میکند که در تشریح شیج ان الت بجهت مشخص
مثلا شیج غشاء عضلاتی رحم ملاحظه نکرد مگر در هنگام حمل یعنی آنوقتیکه
عمل تغذیه او زیاد از حالت طبیعی میشود و هم چنین غشاء عضلاتی معده و
که در حالت طبیعی خیلی کم نمایان وقتیکه هیپریت روفی در آنها عارض شود

الباق عضلات ایشان تا انتهای معبرشان میتوان تشریح نمود در جمیع آلات هیپرت
رونی حجم عروق دم آنها زیاد کرد و ولی الباق عصبانی بحالت خود باقی ماند
هیپرت در جمیع آلات و در کبد و در جزو او در آلات حرکتیه از انساج مختلفه
اغلب بروز هیپرت روئی در یکی از آن انساج است و حال آنکه سایر انساج
با بحالت طبیعی باقی ماند با هزال بماند و باین واسطه حجم الت در نظر با بحالت خود
است باکو چنانکه است و این نقصان حجم مخصوص مسائله که در در قتیله
هیپرت روئی عارض شود و آلات محووف خاصه اگر زیاد شدن حجم سبب
جوف الت باشد و باین واسطه جوف الت کمتر از حالت طبیعی شود و این قسم
هیپرت روئی مخصوص در قلب دیده شود

تخصیص تخصیص الت هیپرت روئی در غده اغلب سان است ولیکن چون
عروض او در یکی از انساج باشد و مجدی و نریک که در که تغییر کلی در شکل
رشد مستقیم کرد و با یکی از امراض اتفاقی و عموماً الت هیپرت روئی در عمل آلات
زیاد کردن عمل آنها است چنانچه هیپرت روئی که خیلی زیاد نشود خاصه در
بعضی آلات مورت زیاد عمل طبیعی الت است مانند هیپرت روئی عضله
دایره و کاهی از اوقات این مرض بواسطه ثقل و عسر قیله در بعضی از اعمال بدن
می آید و مورت خطر کلی میبک و چنانچه هیپرت روئی غده زائده بواسطه فشار
بر حری و قصبه الیه مورت عسر البلع و خفگی میشود و اینجا که هیپرت روئی
در آلات مرتبیه مانند دماغ و قلب عارض شود در جمیع بدن اختلال کلی
روی دهد ولیکن هیپرت روئی عموماً مورت اختلال در اعمال تغذیه
و اعمال بدن نمیشود بخلاف امراض اتفاقی که در هر موضعی که بروز کند
موجب اختلال کلی در اعمال عمومی بدن میشود و اینجا که هیپرت روئی

حرکت

مربک نباشد عدد فیبرین خون تغییر نیابد و عدد این جزو تغییر نیابد مگر در بروز امراض و بعضی
از هیپرت روئی ها عارض شوند در هنگامیکه عمل الت زیاده از حالت طبیعی شود و مثل
آنکه اگر یکی از ریهین یا یکی از ریهین فشرده یا بوطرف کردند و عمل او بکرون هم شغل او مضند
هیپرت در او حاصل کرد و ولی این هیپرت روئی مرضی نیست و مورت هیچ انقلاب در
اعمال نکود و بعضی اوقات هیپرت روئی عارض کرد و از مرضی حاد یا مزمن در خود الت
یاد را القی و جراحت هیپرت روئی غشاء الحافی بعد از ورم جلد با غلط و هیپرت روئی
جدار قلب بعد از آنکه در کاردیت و پرکاری دیت چون در بعضی از اوقات سبب سستی
از برای هیپرت روئی پیدا نمیشود اشتباهی که بسیار مایلند که از برای هر چیزی و لیلی
بیانی نمایند بعضی بر این معتقدند که در حله اند مثل تحریک تغذیه زیاد شدن قوه نشا
و این بر این چون چیزی نمیفهمند که مایه سکوت باشد نباید قبول نمود و در تفصیل
اشکالات لیلی طبعی باید عادت کند باینکه برهانی بادل لیلی را که نمیتواند ثابت بکند یا
دکند عجزه اینکه خیال همیشه مصروف بر آن است که این بر این راهادی علاج کند و بهتر
از آن است که چون شخصی سبب را نمیفهمد اوقات خود را صرف تحصیل مرض کند اکنون
نقطه کو میبکیم در میان آن هیپرت روئی ها اینکه سببشان معلوم نیست بعضی
هستند و بعضی چنان مینمایند که بسته اند بعمل تغذیه عموم بدن مثل آن خندان برهانی که
یکد ضعه در اغلب آلات هیپرت روئی عارض کرد و چون دماغ و عده زائده و صوت
و لجه و زبان و بعضی از عظام و قصبه عضوی هیپرت روئی شد باید را خنثی کرد و
باید هر حرکت را از او کم کنند و عمل تغذیه او را کم و عمل جاذبه را زیاد نمایند و باین واسطه
بر این وضع عمومی و موضعی را وید جاذبه مانند نریق و بد بکار بوند
در هیپرت روئی دماغ و ^{تشریح} علامات تشریحی در این مرض شبیه اند بعلاماتی که در
اختلال دماغ از آن سرب بهم میرسد چنانکه اگر جمجمه را ببرد دیده شود که الغلیظ

سبب او نمند و کشیده شده است که باد و انگشت او را گرفت و چون ام الغلیظ را از میان
 ببرند دماغ بکبار برپرون جهد و طریقه ها بزرگ و بچین کشند و بطون دماغ کوچک
 شده و در هیچیک از بطون و طویبت سرخی دیده نشود و جرم دماغ بخون و عروق و
 معصره ها محال اند از خون تقویا و آن رنگ نرنگه در مرض سرخ دماغ مشاهده میشود
 در اینجا نیست و قوام جرم دماغ زیاد و مشابه شود با سفید تخم سخت شده و موسوی
 حکایت میکند از یکدماغی که در نثر ضعیف شده بود قوامش بجای بود که اندک مقدار
 باد چاقو داشت

علامات و رتقا و انقباض مرض صلع همیشه با این مرض همراهی دارد و این صلع که
 شدید و متصل است گاه گاه مجدی شود که مرض بفریاد اید و قوای دماغی کم و گاه بکلی
 زایل شود و در بعضی قوای دماغی تا آخر باقی ماند و اختلالی بهم رساند مگر در اوقاتیکه
 وجع شدت کند و با آنکه بعضی تشنجات مرعی در میان مرض هم رسد و عروق این تشنجات
 مرعی را ابتدا بفصلهای نهاده است اما ابتدا ریح فاصله کم گشته تقریبا تشنجات متصل
 و با شدت و ضعف گردد و گاه این تشنجات منتهی شود با غما و بعضی از مرضی در روی با
 نمیتوانند بایستند و چنان مینماید که مبتلا شده اند بفلج عام و در اعمال قوه نباتیه
 کم اختلال مشاهده کرد و رتقا را این مرض بطور زمان است که بعضی قواشان بیدار
 تحلیل رفته بملاکت میرسند مانند کسانی که مبتلا بام الصبیان باشند و در بعضی بکلی
 بغیر بواسطه غشی یا تشنجات در رسد و بطور تحقیق دلم این مرض را نمیتوان تعبیر کرد
 گاهی چندین سال طول میکشد در این صورت باید فاصله برون علامت مرعی زیاد باشد
 تشنجات تشنجاتی از بسیار مهم و مشکل است و باعتبار کمال از دلم زیاد
 و عدم محمی و فلج موضعی و طریقه برون صلع و اختلال مشاعر و تشنجات مرعی
 با یکدیگر همراهی دارند این مرض غیر خادشود از ورم دماغ و ورم اتین و ورم شدن
 بکرمی

بکرمی از دماغ و زوال دم دماغی و دمل کسبه دماغ تو بکول و اسفیر و سبب جمیع مواد
 در یک موضع محدودی از دماغ جمع میشوند طویل نمیکشد که موجب برون اختلال یک
 موضع مخصوصی از اطراف میشوند و این اختلال ثابت کند که دو نیم کره دماغ با هم
 دیگر یکدفعه بزرگ نشده اند و لیکن در صرع و در ورم مزمن اتین و دماغ و در
 که یک علتی التي برقرار بطی واقع شود بر موضعی که فشار بر خط وسط دماغ دهد یا بجهت
 دو نیم کره بواسطه صلع و تشنجات عمومی و خای عقل و شعور متدرجاً جانشین شود
 با هیپرتروفی دماغ پس در تشنجات این مرض طیب باید دقیق باشد و بهر دو سخن بگوید
 تقدیر المعرفه کو با همیشه مهلك است

اسباب خیلی نادراست که پس از چهل سالگی عارض شود و در اطفال و شبان بلا
 بچان عارض گردد و در آنرا استعداد پیش از نرزان است و سبب بکری در این مرض
 نشده است و بعضی اوقات مولودی است

علاج هنوز علاجی از برای این مرض دیده نشده است مگر از فصد های موضعی در
 قاعه سرو طاع در اطراف و غیره که کامل که اطباء بکار برده اند و شاید املای وسیقی
 بدی جایز الاستعمال باشند

در هیپرتروفی نخاع هیپرتروفی نخاع بسیار نادر است و اینجا این مرض
 که مخصوص موسس و هورن و موسس و موفون نقل کرده اند بسیار معدودند و هیپرتروفی
 نخاع در کل امتداد او بادر یک جزا است در هر صورت باشد که الت مجدی
 بزرگ گردد که جمیع فضای ثقبه فقرات را بکمر و جرم نخاع در این صورت صلب گردد
 و هیپرتروفی باشد که در دو جزا او یا یک جزء او واقع شود در صورت اخیر در
 رمادی واقع شود و در این صورت بواسطه نمو یک ماده در ماده حاصل میشود
 ماده سفید بکه او را احاطه دارد و بیدر حنج نازک گردد و هم باشد که بر طرف شود

با این که در دو هیچ معجزی از علامات نیستند که بتوان نسبت به هیپرتروفی نخاع داد که گاه بر وزن علامات مانند صرع و گاهی قطری است و گاه شبیه است بعلامات ورم نخاع یا نرم شدن نخاع مانند وجع و تعدد و فالج در هیپرتروفی قلب هیپرتروفی قلب عبارت است از ضخیم شدن جدار قلب ناریخ مرض مَرکَنیه ضخامت قلب را بخوبی خود بیان نمود و با سیم ابوسریا ضخامت قلب و اتساع جوف او را استقامت نمود و گوید بر اثر با اعتقاد مورکوفی باقی ماند مانند در سینه عیسوی موسیو برتن در ابتدا به تنهایی و بعد با عانت موسیو بوبوا قضاای از برای هیپرتروفی قلب بیان نمود که هنوز از انقسام در علم باقی مانده اند و بعد از این حکیم توفی نزادی در شناسائی عظم و ضخامت قلب حاصل شد بواسطه نوشتجات لایک و شومیل و اندر ل و هوپ و موسیو بوبوا پس معرفت هیپرتروفی شد است و برای شناختن این مرض لازم است که ضخامت و حجم و وزن قلب را در حال طبیعی بدانند موسیو لایک می گفت حجم قلب در حالت طبیعی بقدر هشت ان شخص است و این نسبت لایک اگر در اطفال صحیح شده باشد در سربا بر اسنان خلل از نسقم نیست و معاصرین یک سلسله از اطفال خطا مدکور داشته اند که از مطالعاتها خوب میتوان تمیز امراض قلب را داد و موسیو بی نزد نموده است که یک اندازه معینی نمیتوان داد که در جمیع اسنان بکار برده شود زیرا که حجم قلب جوفهای و باسن همیشه در تنایب است که هر چه سن زیاد شود جوفهای و بزرگ شود و همیشه قلب زنان از قلب مردان کوچکتر است و قلب بستره باندازه شخص نیست اما نسبت زیادی دارد با چنانی سینه پس لازم است که اندازه های چند برقرار نمایند که هر یک از آنها مربوط باشد بیک مدتی است و یک نوعی از جنس زن و مرد و لایک ضخامت جدار بطن این را مقیاس قرار داد

بود

بود از برای تشخیص جدار بطن اسیر و این مقایسه غلط است زیرا که جدار بطن اسیر و وزن برون ضخامتش متفاوت و حال آنکه جدار بطن این یک حالت باقی میباشد و اگر ضخامت جدار و بطن مثل هم باشد در سربا بر اسنان اختلاف کلی بهم میرساند و ضخامت جدار بطن اسیر در هر جای یک هیچ نسبت که جزء وسطی و اعلا در جدار ضخامت را دارد و بالا پیش متوسط و نقطه اش از هر کجاست و در بطن این برخلاف قاعده ضخیم و وسط متوسط و نقطه کمتر است

در ارتفاع قلب

سن	مرد	زن
از يك تا چهار	۵۵۵۲	۵۵۵۱
از ۵ تا ۹	۵۵۲۲	۵۵۶۱
از ۱۰ تا ۱۵	۵۵۷۷	۵۵۷۱
از ۱۶ تا ۲۹	۵۵۹۶	۵۵۱۹
از ۳۰ تا ۴۹	۵۵۹۱	۵۵۹۴
از ۵۰ تا ۷۹	۵۱۰۳	۵۵۹۶

در عرض قلب

سن	مرد	زن
از يك تا چهار سالگی	۵۵۶۱	۵۵۵۹
از ۵ تا ۹	۵۵۲۵	۵۵۶۷
از ۱۰ تا ۱۵	۵۵۱۴	۵۵۷۱
از ۱۶ تا ۲۹	۵۱۰۳	۵۵۹۶
از ۳۰ تا ۴۹	۵۱۰۱	۵۱۰۰
از ۵۰ تا ۷۹	۵۱۱۱	۵۱۰۵

در قوت

در قطر قلب

سن	مرد	زن
از يك تا چهار	۵۵۲۵	۵۵۲۳
از ۵ تا ۹	۵۵۲۹	۵۵۲۷
از ۱۰ تا ۱۵	۵۵۳۲	۵۵۲۱
از ۱۶ تا ۲۹	۵۵۴۰	۵۵۳۲
از ۳۰ تا ۴۹	۵۵۴۰	۵۵۴۰
از ۵۰ تا ۷۹	۵۵۴۶	۵۵۴۲

ضخامت جدار قلب در قاعه او بدون ستونهای عضلات

سن	بطن اليسر	بطن ايمن
از يك تا چهار	۵۵۰۷	۵۵۰۳
از ۵ تا ۹	۵۵۰۱	۵۵۰۴
از ۱۰ تا ۱۵	۵۵۰۹	۵۵۰۴
از ۱۶ تا ۲۹	۵۵۰۴	۵۵۰۵
از ۳۰ تا ۴۹	۵۵۱۱	۵۵۰۵
از ۵۰ تا ۷۹	۵۵۱۲	۵۵۰۵

در ضخامت جدار قلب و روست بدون جدار عضلاتی

سن	بطن ایسر	بطن ایمن
زن	مرد	زن
۹ تا ۵	۳۰۰۲	۳۰۰۲
۱۰ تا ۱۵	۳۰۰۴	۳۰۰۲
۱۶ تا ۲۰	۳۰۰۴	۳۰۰۳
۲۱ تا ۳۰	۳۰۰۴	۳۰۰۴
۳۱ تا ۴۰	۳۰۰۴	۳۰۰۴
۴۱ تا ۵۰	۳۰۰۴	۳۰۰۴

ضخامت جدار قلب و نقطه او

سن	بطن ایسر	بطن ایمن
زن	مرد	زن
۱ تا ۴	۳۰۰۵	۳۰۰۲
۵ تا ۹	۳۰۰۶	۳۰۰۲
۱۰ تا ۱۵	۳۰۰۶	۳۰۰۳
۱۶ تا ۲۰	۳۰۰۸	۳۰۰۳
۲۱ تا ۳۰	۳۰۰۸	۳۰۰۳
۳۱ تا ۴۰	۳۰۰۹	۳۰۰۳

ضخامت

ضخامت جدار بین دو بطن در وسط

سن	مرد	زن
۱ تا ۴	۳۰۰۸	۳۰۰۲
۵ تا ۹	۳۰۱۰	۳۰۰۱
۱۰ تا ۱۵	۳۰۱۰	۳۰۰۱
۱۶ تا ۲۰	۳۰۱۲	۳۰۱۰
۲۱ تا ۳۰	۳۰۱۲	۳۰۱۱
۳۱ تا ۴۰	۳۰۱۳	۳۰۱۲

در وزن قلب

سن	مرد	زن
۵ تا ۱۰	۲۶۴ گرم	۲۵۶ گرم
۱۰ تا ۳۰	۲۷۲ گرم	۲۵۶ گرم
۳۰ تا ۵۰	۲۹۸ گرم	۲۶۰ گرم
از ۵۰ تا ۶۰	۳۱۲ گرم	۲۷۲ گرم

از ۶۰ تا ۷۰ میلادی
 این شرح مرصی هیپرتروفی قلبیاد در هسالت است بادریک بادریک جوفیاد
 عروضا این قسم اخیر بیشتر از نوع اول است چون هیپرتروفی و در هم قلبیاست
 او شود که ۳ یا چهار مقابل حالت طبیعی کرد و وزن او که در حالت طبیعی عموماً
 ۲۵۰ تا ۲۸۱ گرم است ۳ یا چهار دفعه زیاده از آن کرد و ولی فادراست که از
 ۸۰ گرم تجاوز نماید و انقلابی که مذکور شده است در کتب که ۱۵۰ او و
 هزار گرم وزن بهر ساند بودند که یا خلای از اغراق نباشد و قبلاً حجم قلب
 زیاد شود تغییرات زیاد در شکل و در وضع و در معبر و تناسبات او بهم میرسد

باین قسم که نقطه او محوشه مشکش مد و ریا گوی که دو قطر عرضی خیلی زیاد تر از
 قطر عمودی او خواهد شد و وضع او تقریباً در سبب بطور عرضی خواهد بود و نقطه او
 میل بطرف وحشی نموده از پستان چپ عادی شود با فاصله بین الاضلاع ششم یا هفتم یا هشتم
 و فاعله او زیاد با کم نزدیک تر خواهد شد و برین بنی بطرف چپ یا راست فشرده شود و فیکه
 هیپرت دوفی در یکی از تجاویف باشد عموماً بر و نریش در بطن اسپر است و این ضخامت
 که بندرت از ۲۴ میلیمتر تجاوز میکند باشد که شصت میلیمتر برسد و اعلا در جبهه
 عموماً یک قدر بالاتر از وسط جدار قلب است و فیکه این ضخامت زیاد باشد مخصوص و فیکه
 جدار بین البطنین هم متساوی باشد بطن ایمن و کوچک و ما بین اجانبه بالای قلب گردد
 و اینجا که ضخامت در بطن ایمن باشد نقطه قلب که در حالت طبیعی از بطن اسپر متشکل است
 فقط از او حاصل بد و در اینجا غالب ضخامت در ستونهای عضلانی است که در حالت طبیعی
 وجود این ستونها در بطن ایمن بیشتر لازم است و ضخامت جدار بطن ایمن عموماً از ۱۱
 میلیمتر است و باشد که ۳ میلیمتر برسد و اعلا در جبهه ضخامت در فاعله بعد از آن
 در نقطه او خواهد بود و دهلیزهای قلب بندرت منفرد ضخیم شوند و در این صورت ضخامت
 همیشه در خمیده های او خواهد بود و باشد که ضخامت دهلیز ایمن جدی گردد که مساوی شود
 با بطن ایمن و در دهلیز اسپر تا هفت میلیمتر میرسد و باشد که هیپرت دوفی در یکی از
 قلب باشد مانند جدار بین البطنین و نقطه و ستونهای عضلانی و غصه دلول و در اینجا
 قلب جوف و با بحالت طبیعی باقی ماند با کوچک تر شود و با بن مرکز و با بنواسطه معین آنها
 بر سه قسم تقسیم نموده و بحد یک اسم مخصوص داده است اول هیپرت دوفی ساده و دوم
 هیپرت دوفی مرکزی سیم هیپرت دوفی محیطی هیپرت دوفی ساده
 هیپرت دوفی که حجم قلب زیاد شود بدون تغییر در تجاویف و این نادراست
 هیپرت دوفی مرکزی که جدار ضخیم و تجاویف کوچک گردند و موسیو گردد و فیکه
 دیوانه



دیوانه و این نوع هیپرت دوفی را میگویند موسیو و فیکه که ضخیم شدن جدار و کوچک
 شدن جوف بسته بطریقه مرون است نه آنکه خود مرضی باشد مثلاً اجماع آنها بر آنکه میگویند
 با آنکه به مشقت هلاک شوند در قلب آنها این حالت هم میرسد این قول صحیح است ولی نمیشود
 انکار نمود آن امثله را که موسیو برین دیوانه دوفی و موسیو و دشامبر و خود مصنف
 میکنند و اشتباهی که قبل از مرگ جمیع علامات مرضی التي قلبه را نخواهد بود و بعد از مرگ
 در تشریح قلب مشاهده شد که جوف بطن اسپر که از طبقات عضلانی محو شده بود و حجم
 نظری که بن مرکز و گاه کوچکتر و گاه بحالت طبیعی بود و چون کوچک شدن جوف قلب بواسطه
 نمو عضلات و مرضی التي باشد اکثر انکشت در جوف قلب کنند و نخواهند او را متسع نمایند
 حکما طبقات عضلانی باده شوند برخلاف آن کوچکی جوف او و ضخامتش بواسطه نوعی از
 درون باشد اکثر انکشت در جوف او و کند منبسط گردد بدین آنکه حرق در او میسر شد
 هیپرت دوفی محیطی که بیشتر از سایر اقسام است و کور در بنال او را بر سیم الکبوی
 خوانند متصف میشود با اینکه ضخامت جدار قلب هم را می کند با اتساع جوف او و در این
 نوع از مرض حاصل گردد آن حجم و انداز و با دیگر سابق گردد و در این نوع از مرض بطن
 اسپر میتواند بجای متسع گردد که مشت مرتفع ممکن است در فضای او جا گیرد و عموماً
 در هیپرت دوفی قلب ماده عضلانی قوی تر و سخت تر از حالت طبیعی گردد و گاه
 برخلاف این دیده شود و اغلب ضخامت غشاء عضلانی قلب هم را می کند با بعضی علل دیگر
 مانند علل پرکاری و دلولها و غیره و باشد که قلب منبسط گردد بواسطه حصول خون
 بسته لبضی شده و هم مشاهده کرد در بعضی علل در آلات دیگر که هم را می کنند با متسع شدن
 از مرض قلب مانند استسقا و دانه های سکنه و آبوی و کزیشون کبد که ما برین
 حجم او گردد و غیره
 علامات در اغلب از مرضی احساس و جمیع در موضع قلب نمیشود و بعضی

احساس ثقل و کوفتگی در موضع قلب یافت میشود و اکثر طبیبان قلب بدون سببی واضح عارض
 گردیده که عموماً ماضی شود و بعضی و غشی و انجا که هیپررت روفی زیاد باشد در موضع قلب
 بک برآمدگی نمودار شود و اغلب ضربان قلب بطور مشاهد شود و نقطه قلب که منعطف شود
 بجانب یسار بین اضلاع ششم و هفتم و هشتم را پکند و بلند نماید و از پی کوسپون
 میتوان بخوبی محسوس و برامعین نمود زیرا که در وقت صدک در موضع قلب در حال
 از چهار الی شش سانتیمتر مربع است باشد که دو بام و دفعه زیاد از این کرد و در هفتم
 کدورت صدک بیشتر از حالت محسوس میشود و در زیر انمله احساس کرد و مقاومتی که
 در حالت طبیعی نسبت و بواسطه اسکلوسپون احساس کرد که حرکت قریب از قوی
 قلب قوی تر گردد و اغلب عجزی قوی میشود که دست با کوشی را که بحال قلب گذارند
 بلند میشود و چنان احساس میشود که از زیر یا چکوشی موضع را میگویند ولی این علا
 مدام عارض نگردد و خاصه عارض نشود و در وقتیکه انبساط قلب زیاد باشد در یک قطعه
 از زیر قلب محسوس شده باشد و در ان مواضع که هیپررت روفی خیلی زیاد باشد این حرکت
 مبهم و طولی است و انجا که هیپررت روفی کم باشد و انجا که تجا و یف قلب منبسط
 شده باشند اصوات او بلند و عظیم گردد که در زیر پتوقو این و از پشت شنید
 شود و در این وقت است که ۳ صد استنید شود و ان صدای سیم بواسطه خون ریزن نقطه
 قلب است بجدار سپینه و این صوت سیم را که شکل ان مطلبک نامند مخصوص بانمراض نیست
 بلکه در طبیب قلب های عصبانی هم شنید شود و میتوان این صدای احساس نمود بطور
 عارضه از گذشتن کف دست بر روی کوشی و از پشت دست کوپیدن با سر انگشت
 دست چپ این صدای سیم مانع نمکند از اینکه صدای طبیعی قلب شنیده شود
 و در این وقت ان اصوات گاه کوتاه و گاه غلیظه استماع گردد و هیچوقت با صدای
 دم همراه نمکند مگر آنکه در مرض همراهی کند با علت سرپوشهای قلب و هرگاه در هیپر

دوف

دوف قلب صدای دم شنید شود موقی و از عوارضات خواهد بود مانند در وقت چیدن قلب
 بشدت و این صدای دم که در هیپررت روفی قلب با انبساط جوف نادر است و در هیپررت روفی
 ما با هرگز زیاد است و این بواسطه این است که ثقب قلب تنگ میشود و فیض عموماً منتظم و اغلب
 بطی است و این بطور بواسطه این است که مدت انقباض تجا و یف زیاد میشود و عموماً فیض
 صلب و غریض و موجی است مگر در صورتیکه انبساط قلب جدی باشد که جلد ضعیف شود
 این صورت نبض این و ضعیف میشود و در هیپررت روفی مرکزی انجا که بطن اسیر خیلی
 تنگ شده باشد نبض کشیده و موجی و سخت است و صغیر و انجا که هیپررت روفی ساده
 باشد صورت بر اثر و خسته چشم ها برآمده گردد چنان بنظر میاید که حرکت خون قوی
 شده است و اعمال تغذیه و هضم اختلال پیدا نکند و عسر النفس عارض شود و بانند
 حرکتی تنگی نفس دفعی عارض شود و این علامات در ابتدای مرض چندان وقعی ندارد
 ولی چون مرض بانتهاد رسیده که تهیج در اطراف پیدا شود و حجم کبد زیاد گردد و خفگی در
 رزق صورت و کبودی در ریهها هم رسیده است و انما بد اقامت و زاین علامات در
 هیپررت روفی خیلی در قوا ضیق شدن ثقب قلب است
 رفتار و دام و انتهای مرض رفتار هیپررت روفی قلب عموماً بطی و در قوا بد
 و هرگاه مرض جزئی و بدون ترکیب باشد و هرگاه در مرض سرشته ضرر و پر بخوبی رفتار کند
 باشد که چندین سال زندگانی نماید و در غیر این برخلاف است که در چند ماه بهلا
 رسد مانند سایر اراض قلب هیپررت روفی در مدت دوامش بقا علیک زیاد است
 سار و انجا که مرض در بطن اسیر باشد رفتارش سریعتر است که باعتقاد موسسولوی
 دوام مرض در وقتیکه در بطن اسیر قلب باشد حد وسطش و سال و چهار ماه است
 اگر در بطن اسیر شش سال و نیم و باعتقاد معلم مذکور انجا که حرکت باشد با انبساط قلب
 رفتار و مقابل سریعتر است تا انجا که مفرط باشد و تا کون ثابت نشده است که این

مرض منقح شفا کرد و اگر چه لا نیک و لویه و هب و خرنندی هر یک بیان نموده اند که ابو البرکات
الطبرق قلب را یکبار هر یک معالجه نموده اند و بعضی از مصنفین قائلند که هیپرتروفی
قلب سبب بعضی امراض میگردد مثلاً آنجا که هیپرتروفی در بطن ايسر باشد سبب
و نوبی دماغ گردد و آنجا که در بطن ايمن باشد مورث همورثی و بکره و طاسانی مصنفین
و در این عقاید را کرده اند

تشخیص تشخیص دادن همان هیپرتروفی قلبی که نیست بلکه لازم است که محل و
نوع او را تمیز داد و هیپرتروفی قلب مخصوصاً تمیز داده میشود بحسب شدت قلب و ضعف
صداهای او و چون هیپرتروفی هر گاه با انبساط قلب از یک سو و سبب صدای خفکی
بیشتر و کامل تر خواهد بود تا بحالت مفردی و آنجا که حرکت قلب منقبض و اصوات ضعیف
و مبهم و نبض ضعیف و هر گاه با خفگی در موضع قلب بحالت طبیعی یا کمتر از او معلوم است که
هیپرتروفی در بطن ايسر است و از طرف الخط بعضی علامات میتوان فهمید که گاهی قلب بیشتر
علیل یا مخصوص کدام عضو از او است علت چنانچه اگر علت در بطن ايسر باشد احساس
ضربان قلب در نزدیکی عضاد برف ضلع پنجم و ششم و هفتم یا هشتم شود و صدای خفکی و بر
اندک سینه هم در همین مواضع است و نبض قوی و متمدد و توجی است و صورت
سرخ و برافروخته است و آنجا که بطن ايمن مبتلا باشد ضربان قلب احساس خفکی در
اسفل قفس است و علامات مذکور در نبض نخواهد بود مگر آنکه بطن ايسر هم مبتلا
باشد و مذکور شده است که در بزرگ و در بزرگتر که در هم حسن خفکی بیشتر گردد و در
او بواسطه جیل خون از بطن ايمن در او و بعضی از مصنفین معتقد شده اند بضرای
و ریوی و طحی و یکی ثابت است این است که و در این بزرگ شوند و آنند حرکتی هم
در آنها پیدا شود و این ضربان و ریوی و عظم و در این بطن ايمن نیست بلکه این
ان است که در اول مابین و بطن ايمن در حالت انقباض بطن ايمن در دست
بسته

بسته نمیشود و اگر این علامت ثانوی هر گاه بکند با علامات مخصوص هیپرتروفی
بطن ايسر نمیتوان گفت که بطن ايسر و مبتلا شده اند بلکه بسیار دیه شده است که در
هیپرتروفی بطن ايسر که هر گاه با انبساط زیاد قلب و بطن ايمن در طرف
و اعلا بوده شده بسیار کوچک گردد و این علامات با مرض هر گاه داشته اند و در
این علامات در این صورت البته بواسطه اختلال است که در گردش خون و ریوی
میرسد و هیچ علامت مخصوصی برای شناختن هیپرتروفی و بطن ايسر در دست
نیست ولی با اعتقاد موسس و بوی خلاف عقاید عامه آنجا که هیپرتروفی فقط در
باشد ضربان خود قلب خفیف تر از وقت است که در بطن ايمن مبتلا شده باشد
تشخیص هیپرتروفی از سایر امراض که شباهت به هیپرتروفی دارد در بطن
دیت و آنند و کار دیت و ذات الجنیه که هر گاه با ترشح و طوبیت است و در بطن
سر به و ابورسهای و ریوی و طیش قلب عصبانی نیز میباشد ولی با نند و قوی تمیز داد
خواهند شد مثلاً هیپرتروفی از بزرگتر دیت تمیز داده شود بعد از حی و عدم
حاصل از اصطکاک و باینکه ضربان جرم قلبی در بزرگتر دیت مبهم است و در هیپرتروفی
روغ شده بد و خفکی صوت سینه از یک سو و در موضع قلب اختلاف کلی در
یک از آنها دارد چنانچه در هیپرتروفی خفکی همیشه در یک موضع است و حس
زیرا است و حال آنکه در بزرگتر دیت موضع خفکی میتوان تغییر داد باختلاف تغییر
موضع و حس تفاوت در زیر نا مل کمتر است بواسطه طوبیت زبردست و آنند و کار
که بواسطه شدت ضربان و طیش قلب و خفکی یک سو و بلند شدن سینه و شستیه
میشود با هیپرتروفی تمیز داده شود بواسطه امواتیکه در قلب استماع گردد و بواسطه
مرفقار مرض که در آنند و کار دیت حاد و با حمی است برخلاف در هیپرتروفی و در
الجنیه که هر گاه با نشتر طوبیت زیاد که قلب را از موضع خود خارج سازد علامت

مخصوصه و در که ابتدا با هیبت و در وقت مشتبه نخواهد شد و چون با امفیزم و نزیکولو
 ابوسلمه گفتگو کنیم طریقه تمیز اخبار از مژگان و خواهم داشت و اغلب از اطباء پیش
 عصبانی را زیاد با هیبت و در وقت قلب مشتبه نمایند و این یک خطای بزرگ است زیرا
 که بجهت معالجه ضرورتی بر بعضی خواهد رسید در پیش قلب عصبانی که اغلب را می
 با انی و کلوز و تحویب در سینه بهم نمی رسد و صدای خفگی از حالت طبیعی تجاوز نکند
 و نفخ در اطراف پیدا نشود و علاوه خود طپش متناوب است و در فاصله هر دو سه
 اختلال از قلب و در نزیک و اینجا که طپش قلب با کلوز و انی همراه بود صدای دم با صدای
 اول قلب را می کند و بعضی صداهای شراپین استماع کردند و اوجاع عصبانی و بک
 در بدن بهم می رسند و عمل معده مختل گردد و جلد پرنک گردد
 تقدیر المعرفه اگر هم قبول نکنیم که کاهی هیبت و در وقت قلب شفا یافته است باز
 هم باید او را از اراضی خطر محصور داریم و خطرات و کمترین از مرض سرپوشه قلب
 قلب است زیرا که مگر مایه بر و در علی خطره میشود و در بعضی با هیبت و در وقت بیشتر
 نزدیکی نماید و هیبت و در وقت بطن ایسر خطره از بطن ایمن است و هر چه انبساط
 قلب بیشتر شود خطر مرض زیاد گردد
 اسباب سبب مرض باشد که انشی بود استعداد درون پیش از زمان است قبل
 از سی سال نادر و عمومیت دارد از نسی تا شصت و گفته شده است که سبب مایه
 خستگی بازوها شود شخص را با نمرض استعداد دهد ولی اعتباری در این قول نیست
 و از اسباب اتفاقیه تنگی طبیعی و از طبعی یا شراپان و در بلای و تنگی یک تا چند نفث قلب
 و عدم کفایت سرپوشه ها و هر علتی که مایه زیادی حرکت قلب گردد و این زیادگی
 مایه ان شود که قلب زیاد تغذیه کند لکن بزرگ گردد و بعضی مدی شکل سپند را
 که خارج از حالت طبیعی بود اسباب استعداد این مرض دانند و از اراضی مرده فقط

امفیزم

امفیزم و نزیکولو است در سبب بخلاف که خلاف این دیده شود که همیشه هر گاه کذب
 کوچک شدن قلب و نبض معتقد شده اند که حرکات نفسانی جماع و حرکات غلبه
 و از اطراد را شریب الکی شخص را مستعد با نمرض نمایند ولی اینها هم گفتگوی خیالی است
 اما آنچه معلوم شده است اند و کار دیت و پرکار دیت و در مرضی هستند که اغلب
 هیبت و در وقت قلب می شوند و با اعتقاد موسوس بود و وقتیکه پرکار دیت یکی قلب
 چسبیده شود صورت هیبت و در وقت محطی گردد ولیکن اغلب اوقات در وقت هیبت
 و در وقت قلب با جهته است یعنی معلوم نیست و بعضی اسباب هست که صورت هیبت
 و در وقت موقتی می شوند مثلاً فصد مکرر که در چند روز متوال خون زیادی کیرند
 جدار قلب ضخیم و تجا و نفث منبسط و عمل از اسبابیکه مایه بزرگ شدن قلب گردد
 اولی شراپ و در کردن تمام اسباب محرک است چنانچه شفا
 می کنند بمرض راحت بدن و راحت نفس و غذا را ملائم وضع جمیع اغذیه و شراپ
 بزرگ و منعش و اینجا که عسر النفس و حرمت و جبهه باشد از فصد تسکین فوراً
 کلی حاصل میگردد و در هیچ دم که هر کس قابل است باینکه علاج موقتی است بعضی و بلند
 که اگر زیاد بود بطریق الی رتبی که اسم شخصی است دفع مرض را خواهد کرد و لایک از
 اشخاصی بود که این طریق را پسند یک و عمل نمود که هر دو یا چهار یا هشت روز
 یک فصد عربی می نمود خون زیادی هم می گرفت و بمرضی که جوان و پر قوت بود
 زیاد از چهار صد و بیست گرم غذا نمیداد و از این مقدار بیشتر از شصت گرم کم
 سفید داخل داشت و شراپ بکلی ممنوع بود و وقتیکه بعد از نرد و ماه که باین قسم
 مرض را نگاه میداشت و طپش قلب و سایر علامات دفع شده بود بیک سرچ فاصلا
 میان دو فصد را زیاد میکرد و بر مقدار غذا می افزود ولیکن چون علامات دو
 اشتداد پیدا میکردند دوباره از این طریق را از نو شروع میکرد و همچنین از علاج

حاصل نمیکرد مگر آنکه جمیع علامات هبیت روی قلبی فامدت یکسال مشاهده نمیشد
 انوقت دست از علاج بر میداشت ولی این ماعدا و حشیا نه که لطیب و مرهم هر دو
 او نیز از بندرت با آنها پیروی شده است و گذشته از همه بعلاوه آنکه کو با هیچ
 کس لهجاق نگذرد است اغلب مرهم برادر و دو قهلاکت میرساند پس بهتر است
 از این نحو علاج و مار خوشتر است که فصد نشود مگر در صورت لزوم یعنی آنکه
 گردش دم در دست نشو یا خیلی قوی بود و ما ملاحظه میکنیم که گاهی از اوقات از
 فصد هم هیچ تخفیفی در علامات بهم نمیرسد و این در وقت است که هبیت روی
 قلبی همراهی کند با انبساط جوف او در اینوقت بهتر است که شخص یک فصد امتحان
 بکند یا آنکه چند عدد در او بمقدار اندازد تا اگر منفعت حاصل شد بعد هم میتوان
 خون گرفت و الا ملا و مسهلات خاصه مسهلا و ترشطیک که لایک استعمال میکرد
 فصد در حجاب در نزد نیا که بعلاوه عمل فصد که از آنها ناشی میشود دفع استسقاء
 که از آنها بروز میکند و در هنگام بروز استسقاء ملت مستعمل اند و بعضی از
 مسکنات مانند امید سپاند یک قطی و آب لوبیبه سر نیز استعمال میکنند ولی آب
 در این ادویه نیست و از جمیع ادویه مستعمله بهتر در بطال است که هم مسکن
 و هم بسبب مدد ریشی دفع استسقاء است و استعمال بطور ریح از نیم لی یک گرم با آنکه
 استعمال کنند شربت کرم که میگویم او حادی یک غنچه و غبار در بطال است و
 اغلب طبای فراموش نمیدانند استعمال غبار و کرم که قدر شربت در اطفال از یک سال
 یکم کرم شروع کنند تا یکده یکم و در بزرگان از یک کدم شروع کنند تا پنج تخم و
 تعقیب الکلی و از شش تا سی شش قطره مستعمل است و در تعقیب الطوی او هیچ
 نیست و بهتر از همه در بطال این است که از یک تا چهار مبلبکم که مساوی است به
 با چهل سانتیکم غبار و است و در بطال یکم از دواها نیست که هیچوقت شخص

باوعاری

باوعاری نمیکرد که در هنگام استعمال به مینوی و قوی در مرهم و فصد و با اشتها و ضعف
 دوا را هر چند میگرد و در اینصورت باید ترک دوا کرد و لازم است که خود لطیب بداند
 این علامات بر روی کنند گاهی که ترک دوا کنند که آنوقت در بطال عموما ماس و در بدن با
 و اینجا که معده قبول دوا نکند بطوریکه اندر نیک بکار بند که شمع بجای انداخته و در
 دوی جلد از بانه تا چهل سانتیکم غبار در بطال بریزند ولی در بطال این دوا نیم
 غلبه ان استعمال کرد زیرا که تحریک زیاد نموده باعث وجع شدیدا شود و بعضی از ادویه
 و غیر آنها برای کوچک کردن قلب مذکور شده است مانند داغ صدر و خوردن باد
 و ترکیبات او آب ویشی و آب معدن امس و آب کارلسبات و لیکن در هیچ یک
 از اینها کو با اثری نباشد

شرح مرهمی حجم کبد زیاده از انداز طبیعی که در چنانکه از نریاضات تجاوز نموده
 تا ناف و گاهی تا خاصه برسد و روی شکم و سر اسف وافر گردد اینجا که نموش روی
 باشد حجاب حاضر و مرهم را فشرده تا جای ذی صلح هفتم برسد و وزن کبد بمیزان انداز
 زیاده شود چنانکه از دهن تا هفت هن تبریز میرسد و اینجا که هبیت روی در حجاب
 کبد باشد شکل او بحالت طبیعی باقی ماند ولی چوبه در یکی از اجزای او و در سکنی حال
 طبیعی خارج شود و وزن و قوامش عموما بحالت خود باقیست و گاهی صفت غلبه
 در این صورت مشاهده کرد که حجم دانه های زرد او مانند آنکه در سیر فراست
 شده است و فرقی که با سیر ندارد این است که در سیر زردی رنگ حجم دانه های زرد را
 نماید باهر حال دانه های سرخ که بدین واسطه حجم کبد با بحالت طبیعی ماند کوچک شود
 برخلاف در هبیت روی که هر دو ماده کبد بزرگ شوند همیشه به حجم الت افزوده
 شود و اینجا که بزرگی مخصوص مرماه زرد باشد کبد و وزن بزرگ تر و صلب تر از حالت
 طبیعی شود و دانه دانه گردد و هر دانه از دیگری جدا گردد بواسطه شباهتی سفید

رنك كه حاصل شده از خرق غلاف پني كبد و با وجود بزرگي حجم كبد ترشح صفراي
 زرد رنگ در دلخه در مژده مجتمع گردد اغلب كم رنك و رقيق است
 علامات و افعاي مرض عموما ابتداي مرض معلوم نگردد و ب
 مرض را مستاهه نكند مگر بعد از چندين ماه يا چندين سال پس از ابتلا بمرض
 اولين علامت هزال تدريجي و قلت قوای بدن است اگر چه عمل هضم بحالت طبيعي باشد
 و گاه باشد كه اسهال ابروی دهد و غذا بجز هضم نشود و گاه برقان عارض شود
 و احساس جوع در موضع نشود و فقط در بعضي اشخاص احساس ثقل در شراش
 اين شود و چون سكر امكسوف نمايند قاعه صدر را طرف راست و چپ كاه راست
 بزرگتر بظاير و چون موضع را لمس نمايند احساس ماده صلب و صاف كرده شود كه
 بركو سپون بگلي كدر باشد و سمت اسفل اوندك و معوج بود كه با ساني فهميده شود
 كه ماده كبد است و بواسطه بركو سپون و اسكولاسيون انتهاي علای و رايبر با ساني
 توان شناخت و حجي عارض نگردد مگر در صورت تركيب و با وجود حجم زياد كبد هيچ
 وقت در اين مرض استسقاءي رقيق عارض نگردد و مرضي است كه دوام او بخيلي طويل
 است و بليشد كه منتهي بمرگ گردد و اغلب مرضي بواسطه مرض ديگر بمرگ ميرسد
 تشخيص هپريت و ف كبد محل ماده و شكل او و نازك و اعوجاج
 اسفلش ميتواند كه اين ماده از كبد حاصل شده است و ضلع اسفل ماده كه نازك
 و معوج است و معبرش از راست بچپ ميباشد نمي دهد قطعه اليه كبد را از سبزين
 معك و مشرب و هپريت روي طحال كه معبرش عمودي و با اضيب و است و ضلع
 اسفلش مدور ميباشد شش ختنه اينكه ماده متعلق بکبد است بسيار آسان است
 چيزي كه مشكل است اين است كه نوع او را نمي دهد كه اين چه ماده است از
 خلاصه حجم كبد بزرگ گردد و رقيقه خون از حالت طبيعي داخل و مشود و با آنكه يك
 ماده

ماده غير طبيعي در او نمونمايد زيادي خون نمي داده شود از اينكه او را سال علوق يا فصد
 بزودي حجم كبد بحالت طبيعي شود و لي نمي داند هپريت و ف از محصولات مرضي مانند
 كبسه ماني و با كبسه كرمي و سرطان حالي را شكل نميست و چنانچه بعد از اين خواهم
 ديد در كبسه هاي ماني و دودي بعلاوه علامت مخصوص خودشان شكل كبد هم تغير
 بايد و در سرطان بعلاوه آنكه حجم كبد بخيلي بزرگ نشود و فتاد سربع مرض و علا مانيكه
 از سبب بدين ملاحظه شود و زيادي استسقاء رقيق و علامات سوء القبه سرطان و شكل
 ماده كه بليند و است نمي سرطان و با ساني ميدهند و لي انجا كه هپريت و ف در م
 زرد كبد باشد و سطح او دانه دانه گردد و اين دانه از سبب احساس شوند مرض مشتبه
 گردد با دانه هاي سرطاني و عسرت در تشخيص پيشر شود اما چون دانه هاي هپريت و ف
 سخت و ميوجع ميباشند و دانه هاي سرطاني قوامشان بلك نچي نسبت كه بعضي مواج و بعضي
 از هشتاد تغير هيات بغير ساند و بر و زرشان فو ركي است و هراي نميابد با علامت عامه
 سرطاني
 تفايم بين المعرفه مرضي است بخطر
 اسباب و ف هپريت و ف كبد چيزي را سبب و معلوم نشد است مگر آنكه
 ميتوان گفت كه از كثر سپون هاي مكر را مياند كه سبب زيادي تغذيه اكل كردن و خري
 در اين اولي معلوم شده اين است كه اهل سر سبر كه در گرم سبر روند و خورون اب
 جو كه بعد نوك شق نيز از اسباب مرض است
 علاج استفراغ دم و مسهلات مكر و خوردن املاح ذيبني و ندهين با اغا
 ندهين با املاح بدی و سرب و استخام ادويه الكلي و فاع و غيره از هپيك منفعتي
 جهت مرض حاصل نسبت و طبیب هم اينها را امتحان كرده در ايجاي معدي بفرستد تا نفر
 از معالج ميشد باشد

www.tarikhem.org

www.tarikhem.org

در بیان سیر کبد

سیر کبد که معنی موم است عبارت از تغیر مخصوصی است در کبد که بعضی از اجزاء او
 بزرگ شوند و برخی هزال یابند و آن اجزاء که بزرگ شوند لونی حاصل نمایند شبیه بلونی
 موم زرد
 تشبیه مری از برای این مرض و درجه فرض شده است در درجه اول تغییر در
 شکل است هم مری و حجمش بحال طبیعی است و گاهی هم اندک بزرگ شود و وقتی که کبد را
 بشکافند و آن دانه او بیشتر بظهور آید که بعضی از دانه که یکی سیاه و یکی زرد رنگ
 نمودار گردد رنگ زردی غالب شود و این رنگ زردی بواسطه دانه های مدور است که بزرگ
 از دانه های طبیعی کبد است و حجم این دانه ها که بقدر نخودی و در درجه دوم حجم کبد کم شود
 و در آن دانه های بسیار هم رسد که رنگشان شبیه است بزرگ چرمی که های زرد و
 و قشقرق زاده از حالت طبیعی شود و چون صفای کبد را بر دارند و ملاطفه نمایند
 شود که هیچ الی مرکب شده است از اجتماع حله ها صفای زرد رنگ و قریب به زرد
 که این حله ها گاهی بیک سبزی ملتیقوشه اند و آن هم جدا شوند بواسطه خطی
 سفید رنگ و باشد که غشاء مجرای کبد بزرگ شود و بزرگ شده است که سطح مجرای
 ملتیق مجرای کبد گشته است و عروق که از کبد عبور میکنند باشد که مسدود شوند
 اغلب فضای آنجا تنگ شود و بندرت اوسع گردد و اشخاصی که باین مرض هلاک شوند
 در مری از آنجا دیده نشود و صفرا بیک در جوف او است زرد رنگ و قریب به سیاه است و در
 اغلب استسقای زرق همره است و گاه استسقای لحمی هم در اطراف مفاصل دیده شود و بعضی
 علل در قلب و کلیتین و ریه مشاهده کرد که بزرگتر از آنجا که قبل از بزرگ شدن کبد بعد
 از او است

علامات و زرفاد آنجا که بزرگتر از میان یکی از امراض موم زرد استسقا اما
 مری زرد

مرض قلب و کلیه باشد مادام زندگی مرض شناخته نشود و آنجا که بد و عارض گردد و در کبد
 بزرگتر از معلوم نگردد زیرا که هیچ دردی در شراستیف این نیست و اشتیاق به غذا و عمل
 هضم بخوبی است و برقان عارض نمیکرد پس هیچ علامتیکه دلیل بر اختلال کبد باشد
 بزرگتر نماید اما مریض رنگش بلخته شود و لاغر گردد و قوتش کم شود و اغلب قبل از آنکه
 باین علامات التفات شود شکم از تشنگی طوی استسقای بزرگ گردد و چون مریض را
 نمایند هیچ یک از عللی که عموما مریض استسقا شوند در بدن نیابند و حجم کبد بحالت
 طبیعی است و با قدری کوچکتر و استسقا و بزرگتر و در قیاس است و گاه بیک حالت
 مقیم و بعضی اوقات نقصان یابد ولی بکلی رفع نشود و چون شکم بسیار بزرگ گردد
 اطراف مفاصل بزرگتر میشوند و اطراف عالی و صورت و در بزرگتر از آنجا که باین
 مریضی یا بزرگتر از بزرگتر خاک شود و جلد خشک و در او خورده اشتیاق کم و هضم
 عسر شود و بول کم شود و اگر او اختلال عمل تغذیه بجهلاکت رسد و گاهی بواسطه بعضی
 ترکیبات مانند ذات الجنب و ذات الریه و غیره زردت هلال شود و زردت هلال همیشه
 بطور از زمان و در او مشهود است که سه ماه کمتر بده نشده و باشد که چند سال طول کشد
 و در آن انهای بلا شک کاذم مرض است

تشخیص مرض هیچ علامت مخصوصی نیست که دلیل بر وجود سیر باشد و شناختن
 نشود مگر بطریق نفی مثلا کسی که بد و استسقا شد و در او هیچ علت الی که سبب استسقا
 گردد یافت نشود و هیچ ماده در شکم نباشد که بزرگتر از کبد فشار دهد باید فرض
 که سیر است و در این صورت اگر از یک سو بدون معلوم نشود که حجم کبد نقصان پذیرفته
 احتمال بیشتر میشود و خطوطی جمعی حاصل نمایند زیرا که اطراف و فی ساد کبد هم مریض
 بزرگتر از این علامات میگرد و در این شک چه از برای تشخیص و چه از برای علاج
 چندان عیبی ندارد

علامه المعروفه مرضی است لاعلاج

اسباب، نادر است در اطفال و اغلب عارض شود در سن وقوف و مردان بیشتر از زنان مبتلا شوند و مشهور است که افراط در عرق شراب سبب این مرض می گردد لیکن هنوز ثابت نشده است و امراض آلبه قلب یکی از اسباب مستعد این مرض اند و جناب مسبو یکرل یافته است که اشتیاق صید که از سبزه می برند در بعضی نشان قلب مبتلا است و ثلث آنها که از اعراض قلب می برند سبزه دارند و کوبلوم مذکور داشته است که سبزه یکی از علامات کوفت در جبهه و بیم و بیم است و هیچ دلیلی برای اثبات قول خودش ذکر نموده است

الاج هیچ یک از معالجاتی که تاکنون در این مرض بکار برده اند دفا در مرض را تغییر نداده است و از جمله آنها است مصرف جلدی و مسهلات و مدترات و مقویات و ادویه الکلی و زینبی

در بیان هیپرتروفی طحال

تشخیص هیپرتروفی باید فرق داد که ترسبون طحال و اگر هیپرتروفی که ترسبون طحال اغلب بزرگتر بطور حاد است و شناخته شود از بزرگی حجم الت و مقدار زیاد عروق خون بسته شد که در جوف الت است و ترمالت و این مرضی است که در تب قوید و اولی نوابی که کردیم و عموما همراهی غایب با هر ضربه که مورث قلت فیبرین خون شود هیپرتروفی مرضی است مرفن که حجم الت خیلی زیادتر از قسم اول است چنانکه از دیواره خارج شده تا ناف و گاهی بخوضه خاصه رسد و از طرف اعلا هم باشد که حجاب حاجز و پرده را فشرده تا ضلع هفتم بالا رود و وزن او همچون انداز زیاد شود که در حالت طبیعی بقول کرد مله اذاعا ۲۵ گرم است و باشد که تا پنج جلد و زینبی که و شکل و لونش بحالت طبیعی است و قوامش افزوده شود که او را چون تیرند نسج او

سخت

سخت و خشک تر از حالت طبیعی است و شبیه بفصل و یا به کبد است و غشاء مجلالت

طبیعی با ضخیم تر شود و گاه در او قطعه غضروف ماعظم پیدا شود علامتها

علامات و قیاسها در هیپرتروفی طحال خبلی بزرگ شود بدون آنکه

هیچ اختلالی در اعمال طبیعی هم رسد چنانچه هر کسی چندین بار دیده است اشتیاق را

که ظاهر اتمام علامات صحت در آنها بوده است و طحالشان خیلی بزرگ شده بود

اغلب وفات هیپرتروفی طحال همراهی نماید با اختلال از چند و آنجا که هیپرتروفی

متبع شده باشد از نواب خرمه لون شخص زرد مانده و شخص کم قوت و ضعیف

شود و استعداد کلی برای نواب هم رساند و آنجا که عرض هیپرتروفی بدون سببی

معین باشد شخص قدیم هر از ایابد و قوایش کم شود و رنگش باخته شود و بعضی

احساس ثقل یا احساس صعب و شرا سیف ایسر نماید و خوابیدن بدست است

خیلی مشکل شود و اغلب چون مرض شکم و لمس نماید احساس ماده متراکم کند

و این ماده باشد که جمیع طرف را ببرد و سطح اوصاف و سخت باشد و اغلب این

فشار بر با و جمعی روی ندهد و اگر هم روی دهد خیلی کم و از طرف قدام و اسفل

متبعی شود بیک کنار کرد و کلفت و از طرف اعلا از شرا سیف و بیالارود و

طرف چپ سینه منبسط گردد و از بزرگی کوسون صدا بکلی که و احساس می شود که

موضع جسمی صلب و سخت و ضخیم است و بواسطه بزرگی کوسون از جانب اسفل و

قدام بهتر از لمس میتوان او را محدود نمود و از طرف اعلا فقط از بزرگی کوسون حد

او معلوم میشود و اشتیاق صید طحال آنها بزرگ شود لون مخصوصی در تمام بدن آنها پیدا

میشود که بزرگ جلد سرهای پر گردد و این لون نامید شده است لون طحالی و لون غشاء

غضاط نیز کم گردد و اشتیاق نقصان یابد و در هضم عسرت هم رسد و گاه کاهی اسهال عادی

شود و بعضی را عسرت در رگم هم رسد و گاه مرفه خشک نمایند و بالاخره پسلی تر

کم باز با استسقای ترقی بر وزن نماید و اطراف مساوی متغیر شوند کم کم قوی فانی ^{کنند}
 در رسد و عموما مرض بدون حمی میباشد مگر وقتیکه مرکب شود با مرض وری و این ^{یک}
 دلیل است بر اینکه بزرگی طحال با لاساله سبب نوبه نمیشود و بعضی از مصنفین ^{بی}
 اند که عظم طحال مورث امراضی چند میشوند مانند عاف و بواسیر و دست طای
 و قرحه ساق و نفوذ الدم و حمی و هیچ دلیل برای اثبات این اقوال ندارد چنانکه
 ثابت شده است این است بزرگی طحال سبب است با هر اوست نفوذ الدم معدی و
 این نفوذ الدم که همیشه مرضی است خطیر اغلب موجب هلاکت مرض میگرد و دو سبب
 که بزرگی میفرماید من خودم میجمع اکادمی طی نموده یک طحال را که زیاده از یک من و یک پانز ^{یک}
 وزن داشت و او را از شخصی برداشتم که مرده بود بواسطه نفوذ الدم معده و چنانکه
 گرم خون قی کرده بود و این نفوذ الدم معدی علتی است که بواسطه فشار طحال عسر
 درد و ران دم معدی حاصل میشود و بر پیش خون همیشه بطور فشار است نه بطور
 خوق عرقی که قدام معتقد بودند و ترقی و مرض بطور بطی و از زمان است و سالها
 و ماهها طول داد تا آنکه طحال بزرگی که ذکر شد بوسه و معلوم نیست که طحال
 هیپرتروفی شده و یا بهر بحالت طبیعی بتواند رجعت نماید بانه و آنکه که بشفا
 این مرض معتقدند البته حالت کنترسپون بحال را از حالت هیپرتروفی و آن نیز
 نداده اند و دلیل بزرگشان آن است که از استعمال کنند بعضی طحالهای بزرگ
 درد و سوزش بحالت طبیعی رجعت نموده است ولی این طحالها انهای بوده که
 پس از تیغ زنی با بعضی نواب بزرگ شده اند و بزرگی آنها فقط محض میل جم با آنها
 بوده است و بدیهی است که طحال هیپرتروفی شده که جرمش سخت و صلب و شش
 عضلانی با کبدی شده باشد در صورتیکه مرضی قابل علاج بوده و درد و سوزش
 سهل است و چندین ماه هم بهیج دوائی نمیتواند بحالت اصلی خود رجعت ^{نماید}
 نماید

تشخیص اشکالی برای شناختن طحال بزرگ شده نیست چون همیشه از زین
 اضلاع تجا و ز نماید و بواسطه خفگی صدا و در و زودی که محل عبورش بخلاف
 معبر کبد است از لمس و پی کوسپون میتوان اطراف او را بخوبی محسوس کرد و در
 هنگام پی کوسپون با نواز که احساس خفگی صوت میشود و تحمل را با مرکب یا سناک
 جهت خط بکشند بخوبی پس از تمام عمل شکل طحال معین خواهد شد و شکل طحال
 بزرگ شده بشکل بیضی است که اطول اقطارش بطور عمودی باشد و در وقت پی کوسپون
 باید از سمت فوق حد و طحال را بپای معین کرد که چنانچه مدکور شد اغلب در
 جوف صدر صعود نماید و چنانچه پیری نشان داده است باشد که حجم طحال از پست یک ^{سای}
 سانیته طحال تجاوز نماید بدون آنکه از پراضلاع نمایان شود
 قدما ^{قدما} عموما مرضی است خطیر و اگر بعضی اوقات اختلالی در بدن ظاهر شود
 و طحال اختلال در عمل تغذیه بدن بمرسید استسقای ترقی بر وزن نماید و خطر
 بیشتر شود در آنجا که طحال خیلی سخت و بزرگ باشد و از نواب متجش شده باشد یا
 آنکه با نواب همراهی نکند
 "بیب" تقریبا تمام اشخاص که طحال بزرگ دارند در یک وقتی مبتلای بنوبه ^{من}
 بوده اند که بعد از معالجه شدن نوبه طحال بزرگی از حالت طبیعی شده بجهان ^{من}
 باقی مانده است و پس از یک دو سال که شخص نهایت سلامت را داشته باشد و نیش
 کاهی شده هزال باید و کاهی چنانچه مدکور شد عظم طحال بلا واسطه از نوبه است
 و پس از دفع نوبه طحال بجهان انداز مندرج بزرگ میشود و کاهی نوبه هم
 با آنکه طحال در بزرگی بزرگ میشود و این مسئله را باید چه برای تقدیر المعرفه چه
 برای معالجه بخوبی بفهمد و کاهی طحال بزرگ میشود بدون آنکه نوبه عارض
 شده باشد و با آنکه شخص در جایهای خوب دوا زنده گانی کرده باشد یعنی بدون



انکه سببی بتوان جهت او قائل شد

علاج انجا که منبج شده باشد از نوبه و خود نوبه هم هنوز دفع نشده باشد استعجال
کنه کنه دفع تمام علامات و امیکند و انجا که بروزش بدون نوبه بود و الت سخت
بحجم بود هر چند و نوبه کنه کنه بخوراند اثری نخواهد داشت و چون مشاهد کرد
که بروزی از استعمال کنه کنه و پا ازاد و بچند عظم طحال بحالت طبعی رجعت کند باید
بقین نمود که بزک او از کنه سبون بوده است نه از هیپرت و فی واد و بزرگی که
در این مرض مستعمل اند از این قرارند املح بدی از خاج و داخل و حمام الکلی و
مسکلات و مستفرغات جلدی و دوش و لی این معالجات همیشه بی ثمر مانده اند
استحمام در آب ویشی و کار سبب خاصه در خود سر چشمه ان ابهای معدنی کوئین
مفید است

در بیان کوئین و بعضی عظم غده زنده

این مرض عبارت است از هیپرت و فی غده زنده

شرح مرض باشد که هیپرت و فی در غده زنده بود با در قطعه از او انجا که
هیپرت و فی عام بوده باشد که حجم و وزن آن الت خیلی زیاد شده باشد یعنی وزن
تا صد مثقال متجاوز بود و فی الت و نوبه تو و سخی تو از حالت طبعی شود و او
شرط نمایند بر طوبت زردی لی خاج کوئین و عروق او حجم شوند و چون خیلی حجم
در جوف آن بعضی محصولات مرض یافت شود و بحجم او افزاید و این محصولات
اغلب کبسه های مائی است و بمسکه غشاء اولیضی یا عظمی یا غضری شود و گاه
اسفیدوسی یا سراطی نمود نماید و باشد که ماده سلع یا کبسه دودی و غیرها
بروز کند

علامات در نهاد مرض کوئین عبارت از ماده ایست نرم و خیری و پیوسته بدی

تغیر

تغیر در لون جلد و در پدهای موضع بزرگ شوند و شکل و حجم او بسیار مختلف است
که در همه الت باشد شکل او بعضی پاره پاره و راست و جمیع جز مقدم را فرا گیرد و گاه آن
جداشده بروی سینه و باشد که تا ناف بلکه تا سر زانو هم نوشته اند و رسیده و گاه فی
صعود نموده تا زپوش رسد و لی این بزرگها تا در راست اغلب یک با ده مشت مرض است
و انجا که هیپرت و فی در یکی از قطعات او باشد ماده در یک سمت کردن واقع خواهد
شد یعنی در طرف راست یا چپ حلقوم و فسیب و بندرت الت بشکل خود باقی ماند و
بخوبی محدود و محدود شود و در وقتیکه بواسطه ان زمان غشاء لحمی اطراف مبتلا شده و صلب
گردد و چون ماده در روی حلقوم واقع است جمیع حرکاتی که حلقوم در وقت نفس
و بلع مینماید او هم پیروی میکند و چون شرابین بسیار حجم از میان او عبور کنند ضریب
هم در او حجم رسد و گاهی اختلا ف زیاد در حجم او پیدا شود چنانچه در زنان در هنگام قاعدگی
بزرگ شود و بر طوبت هم همین اثر را دارد و بواسطه نسبت مرض بالآت دیگر بعضی اختلا
بروز کند چنانچه از فشار بر حلقوم صدا خشن و نفس عسر و کاهکاهی حملهای اختناق
ظاهر شود و از فشار بر مری در بعضی عسر البلع خاصه در اکل اغذیه صلبه بمرسد
از فشار بر دوجین عسرت در رجعت خون و سردی پیدا شده صلاع و تغلی و سر رفت
دهد و گاه کاهی کمتر سبون و هم نرف الدم و مائی عارض گردد و صورت کبوت و بزرگ
و لهما منتفع و سباه کردند و انجا که صعود کرده فشار بر غده بزرگ دهد و شیخ بزرگ زیاد
شود و گاهی سامع نقصان بمرساند و این علامات مخصوص بروی نمایند در وقتیکه
نخود غده بطرف خلف باشد به بطرف جلد و در این صورت باشد که حجم الت بسیار کم شود
و مورت علامات مذکور کرد و از انجا که در بعضی از بزرگ کوئین و جمیع شیوع دارد
و اغلب یک ثلث از مبتلایان بکوئین حق هم پیدا کنند بعضی از مصنفین بخطا افتد و گفته
که کوئین سبب حق کرد و لی این قول برخلاف است بدلیل انکه اغلب از جمعا کوئین دارند و

بعضی از فلان هم که کوثر شایع است حماقت نادر است و اکثر مبتلایان بکوثر بسیار
مردمان کافی و با عقل میباشند و رفتار این مرض بسیار بطی است که عموماً اذیت شش سالگی
تا وقت بلوغ بروز نماید و بتدریج نمیکند و باشد که سالها بیک حالت بماند و یکدفعه
بدون سبب معین بوزن شود و باز تا چندین سال بیک مجد و قوف بماند و در زمانی
دیگر نمیکند و بجمین ترک حاصل کند و در بعضی اوقات نموش بسرعت است که فقط در چند
ماه عظم بجز ساند و چون سن بچها با جهل و بیخ سال رسید و بیک در او غوغا نمود و اما
استعداد مرضی یکی از محصولات مرضی که قبل از آن شد و سر او یافت شود و باشد که بخود
خود مرفوع گردد و هر چه رفتارش سر بجهت تحلیش سر بجهت خواهد بود و اینجا که رفتارش
بطی باشد و چندین سال دوام کرده باشد میتوان گفت مرضی است که علاج له

تشخیص او این است که برای تمیز کردن چندان اسکالی نیست و یکباره نرم بدون تغییر جلد
که واقع باشد در روی حلقوم یعنی در حلق و زائده بسته نمیشود مگر از بیرون غده مذکور
زیرا که کپس مایه و دی با توجع است و امفیزم حلقوم خواست حاد و همیشه عارض شود
بعلا نریز و چون فشار بر او دهند حس کرده بپای اسپون شود سرطان غده زائده که مرضی
نا در تحت و بیست و بلندی دارد و موج و با انورین سیات و عاده های خنای بوی که
طوفین کردن واقع میشوند نیز کوثر متبیه خواهد شد در انورین هم ضربان هست و تمام
میشود و در وقتیکه فشار شغنی مابین او و قلب داده شود و حال آنکه اگر این فشار را مابین او
و عروق مغز بر دهند ضربان شدید تر گردد و مواد خنای بوی که در طرفین کردن میشوند
و در ابتدا از یکدیگر جدا بعد متلاکشته بالاخر عله چندی از آنجا به تحلیل رود و بعضی بزم
نشینند

تذکره الحرفه اگر چه نادر است که مملک باشد ولی مرضی است موفی و لا علاج
در وقتیکه در میان مردم آبی می شود

سبب

سبب او این است که گاهی موروثی است در زنان پیش از زدن بروز نماید و در زنان عارض
شود گاهی پس از جنس طبع و حمل و در هات پیش از شهر شیوع دارد و کثرتی که درون و
و خارج خنای بوی از اسباب مستعد اند و در بعضی از اممال این مرض شایع است و
چنان هم که شایع باشد امکان نیست است و در امکان مرفعه غیر شایع خواهد بانیواسطه بعضی
از مصنفین بر آن شده اند که سبب مرض رطوبت هوا و جاری نبودن لوات و لی چون
در امکان مرفعه کلیمین که هوا پیش خشک و پودا است و این مرض نیز شیوعی دارد معلوم میشود
که رطوبت هوا و عدم جریان او سبب این مرض نخواهند بود و بعضی از مصنفین هم باین
دلیل واضح سبب این مرض را از استعمال بعضی از اجهال میداند چنانکه بعضی کان میکنند با
باجها بیکه از بیرون میآید و بعضی دیگر از آنجا میداند که هوا پیش کم باشد و بعضی
از آنجا میگویند که املاح اهکی و نیز بیباد دارد معلوم است که این عقاید اصلی
ندارند در این او بخوبی دانسته اند که سبب این قفلان پاک شدن پلاست و راجها و
نمذها و هوای مستشفه به صورت آنرا اکنون سبب این مرض در دست معلوم نشد
استفاده همبیکه شده است و راجها بیکه این مرض اندمیک است از استعمال اجهال اینجا
و اینجا علت در آن اجهال است فیه نه شده است و اینجا که مرض اسیر ادیک باشد بسبب
او هیچ معلوم نیست

در وقتیکه ابتدای مرض باشد خاصه در سن شباب مرضی را از وطن
خارج نمایند و ستره و ریه او را خود حفظ کنند تا از غواقتند و تحلیل رود و چنانچه
در لان مدرسه برای آنکسها ساخته بودند و در آنجا تقریباً هر سال که درها مبتلا بکوثر
بودند بدون آنکه صاحب مدرسه معالجه و حوا آنها کند بعلت آنکه بقیه داشت که چون
ایشان بوطن خود مراجعت نمایند مرضشان بوطرف نکود پس از شطیرون کردن و بعضی
است از وطن خود میروند و حکمی بر آن است که اگر در هزاره شغال نمک طعام از یک عشر تا

مشغال بدو و چون با سبوم داخل کرده و آن نمک را با طعام بخورد مبتلا بر کولیت نشوند و اگر هم
 شک باشند بتخلیل جود انبرای این مرض و طاهای بسیار استعمال شده است و طبعی
 از اینجمله است مفرجات و ضمید محلول و خوش و داغ و عقد شرابی غله و نانک و عدلین و
 جود لمان بزک خواستند که او را برون آورند و برون آوردند و طایفه ای از آنها باید دست
 کشید یکی از او که بسیار نافع است بد میباشند که از داخل تعین او را باید و در و بونا
 سبوم استعمال کنند و از خارج هم روغنی از بد بمانند و بعد از بد سفنج سوخته نافع است
 و باید انقدر سوزاند که زغال شود و از عباد و طفل که از ده سال متجاوز است باید
 دوزی سه گرم در سه وقت داده شود

در بیان داء الفیل

عبارت است از تجمیع و هیبت و دفع جلد و غشاء لحمانی و وسیع تحت
 او که از این مرضان الت از حالت طبیعی خارج شود
 شرح این در موضع معلول جلد صلب و ضخیم شود و بشیر ضعیف و شکاف و به
 سختی جلد ملتصق گردد و بشیر موله بشیر که مابین جلد و بشیر واقع است مجدی بزک
 شود که طبقات او را میتوان تمیز داد و ضعیف است جلد باشد که بچه ها و سانه طری و بید و
 غشاء لحمانی تحت جلد صلب و ضخیم شده در میان حبابهای ماده سریشی نشینند و بشیر
 شود بجرم ماده اسفیر و می و عضلات بزک شک هزل بایند با آنکه مبتلا شوند به
 و گاهی دیده شده است که او دره موضع مسدود شده اند و غده و عروق جلد به محلی
 گشته اند و باشد که عظام هم باز شک شکند که بجهت ساند عروص این مرض در
 سافل خاصه در ساق است و بندرت در اطراف عالبه عارض گردد و اغلب در بطن است
 و گویا دیده نشده که هود و طوف بکده مبتلا شوند و جز معلول مجدی بزک که در ده
 شود بیای قبل با بنواسطه این مرض موسوم شده است بلاء الفیل و گاهی هم عارض شود
 در چنان شک

در چنان شک و بضر و لجهای بزک فج و پستان و صورت بتمامه با د بک جز او مانند لجهای
 و جفتی و غیرها بالاخره هیچ جز از بدن نیست که مبتلا نشوند
 عموما هر که کند با وجع در معده و سرد ساف و عروق جلد
 و اغلب اوقات در موضع مشاهده کرد تمام علامتیکه مخصوص ورم لمفاتیك است و
 لحاظ بخیلی متعجب شده مرض احساس شعری و جی و غیر نماید و اشتها کم شده گاهی قی
 عارض شود و این نوع نوبه ها که فاصله آنها چندین سال است باشد که در سالی چهار
 دفعه بروز نماید و پس از دفع هر نوبه بگوید در مرض هیچ علامت نماند مگر آنکه بخی
 در موضع و این تجمیع عروص هر نوبه بیشتر شود تا آنکه بجرم زیاد بجهت ساند و در ابتدا که نوبه
 چنان میباشد که از ترشح رطوبت ملای باشد ریاست و لیکن بعد بجد و صلب شود که از
 فشار انگشت فرو رود و در این هنگام مرض هیچ اختلالی در اعمال نیست مگر آنکه اختلا
 لایکه از جرم و وزن عضو معلول منتج میگردد و جز معلول اشکال مختلف پیدا میکند
 مثلا در پستان شپیه شود به متکائی و این تجمیع با در همه جای است با آنکه در طبقات
 او است و اگر محل مرض در پوست بضر و لب بزک فج باشد بکدام بسیار بزک که در
 انده ناسی بگوید کم است و بگ شود و در میان دو پا او بزک میگوید و میرسد تا زانو و اگر
 در پوست ذکر باشد شپیه کرد و بزک خز و پستان تا سر زانو میرسد و اگر در صورت باشد
 بسیار بگوید که سر بقدر سر که می شود و تنها اینی صورت را بپوشاند اگر در بینی
 واقع شود و عموما در ابتدا آن جلد تغیر بجهت ساند و در زبیل و مشاهده کرد در عروق
 زیاد و بعد بتدریج خشن گشته و ویرید ها دالی شوند و مله های بشیر و بجهت ساند
 آخر شقاق بجهت سبک حس بالمرو فانی نکرد
 دغایر و دلم و اینها را مرضی مانند آنچه مذکور شد زقا و مرض را تبا بطبی
 نوبه است و غوش و ابتدا با انتظام است و چون بیک درجه رسید مدتی بجاالت

و قوف بماند و عظام و لحم و پوست که تا بیست ساله دام کند و گاهی بپا شده است که بخود خنق
تحلیل رفته و ط اغلب با دام الحاق بوده است و مورث هلاکت نمیشود مگر در اشخاصی که
سوء مزاج داشته باشند یا آنکه ماده مورث غانغرا باشد

تشنه از سختی و صلابت ماده و از فقر مرض و از اینکه مرض موضعی است این
علت را از نفخ موضعی که فقط مرضی است که با او مشتبه میشود تمیز داده خواهد شد
اسباب نادر است مرض مزاجی حاصل شود مخصوصا عارض شود در بلاد گرم
آنکه بتوان برای او سببی فهمید و این مرض نه مسری و نه ارثی میباشد در استعدا
زن و مرد فرق ندارد و در هر سنی بروز نماید خاصه در جوانی اگر چه برونش
بلاجهت است اما در موضعی که او رده اش تنگ یا مسدود باشد بیشتر عارض شود
تقریر از این مرض در موضعی که او رده اش تنگ یا مسدود باشد بیشتر عارض شود

و صاحب علت همیشه در غلظت و تقیرها معالجه پذیر نیست
علاج در ابتدا باید ضد ورم بکار برد و از مملنه و روغن زیتونی مستعمل اند
و در حالت ازمان ندی باری و روغن بید کو یا نافع باشد و از هر چه فشار است بواسطه
پچیدن و چون عرض از ثقل و سایر علل بجهت ان الت خسته میشود از جراح استعدا
قطع میکند ولی نباید قطع کرد مگر در صورتیکه این مرض باعث مجری نشاند بعضی
لازمه بدنی شود یا مرض را از کسب اندازند یا که اگر در بعضی از خطرهای قطع نجات
باید اغلب مرض عود نماید

در میان آن که روغن زیتونی

این مرض عبادت است از شاخی شد و جلد و عرضی است بر نادر که تا بحال زیاده از
پنج دفعه دیده شده است و جلد در یک و سعه کمی باز دارد سخت مخصوصی حاصل کند که
صلب کشید کرد و بطوریکه نتوان او را بر باد و انگشت گرفت و عضوهای موضع
بکلی

بکلی ناپا شوند و هرگاه موضع مرض صورت بیانات سپاه مفقود کرد و بطوریکه کو یا
صورت معولی است و اگر در اطراف باشد حرکت عسرت بهم رساند یا جلد بکلی
از کار بماند و با وجود این حس و حرارت و ترشح عضو باقی ماند و لون او گاه عجل
طبیعی و گاه تیره تر شود و ضخامت جلد قدری زیاده از حالت طبیعی شود ولی غشا
لحمی تحت او بحالت طبیعی باقی ماند و نفخ و جرمی بود و اعمال تغذیه و تنفس و اش
دم اختلال حاصل نکند و رفتن او بطور امان است و شفا کو یا ممکن باشد و با جراحی
مشهور نشده است مگر در ۳۳ زن و ۳۳ پسر و یک سالگی و سوس و پنجاه و
برای او باید پس از این بپا کرد ولی الکلن هاش را با استیمام و املاح زیتونی و بدی باید
بکار برد شود

در این مرض که معنی قول در اصول است

الطریق عبارت است از حالتی که یک الت یا یک شمع از جیش بواسطه کمی تغذیه
کاهیده شود و در حالتی که عارض شود بعضی تغییرات را که
تیمم او کم میشود لهذا غشاء آن نازک گردد و جرمش کمتر شود و گاهی از اوقات میشود
که اطروخی در یک الت خیلی زیاد باشد بدون آنکه در حجم و شکل تغییری بهم رساند
باشد مانند آنکه در سبیری شمع داخلی عظام کم میشود بدون آنکه حجمش تفاوتی نماید
و قوام الت کمتر از زیاد بود و از حالت طبیعی شود و گاهی نرم شده و شمع صورت و لاش
کمتر از حالت طبیعی گردد و اغلب اوقات مقدار زیادی از چربی و و الت و احاطه
نماید که کو یا خلا حاصل از کوچکی الت را میخواهد جملی نماید بالاخر شمع الت صفت
کاهیده شود تا آنکه بکلی بظرف شود و بجای او غشاء لحمی و بعضی روغن شود
اطروخی بجهت چند میتواند حاصل شود و اغلب حصولش از کم رفتن خون است
بالت چه از عقد و چه از انسداد شرابان او و بهم نیت زیاد کردن قوه جاذبه است

که بفشار متصل سبب اطروف میگردد و گاه سبب اطروف کم شدن قوه عصبانی است
چنانچه از پریدن عصب عمده یک عضو هزال در آن هم رسد و بجای آوردن عمل
و کم کاری الت موثره اطروف او شود چنانچه در مفاصل مشاهده کرد و در
الت متحرک بریم کرد و نیز سبب اطروف کرد و باشد که اطروف حاصل شود بدون
سبب واضحی و اثر اطروف موضعی یا عمومی است باعتبار عمده بودن الت بهر حال
عمل اطروف کم کردن و یا مفقود نمودن عمل الت است

اطروف دماغ

اطروف دماغ عبارت است از کم شدن حجم و تغذیه به یک جن از دماغ و اثر
از آن نوری متناهی است از اینکه در اطروف کوچک حجم دماغ بعد از آن است که باعلا
درجه نمود سبب باشد و در اثر نری کوچک دماغ بدوی با ثانوی است قبل از آنکه
همه دماغ با جزئی از او به منتهای نمود رسیده باشد و چون این دو عرض اختلاف
در بدن حاصل نمایند مک تهج و بدون تفاوت است وصفی که در ذیل بیان میشود
بر هر دو این عرض شامل است

شرح مرضی نیم کوه های دماغ از سایر اجزاء او پیشتر متبلا با این عرض میشود
و این اطروف در همه آنها میشود که عارض گردد و با در یک جن آنها بروز نکند و الا
در طرز نری های دماغ که عمده آنها کم و یا حجم شان کوچکتر از حالت طبیعی با یکی
مفقود شود چه از یک طرف چه از دو طرف و چه در یک جن از طرفی و چه اطروف
فقط در طرز نری ها باشد ماده عصبانی اغلب بحالت طبیعی باقی ماند و
در سطح او بعضی طرز نری های سخت و براق شبیه به بطون مشاهده شوند که
کو یا حاصل شده باشند از اغشیه که بملوی هم گذاشته شده اند که گاه در میا
انها اندک ماده عصبانی یافت شده است تا بنا بر جمیع آلات نیم کوه های دماغ
از سطح

از سطح با بطون هزال یا بند با یکی فانی شوند در این صورت گاهی بجای این اجزاء
فانی شده یک کپسوله بهم رسد مائی بدون آنکه هیچ دانه بی بطون داشته باشد و
گاهی در نزد این ان آلات که در بطون جنبین بدون اعانت چاقو مشاهده کردند
قبیل از اثر باصره و جسم مخطط و غیره و گاهی اختلال این حد نیست فقط مشاهده
شود که یکی از نیم کوه ها کوچکتر از دیگری است یا آنکه یکی از قطعات نیم کوه ثالثا فر
باصره و جسم مخطط میشود که کوچک شده باشد یا یکی فانی شوند و باشد که اطروف در تمام
اجزاء دماغ باشد یا فقط در ماده سبب یا در ماده رمادی در این صورت بعوض این
اجزاء افق شده یا کپسوله است مائی یا هیچ نیست در صورت اول باشد که این نیم کوه ها
باشند و باشد که نیستند یا بنا باشند که از آن طرف اصول دماغی دیگر چیزی مشاهده نشود
مگر بعضی الباقی که داخل میشوند در یک نسج غشائی که آن نسج تشبیه است بان نسجی که در حیات
و حی قبل از حصول نیم کوه های دماغی یک میشود و در این صورت هم باشد که همه
سفید نیم کوه ها خالی شده باشد و حال آنکه ماده و مادی دماغ کوچک بحالت طبیعی باقی
بماند و با عارضه میشود و اطروفی یا فقدان یکی از اجزاء دماغ کوچک با همه او با این
همه یک از آلات دماغ نیست که این عرض در آنها عارض نشود جز با یکی الحاصل این جن
مختلفه که در اطروف و از نری بطوریکه مذکور شد در دماغ وارد میابد تغییراتی کلی
در شکل حجم میسر میشود مثلاً محضین با جبهه باقی دره و چون فرو روند و این اغلب در یک طرف
راست با چپ باشد که هیچ اختلال در شکل حجم نمیرسد با وجودیکه یک با هر دو نیم کوه
صفیق شده باشند در این صورت با یک یک کپسوله مائی در جوف حجم میسر در فضای
او را ملو وارد و در عروق حجم عموماً هیچ اختلالی بهم نرسد و در طرف مغلوب این عرض
الات بنا کنند ان عضو هزال یا بند حتی عظم

در نیم حصول اطروف اثر نری گاهی از اوقات یک و قوی در نحو هم میسر

یعنی آنکه يك تغیر در عمل تغذیه پیدا میشود که يك التي در هنگامی که باید نمو نماید متشکل
شود و بعضی اوقات این مرض منتهی میشود از يك علتی دماغی مانند نرم شدن دماغ یا بن
الدم دماغی و بعضی اوقات حصول او بواسطه فشار یک ماده خواهد بود و گاهی بالا سال يك
سببی معلوم عارض میگردد مثل آنکه از پیری حاصل میشود چنانچه معلوم شده است دماغ
پیران يك یا نوزدهم یا يك پلسم سبك تواند دماغ شخص چهل ساله است
علامات همیشه يك اختلال در حرکات اختیاری بهم رسد که گاهی در دست یا پا يك
نیمه بدن و گاهی يك طرف باختلاف محل نیز يك اختلال دماغ مفلیح میگردد و این مرضی اغلب
بعلاوه فلج يك تمدی هم حاصل کنند و اطرو فی دوران عضو مفلیح بهم میرسد و اگر سکل
خارج میگردد و فالج اغلب در حرکت سمت چپ بیشتر عارض میشود از سمت راست و هم
فالج در سمت مخالف عرض است و اغلب مرضی مبتلای به صرع شوند و حس کم شود و
بکلی از ابل نکرده و حواس ظاهر و باطن را است که مبتلا شوند و گاهی اوقات حول عارضه
باسیمای تغیر میسازد با عسرت در تکلم پیدا بد و عقل باندن اختلال الت ضایع شود
که حافظه کم و خیال ناقص و من با هیچ با سبب متدبید شود و خونان و یاد گرفتن کارها و
چیزها عسر شود و بعضی احمق و بی حیا ابله شوند و همه این مرضی در جوانی بکلیت می
روند عموماً آنها از جمیعهای مادر زادی بیشتر است و در یک مثله است که بهر هفت سال
هم رسیده اند و هیچیک از اینها بواسطه اراض دماغی نمی پزند و مرگ بواسطه علت
خارج خواهد بود

تشخیص مرضی فلج مادر زادی که مسبب وقوف نمو یا الحروف يك جز از دماغ
باشد چون بطول انجامد تشخیص او محمل بود بواسطه طریقه که اختلال حرکت ظاهر
گردد و رفقت اطراف که کوتاه یا اغریا تمید بهم رسانده اند و نقصان عقل و انتظام عمل حیوانی
حیوانی نمیکند اگر که طبیب در تشخیص مرض تشکیك داشته باشد و خیال مائود و مل
و نوی

و نوی دماغ و غیره بکنند اما در اطفال رضیع و آنها که تازه متولد میشوند بروی پا یا بن
تشخیص مرض آنها بهیچین اسانی است با غیر معلوم است اگر در وقت تولد علتی از
یکی از اطفال بود که همچنان فرقی با دیگرانی دارد شکوه در مرض نخواهد بود اما چون
بدر و مادر از ضعف حرکت یک طرف یا يك عضو طفل اطلاع بهم رسانند مگر مدتی
بعد از تولد تا آنکه چنان بنماید که این ضعف حرکت متدرج باشد واضح است که دانه
سالی و اسقرو س و دمل و کپسه مورث این علامات میشوند خصوصاً اگر طفل بعضی
اوجاع داشته باشد و فریاد کند و متشنج گردد و در این صورت باید طبیب تشخیص دهد
و صبر نماید تا آنکه اطفال چند سال گردند در آنوقت اگر فالج سالمی حاصل نمود و
عقل نمونکرده و فلج نوزاد گردد و در طرف بدن يك فج نمو نمود و طبیب باید به بطور
بقیه بلکه مشکوکا تشخیص مرض دهد زیرا که بعضی اشخاص خانوایی فالج باشند
که با ضعفی در فقرات آنها میسرود و در بر راه افتد و نامدی کند و فاقابل نمایند و
کم کم و متدرجاً عقل منبسط میشود و تساوید حرکات حاصل گردد و مثل سایر
اطفال سالم نمای سوزا گذارند

نقد و ترجمه و تفسیر و علاجه لازم در مرضی است خطر و علاجه

المرضی الخا

بواسطه سن حجم و طول نخاع نقصان باید و این نقصان همراه است با زیادتی در
مپیط دماغ و نخاع و چنان نماید که فانی عمل مورث نقصان حجم نخاع میشود چنانچه
در اشخاصی که بواسطه يك علت دماغی از نیمه بدن مفلوجند نخاع در هر طرف
انجمیع طولش نقصان حجم پیدا کند و اغلب نقصان حجم منتهی میگردد از نوی نخاع
و باشد که عارض گردد از فشار خارجی در این صورت الحروف فی موضع محدود
خواهد بود در آلام حیوانی تمیز این مرض ممکن نیست

الطروفی قلب

عبارت است از یکی وزن و حجم او برای سنجیدن اولاد است که انداز او را در اسنان مختلفه بنظر آورند اطروفی قلب سه نوع است اول ساده یعنی جدار قلب نازک شود بطوری که حجم الت نقصان یابد و آنکه ضایع شود و دوم اطروفی که همراهی نماید با انقباض فضای الت در این صورت جدار قلب نازک و بزرگتر از اندازه شود و نقصان کلی و نیز فی بایم اطروفی که همراهی نماید با انقباض کلی الت که ضخامت جدار بجای الت میست با قدری زیاد تر و فی فضای او کم و در بعضی نقصان وارد آید اطروفی قلب جزئی با عام است در صورتی که یک ثلث یا نصف از وزن او کم شود قلب اطروفی شده و نیز و غیره و بقول لایک شیهه شود



علامات اطروفی قلب که با آن روی حدس نوشته شده باشند مثلاً که درت پر کو سیون باید برضی کمتر از حالت طبیعی باشد و ضربان قلب کوچک و ضعیف و اصوات قلب ضعیف و فیض صغیر و صلب شود و در اطروفی با تمد و نرم و ضعیف گردد در اطروفی با انقباض از هر این علامات چیزی که قدری صحت دارد کی که درت پر کو سیون قلب است و بجای آنکه مطلب معلوم کلی لازم است

اسباب اطروفی قلب مورث اغلب امراض خطرناکه که در تغذیه عامه بدن را اختلال میسرند مانند نقری و سرطان و هم دیده شود در اشخاص که مدت طویلی مبتلا باشند با اسباب ضعیف بدن و گاه سبب موضوع باشد مانند آنکه مدتی قلب می شود از تشویش طویلت زیاد در کسب خارجی و نیز کوچک شود از نازک شدن شرائین غایب قلب

علاج مختلف است باختلاف سبب ولی همیشه مقویات و آهن مستعمل است

الطروفی کبد و مجاری صفرا

کبد

کبد بواسطه کم شدن و انحطای توده از جوش می شود که از حجم و وزنش کاهیده شود

نشیج سرخی اطروفی کبد سه کبد است پادریک قطعه او در هر صورت هم انداز او از حجمش کاهیده شد و این کاهیدن باشد که خیلی زیاد بود که مایل به سببی باشد شده و وزنش نقصان یابد شکل او بندرت تغییر یابد و چون اطروفی موضوعی باشد همیشه شکلی خارج از حالت طبیعی است و لون الت باخته و نیز در ذنک است و فی بجای الت طبیعی با صلب تر یا نرم تر گردد و بگونه از اطروفی کسب است که تخلخل حاصل نماید که در بعضی جاها جرم کبد متفوق شود و بجای او غشاء لچانی برود و در این باشد که شکل و حجم الت بحالت طبیعی نماید و وزنش کم شود و باشد که در جوف او بعضی محصولات حرضی بجهت مثل کسب های و دودی اطروفی جزئی اغلب وقت همراه است و مل مجرای همان موضع را

علامات و نشانه های ابتدای مرض نامعلوم و نیز که مرض کم باخته شد و قوتش نقصان یابد و از سرخ و کاهیده شود و عمل هم گاه بحالت طبیعی و گاه عسرت بهم رساند پس بیک یا چند ماه که شخصی این حالت باقی بماند شکمش رو به بزرگی گذارد و علامات استسقا نیز بروز کند و عرض رفته رفته ترقی نماید پس از مدتی دنیا پاک هلاکت در رسد و در تمام مدت عرض علامتی از موضع کبد بروز نکند چنانچه کبد پیچ و بدن بدون پرقان است و علامت و اعمال هم بقاعده است اگر هم اختلالی پدید آید مخصوص نخواهد بود که محل بر اختلال کبدی شود و از پر کو سیون اغلب معلوم که حجم الت کم شده

نشانه های حدس امکان است و طایفه از روی خطوط جمعی محال است استسقای ترقی دلیل بر مرض کبدی است که چون بطی بروز نماید بدون نفی در بدن با جمع شدیدی در شکم و بدون آنکه هیچ ماده در شکم احساس گردد بطوری که حدس بطروفی ساده کبد

بابه سیرن توان زد و بگویم آنکه کدام از این دو است ممکن نیست

فصل در معرفت تقریباً علاج است و عرض مرض کاه بدن سببی معینی و گاه منج شود با احتیال بلکه در جرم کبد باد عروق و است مثلاً کبهای مانی مورث اطروف کبد شوند و نبی حاصل شود از انسداد عروق یا بواسطه ریگی که یکی از مجاری صفرا انسداد سازد و همراه اغلب اطروفی بهم رساند ولی در مدت حیات بهیچ علامتی آشکار نشود در این صورت از رفتار مرضی که نمودن موجب تطویل کلام خواهد بود

اطروفی عضلات

فتار و راحت زیاد و فضا با انسداد عروق و اعصاب و غیره اسباب هستند که موفی اطروفی بعضی عضلات میگردند و این اطروفی ها که ثانوی و عرضی هستند منقوص گفتگوهای است یک اطروفی مخصوصی است که عارض میشود در بعضی عضلات و آنها را قافی میسازد بابتدیل میکند به پنج جوبی و اطروفی در وقتیکه جمیع یک عضو را یکدیگر بدون انکلی با قاعده داشته باشد بعضی عضلات را مبتلا سازد و بعضی را عارض نکند

علامات و اشیاء که بعد از اثر سرما یا خستگی عارض گردد و اغلب بدو سبب در بعضی از عضلات میسرید و بعد از آن در بعضی عضلات آن عضو میسرید و بواسطه اشکال عجیبه و غیره در آن عضو میسرید با در فال بعضی حرکات انقباض و این عضلات بتدریج جیمشان کم شده فاذک کردند و تبدیل شوند به پنج جوبی و اگر موضع المی را ببیند یک سطحی نرم بحرکت احسان شود و چون یکی بر طرف شده باشد بندی لبی با سطحی استخوان محسوس گردد و وقتیکه عضله یکی مفقود نشده باشد حس الکترونیت در او باقی ماند و این علت کم بعضی از دیگر سربایت کند خصوص به عضلات هم کار و طرفی و دیگر این علت هر چند منبسط شود موضع باقی ماند و در هیچیک از اعمال اختلال بهم نرسد که در آن دم بحالت طبیعی و تنفس بقاعه است مگر وقتیکه عضلات منبسط صد مرتبه باشد

اشقی

اشقی خوب هضم بقاعده حواس ظاهر و باطنه و عقل و مشاعر کلا بجا است پس این اطروفی عضلات ناخوش شخص خوابت سلامتی را دارد اگر جمیع عضلات بدن مبتلا شده باشند و بد شود که آنها مانند تشریح شده بخوبی میخورند و مد فوج بجا است و حال خودشان را بخوبی بیان میکنند یعنی اعمال تحت جمیع احوال خود باقی اند بجز حرکت و ابتدای مرض همیشه از طریق عالی است و در اطروفی عضلات صغیر دست

در تمام طول با حقیر است که گاه بعد از چند ماه اغلب عضلات از حرکت باقی و گاه این نتیجه پس از چندین سال بدست خواهد آمد و باشد که هر ضمدتی و قوف کند بعد از بروز هر وقت بحال اصلی رجوع نماید

التخیر در ابتدا که هنوز بجز ضعف و حرکات حاصل نشده است اشکال دارد و چون هر ال محدودی در یک جز از بدن بدن و سبب میسرید و دیگر شکلی و تشخیص نخواهد بود زیرا که اگر علت هر ال از نخاع و دماغ فرض کنند باید از قلب میسرید باشند زیرا که در علل نخاع و دماغ اول فلج در کل عضلات بکطرف میسرید و بعد از آن در سمت پادریان عضو پیدا شود

نوعی از عدم مرضی است به خطره که اگر بعضی از تنفس عارض شود و مورت هلا کرد و اگر در اطراف محدود بوده باشد شخص از حرکت باز ماند و اما هر از هیچ وانی صحت حاصل نشده است

اسباب آنچه تاکنون مشاهده شده در مردان و زنان قوی بیشتر بوده است تا زنان و اغلب عرضش بدون سبب بوده گاهی پس از سرما خورده که حاصل شده و قمر لجات و دلغ و خوش و استیام در میان کوکری و اقسام ندهینات و دلکها و خور این بدن استرکین همه تاکنون حاصل بوده اند از الکترونیت گاهی بعضی در بعضی ضعیف و مرده لهذا باید مستعمل داشت

در اندک و راسبوی معنی صلابت

صلابت عبارت است از زیاده شدن قوام طبیعی اشاع بدون آنکه هیچ تغیری در شجاعتها
بهم رسد و قتیله اشاع الات صلابت یافته و بر تپاده شوند و چون آنها را با جاقوی برنگ
صلابت و سختی در زینالت احسان شود که در طبیعت نبوده و هیچ وقت آن صلابت که از
بر پلان ماده اسفیر و سی حاصل میشود نمیشود و لون الت بندرت بحالت طبیعی است که
که رنگ تو کاهی بر رنگ تو از حالت طبیعی است و کام رنگی غیر از رنگ طبیعی حاصل کند لکن
گاه بحالت طبیعی و گاهی بیشتر و گاه کمتر است مگر در کشته انحراف صلابت مخصوص او را
نتیجه نرم دانند و طالع نرم نیست که همیشه صلابت نتیجه نرم باشد پس از این خواهیم دید
که صلابت حاصل شود بدون نرم

صلابت دماغ

برای صلابت دماغ چندین درجه فرض شده است در درجه اول قوام او بطوری که
که گویا چندین روز از او در میان تیز از ضعف خیسایند باشند در درجه دوم قوام
مانند موم که در درجه سوم مانند غضروف بعضی شقی در درجه این حالات خون در
دماغ بسیار کم بود صلابت دماغ عمومی است با موضعی و جزئی صلابت ماده ایض
بیشتر از ماده مرادی باشد و صلابت عمومی دماغ خواست حاد دانه شود و در حیات
شد بک و در اشخاصی که از نرم دماغی سرخ جرمه باشد و صلابت جزئی دماغ مرضی است
مزمون شاید که محدد باشد فقط در چند تونید یا آنکه در یک نقطه از ماده سفید
عموما هر چه کند با علل دیگر دماغ مانند نفخ الدم و غیره و اکنون سبب برای صلابت
معین نشده است صلابتی جزئی گویا اغلب منتهی شود از نرم جزئی دماغ با آن فرستند
او تاکنون علامات معین از برای این فرض نوشته نشده است جمعا آنکه این مرض را می
با علامات بسیار مختلف انجا که صلابت عمومی باشد مرض بزودی بواسطه هلاک
و نجات

و تشیبات بهلاکت رسد و چون صلابت جزئی بود جمیع علامات که از مواد دماغی بر می
نمایند ظاهر شوند مانند صرع و فلج و اختلال عقل از هذیان شدید تا اعلا در حیات پس
معلوم میشود که از زمان حیات تشخیص دادن این مرض بسیار مشکل خواهد بود

صلابت نخاع

صلابت نخاع یا در هر جزء او است یا در یک جن او است در هر صورت قوامش
ان میشود که نخاع را چند روز در میان تیز از خیسایند باشند صلابت نخاع که خیلی
کمتر از نرمی او بدیهه میشود رفقا من معاصره رفقا من نخاع است و در زمان حیات
محال است تمیز این دو عرض از هم و موسیو کلا کوید علامات مخصوص این مرض را
بر فرض در یک کج از اطراف است و بعد از زمان مختلف در یکی از طرف دیگر بر می
کند هم چنین سیر کند و بتدریج هلال در دست پای معلول به رسد بعد از آن دست
پای طرف مقابل همچنان طور بنی مبتلا شوند و کم کم حرکت کل اطراف معدوم شود و
این فلج تدریجی در نخاع نباشد چنانکه بعد از آن خواهد شد و بعلاوه عمل مانند و مستقیم
در این مرض تغییر نیابد و حس حرکت نادر است که بکلی ناپدید شوند که تا مدت مرضی
و راه مرده و این مرض همیشه بدون حسی است و اغلب در نقطه که نخاع معلولی است
و حسی شد بد شیب بوجع مفصلی پیدا شود دوام این مرض خیلی طویل است که اغلب یک
با چندین سال بطول انجامد

علاج ادویه که در نرمی نخاع مذکور داشتیم در اینجا بنی مستعمل است

صلابت قلب

صلابت قلب مرضی است نادر و علامتش ناشناس است و همیشه همراهی کند با هپاتیت
روغ قلب و چون با جاقوی بروی قلب بنند صلابتی که احداث شود مانند آنکه در لوله
مخوف جری و مقواتی احداث شود و اگر نخواهند او را بریزند با شکال بریده شقی

صلابت کبد

جرم کبد سخت مانند ماده اسفنجی و سبکی و چون او را بریزند صلا کنند از کشیدن پاژ
نشو بلکه کینه گردد و باشد که این مرض بدون ترکیب باشد و طایع غلبه هر یکی کند با هیبت
دروغ و باطروغ و با سپر ز علامت نتیجه از صلا بت کبد تا کون غیر معلوم است
باشد که سبب استسقای خرق و اختلال عمل هضم شود و طایع از روی تخمین چیزی در
دست نیست

دایره ایسمان یعنی نرم شدن

نرمی یکی از علایق است که اغلب در انساج بدن انسانی ملاحظه میشود و عبارت است
از نرم شدن توکم انساج و چندین درجه برای او منظور کرده اند در درجه اول انبج
اوصاف سطح خارجی دماغ حالت طبیعی را دارد و با بصورت پاره میشود و در درجه
مبدل گردد بیک تجمیع که باد چاقوان ترخین لوله آب برداشته شود در درجه سیم این
تخم هم ذایل گردد و چندی مری نمیشود مگر در بعضی نقاط باقی مانده از انساج
نرم شده و نرمی با در تمام يك الت است یا در يك جن محدث او و انجا که الت مرکب از
انساج مختلفه باشند نرمی با در تمام انساج است یا در بعضی از آنها چنانچه در آلات
هضم اغلب نرمی محدث و بغشاء مخاطی است و انجا که الت مجوف باشد و نرمی در تمام الت
بروز کند ثقبه احداث شود حجم الت نرم شده با بحالت طبیعی است یا بزرگتر و این
بزرگی بواسطه رطوبتی است که با و داخل میشود و گاه کوچکتر از حالت طبیعی است و
ان الت بنی با بحالت طبیعی است یا کم رنگ تر یا سرخ تر و باشد که خون در بعضی اجزای
و نیز نماید قبه های چند حاصل کند و باشد که رنگش بنفسی یا سپاه یا زرد گردد و این
الوان مختلفه و قوعش قبل از نرمی نیست بلکه بعد از نرم شدن الت حاصل شوند
چنانچه عروق الت مرصفت چون نرمی با در نرم گردد و پاره شده خون در الت مرصفت
کند

کند و عموماً زمانی برای نرم شدن الت لازم است ولی باشد که بطور فوری حاصل
آید و انجا که نرمی از درجه اول تجاوز نکند باشد که بحالت طبیعی رجعت کند ولی
چون توکم انساج از هم بپاشد و بحالت شخم شود بکمال است که بحالت طبیعی
کند ولی گاه در انساج الت هم شفا ممکن است مانند آنکه در فقدان آلات ملاحظه
میشود که يك اثر جرحی بر طرف نشد مادام باقی ماند و اغلب مصنفین بر آنند که
نرمی حاصل شود از نرمی و طایع بستگی های موسس و اندر ال و سایر پنهان
که نرمی هم دخلی بمرم سابق با حالبه ندارد و بسیار دیده شده که در روی نعش
نرمی ان همیشه همراهی با قلت دم داشته است

در نرمی دماغ

نرمی دماغ عبارت از نرمی است که در روی نعش شناخته میشود که شدن قوام
تمام جرم دماغ با يك جز او اعم از آنکه لون دماغ بحالت طبیعی باشد یا تغیر یافته
باشد در چنین حبات همراهی کند با صداع و اختلال عقل و مشاعر و حس حرکت
نملی و فلج و تمرد و وجع در يك یا چند عضو خصوص اطراف و منقسم شده این مرض
بجاد و خرمن

نشج نرمی

اسم مرضی می رساند که جرم دماغ بیک درجه نرم شده است و گاهی از پس احساس
شود که جرم دماغ گاهی مانند سریشم سخت و گاهی مانند لوزانک است و گاهی
کوششی غلیظ یا رقیق که در آن هیچ نشج ملحوظ نگردد و لون دماغ بسیار مختلف
شود که پشت کلمی یا قرمز و گاه خرمائی یا زرد مرهادی یا سفید است و گاهی از
نصوص اگر نرمی در ماده سفید مرکزی باشد لون او بحالت طبیعی باقی ماند و
این اختلاف الوان بواسطه زیادی یا کمی خوفاست که در دماغ رخیده و نادر است

او مخلوط شده اینجا که برخی در سطح دماغ باشد اغلب همراهی کنند با تجمیع الت باسفل^{سطح}
 ام الغلیظ بواسطه عدم ظرفیت و کجایش مردیه و منبسط گردد و این خشک و
 توخالت دماغ چون شوند و التصاق ام الغلیظ با جرم دماغ بیشتر شود این^{مات}
 تشریحی مخصوص صورت حادی مرض است در صورت مرضی لون قوی^ه
 دیه نشود و اغلب لون الت سفید است و این بواسطه عدم دفعش خون است
 او این علامات مذکور مشاهده کردند در هر چه اول مرض چون چندی^{مات}
 تغیر کلی در آنها بهم رسد و این تغیرات مختلف شوند موافق آنکه علت
 در روی دماغ باشد یا در وسط او و اینجا که مرض در ظاهر دماغ باشد بعضی
 قطعات زرد رنگ و نرم ملاحظه گردد که ضخامت آنها مختلف و بزرگی شان
 از یک قران تا یک بول است و ظاهر لخیلی شباهت دارند بغشاء و اینجا که نرمی
 در عمق الت باشد بواسطه جذب شدن ماده دماغی پوده متداخل باقی ماند
 در خلل و فرج او و بطوری سفید رنگ و ناصاف مشاهده شود که خیلی شبیه است به شیر^{هک}
 و گاه جرم دماغ بکلی محو و ب شود در این صورت اگر علت در سطح ظاهر باشد فقدان
 ماده مشهور گردد و اگر در عمق باشد کودال و غارها دیده شود شبیه آنکه در کسبه
 سکنه حاصل گردد که در روی نخش نمیتوان تمیز او و اغلب مسعت علت بقدر
 نخود تا فندق است و باشد که بقدر سلب کوچک یا تخم مرغ گردد و بندرت
 تمام بکلی طعم و هم تمام یک نیم کرده و احاطه کند و اکنون مشاهده نشد که علت^{هم}
 دماغ را فرا گیرد و گسائیکه مبتلا باین مرض بوده و صحت یافته اند و تشریح مرضی^{هک}
 شد که بعضی کودالهای کوچک شکل خود را از آنکه مفروض نباشد با نرو^{حصول}
 این کودالها از مجید و ب شدن جرم دماغ است و گاهی دانه شقی قاطع صلب قوی
 رنگ با زرد رنگ با سفید اعم از آنکه جمیع سطح او بیک نج باشد یا سوراخهای^{در او}

در او باشد مانند آنچه مذکور شد و این سوراخها خالی باشند یا مملو بوند از رطوبتی
 سفید رنگ مانند شیر^{هک}

علامات باید تمیز داد علامات بصورت حادی یا مزمنی
 علامات و رتبه^{در} حادی و مزمنی در مرض بدو مقدمه است و گاهی در^{ابتدا}
 صداع و در بعضی حرکت غلی و تشنج در یکی از اطراف پا در نیمه بدن عارض گردد
 و اینجا که بروز مرض بدو مقدمه باشد مرض بختیابی هوش را فتاده و فلج گردد
 مانند آنکه در نوزاد دماغ در ساقهای قوای دماغی مرض و حس و حرکت تدریجی^{مست}
 اینجا که ابتدای مرض باشد اغلب راشخا صبیکه زیاده از شصت سال عمر از یک به^ک
 سه سال بدو و آنکه مشاعر رجعت کند بعضی دیگر بعد از چندی بهوش آیند و در
 بعضی هم فلج رفع گردد و این بهترین موقفاست طول نکشید که قوی دوباره
 زایل و فلج عارض گردد و در اینجا با در میان یکجا از امر اخر مرکب با این مرض هلاکت^{شد}
 و اینجا که رقتا در مرض تدریجی باشد در بعضی از مرضی صداع عارض گردد که محل^{است}
 اغلب در هر چه است بدو هیچ مشاعر که حافظه را بل زبان بالکنت و بعسرت بیان
 خیالات خود را نماید و هنر پنج مشک در یکطرف بدن حس حرکت غلی^{است}
 و تشنجات عارض فلج و تمدد ظاهر گردد و گاهی رفتار مرض بطور خوف و غضب
 که بدو مقدمه یا بعد از حالات مرضی دفعه صداع شدید عارض گردد و اضطراب
 و اختلال در خیالات پیدا شود و هذیان شدید تشنج و تمددالات پیقاعا^{است}
 بطور صریح عارض شوند و این اختلالات باشد که هر یکی کند با فلج یا یکطرف
 مفلیج و طرف دیگر متشنج شود یا مرکب این دو یعنی با هم یکدفعه از^{است}
 مختلف است که گاه در هفته اول یا ابتدای هفته دوم بهلاکت رسانند و گاه
 با هفته چهارم طول کشد بدو و آنکه هیچوقت علامات محیی بر او نرکنند و

بعضی از مرضی انتقال یابد بحالت از همان بندرت علامات متدرجا از ابل گشته مرضی محتمل یابد ولی در اغلب آنها فلج نا تمام با ضعف در اطراف مغلوبه باقی ماند عقل و مشاعر بقوت سابق برنگردند

علامات و زنها حالت از زمان در اغلب بک شود که اشخاص متوجه میگردند شکایت از کسالت و ثقل بر اس نمایند بعد مداع عام یا صدام عصبه باد و اسرار عرض گردد و این حالت تا چند روز یا چند ماه یا چند سال بماند بعد از آن مرض عسرت در تکمیل میسر است دست و پا بخوبی بر فترت حس و حرکت نمایی در آنها برنگردد و در انتهای اطراف حس سوزن زدن بهم رسد و گاه در مفصل و جمیع ضرب عارض گردد بعد از این حرکت نقصان یابد که شخصی در هنگام راه رفتن یکپای خود را بر زمین کشد و اشیاء سبک و زن از دست می افتد بآنکه انامل توانست اشیاء خور و در از زمین بردارند و بتدریج فلج در یکطرف یابد هر دو طرف کامل گردد اگر چه علت محدود در یکطرفه دماغ باشد و این علامت اخبر که فلج طرفین باشد مخصوص بصورت از زمان است و باشد که در این صورت هم برف نهانند و گاهی علت ابتداء را انامل یا طرف بر و برنگردد بعد در سوابق بدن و او جاعی که در این مرض هم می کنند از فشار شدت نمایند و طام خود بخود بخود بخود شدت کند که مرضی بفریاد آید و حس هیچ وقت بجای نماند نشود و هیچ وقت هم زبانه از حالت طبیعی نگیرد و بعد دهن کج سبای حماقت و تعجب ظاهر و حافظه ضعیف و بر طرف گردد و عقل تمام و تکمیل عسرت بهم رساند چه از فراموشی است چه از عسرت در تکمیل ضعف عقل مجدی شود که گاه حیات انسانی بکلی دفع شده خود در این بر این واد را در ابل گردد فلج کامل و در اطراف عارض شود بماند در اطراف که تا آخر حیات باقی ماند بافتنی فلج شود و رفتن این مرض بدی و متصل در ترقی است

دوام و انتهای مرضی دوام حالت از زمان مرض بسیار نامعین از چندین روز تا چندین سال دوام کند و اغلب منتهی شود بمرگ و این افتها با واسطه ترکیبات دماغ با واسطه خود صورت

باشد

باشد که منتهی بشفا گردد

تشخیص مشتمل بر دو باورم دماغ و ورم امین و کثر پیچون و ترقی الدم دماغی و تشنج جلد دماغ از حالت طبیعی و محصولات عارضه در دماغ در مال بسمان حال با ورم جرم دماغ تمیز داده شود باینکه در ورم دماغ درد وجه اولی و علا و حسی که در لوم البسمان نیست جمیع حواس بر نازد شود مثلا تشنج عارض شود و صدام شدید روی دهد با هذیان و حسی جلد نازد گردد و همین علامات در جرم ورم هم باقی ماند و بوفلج غلبه دارند و عرض مرضی جوانان است و حال آنکه اغلب مرضی در لوم البسمان از شخصیت سالکی متمایز است و در امین نیز بواسطه حسی و هذیان و صدام شدیدا از مال بسمان حاد تمیز داده شود ولی اینجا که مال بسمان جز بر دماغ با علتهای دیگر تشنج می کنند تمیز حال گردد مگر آنکه اگر مرضی بر باشد حد بر لوم البسمان خواهد بود و اگر جوان باشد بر ورم امین تشنج و فلج و جمیع اطراف گردد و عرض می باشد ولی اینجا که محد و بیک سمت بود حدس بر و مال بسمان است زیرا که در ورم امین بودن تفاوت در هر دو سمت بر و برنگردد کثر پیچون تمیز داده نشود از قلت دوام او و هم در کثر پیچون علامات در طرفین بر و برنگردد و در مال بسمان محد و بیک طرف است اینجا که رفتار مرض مجدی سریع باشد که شخص بر و دی بجلالت نوسد از ترقی الدم دماغی غیر تشنجی عرضی از چیز دیگر تمیز داده نشود از انحراف جرم دماغ از حالت طبیعی بر ورم محصولات اتفاق در دماغ که رفتارشان معاینه مانند نرمی مزمن دماغ است تمیز دادن خیلی مشکل است و چون صدام شدیدا محدود در یکطرف می باشد و هم می کنند باقی و کوری بد و ن فلج حدس بر حصول ماده است در دماغ و این حدس نباید شود اینجا که هر می کنند با جمله های صریح بد و ن عرضی فلج در میان جمله ها لکنت زبان و قنای عقل در این مرض کمتر از نرمی بر و برنگردد اگر هم عارض شوند و سرا و اخر عرض خواهد بود پس آنکه تمیز و مال بسمان از نرمی داده شد از محل فلج هم تمیز نمی کرد معلول طام خواهد شد

مقدمه المعرفة مرضی است بسیار خطرناک اگر هم منتفی نباشد بک علتی بدو بدن باقی گذارد صورت از زمان که بدن به خطور مرض مبتلایند

سبب از اسبابی که برای این مرض نوشته اند هیچ یک یقینی نیستند و طبعاً چنان نماید که اگر این مرض مخصوص مریضی نباشد اولاً غالباً بروزش را نخواهد بود که اکثری عرضش بعد از من شصت در جوانی نادر است که ما و سایرهای زیاد از اسباب محصله مرض است چنانچه در اغلب وقت بروزش در تابستان یا در فستاد است و بروزش در مواد در دماغ و قهقاری قدیم از اسباب مستعد اند

علاج آنجا که ابتدای بروزش با علامات کثیر پسوند بمر شصت موی خارج باشد خون کم کنند بواسطه فصد و علق بن گوش و آنجا که عرضش در وضع فکات و منعشات و مصرفات جلدی و شمع مفرج و ضماخ خردل نافند بعد مسحلات و حقن مسمله و دای و خوش موافق حالات مرضی بکار بوند از برای عرض فلج داک محله و شمع مفرج و استر بکین و بجا معده نبه کوکری و فلبائی البته مضر خواهند بود

نوعی نخاعی

نخاع نیز مانند دماغ بطور حاد بل من نرم شود و علامات تشنجید در اینجانب چنان است که آنجا که در نوزاد نوزاد نوزاد و دماغ در چند سائنه طور پیشو که تمام نخاع را فرا گیرد عروضش در قسمت ظهری و در دفعه بیشتر از قسمت کمری خواست و مکرر باشد که در عرض در ماده ایضاً پاره می شود و باشد که محدوده باشد به دو دسته قدامی یا د و دسته خلفی نخاع و باشد که محدوده باشد در یک دسته قدامی و یک دسته خلفی

علامات و نوزاد آنجا که در تقار مریضی یا عمومی مرض بطور حاد باشد که بعبه همه با کتوف یا نصف بدن مفلوج شوند از هشت ساعت الی چهار پنج روز هلاکت رسد و اغلب تقار مرض بطوری است که ابتدا احساس حرکت غلیظی در موضع پیدا شود و خلاصت

و خلاصت و بروزت در یک یا چندین اطراف خاصه ابتدا در اطراف بمرسند و انقباض و قبل الحس و گاه دفعه مفلوج شود بندرت در او تشنج و تمدد بروز نکند و چنان که در و علامت اخیر بواسطه ترکیب مرض با ورم ام الرقبه نخاعی است دفعه بزرگ و اولاً در اراده خارج شوند پیشو که سلسل البول با حبس البول عارض گردد بعد از چند روز یا چند هفته شخص هلاک شود و چون مرض محدود باشد بخبر اسفل پشت با قطن باشد که مدت طول کشد و منتفی بحالت ارفان گردد علامات حالت ازمان مرض این است که بعد از آنکه علامات مقدمه تا چند ماه طول کشید یعنی حسن حرکت غلیظی و بروزت و خستگی از کار و حبس البول یا بیوست مزاج یا خروج در اراده واهی پیدا کرد یا آنکه در دوران قوه مردی ساهل کم شود یا خروج و بیج بلا اوده باشد از مستقیم و در بعضی فقط صبح کشاله ران است هم چنین در بعضی در شکم و سینه و اطراف سافله است بعد از زمان طویل که این علامات بروز نمودند حرکت اطراف سافله کم و عرشه بهم رسانند و در بعضی بجهت تکامل کند و راه رفتن مشکل شود کم و یکباره گاه ممکن باشد راه رفتن بالاخرن عمل بدن محال باشد بروی پاچه بواسطه فلج و چه بواسطه تمدد این صورت در بعضی حرکت بنفد حسن اگر چه کم شود ولی بکلی ناپاک گردد و گاهی در بعضی مفاصل احساس و جمع گردد فلج مثانه و مستقیم و هلاکت است که با فانی حسن همیشه در ورم نخاع و نوزاد حاد و بروز در اراده و نوزاد نوزاد من باشد که عارض نشود و آنجا که نوزاد در قعر اعلائی نخاع نباشد تنفس ازاد و حرکت قلب منتظم و عمل هضم غیر از موضع مفلوج بقاعه است و این علامات مذکور مختلف گردند باعتبار موضع معلول آنجا که علت در جزء اسفل کم باشد یا پشت فقط اطراف سافله مفلوج گردند و باشد که مثانه یا مستقیم نیز مبتلا شوند و آنجا که در گردن باشد اطراف سافله نیز مبتلا گردند و آلات تنفس هم مبتلا شده تنفس سرعت بهم رسانند و تنفس فقط بواسطه

حرکت مجاز خواهد بود و با واسطه آنکه خون درست صاف نشود بتدریج بافتن
بطنی شخص بکوت رسد و هر چه محل معلول نزد بکتر باصل نخاع باشد اختلال پیشتر
بود و اگر علت بختنا در اصل نخاع بکسر رسد مانند آنکه در سکنه شد بد شخص و معتقد
بمجرد و اینجا که علت محدث باشد و در دست قدام حرکت فانی شود اینجا که محدث و بد
دست خلفی باشد حس فانی شود و اینجا که محدث و بد بکسته باشد حس حرکت همان طرف
فانی شود بموافق آنکه دست معلول از قدام باشد یا از خلف اینجا که علت در دست خلفی
باشد بعلاوه فانی حس حرکت هم از انتظام افتد زیرا که چون در بعضی حس حرکت گذشته
نمیکند باز حرکت دیگر غیر از آن نمیتواند بکند بجهان طور هر کات بقاعه از آن ناشی شود
مانند آنکه در مردم نخاع و اغلب اعراض نخاعی و این مرض هم سبب فلج از اسفل باعلا است
اول یک با هر دو با با هم مطلق و بتدریج و عیال از فته اطراف عالیته مبتلا شوند و
بخلاف حرکت فلج از بالا بپایین است و نیز علت کور شده که اطراف سا فله تمام حرکتها
برجا بود در حالتیکه اطراف عالیته بکلی حرکت افتاده بودند در اینصورت بر این شد
که نیمی عجزی بقوامت که در بط نخاع نشیت و قطن از دماغ بر پله شده باشد یا آنکه نیمی
محدوث در لیا فیکه مخصوص اطراف عالیته هستند

دوام و انتهای مرض دوام مرض در حالت ازمان نامعین است که از چند
ماه تا چند سال است و اغلب منتهی ملک شود و بندرت شفا یابد و در اینصورت هم
اغلب مرضی عاجز مانند در یک موضع فلج با استرخا باقی ماند

تشخیص اگر چه تشخیص از مردم مزمن نخاع بسیار مشکل است و از اینجا که در تمام
نخاع بعلاوه جمیع یک جمیع در موضع معلول اغلب هست و در قمار مرض هم سبب است
نشاند نخاع بواسطه با دهای غطی یا غیر غطی مرض مشتبه گردد بدین لازم است که در
تمیز مرض را بر وی شکم بایک چلو بخواباند و فقار را بخوابد ملاحظه و حسیت نماید

انحراف

انحراف یا باینکه بافتن است در قمار هم نوسیه باشد
نقشه الحرفه بسیار با خطر است زیرا که اغلب هلاک شوند اگر منتهی شفا گردد
مادامه که مرضی عاجز ماند و چون هنر در اطراف بکسر رسد یا آنکه در قدام مرضی
باشد به خطر مرض بکسر رسد

سبب مجهول است بعضی مرض با نوعی از عاتق پای شبوخی دانند و سبب از ع
و خستگی زیاد را هم گفته اند و هیچیک اصلی ندارد استعدا در آن پیش از رخنان
و در حسن وسط پیش از پیری عارض شود

علاج در ابتدا اگر مرض قوی المرح باشد چند حجامت بروی نخاع کنند بعد از
ان دانه های متعدده بجهان موضع و در اول مرض استیام در ماه کوکودی طبعی
و بکار بندد و در پیش از نافع است از آب و در دست ضرر و به وقت شود اما در
که نافع باشد ندریم و اگر حدس باین باشد که فقار بزرگ شده است بولیمه بایند
دو و با سپوم مستعمل است و اینجا که فلج خنای پی باشد بد و در و فرو و غن
ماهی بکار ببرند

در نیمی قلب

نیمی قلب را که ابتدا حرکتها و شری نوشت باز با این اول و از غنغرا یا تمیز پیدا شد
و در دست تمیز داده نشد مگر بواسطه لایک در اینصورت اگر قلب هیپرتروفی
شده باشد نرم و رخو و جدا را و فرو رفته است و میتوان او را پیچاند مانند لانه
شده و باشد که انگشت با و فرو رود این کم شدن سختی الت باشد که نزدیک بحالت
دقت و مبعان گردد و این نیمی اغلب بزرگ جن الت است و باشد که هر عضو مبتلا
گردد و بعضی تغییرات در لرون قلب پیدا گردد که باین بواسطه اینجا که چندین قسم
قار باشد اندامان در مزی و نزدی و سفیدی و سریشی و غیره در نیمی قومی

الباقی عضلاتی است که در غشاء غشائی محاطی ماده قوی و نازک نشکند که
 انما در بواسطه خون متغیر است و در مجرای نوزاد شده ملاحظه شود غده زیاد از نقاط که
 انما عبارتند از خون متغیر و هر یک از آنها قوی و مسکن هستند و گاهی چون نوزاد شده و
 با سفید است و این حالت اغلب را می بیند با ورم غشاء غشائی قلبی نوزاد که اول کوبند
 او را میان غده در این حالت نوزاد قلب میماند و غده شود یا آنکه شبیه شو بهی خزان
 شده چنانکه لایق بیان کرده و این حالت اغلب را می بیند از ضعف المزاج و بیک شو و یا
 نوزاد سریشی یا نوزاد سریشی میماند که نوزاد از نوزاد قلب را که در غشاء غشائی او
 شده باشد و طبعی سریشی نوزاد قلب همیشه مرضی است تا نوزاد که نتیج شو و ورم
 بکلی را غشیه خود با از یک تغیر القی قلب و هم چنین عارض شود پس از اراضی که
 تغیر در طبعیات بدن دهند چون طبعی وید و جزو بریم و اراضی غشائی و سرطان
 و بعضی اراضی سموی و غیره و این نوزاد ها عارضه و ضلالت غیر از حصول ورم است و
 با نوزادها بیکه از ورم جرم قلب پیدا شود فرق دارند و اکنون درستی از برای مرض
 نوشته نشده است مثلاً ضعف فیض و عیوض غشاء و تغیر ضربان و اضطرابات قلب
 هیچ یک از علائم این مرض نیستند و چنانچه بعد از این مذکور خواهیم داشت این مرض
 بکلی از اسباب خرق قلب است و چون در جرم ممکن نیست ختن این مرض تقدمه الحرقه
 لازم ندارد

در نوزاد معده

از جمیع تغیراتی که در جگر معده بهم میرسد نوزاد با چندین اغشیه او از
 سابق بیشتر بیکه ملبس و از اغشیه او غشاء مخاطی او اغلب مبتلا شو باشد که این
 نوزاد با اغشیه هم تجاوز نکند حتی صفای در این صورت بقای جگر عمدتاً است
 هم کسخته کرد و ولیکن این تغیر هر چه منبسط و عمیق تر بود غالب مرض حقیقی
 و اکثر

و اکثر نوزاد نغشی است یعنی آنکه بواسطه تغیر مخصوصی را است و بنوعی عمل نغشی مخصوص معده
 بیشتر سبب نوزاد و کوبیدن لازم است که ماقبل از آنکه نوزاد معده را بیان کنیم نوزاد نغشی
 تفصیل ذکر کنیم تا این دو نوزاد را هم بتوان تمیز داد

در نوزاد نغشی معده

موسسه و بویاد چون ملاحظه نمود یک قطعه از نوزاد و آنکه سکی بلع کرده بود و از مقلدش
 آفرینان بود خیال کرد که مجرای تغذیه یعنی معده و امعاء هم نیشوند ولیکن هونظر نام در
 سن ۱۷۷۲ عیسوی در جمیع اطباء لندن نمود که اغلب اوقات در روی اموات جنطی معده نوزاد
 و جلد بود و این نوزاد بسیار شبیه بود با یک یک قطعه از گوشت در معده حیوان نوزاد به نصفه
 نوزاد شده باشد و هم او نمود که تشبه معده میتوان جلد و معده را نوزاد و ابکی سازد در وقتیکه موت
 قوه متفاوت معده را در عمل نغشی و کدر حال حیات دارد بر طرف سازد این خیالات هو
 بعد از او بواسطه سابق اطباء مشهور ثابت و مبرهن کرد و آنکه اگر نخواهیم اسامی و اعمال آنها را
 ذکر کنیم موجب تطویل میشود ولی مانند آنکه موسسولوی و موسسولوی و لیر نوشته و نمودند باشد که
 انسان در وقت عمل هضم که تشبه معده زیاد است بمیزد و معده او نامدی هیچ غلب نکرده باشد
 یعنی پوزر سر چهار روز و این نوزاد که با نوزاد جمیع نقاط معده مشاهده شود و طایفه غشائی
 جانب نوزاد معده در طرف خلفی او بواسطه اغشای وضع نقش نوزاد کردند در این صورت بوی
 زیاد از نوزاد خارج شود و خون محتوی در عروق سیاه رنگ کردند و مخاط معده پرنک شد
 مانند تخم میوه جات با ساقی کند شود و این نوزاد که در جمیع معده که بکلی بر طرف کرد و
 موجوده در معده در جوف شکم در بخت هم یک از اغشای که بر خورده و فاسد کرد اندک این
 جهت که دیده شود که حجاب جلیز و طحال بکلی بر طرف شوند و هم گاه سر و غشاء جنب
 نوزاد فاسد کردند و لیکن این تغیر اتصال نوزاد و نازک و غیر متساوی هستند و در هیچ
 آثار در معده مشاهده نکرد و این دلیل واضحی است بر اینکه در جرم حیات هیچ نوزاد این اختلال

بمرد و طی اگر چه مذکور شد که طایفه ای است که تمیز این اختلاط در وجه هنگام حاصل شده است
 و طایفه دیگر که این خلل محدود در همان مخاط باشد و محلش هم غیر از تعقیر بزرگ معد است
 این تشخیص عسر مرت پیدا کند پس باید دلیل دیگر بر عدم ورم پیدا کرد و همین قدر کافی است که طیب
 بداند که در نری غشی آلت بزرگ و شفاف است و حال آنکه در نری مرضی مخاط کاهی قرمز رنگ
 و گاه سفید که ریش ریش بر یک در او از مخلوط بود و گاهی از اوقات این نری از معده تجمد
 کرده بگریز رسد

در نری مرضی معده

مصنفین دو قسم نری مرضی معده نوشته اند یکی از آنها موسوم است به نری مرضی مخصوص
 عارض شود در اطفال و یکی دیگر موسوم است به نری مرضی که هر گاه کید با نازک شدن غشا
 مخاط و این نوع نری عموما عارضی است و در جمیع انسان مشاهده می شود اما نری مرضی
 تواند در جمیع اجزاء معد بروز نماید بخصوص در انتهای طحالی که در ابتدا الباف معد از هم
 جدا شده و جوف آنها در طوبی سریشی نشکرند و با بواسطه جلدالت خفیم و نفوذ شفاف گردد و
 بند ریج این الباف هم مبتلا شده معدوم گردند و بجای اینج معد جزو طوبی باقی نماند که
 شپه است پس ریشم و این الت تبدیل شده بزرگ و شفاف است و چنان می نماید که از مواد غیر
 آله است و هیچ عرق در او نیست و یک بوی خوشی از او خارج شود و اگر بخورند این تعبیر الی
 خود بزرگ نمایند باید معد و امعاء را بخورند تا تبدیل بماده سریشی گردد و گاه این نری بجای
 شود که معد و محل منبسطی منقبوب گردد و این مواد در جوف شکم ریخته شود و با اعتقاد موسوم
 کرد و لبه این منقبوب شدن پس از نری و بواسطه نری غشی است زیرا که در هیچ مورد هیچ
 علامتی از ورم صفاق ملاحظه نشد

علامات نری اطفال در ابتدا شیر و مایه را بر داکه بنوشند بعضی دفع نمایند و گاهی هم
 و صفراوی نمایند کاهی عطش مفرد را خاب و نری و نمکین و لجه کوزند و بزودی ال

پیدا

پیدا کنند و عموما اسهال نری عارض گردد و مدفوعه با بلر زقی و کاهی سبز است و بنفش
 بطویله ماند و مشاعر عیا و بعد از یک هفته بلچند ماه طفل بحالت رسد
 سبب این مرض اغلب شیر خوار کردن و از شیر گرفتن و بعد از شیر گرفتن چنان
 نکردن از غذاهای غیر عادت و غیر محمول در نری یعنی آنهاییکه اطفال را ناشیر نالایق تربیت
 کنند این مرض حاصل گردد

علامت نری اگر در طفلی که تازه از شیر گرفته باشند این علامات بروز نکند بدو
 تاخیر و باره شیر مادر را بخورند که اگر تاخیری در او بهم رسد طفل هلاک گردد و اگر
 علامت در طفلی که از پستان مصنوعی شیر خورده بروز نکند دایه از برای او بگزیند و اگر آن
 بدایه باشد دایه را عوض کنند بهر صورت لازم است که شیر خورده با دوا و معده نکند که
 دفعات شیر دادن را زیاد کنند ولی هر وقت که شیر بخورند و اگر شیر بزودی بپشت
 و بقی دفع آب معدنی و بشی را بخورند یعنی با شیر مخلوط کرده بدهند و استیام در ماء
 قاتر هر روز بنمایند و قیال هم در اهاله و هم بخوری مستعمل است و سوتیارت دو
 پیوت هر دو نری از دوا و چهار نخود بخورند بعد از اینها نافع است که مشرق رایج
 بنم معد اندازند و شیر به بار ده بهتر از شیر به حاره است و اگر قی زیاد باشد چنانکه متصل
 بود طفل را از شیر به مانع گرداند و گاهی آب بخ یا بخ کویده با شربت یا خالص طفل دهند

امان نری شیمی و اسهالی معده

این قسم از مرض کاهی عارض شود بدون مقدمه ولی اغلب عروضش در اشتیاقی است
 که مبتلا برض مزمن بوده باشند خاصه مسلولین که یک خمس از آنها مبتلای این مرض
 گردند و این مرض در جمیع نقاط معد بروز نکند و باشد که جمیع او را فرا گیرد ولی
 اغلب بروزش در محل طحالی است و موضع معلول کاهی سفید مایل بکبودی یا مایل بنری
 است و گاه رمادی و گاه شیری است و بندرت قوز رنگ شود و غشاء مخاط

ان محل بسیار نرم شود و گاه قوامش مانند رطوبت نرمی گردد و خفامت او نزدیک شود
بعضی امت غشاء مخاطی امعاء دقاق و گاه بکلی ذایل گردد و این نرمی گاه بالسویه و سبب
سازد و گاه قطعه قطعه بر وزن کند و باشد که گاه بطور بند بر وزن نماید و غشاء الحجاب
تحت مخاط اغلب سالم و گاه او نیز مبتلا گردد و مخاط حجاب و گاه سالم و گاه قریب من نك
شود و گاه خفیم و بند بر ت مجروح گردد و رقتا را نیز من حاد یا من من است در صورت
حادی احساس وجع شدید و در موضع معده گردد و عطش مفراطی دهد و از
دهان بوی نوحه خارج شود که چون طبیب وارد آن منزل شود استشمام این بوی را بوی
کند و قوی و قی کرانی بر وزن نموده زبان بحال طبیعی باقی من شود با وجود این علامات
عارض نشود و در مرض هزال باید در چند هفته ای چند ماه بجلالت رسید این مرض اغلب
در شویخ عارض شود و این اشخاص که سابق مایل سالمی داشتند بغتة غذا که خورند
متدحجبا اشتیاق رفع شده اخلاص قهرا از جمیع اغذیه کردند و عوض وجع در موضع
در معده احساس غلبه شود و زبان آنها بحال طبیعی باقی من گردد و یک یا چند ماه دوام نماید
از آن نبض سریع و هزال زیاد پیدا کند و قوی فانی گردد و در مرض عجز بدون آنکه در هیچ
يك از آلات علامت مرضی بروز نکند در تشریح مرضی بد شود که مخاط معده زیاد و نرم
شده است و چون این مرض در میان مرضی دیگر خاصه سل بروز نکند شلخته شود و باید که
اشتیاقی که قی کرانی عارض گردد و گاهی وجع شد بد در موضع معده بجهت رسید که از فشار شد
کند و از خوردن توپاک تسکین باید و گاه هیچ وجع بروز نکند و قی شدت نماید بجهت
از هیچ معالج تسکین نیابد و گاه این علامات بخود بخود چند روز رفع شوند و
بار بروز نکند و طایف اغلب سبب کلی حرکت این مرض خواهد بود
تشخیص مرضی این مرض مجدی با ورم حاد معده شباهت دارد که در حال حیات
ممکن نیست تمیز داده شوند و طایفه این مرض وجع شد بد و سوزناک نیست بلکه
است

است بوجع عصبانی و همیشه قی کرانی است و از دهان بوی سرکه میناید که همیشه قی
این حالت در ورم معده مشاهده نمیشود و رقتا در ورم معده بیک نهج است و اگر بعد
تسکین هم شده نماید از آن پرهیزی خواهد بود با وجود اینها مشکل است تشخیص
توزان را نه چون تشخیص این مرض مشکل است تقدمه المعرفه مشکل است
و طایفه این مرضی که در موضع معده خطره و مجهول السبب
علاج او پیچیده و نرمی و زوال حاصلی ندارد مگر اینکه زوال انداختن مرض را
تسکین دهد و از برای رفع قی و قی نیست مگر از انداختن شمع در رنج بوی و قی
دوای جوهر توپاک تسکین نماید و اثر به باره بالفعل چون آب بخ و غیر تسکین وجع کنند
و گاه سدی هم کنند مخصوص و قی که توپاک هم با و بخور دهند و غذای مرضی شیرین با آب
و بنی مخلوط نمایند باید باشد
در نرمی غشاء مخاطی امعاء
مخاط امعاء بواسطه غلبه رطوبت معده میشود که نرم گردد و این نرمی یا در معده دقاق یا غلاظ
و اغلب همراهی کند با نرمی یا سوز رخ شدن معده و غشاء مخاطی امعاء یا از داخل نرم شده
بخارج میرایت کند یا از خارج بداخل یعنی پس از آنکه معده سوز رخ شد قی و اوجاق
امعاء شود باعث نرمی گردد و نرمی مرضی امعاء خیلی پیشتر از نرمی مرضی معده ملاحظه
شود و عرض این قسم نرمی در معده غلاظ پیشتر از معده دقاق است و اغلب نرمی محدود
در مخاط فقط و نرمی امعاء پیشتر بد شد و در اطفال و عروض بواسطه اسبابی است
که در نرمی معده ذکر شد و در میان انسان نرمی امعاء بالا صاله مرض اصلی نیست بلکه
اغلب مرض ثانوی و بالتبع است و مخصوصا بد شود در حقای لطیف و بد و بد
از علامات و ابهامی است بدون وجع و در اطفال سفید و در میان انسان زرد
است و بسیار عسر العلاج است و همراهی کند با هزال و چون همراهی با قی نکند تمیز

داده شود از نرم حاد امعاء چون رفتار نرمی باشد همچو جوار نرم امعاء تمیز داده نشود علاج
او در اطفال خوراندن شیر است که چه از شیر گرفته نشوند و در سبابه اسنان اشربه بارده منع
انرا غلبه صلبه و انداختن مصرفات بروی شکم و خوراندن بسموت و اما لکه کردن آن است

در نری غالی و کبد

طحال و کبد و احشای هستند که اغلب پس از کشون نغش نرم میباشند و این بهر دو جرا
مشاهده شود که هر اهری کند با باختن رنگ الت با ندادن لون و این تغییرات که در حال
هیچ پیدا نیستند معلوم است که مرض ثانوی میباشد و اغلب عروضشان در حقایطی
و حمای ورمی و جمیع امراضی که هر اهری کنند با نقصان فیبرین خون است که قبل در موقع
بیان شده است

در نری جرم

تشریح جرم نری غانقرایی در جرم دبه نشود مگر پس از وضع حمل که کاه می شود
عشق باد در داخل خود جرم بعضی قطعات غانقرایی مشاهده کرد که شبیه است بچنانکه
با سنگ جهم با ساین محرفات سوخته باشد و از موضع نرم شده بوی مخصوص غانقرایی
اتباع کرده و کاهی این غانقرایا شبیه باشد به نری شیخی غشاء مخاطی معده که اگر با نشت چاقوی
جرم را بخرامند غشاء مخاطی مانند غشاء پوشیده نشیخ متلاشی کرد و این نشیخ که قوی
رنگ است بوی مخصوصی دارد که غیر از بوی غانقرایا است و کاهی این غشاء نرم شده بجا
طبیعی باقی ماند و با مانی کند شود و بوی تعفن هم از آن متصاعد نکند و این دو قسم اخیر
اغلب همراهی کنند با ورم جرم و صفاق و ورم بد و عروق جذبه

علامات نری جرم همراهی کند با ورم صفاق و ورم بد و عروق جذبه لهذا مشکل است
بیان علامات مخصوصه او و نمی توان گفت که نری غشاء مخاطی جرم بوی خود
بروز هیچ علامت موضعی وجع نمیشود ولی همیشه همراهی کند با علامات عمومی پختن
فانی

فانی و می شد بد که بد خون جیض و نفاس متعفن کردند و سببای در نریه تغیر کلی حاصل
در چند سروز با چند ساعت نرهای بسیار قوی هلاک کردند و اگر عروض نری جرم
در وقت حمل باشد پیشو که جرم سوراخ شد جنبین در شکم افتاده هلاک کرد
تشریح نری جرم نمیتوان به تحقیق تشخیص نری مخاطی جرم را ولی چون قوی بود
فانی کردند و بنیض صغیر کردند و سبب تغیر باید و هیچ اختلالی در موضع نباشد حدت نری
جرم میتوان نزد و مقدمه المعرفه همیشه مهلاک است

اغلب نری جرم در ماتی نیت یعنی نریهای مخصوص زاییدن و سبب
مواضع کمتر بد شد و بخصوص عارض شود در زمستان و پائیز و در زمانیکه ورم صفاق
وضع حملی شایع باشد

الاج مقوبات و منعشات و اهلای هستند که در این مرض مستعملند

در نری عظام

تشریح عظام شناخته شود بواسطه کوشدن مواد ارضی در زیاد شدن مواد البه ان عظم
نرم شود و بواسطه ثقل بدن با فشار بر با نشت عضلات منحنی و خمید شود و این حالت عظم در
دو مرض پیدا شود یکی راشی طسیم و دیگری استوملاسی که اولی مخصوص است با اطفال
دیگری در شبان

راشی طسیم مرضی است مخصوص اطفال و شناخته شود بواسطه تغیری کلی پختن و
امتداد زیاد طول و حجم با در نری عظام و این تغیر همراهی کند با سوء مزاج

تشریح عظام ملاحظه کرد که نری عظام بزرگ و انحنای در عظام طویل و عروض
شود و علاوه بر عظام ناقص شود و این نقصان بخصوصی دبه شود در عظام اطراف ساق
و با نواسط نسبت مابین عظام اطراف عالی و ساقه بطرف شود و با اعتقاد موسوسه که در
در جدار اول عظام طویل خون سپاه زیاد جمع شود بطوریکه اگر انحاء از میان ببرند خون آن

انها جویان نمایند و بدینجه است که خون در میان عروق نخواهد ماند بلکه نشتر بجای مغز و خلأ
 فرج آن نماید و بعد لون سپا خون دفع شده سر نشتر کشند و متفاوت گردد و باینجه عظم منقبض
 و صاحب عروق گردد و در این هنگام عظم چنان نرم شود که مانند ویش بعضی رختها میشود
 انرا بهم بچایند و بعضی اوقات ممکن است استخوان بشکنند و این شکستگی اگر در شخص
 باشد اثرش بر عروق بر طرف گردد زیرا که ضرب بعد جدی منقبض گردد که بخود عروق کفایت
 کند نگاه داشتن و دو قطعه عظم شکسته را در درجه دوم شناخته شود از بزرگ شدن
 عظام و تغیر یافتن شکل آنها و این بزرگ شدن بواسطه اینی اسفنجی است که حاصل گردد از آن
 خون سپاه مر شتر که درجه اول مذکور شد و این منقبض است اتفاق و غیر طبیعی که چون در
 بشفا منقبض شود بتدریج این منقبض گردد و شش به علاج

از استخوان و فک در این نادراست که ابتدای بروز مرض در حالت صحت باشد و عموما
 بروز را در ابتدا بحالت کمون است که اغلب منتج نمیشود از امراض مختلفه مرضه شکمی باشد که
 مدت زیادی طفل مانند جاضعیف و لاغر شود باین طوری که طفل نمکین شود و دست از بازی
 و غالباً خوابیده یا نشسته ماند ضعیف و هزال باشد و از اوجاع مفصل و عظام شکایت کند
 و باندک حرکت و درجهی خواب عرق زیاد کند و در اغلب اسهال دست داده است و مفتقو
 او را در زیاد گردد و چون او را سر دهند و صواب آهکی در او بچسبند و بعد از یک الی شش ماه
 شود که فتق عظام مخصوص عظام ساق و ساعد منقبض میشوند و که حاصل کنند و باین سبب
 عوام گویند که این طفل دانه میزند یا که میزند و عموماً چهار خمس از مرضی در ضلالت از این حد
 تجاوز نکند چه بواسطه خود مرض و چه بواسطه معالجه جید و در سالی عظام نمکین و متعفن
 شوند چنانچه نخدین و ساقین کافی حاصل کنند که تحدیث آن از طرف انسی بدن بود و کافی
 از اوقات نخدین آنها شان از طرف قدام باشد و قصبتین از طرف وحشی و کافی آنها
 بطوری باشد که زانوهای بطرف انسی بهم مایل شک و بهم برخورد و حال آنکه ساقین از یکدیگر
 ریزد

دور میشوند و باینواسطه راه رفتن عسرت بهم رساند و اغلب از مرضه ضلالت و ده رفت مکبض
 انسی قد بین و اطراف غالبه انحنای بیشتر از اطراف سافله است بجهت آنکه اطراف سافله محکم
 کند و با وجود عصبین و ساعدین بطرف انسی بدن منقبض گردد و عظام در سغ و مشط بزرگ
 شوند و بر قوه از ساید عظام اطراف غالبه بیشتر انحنای حاصل نماید و قفا و قنای منقبض شوند
 خواه از طرفین که شیب شوند به بد و خواه از قدام بخلف و باشد که از وجهه منقبض گردند
 و انعطاف قفا را قابل ملاحظه نماید و این انعطاف قفا را آن عموماً باشد صد برجسته
 و بیشتر اید و غضروف اضلاع فرو روند و باینواسطه در بغل بسیار صاف شود و چنان بنمایند
 که تقریباً هم رسانند اند و انتهای قنای منقبض شوند و از بدینجمله نمودار گردند و ب
 خلاف حالت طبیعی انحنای پیدا کنند یعنی آنکه تحدیثشان از داخل و تغیرشان از خارج خواهد بود
 بهینجهت سپهر انحنای شیب شود پسین مرغ و این انحنای در عظام عرض نیز مشاهده گردد مخصوص
 در عظام عرضی حوضه و جمجمه و کاهی خاصه و عانه بهم نزدیک شوند و باینواسطه عظمی ر قدام
 و خلف حوضه بعضی پازده سانه میسر باشد که بجهت رسانند بطریقه و کاهی نزدیک عظام
 حوضه از طرفین باشد و در انصوت نقصان کلی در عظم عرضی حوضه بهم رسد و اگر مرض
 در اطفال صغیر که هنوز ملاذ آنها بسته نشد باشد عارض شود و چون عظام از تنقبض
 دماغ بواسطه قوه انبساطی و غوغ خود بشیر بزرگ شود و جمجمه را بزرگ کند و شش شش
 پس در بویخی مهبی و اگر بعد از بسته شدن ملاذ عارض شود عظام داس منقبض گردند
 که های چند بهم رسانند مخصوص در رانها و اضبع که ماده اسفنجی آنها بیشتر باشد و عظام
 صورت نیز مبتلا می یابند مرضی گردند که چنان بنمایند که عرضاً صورت بزرگ شود و طولاً
 کوچک و فقط دندانها اجزائی هستند که مبتلا می یابند مرض نمیشوند

و باقی انشای عظام اختلال کلی در بعضی از اعمال عمل بدن بهم رساند چنانچه بواسطه رفت
 رفتن اضلاع از طرفین قطر عرضی صمد که میشود بواسطه تغیر مکان اضلاع در هر طرف

نفس اضلاع بعضی آنکه حرکتشان در خارج باشد بلا اخل صدر غرض کنند و باین واسطه تنفس
مجاور اجزای شود و خود مجاوری هم بواسطه نرمی استخوانها که نلکه کاهش باضلاع کم کرد
بواسطه انبساط امعاء زیاد از حالت طبیعی بفرق مایل شود و باین واسطه قطر عودی مبین
هم کرد و در هم چنین بواسطه انحراف فقرات از حالت طبیعی و حاصل شدن قوسها خوف
صدر کوچک کرد و باین واسطه فشار بر ریه و ریه امده بجهتشان بسیار کوچک کرد
و باین واسطه است که تنفس قویتر نشیما قویتر و عسر است اغلب این مرضی خیلی نرم و بقل
میرسد و عقلشان بالنسبه در غالب پیشتر از دیگران است و این بواسطه غرض زیاد و غ
رغای زیاد و دایم دانستن آنها ای غنای غنای عظام عموما از پائین به بالا است ولی اغلب بپای
در غنای مساق بر وزن کند و بعد از آنجا و بعد در غنای شست دست و بعد از آن ریه و
بعد از اضلاع و بعد فقرات مبتلا کرد و آنجا که در فاق عرض سر برع باشد در وای سه ماه
جمیع عظام بدن از حالت طبیعی منحرف گردند و کند و ولی اغلب يك يا چندین سال
طول میکشد که مرض از اطراف بفقار مرید و در این مدت اطفال همیشه غلبه و مبتلا
بامهال و سایر علامات دیگر میباشند و بعد مرض بدیهه سیم رسد یعنی منتهی
کرد و بمرکب یا بشفا در صورت اول اسهال زیاد شده قوی کم کم فانی شده و زال
توقی کرده بمرکز و اغلب بسبب یک مرض اتفاق خواهد ماند ذات الیه و مسل و ورم امعاء
و غیرها آنجا که منتهی بشفا شود مرض بدیهه قوت کبر و عضلات قوت گرفته بدن
دوین و کداز در هرگاه انحراف بدن از حالت طبیعی زیاد نباشد بمرکز نقصان فاق
ان انحراف طرف کرد اما چون انحراف از حالت طبیعی زیاد باشد بخصوص اگر در
اضلاع و قص و فقا و باشد مادام العمر باقی ماند و باین واسطه است که این اشخاص
مادام العمر مستعد اند امراضی که این انحراف سبب میشود که اگر مرض در ساقین باشد
راه رفتن مشکل شود و اگر در ریه قوه و کف باشد حرکت باز و عسر شود و اگر در خاصر

باشد

باشد و منع حمل در زنان مشکل و گاه محال کرد و اگر در صدر باشد بخصوص چون همراهی
باقیتر کند نفسشان تنگ کرد و اغلب مبتلا کردند با مرضی از قلب بخصوص انقباض و
هینیت ریه و اغلب این اشخاص بواسطه عسرت و آزارش دم لیه و خستین و سرد
انامشان اغلب بنفیس است و چشمهاشان بوامه و اشک و زبان است حروف نشان
مشکل و گاه کاه صد امشان فانی شود

تشخیص **عسر** اشکال ندارد مگر در وجه اول که جز علامات عمومی چیزی و عری غلبه
و هینیت عظام مبتلا شدند و انحراف در حالت طبیعی آنها پیدا شد با هیچ مرضی
نمیکرد و مگر با استی مالمی و یا چنانچه ذکر خواهد یافت فرق مابین ایند و مرضی
معلوم خواهد شد

تقدیر العجز آنجا که مرض محدودی با طرف و ضعیف باشد چندان خطری ندارد و چنانچه
که هم سهل العلاج و هم پس از دفع شدن شخص از کار باز ندارد اما چون مرض
شدیدی داشته باشد و انحراف زیاد باشد خاصه در غنای صدر خطرناک است زیرا
که هم عسر العلاج است و هم انحرافش باعث امراض چند کرد

سبب دانی طبعی مرضی مخصوص اطفال خاصه وقت در آوردن دندان اول
دویم و اغلب برونش از يك تا سه سال است مخصوصا شدت در سال دوم بیشتر
و استعداد و دختران زیاد از پسران است

علاج در صورت خفت مرض ستر و برپا قدم دارند و بیلاق روند و
مقویات استعمال کنند و طفل را باید بدینگونه بپراند با آب گوشت و تخم مرغ نان
بخوراند و غذای صلب بخوراند مگر و قهقهه تمام دندان شان بیرون شده باشد
و شراب آهن داغ و دیر مرمه مانند عصا و خبطیا و غیره بکار برند و از هر یک
نافع تر است و غن مایه که از يك تا دو وقتال در اطفال بخوراند

دند که در دند و امعاء زرد مانند بول خزان شده شوند و قوام ان انسان نبی مختلف است چنانچه
 گاهی که در طوبیت در جوف آنها پیدا شود حجم آنها افزوده شود و نرم گردد و باندک فشاری
 مضمحل شود و بعضی اوقات برخلاف انسان مذکور سخت و صلب مانند پوست اهو گردد
 که از فرقه صوت از آنها بلند گردد در صورت اول غانغز پای و طبع در صورت ثانی غانغز
 پایی نامند و اجزاء آلات غانغز پاشده سرد گردند و در همه موارد مساوی گردد بحجرات
 شیء مجاور و از انسان غانغز پاشده تعقیب مخصوصی خارج شود و ملائین بوی مخصوصی در بعضی
 اعضا اختلاف پیدا کند مثلاً در ریه غانغز پاشده بوی خارج شود که بوی تعقیب نغشی بود
 توامت بامبوی مخصوص غانغز پاشده مجاورت هوا لازم است و چون در غانغز پایی که در جوف
 و حرکات حاصل گردند و از هوا هم خیلی و نرمند همین بوی پیدا شود باید معتقد شد که
 وجود هوا برای حصول ان عذوق لزوم ندارد اتفاق تعقیبی که در انسان هم میسر شد
 ان است که بخاری ازان تسبیح خارج شود که داخل گردد هم در انسان مؤثره و هم در انسان سالم
 و وجود ان بخار دانسته شود بواسطه حصول که بیطاسیون از فشار بر عضو در انسان
 غانغز پاشده اثر نبی از آنها معدوم گردد و جمیع اعضا و جمیع انسان بهم شسب گردند مانند
 مانند عضله و عصب مگر در و استخوان که قدری حالت خود را نگاه دارند و از اجزاء البسه
 که مبتلا باثر غانغز پاشده اند شمع و عرقند که گاهی آنها در همان مواد غانغز پاشده
 جست بمرسبی که غانغز پاشده عارض شود اغلب عروق در هک مسافتی از موضع مسدود گردد
 و انسداد لازم است بخصوصی را بخاکه سبب غانغز پاشده عروق بوده باشد غانغز پاشده
 گاه محل قوکه غیر مجدد و دامت و آلات مجاور بد و اغلب متفحیح است
 علامات و رقبته عروق غانغز پاشده میبکند بتغیر لون که در ابتدا کبود و بعد
 بنفیس و بالاخره مینا گردد و در عروق شعریه بطی شده حرارت ملوک و مکی
 بعد از ان کافی گردد و با حرارت جو نساوی حاصل کند و چنانکه ذکر شد عضو غانغز پاشده

سخت

سخت و خشک و گاهی در طوبیت در جوف ریخته نرم که با اندک فشاری مضمحل گردد و در
 این قسم اخیر است که بوی مخصوصی غانغز پایی است تمام شود غانغز پاشده بوی که با بعضی
 علامات عمومی با خطر که بعضی از آنها بر و زرش بواسطه سببی است که غانغز پاشده از او
 شده است و بعضی دیگر بواسطه خود غانغز پاشده جذب شده عفنه که در اخر مرض بر فکند
 و این علامات ثانوی عمومی مافنای قوی و سایر علامات اوی نمیک و لیک است که
 چندین بار بر بیان آنها شده است و چون سبب غانغز پاشده اسباب بخارج باشد و خود
 غانغز پاشده هم وسعت زیادی نداشته باشد و در اعضای دیگر بر و زرش نکند و بر و زرش نکند
 گردد و باشد که علامات عمومی بر و زرش نکند چون غانغز پاشده شود در حد قو و در حد
 الت سالم پیدا شود که عمل ان جدا کردن عضو یا الت حرره از عضو یا الت نده است که با نهاله
 قوی در اطراف اسکار پیدا شود و بواسطه تجمیع جن متورم اسکار فرو رفته غایب بعد
 بعضی شفا پیدا شود پس از ان تفرق اتصال کاملی که الت حرره و ازاله نده جدا کند
 و در میان آنها مربوطی برقی پیدا شود و این تفرق اتصال که ابتدا در ظاهر پیدا شده بود
 که کم بعق برود و اسکار متحرک گشته بالاخره جدا شود و زمانیکه برای افتادن اسکار لازم
 مختلف میشود بواسطه زیاد و کمی غانغز پاشده و موافق خارج مرض چنانچه اسکار اگر در جلد
 باشد و از ریه لا پانوده و ز طول کشد و در سهای آلات بیشتر از این زمان لازم دارد
 و بعد از افتادن اسکار یک فقدان التي باقی ماند که مرهش و التپاشش مانند سایر
 جراحات است و اینجا که انتهای مرض بملاکت باشد علالت اوی نمیک و تانک نریک و
 در حبه اول بر و زرش کرده بعضی در وقت افتادن اسکار هلاک شوند و برخی پس از افتادن
 ان در صورت اول بواسطه اسکنه طبیعت عمل افتادن اسکار را کافی نیست و
 صورت دوم باز طبیعت عمل التپام را غیر کافی است و از عهه نمیتواند بیاورد و بعضی
 اوقات عروق حرکت بواسطه بعضی ترکیبات اتفاقیه است مثلاً وقتی نرفه الت

شدیدی از خرق عرق و و می دهد و بالانکه غانقر با مورث و سرم شندی مثلا در جنب
 باد صفاق می شود
 تشنج ^{است} اسکا در تشنج هر سید در وقتیکه مرض در عموالت بود چنانچه در وقتیکه
 از هر نوع غانقر با ذکر خواهیم مذکور خواهیم نمود و اینجا که غانقر با ظاهر بود از فضای
 حصر و سبب الت تمیز داده شود
 اقله تر از ^{است} اگر چه همیشه از امراض خطرناک است و طایفه از آن قوی تر شود و وقتیکه
 وسعت مرض بیشتر و عضو عمده بود و غانقر با ای رطبا از باطن خطرناک تر است
 سبب ^{است} از برای غانقر با بعضی اسباب بلا واسطه است مانند بعضی واهی
 چون اسیدها و غیره و داغ آهنی و جمع شدن حرارت و پاک شدن او در عضو ضربه
 و ضغطه و سرم شندی و فشار زیاد و عقد شریان با انسداد آن بخودی خود و بعضی
 سمومات حیوانی مانند ماده دمی کوفت و مسموم و سگ کوبه و دوش بول
 باور از بوجله و اقل غانقر با یک جنس است میباشند بعضی اسباب عمومی دارند مثل
 آنها بلکه عارض میشوند در میان مجامع شندی و نواب و در پی و بعضی امراض نخاعی و
 پس از آنها بیشتر و ضعیف در صاحبان سوء القبه و ضعیف المزاج است
 علاج اول باید دفع سبب را نمود و بیم باید امداد کردن افتادن اسکا را بیم باید
 جوامد را التیام داد پس اول کار لازم دفع سبب است و از برای و سرم ادویه ضد تشنج
 و غدارات و مقویات بکار برونند و فصل بندرت لازم میشود بخصوص اگر سطح غانقر
 زیاد باشد و در این صورت باید تقویت فراخ کرد مقویات بخصوص کنگنه بسیار لازم است
 و اینجا که سبب غانقر با بعضی اسباب مخصوص بودند با آنکه مرض بخودی خود می شود و تشنج
 باید داغ نمود

در غانقر با و رینین

تشریح

تشریح ^{است} اینجا که مرض غیر محدودی بل جنس با جمیع یکی از رینین مبتلا شود و اینجا سبب
 دنک و قابل الاضمحلال کشته بوی عفنی از او خارج کرد و چون الت و لیرند بکر طوبی
 بد و ده ابخوره از او خارج شود که چون با ادیشونید افعای سیاه رنگی عفن با آب
 و بموضع آنها غاری باقی ماند و اینجا که مرض محدود بود اغلب عرضش فقط در مخاط
 شاخهای قصبه است و از یک یا چند بن نقطه است که آنها متسع شده باشند و گاه عرق
 مرض در جرم دیده میباشند که نقاط کوچک سطحی تحت جنب با داخل جرم ریه و احدا با
 مالوان مختلفه با بوی مخصوص ملایم تر که با اندک فشار مضمحل شود و اسکا رگاه متصل
 شود بالوات مجاوره و گاه جدا شده بالالوان مختلفه و خشک میماند در موضع خود مانند
 شیخ حاجی و گاه بخلاف نرم شده متعفن و سیاه رنگ شود و در کبسه میماند و جدا
 کبسه رگاه نرم و گاه صلب گردد و جدا رگاه متشکل شده گاه بلا واسطه از جرم ریه صورت
 بسته است و طایفه اغلب غشاء کاخ در ریه و راول بسته شود و حصول غشاء کاخ در ریه بعد
 از افتادن اسکا و است و گاهی قبل از آن
 علامت ^{است} نادر است که عرض مرض در میان ذات الریه بود و اغلب عارض شود
 در اشخاصیکه مدت ها مرض بوده اند و اینجا که مرض بدوی بود قبل از عروضا و مدت
 چند روز یا چند هفته یک کسالتی در مرض میسرید که نتواند بیان آن کند اشتها کم
 و قوی ضعیف و در بعضی سر فر عارض گردد و علامات بر نشست نباید و بعضی
 اوجاع در سینه پیدا شود و بعد از آن دفعه علامات مخصوص غانقر با پیدا شود
 چنانکه تعفن در نفس حاصل گردد و بعد از سرهای زیاد که عموما خیلی زیاد و
 اند نشستی خارج کند بالالوان مختلفه و خونی و گاهی خون خالص و بمقدار زیاد و این
 نفث نیز همان بوی عفونت دارد چنانکه اطباء بزرگ را متعفن سازد و اینجا
 که غانقر با محدود و مخاط شاخهای قصبه باشد با آنکه قدری مجرم ریه سر است

کوه باشد غیر از این علامات ملک و بر چهره مشاهده نکرد و طالع آنجا که غانقر با سطح زبانی
 از زبیر اگر فته باشد مراغوض صد اکر و کوه پیتامیون که هر چه کند با سوزن شنبه
 و آنجا که غانقر با شاخه قصبه راه پیدا کند سوزن مغاری و غراغری و یک طور بلوکی
 بعضی صوت میند استماع کرد و این علامات ملک و را و قنبر که از سال گفتو میگویم بیان کنیم
 نمود این علامات هر چه کند با علامات خطر عوم بدن که صورت و سیما متغیر و قوی
 زایل و بیض میریزد و صغیر و کاهی اسماعال عارض کرد و کاه باشد که هیچ یک از این علامات نا
 اولی و مرض بر و نرنگند

دفعه دوم و آنجا که غانقر با شاخه قصبه است و خوب و بدی حالت کاه
 بمولع اعرض شوند و کاهی مرض بخود منتهی نمیکند و کاه حرکت بواسطه ترکیبات مرض
 حاصل شود در هر صورت انتهای مرض بمرک است و دوام این مرض کاه که در انتهای
 هفته اول لا هفته سیم خواهد بود و کاه یعنی آنجا که مرض عده و خفیف باشد مانند
 اراض مزمنه سیر نماید که تا شش هفته اول دو ماه دوام نماید

تشنه و غش و نفث و غرجه و دلیل بر وجود غانقرای مزمنه میباشد
 و طبعی که این دو علامت مخصوص هر دو مفقود باشد و این در وقت است که غانقر
 غانقرای با شاخه های قصبه اتصال نداشته باشد و با سانی غانقرای و پیران غانقر
 غانقرای و دهن و خلق توان نمیزد و طبعی مشکل است چون موضع غانقرای و خلق خلی
 پائین باشد در این صورت هم فقام نفث غصن نمیزد و مرض را خواهد داد

نقد و معرفه بسیار خطر و مهلك است
 اسباب اگر چه در جمیع انسان دیده شود ولی در سن طفولیت بیشتر دیده شود
 و کاهی منجی گردد از اراض چنانچه در اطفال اغلب عرضی در میان حیات شوریه است
 و در جمیع انسان منجی گردد از آن و من من با از ذات الی به خفیف عارض کرد و در صغیر
 المزاج

الزاجان و کاه منجی گردد از سکنه مزمنه
 چون قوی ضعف زیاد حاصل کنند تقویت از شراب و کینه نمود و غلظت طعام و
 کار و برد و شویط و قلعین مستعمل است با بر و خفت خواب باشند و باد داخل کنند
 منجمیات ماکوله نادر و شفا مستعمل است و کاهی داخل تریاک کنند مثلاً سه گرم کلور
 دو شویط گرم تریاک را بپس حب کرده چها حباب او را از صبح تا شام بخوراند و اگر مزاج
 قوی داشته باشد میتوان فصد کرد یا آنکه شمع انداخت و چندان روز نداد

در غانقرای مزمنه
 یک تجمیع در وجنه و آنجا عارض شود که کاه نصف صورت را حاکم
 کند و جلد کشیده و براق و بنفش و سیاه رنگ گردد و در بلند ترین نقطه او یک اسکا
 است سرخ و خشک بقدر یک عدس یا یک پول سیاه کاه این اسکا جمیع نیمه را حاکم
 فراموش و مخاط دهان جز لحت رها و سیاه رنگ میسراند و کاه جمیع وجنه و لثه مبتلا
 گردند و کاهی این غانقرای فقط در غشاء مخاط و جلا است و آلات مابین این دو غشا
 سالم بمانند و کاهی غانقرای مبتلا شود که چون اسکا را از روی جلد افتد گمان دناها
 نمودار شود و کاه این غانقرای با استی ان فک هم سرایت کند

علامت در رفتار و انتهای مرض ابتلای مرض هرگز از جلد نیست تقریباً همیشه
 از غشاء مخاط است که اول یک طاول یا یک جراح حق در مرکز وجنه یا در غش لثه
 پیدا شود و این جرح بزودی بزرگ شده از ابتلا پائین از چندین غانقرای می شود و از
 دهان حریض بوی متعفن استشام شود که در اقل شبیه است بوی دهان حریض
 مبتلای بومر دهان زبانی و لیکن بزودی این بوی بد بوی غانقرای گردد و در مزاج
 از دهان خارج شوند بنی همین بومر در دهان وجنه و شفتین متعفن گردند و جلا خیزد
 و در جلد کشیده و براق شود و در یک ثلث اسکاری در روی او نمودار گردد

manu. tarikhema.org

tarikhema.org

و بود از این اسکار دیو روزی سمی لافتم مرضی است که در ابتدا بک طاول بایک لکه
 بروی او بهم رسد چنانکه در غشاء مخاط ذکر شد بزودی بزرگ گردد و کاه نصف
 صورت بلکه عنق را هم فرا گیرد و دندان برهنه و متحرک مثله و کاه بیفتند و عظم فک
 شده غانغرا یا کبر و چون طول کشد قطعه قطعه جدا شده بیفتد و اغلب اطفال
 شان باخته و غمگین گشته هزال یافته قوی شان فانی شود بنص صغیر و صبر برنج شده
 جلد سرد و کاهی سوزان گردد و کاهی اشتهای باقی ماند ولی عطش زیاد و کاه اعمه
 عارض شود و هزال بسرعت زیاد گشته و اغلبی در هفته دوم هلاک گردند و
 کمتر بواسطه خود غانغرا یا است بلکه بواسطه ترکیبات او است خاصه ذات الودیه و کاه
 از اوقات که دوام مرض زیاد شود اسکار بیفتد و کان دندانها که غانغرا یا گرفته اند
 نمایان گردند و بوی بسیار عفنی از مرض خارج شود که مردم از او متنفر شوند و اینجا
 که مرض منتهی نشفا گردد اسکار جدا شده تجمیع رفع گشته اطراف جرح است صلب و
 گردد و قطعه عظم دریم بیفتد و بعد از زمانی کم باز با طویل سیکا طریقی و در
 تشخیص غانغرا یا دهان از پستول روی تمیز داده شود باینکه ابتدای برقی
 غانغرا یا اطفال از انحطاط و پستول روی از جلد است و از نرم دهان جرح
 و غشاء کاخی تمیز داده شود باینکه در این مرض تجمیع نیست و در جلد هیچوقت اسکار
 بهم نرسد و اصلا ثقب در وجه بهم نمی رسد و عظام برهنه نگرند و زقلاش بطوری
 اذعان و مرض صری و اغلب منتهی نشفا گردد و از برفک غانغرا یا ای تمیز داده شود
 باینکه برفک محدوده در مخاط است و وجه منقبض نیست و عظام برهنه نگرند
 تقدیمت المعرفه در حدیث تقریبا بقصد و سمنف میزند و آنها که علاج شقی
 بواسطه فقدان زیاصله و مخاط همیشه شکشان بدهیات است و حرکت فک
 گردد

سبب مرض

سبب مرض مرضی است تقریبا مخصوص باطفال و اغلب عرضش از سن سه تا پنج است
 و باشد که ماده سالکی هم مشاهده گردد و در دختران بیشتر مبتلا گردند و در اشخاص که وسعت
 در او ضایع دارند دیده نشوند و مخصوصا در اطفال فقرا و مساکین دیده شد بخصوص در
 هوای رطب و در نرگادی و عموما بعد از ضعف مزاج و مرض مقدم است یعنی پس از
 مرضی پیدا شود مخصوصا در نفاقت سرخجهر و خجلك و باشد که نتیجی استجالات او و نیز برقی
 بوده یا شد و هیچوقت مسری نیست
 علاج چون مرض بسیار مایل بانسلاط است باید کاری کرد که محدوده شود و بجهت این
 مستعمل است داغ با آهن و روغن انیمون یا تراتر اسید و عکوسر و اسید کلرید بزرگ
 خالص و از هر چهار ربعی است خمر وین و داغ باید عرض و عمیق باشد که قدری هم از موضع سالم را
 فرا گیرد و بعضی او و به موضعی هم بکارد بزند مانند شستوی با او و به معطن با امونیاکی با عرق
 کافور یا شرباب با مطبخ پوست کنه کنه و غرغره از قابضات و مقویات

در غانغرا یا دهان

غانغرا یا ای حلق یکی از اضرار فاد است و اغلب منتج میشود از علتهای دیگر مثل غانغرا یا ای
 دهان و اغلب عرضش در اطفال مساکین و ناسن ششراست و بنی عارض شود در نفا
 حیات ثوری و این مرض با محدود و با محدود است و اینجا که محدود بوده اغلب در قطعه
 اسفل حلق است و در ارباب حیات ناشناس میماند و چون غیر محدود و به حلق و لوز قین
 و کام و خوراکه و الوت معلول سپاه بزرگ یا دما دی و غیره گردد و بوی تعفن غانغرا
 از دهان خارج شود و اسکار بعد از افتان بک ماده فندان ماده گردد و چون غانغرا یا در
 اسفل و مقدم حلق محدود بود و مرئی بود بوی غانغرا یا ای دهان مشتبه گردد با بوی غا
 نغرا یا ای هر و چون از موضع هم هیچ علامتی مانند وجع و عسر البلع و تجمیع کلوکتر تشخیص
 داده شود ولی چون مرض همیشه مهلك است اگر تشخیص داده نشود چندان از وی نجات

و اینجا که مرض مزمن باشد مانند غائغزایای دهان باید بواسطه داغ محدود شود و بعد از آن با کلفتی
ها و پوست کند که وزن کم سفید و غیره شستنی نمایند

در غائغزایای فوج

بکثرت غائغزایای است که عارض شود در فوج و خنجران منجر بعد از بعضی اراضی در ابتدای
بروز و صبحی سوزان در فوج میسازد و بعد در سطح و لعلیهای بزرگ با کوچک نقطه سبک
پیدا شود و آلات مجاور و صلب میسازد و این تجمیع تا جایی که در بدن بالا رود و اسکار در روز بروز
از اطراف منبسط گردد و ناشرح سرایت نماید و در رالت یک سوزشی میسرمد که مدام در بعضی ضعیف
بخواند و با بواسطه بعضی قطعات میند و از خود جدا نماید و علامات عمومی مانند آنست که
در غائغزایای عمومی مذکور شد و اغلب با اطفال میزند و بعضی از آنها بعد از افتادن اسکا
اگرچه فقلان ماده نر باید بود متفا باشد و هیچ وقت اثر تغیر شکل در رالت بهم نرسد و تاکنون
دیده نشد که جدا در فوج ملحق بهم شوند و لیکن بجهت بکارت بر طرف و نر باید شود

نوع ششم از اراضی تغیر یافته در جوارح با قشر

جوارح با قشر اراضی است که زیاد مشاهده شود و سابقا هم بکرات مذکور نمودیم و اراضی
میشود بواسطه یک تفرق اتصال در پنج آلات که آن تفرق اتصال حاصل شده باشد از جلد
الت یا غائغزای که سبب و موضع اراضی باشد عروضا برض اغلب در آلات منجر است مانند
و مخاط و همیشه آلات بدن بغیر از بشره و ناخن و مومبتلا با برض میگردند و محصولات اتفاق
مانند سرطان و اسقیروس و غیره میباشند جوارح همراهمی کند با ورم و بعضی از اوقات در طی
بهرسد و کشیده گردد و تعبیه او بزرگ شود و گاه پوستی بر کپه و در زیر جلد یا مخاط اتفاق
دار نمایان شوند و گاه یک اسکاری پیچند و در جای او تفرق اتصال با فقلان ماقه نمودار
گردد و در هر یک سبب جوارح میشود مشابه است با عموم او را مگر آنکه تحریک میکند جلد
نیچ را در موضع و مورث میگرد و تفرق اتصال را و لیکن او را سهاده هیچ وقت مورث
تفرق

تفرق اتصال نمیکردند مگر اینکه با یک چیز مخصوصی در طبیعت انورم باشد با آنکه در بعضی صاحب
سوء القیه باشد و با آنکه سبب ورم مدای باشد مثل وجود شیخای جوارح از هم تفرق
میکردند بواسطه تعدد و بواسطه وسعت و بواسطه شکل و بواسطه لون سطحشان و این
اختلافات گذشته از سایر علامات میتوانند هلاکت کنند طیب را بواسطه جوارح
بعضی از جوارح منبسط میگردند بطول و عرض و بعضی انبساطشان بقوت است این
صورت اخر اگر جرح در آلات محوف باشد مورث تعبیه ان الت میگردد و بعضی از جوارح
انبساطشان سریع و بعضی بطی است و هر چه الت عروقش بیشتر و نیشتر نرم تر بود
زود تر مجروح شود این صحت را مفصل بیان نمیکند بواسطه آنکه از هر مرضی که مخصوص
ذکر میکنیم که مورث جوارح مخصوصی میشود علامات انجراحت را در آن فصل ذکر کرد
و بعد هم ذکر خواهیم نمود

نوع هفتم از اراضی تغیر یافته

در تنگ شدن و مسدود کردن بدن و اتساع و منقبض شدن آلات محوفه در این صحت ذکر
میکند اراضی را که منجر میگردند از بعضی اراضی تغیر یافته که بیان شدند اگر چه این اراضی
ثانوی هستند چون چنان چنانند که بعضی از آنها بلا جهت عارض میگردند لکن است
که آنها را از اراضی بیان نمایم

در انقباض و تضيق

تضيق عبارتست از کم شدن فضای یک الت محوف و انقباض عبارتست از تنگی
کردن بدن آن بالتمامه مخزنها یا مایعات کمتر مبتلای با برض کردند و انقباضها هیچ وقت
کامل نیست و بعضی از تنگیها موقودی است ولی اغلب اوقات تنگی پس از قولاست
و حاصل شود از ضخیم شدن جدار آلات و سبب این ضخامت گاه ورم و گاه انقباض تغذیه
از حالت طبیعی است که مورث هیئت بعضی از انساج الت گردد و گاه سبب انقباض

و باشد که سبب تنگی اطرو فی الت بود و گاه سبب تنگی فقلان ماده است که التیام احوال
 نمیشود مگر آنکه فضای جوف او کم شود و انسداد مجاری باشد که بواسطه شئی خارجی حاصل
 با آنکه ماده در خارج پیدا شود که فشار بر آن وارد آورد و تنگی باشد که در مسافت زیاد
 بود با آنکه محدوده بیک نقطه باشد و اینجا که در مسافت زیاد بود اغلب جویوادی است
 و نوع ثانی بیشتر مشاهده کرد و تنگی مخصوصا در رقا لیکه تنگ شوند بیشتر عارض شود
 و هر سببیکه از او تنگی در مجاری عارض شود حصول او باعث اختلال اعمال اشیاء از آن میگردد
 و این اختلالات عمل میکنند بر جمیع بدن چون انسداد در لاف لازمه حیوت بهم رسد یا
 اینکه انسداد بواسطه سببی باشد که آن سبب در بدن اثر کند مانند اسهال و اسهال و اسهال و اسهال
 صورت هم باشد که هیچ اختلال عده هم در بدن پیدا نشود مخصوصا در وقتیکه یک الت
 عمل الت مسدود را بعل آورد مانند آنکه باشد که یکی از شاخهای قصبه مسدود گردد و بیکه
 از عمل افتد و عیبی در شخص هم نرسد چنانچه خواهیم دید که یک شریان عده و هم چنین
 او رقی مسدود گردد و با تنگ شود و در آن دم بواسطه شریان دیگر مجری باشد و یکی از
 تنگی انبساط او مجری است در مافوق آن زیرا که مواد صلبه با رقیقه با آنجا بر که باید از
 انجا عبور کنند و نمیتوانند در مافوق آن جمع شده ان فضای فوقانی را منبسط و برخلاف ما
 تحت آن تنگ کرد و این انبساط مافوق گاه بعدی شود که مایه خرق با جرح با ورم با ثقبه
 مجری گردد و از رطوبتیکه در میان است بخارج با در غایت و بف بدن با بمان اشاج و غینه
 سبب درم شد بد کرد و اغلب شخص را بحالکت رساند مخصوصا چون از رطوبت متراکم
 سبب تنگی و تعفن اجزاء بدن کرد و مانند او در و در تنگی و انسداد مجاری باید کادی
 کرد که آنها را از ابل نمود و اگر ممکن نشود باید جستجو نمود تا ان موضع بواسطه اسباب
 که در و الا با بیکادی کرد که مقل از رطوبت که از آن موضع اگم نمایند

در تنگی قلب قلب

سرپوشها

سرپوشهای قلب اغلب اوقات تغیرات چندی پیدا کنند که خفا متشان و باد شده و شکلا
 متغیر گردد و با این واسطه قلب را خنق نماید
 سرپوشهای قلب حاصل شده اند از دو طبقه غشاء داخلی قلب که در میان
 آنها یک تغیر از تنگی بعضی سخت میباشد و ضخامت سرپوشها در رقا عده و ضلع ان
 او آنها و تغیراتی که در او بهم میرسد محلش در یکی از آنها این دو غشاء است که یکی
 او قاعده بعضی بازوهای پلیچی روی او نموده باید که مورث تنگی ثقبه میگردد و
 چنانچه در ورم داخلی قلب بیان نمودیم بعضی بیه هادر روی سرپوشها حاصل
 شود که بعضی از آنها متشکل شوند از بیاض البیاض و فیبرین و بعضی دیگر بوجود آیند
 از ورم مخاطه و این بازوها که جذب شده زایل گردند و اغلب اوقات باقی مانده
 تبدیل گردند در جابغشاء غضروفی با غطی گشته از آنها اغلب اوقات ضخامت
 سرپوشها بدون ورم است و تبدیل و برون این ضخامت از ماده لیزی و بلندی
 از غشای واقع قلب است و اغلب تغیر یک در سرپوش هم رسد که عموما اختلالی هم
 در عمل آنها پیدا نشود ضخامت ساده آنها است و این حالت نادر است که از ورم آنها
 بهم رسد و اغلب بگونه هیپررت و در غشاء بعضی بهم رسد و این تغیر در سرپوشها
 بطن ایسر بیشتر از سرپوشهای بطن ایمن است و بندرت قبل از پانزده سالگی وجود
 نادر است بلکه هر چه پس بالا رود وجودش بیشتر ظاهر گردد و در جوان بیشتر از
 دیده شود و در سرپوشهای مایهین او رقی و قلب بیشتر از سرپوشهای مایهین دلی
 و بطن واقع شود اینجا که اختلال سرپوشهای مایهین دهلن و بطن باشد در سطح
 اسفل یعنی سطح بطنی بیشتر از سطح دیک است و این سرپوشها در میان بطن بوم
 و ضلع آنها پیچ کت گردد و خفا متشان باشد که بد و از ده مبلط رسد و شکل
 مایهین دهلن و بطن تغیرات چند بهم رساند که گاه مد و مرماند حلقه و گاهی بعضی و گاه

باشند عرض غیر معلوم است و در بعضی باشد که از ابتدا پیش و عسر النفس عارض گردد و بعضی
حمله های اختناق عارض گردد که بفاصله هر دو حمله سلامتی موجود است و بعد از چندی
علامات عسر النفس غیر دائمی گردد و مرین را کارهای با قوت دست کشیده و اطراف
کافی متسع و کافی بحال طبیعی است با رفقه رفقه تا غم دائمی شود و در فقر استسقا و در غنا
شود تا با غنا چون استسقا و دفعه بزرگ و محبت یافت باز مکرر عارض شود و یک

چاره بر نوبت و دوام مرض طول و غیر معلوم است

تشنجه مرض برای تشخیص کامل لازم است اول المعبر کردن وجود تنگی را و دوم
عمل را سیم نمیزد و هند طبیعت ان تنگی را که از چه سبب عارض شد چاره سازد و ثقیب با
توکید با بر پوشها پیچ تنگی مرض ثانوی وجود دارد یا نه و بعضی از مصنفین که بعضی علامت
مخصوص دانسته اند بگویند که نمیزد تنگی ثقیب قلب لسان است و تشخیص داده نمیشود و قنبد
چندین علامات با هم باشند مثلاً یک صوت دم یا آه از دور بآید و در موضع قلب باشد
که هر چه با بعضی غیر منتظم و غیر متساوی و عسر النفس و سلول اعراض مخصوصه قلب
باز هم بطور یقین نمی توان گفت که در تنگی ثقیب قلب تنگی حاصل شده و از برای آنکه
کوم یک ثقیب قلب مبتلا شده و الا باید از زمان حرکت قلب را تعبیر کرد که اول است با قوت
یا سیم و بیم باید تعبیر کرد که در کدام نقطه صدر صوت بیشتر است سیم باید تعبیر ملا حظ
که در بعضی از آن تنگی حاصل میشوند نمود مانند نبض و عمل النفس و غیره و آنجا که تنگی
در ثقیب آو برق باشد در محل قلب صدای موز موز کر به شنیده شود و صدای دم باز نهد
و در صدای اول شنیده شود و شدت این صداها در ضلع اسفل و نه سیم نزدیک عظم
قعر است در معبر آو برق افشش الحشت سانه بطور متد و شنیده شود و اگر تنگی مابین و بین
و بطن اسپر باشد موز موز کر به مسموع نگردد و صداهای دم و غیره در صدای دم قلب
دیده شود و شدت صداهای مذکور در نقطه با وسط قلب است که در قاع قلب هیچ
و شنیده

و شنیده نگردد و در این مرض نبض غیر منتظم و غیر متساوی گردد با صغرا و فک غالباً از لیا
این علامات بمنزله از چندین معتبرند مانند تمیز دادن اینکه تنگی در بطن ایمن و در کدام یک از ثقیب
او است مشکل است مثلاً گفته اند که وقتی که تنگی میان بطن ایمن و شریان و ریوی باشد صدای
دم و ریه و غیره در هنگام اول حرکت قلب در طرف چپ قصور مان نقطه که صدای دم و تنگی
او رقی مسموع میشود و بگویند چنان مینماید که این صدای بگویند بگویند بگویند است از صدای تنگی
تنگی او رقی شنیده میشود و از برای تمیز دادن مرض نبض اختلاف همین اصوات دلیل خرف است
مثلاً اگر صدای خشک و خشن و شپیه صدای پوست اهو باشد و اغلب دلیل بر آنست که مریض
ضعیف باشد اندچه هر چه بکند با تنگی ثقیب و چه نکند و عموماً صدای دم هر چه با تنگی بعضی و غرض
که سطح شان صاف باشد و صدای ریه و سوهان و اثره در وقتیکه که سطح شان خشک
و آنجا که هیپررت روف و اتساع با مرض بگویند باید در مجت افتاده شود

انجا که تنگی بعضی و غرض روفی با عظمی باشد لا علاج است این امر از سر
پیران تحمل بیشتر از جوانان است و آنجا که سبب مرض ورم باشد دفعه تو هلاک کند هیپررت
روف و اتساع قلب چون منتهی گردد بر خط مرض بفرایند
اغلب منتهی شود از ورم بعد از حمله های وجع مفاصل حاد و بعضی اوقات
رقنار مرض بطی و ابتدا پیش غیر معلوم است

انجا که سبب ورم باشد باشد که بواسطه استفراغ دم و مصروفات جلدی و
و استعجال شمع مفرج و داغ در محل قلب نمند تا مواد منتشر جذب گردد و چون مرض
طول کشیده باشد و ماده غرض روفی با عظمی پیدا شود چنان بعضی ماست مالها چاره دیگر
ندارد که شخص از کارهای عسیره دست کشیده زحمات و تعبیرات نفسانیه را دور گرداند
کم خور و در راهویه خشک و خوب منزل کند و پیرهن پشمی بپوشد و آنجا که هر چه
روغی که گاه که مری خون کم کنند و خون را مایل با معاد دهند بواسطه صبر زود و تنگی

دادن

مانند آن است که در مرض قلب ملوکور شد و باشد که از سد مان خارج نبوی فخر

عاریت کرد

مانند آن است که در تنگی قلب ملوکور شد ولی استخراج دم بیشتر ممنوع است
در اینجا و در بطن هیچوقت نباید استیصال کرد و ملوکور که سرعت قلب و طپش و خلبی زیاد
بود

در تنگی و انسداد شریانین

اسباب مرضی جمیع شریانین بدن تنگ و مسدود میگردد و تنگی آنها با خلفی یا
با اتفاقی است اینجا که خلفی باشد تنگی در یک مسافتی زیاد و گاهی در جمیع یک عرق است و چنان
میباشد که این تنگی بواسطه نقصان توالی است و اینجا که اتفاقی بود سبب و مردم شرابانی
و بعضی اختلالاتی است که در جدار و سران بهم می رسد در مردم شرابانی یک طوطی ماض
الپضی در جوف شریانین نشر میکند و منقبض میگردد و با آنکه خود خون غلیظ شده شرابانی
مسدود میسازد تنگی شریانین اغلب عارض میشود بواسطه تنگی با حواصیر از غشیه شریان
و با آنکه یکی از غشیه های او قند بل شود بماده غضروفی و باشد که سبب بعضی محصولات
اتفاقی باشد که در فضای داخلی شریان نمود نمایند و این محصولات جوف شریان را مملو
کند خون بعین حرکت نماید و بواسطه خون غلیظ میگردد و در نتیجه در موضع شریان
یکجای مسدود میگردد گاهی در بعضی حرکات عنیف غشاء داخلی شریان پاره میگردد و در
این صورت منعطف میشود و جوف شریان را مملو میسازد و پیشانی می پوشاند که مانع حرکت
خون میشود و اغلب اوقات انسداد شریان بواسطه این است که بدن و ن هیچ و می
طریقی در خون بخودی خود منقبض میشود و باشد که قندی از خون در جوف قلب پاره
عرق و سببی غلیظ گردد و بواسطه حرکت خون کند شده و داخل و ران گردد و با آنکه عرق
کوچکی

کوچکی رسیده و او را مسدود نماید و اغلب انسداد شریانین اطراف با بواسطه است و گاهی
سبب انسداد فشار خارجی است بواسطه بعضی ماده ها و غیره

تغییر این در شریانین بواسطه انسداد بهم می رسد

شریان مسدود شده مملو است از خون غلیظ شده سپاه و این خون غلیظ شده بغشاء داخل
شریان ملتصق گردد و در هر چه بیشتر می ماند انقباض بیشتر در رگش سفید تر شود و چون
هر چه خشک تر شود کوچک تر گردد و در جدار عرق راهم قشری بهم نزدیک کند و بعد از ملتصق
مغلظه و شریان یکی شوند و قند بل شوند به یک بندگی سخت و در این صورت حیات انقباض
واسطه انبساط شریان صکن خواهد بود

نتایج که از انسداد بهم شریانین بهم می رسد

نتایج شریان سر شده بواسطه وسعت محل انسداد و سبب مختلف شود اگر شریان عمده
یکی از اطراف در جمیع مسافتش مسدود شود غاقترا یا در انقباض بهم رسد و گاهی از اوقات انقباض
فالج بهم رساند یا آنکه مقدمه انقباض که گشته هنال باید و هم چنین اگر شریان یکی از احشاء مسدود
شود همین اختلالات در آنها بهم رسد مثلاً اگر یکی از شریانین شاخه های قصبه مسدود شود
انحز از ریه غاقترا یا کرد

در تنگی و انسداد شریانین و ریه

حیات با انسداد شریان و ریه ی قیام دارد مگر اینجا که جوف این قلب بخارج راه داشته
باشد چنانچه بعد از رجعت سیانوز بهمان خواهیم کرد شریان و ریه ی قیام بواسطه نقصان مملو
که تنگ گردد و این سبب مناسب مقدار خون بالیاقت او بهم خورد و بواسطه بطن این
باید حرکتش زیاد شود و لهذا هیپرتروفی و اتساع بهم رساند و لابد جمیع علامات این دو
مرض در شخصی پیدا شود اینجا که بواسطه ماده خارجی شریان و ریه ی تنگ شود عسر النفس شدید
عارض گشته نبض ضعیف و غیر منتظم و صورت بنفیس و حرکت قلب شدید شده کا

گاهی غشی روی دهد و این علامات باشند که بطور این بود که بزرگند و این در وقت است که مادی
 فشار دهند بواسطه چند جلیجا شود و اینجا که فشار بر شریان بواسطه ماده باشد که رفتن^{دیش}
 سریع بود چون خون مغلطه در بعضی نودی هلاک گردد و تشخیص تنگی شریان و رپدی تقریبا
 محال است و اگر حدس بر این مرض نهاده شود باید مقدار خون را که در واد و پهلکان بسیار
 استعمال نمود

در تنگی و انسداد آئینه

گاهی طبع عاجز آوری کوچک شود و این تنگی در حین حیوة تمیز داده نشود ولی سبب یکی
 از امراض قلبی که در همانند هیپرتروفی و غیره و صاحبان این مرض مادام الحیوة مبتلا^{استند}
 بعسر النفس و طیش قلب و اینجا که آئینه مرئیه تنگ بامسد و در کورده در محل خود بود بمسافت
 کمی بواسطه جمیع اسبابی که قبل بیان شد آئینه تنگ بامسد و در کورده ولی اغلب سبب تنگی
 بواسطه جمع شدن خود آئینه است و گاهی اغشیه و ضخیم شود و گاهی سبب تنگی حصول
 مواد عظمی و غیره است و باشد که سبب او خون غلیظ بود و این تنگی و انسداد در جمیع مقادیر
 آئینه حاصل شود میشود که مافوق موضع تنگ شده بامسد و گذشته منبسط و گشاده
 گردد و مواد و او کوچک تر گردد و در اغلب این اشخاص شریانین واقع در اطراف آئینه^{تنگ}
 تر شوند تا شریانین کردن با شریانین شکم و اضلاع متحد گردند و در این دم بواسطه اینها^{تنگی}
 شود و در اغلب این اشخاص شریانین اعلا بنزکر که از شریانین اسفل است و در اغلب اشخاص
 مبتلای با این مرض قلب هیپرتروفی و اتساع بهرسانند

علامات تنگی و انسداد آئینه در حین حیوة شناخته نشوند و حدس را میتوان زد
 که اول بواسطه وجع در موضع تنگ شده تا با بواسطه وجود صدای دم با ناله در موضع
 ثالثا بواسطه بزرگ حجم و شدت ضربه شریانین واقع در مافوق و کوچک شدن حجم
 وضعف شریانین واقع در مافوق و در اطراف حسی و حرکت غلیظ پیدا شود و در اطراف
 سافله

سافله ضعف و هزال پیدا شود و باشد که مرض منتهی گردد بمرگ و این در صورتیست که رفتن^{دیش}
 مرض سریع و در این دم بطور کامل نباشد و همیشه که فلیج و غانغرا با در اطراف سافله بهم
 رسد اگر چه مرضی است لا علاج ولی باشد که در بعضی خیلی عمر کند علاج در کاه کل مالی است
 و مستعمل میشود برای ترکیبات مرض مثل هیپرتروفی و غیره

در تنگی و انسداد شریانین اطراف

این امراض تقریبا همیشه خلقی نیستند و عرضشان بواسطه اسباب مذکور است که رفتن^{دیش}
 بیان شدند و اغلب عرضشان بواسطه خون مغلطه است که عروق داخل و بواسطه^{است}
 با بواسطه مسدود شدن شریانین او مواد دیگر مانند جواهرت شئی صاعط و غیره
 علامات باشند که عروق اطراف تنگ با بکلی مسدود گردد بدون آنکه هیچ اختلالی
 در بدن بهم رسد و این حالت در صورتی است که ریه در مرض بطی باشد در مابین شریان
 دیگر منبسط شده خون را لازم از او جاری گردد و اینجا که عرق ظاهر عروق تنگی با انسداد
 او معلوم شود در ضعف و عدم قزعات که برخلاف قدری بالاتر از موضع خیلی^{تنگ}
 میباشد و بجای شریان شپیه میشود بیک بندی سخت و گره دار که این بند^{تنگ}
 کوچک و رفیع میشود بواسطه جذب شدن خون مغلطه و جلا شریانین و اغلب اوقات
 انسداد شریان اصلی یکی از اطراف مورث غانغرا یا ای انغضو میکند و این انسداد^{تنگ}
 سبب ای غانغرا یا ای فوری و غانغرا یا ای شنجیخت است در هنگام اول در موضع بکه
 غانغرا یا باید عارض شود حس غلیظ و برودت احساس شود و جمعی بند بد سوزن متصل
 بدون هیچ تعبیری در اجزاء این بزرگرسد بعد ازان تنگ جلد قومن میباشد مرگ شود
 انساج تحت او متعجب و منتهی گردد و بعد از چند روز نقاط غانغرا یا ای ظاهر گردند و
 این نقاط و علامات مذکور عموما در نقطه که ابعاد قلب است ظاهر شوند چنانکه در
 اطراف سافله علامات در انامل و پشت پا و لاب و مرکز و تا نیا نفوقی بر و ترکند و اغلب

عضو در خشک و سخت کرد و چنانکه سایر علامات غانغزایی را بر او نکرند و خلا
ان غانغزایی که حصولش بواسطه انسداد و برید بود عروق پر خون هستند و از ان
علامات غانغزایی را بر او نماند و عموماً علامات مرض چنان است که سایر
در غانغزایی که شود و باشد که غانغزایی سطح زیادی را مانند یک طرف احاطه کنند
این صورت موت در مدتی از تحریک غانغزایی و کاهی از اوقات طولی نمیشد
که محدوده میشود و چون مرده خیلی طول کشد ناجدا شود و غانغزایی خشک خیلی
از غانغزایی را بر او نماند و سوا شود و جمیع علامات موضعی و اتفاقی و تپایی که در
غانغزایی که در هم در اینجا نیز مشاهده شود و غانغزایی شش خفیه چون صفت یافت
خیلی کثیر العود است باین قسم که خیلی از اشخاص بدیده شد که در چند ماه یا چند سال
فاصله انام ایشان متدراً جابجا شده بودند و بالاخره غانغزایی باز مرابت بپای
باساعد نماید

تشخیص غانغزایی شش خفیه است بغانغزایی که توسط مابین واسطه است
که مقدمات مرض را دانست تا تشخیص آسان کرد در ابتدا باشد که مرض شش خفیه
یا وجع مفاصل و علت نخاعی و در وجع مفاصل رنگ جلد و حرارت او با
طبیعی است و باقرین و گرم است در غانغزایی پیری بخلاف جلد سرد و بنفسی
و هم در غانغزایی اوقات شربان تمام و در وجع مفاصل شد بد کرد و در علت نخاعی
علامات در هر دو با هم بروز کنند و حال آنکه در غانغزایی شش خفیه بروز مرض
از یکپایه و یکطرف است

نقد منظره مرضی است و بخطر که اغلب منتفی هلاکت کرد و خاصه اگر انسداد
در مسافت زیادی باشد و خطری زیادتر کرد و چون بروزش فوری باشد و پیری
و فقر و رذائل مسته ضروری و بخطر مرض پیغمبر است

علاج

علاج اصلی رفع انسداد و برقرار کردن دوران دم است ولی تاکنون هیچ چاره حقیقه
این دو عمل پیدا نشده است و بعضی از اطباء بخیال خود بعضی معالجات بکار میبردند
اغلب بمقوبات و ادویه دفع عفونه و تریاک بکار میبردند و بعضی دیگر بخلا و خون
اضمه ملینه اندازند پس طبیب مختار است که چکند

در تنگی و انسداد

اوپر به کاهی بواسطه ضخامت جدارشان و کاهی بواسطه وجود خون غلیظ یا ماده
دیگر و کاهی بواسطه فشار مواد مجاوره تنگ یا مسدود میگردند در این وقت که در
دم در آلات لبنه واقع تحت انموضع بطور غیر ساند بجهت آنکه خون که در شریان بخوبی
حرکت میکند چون بوزیر رسد با پسند و نتواند بقلب رجعت نماید مگر آنکه شا
خهای دیگر وسیعتر کرد و از آنها بگذرد و علای که از انسداد و مرید منبج گردند مختلف
گردند باعتبار آنکه انسداد فوری است یا تدریجی و باعتبار حجم و برید و اینجا که در بد
عده دفعه مسدود گردان و مرید عملاً عضو باشد جز واقع در تحت انموضع متعجب شده
و حجم انضود و با سده مساوی حالت طبیعی کرد و جلد بنفسی گشته حرارت لمس کم شود
حسن عضو نقصان یافته بعد فانی شود و کاهی وجع شدیدی عارض شود ولی اغلب همان
حسن حرکت غلیظ خدر است و ثقل پیدا شود و اینجا که این حالت باقی ماند و خون بواسطه
و مرید دیگر نتواند بقلب رجعت کند غانغزایی را در طبع عارض کرد ولی این آنها بسیار
نادر است و اینجا که و مرید مسدود شده حجم بنزکی نداشته باشد نفخ و تهییج در عضو پیدا
شود که بوزی را بل کرد و اینجا که انسداد تدریجی باشد و مریدهای کوچک تر منبسط شوند که
چون انورید عده بکلی منسد کرد و بواسطه اینکه خون بخوبی بقلب رجعت نمیکند هیچ اختلالی
در دوارش و دم هم نمیشد بواسطه است که کاهی بدیده شد که اجوف صاعد بکلی مسدود
بوده بدون آنکه هیچ نفخ و اطراف و اختلال در تغذیه جمیع آلات جسم رسیده باشد



علاج باید بواسطه وضع مناسبه از گردن و سر و پدید آمدن و نگذاشتن هیچ فشاری مانع شود از انبساط او و رده سار عضوها و اگر تنگی زیاد باشد مددات و مسهلات مستعمل دارند و موضع اندازند و فصد از سر پدید همان موضع نمایند و آنجا که عرض مرض در او و اخراض مرض باشد باید معالجه قوی نکنند و عضو را با پارچه پنبه ای بپوشانند و بپوشانند

در انسداد و سر پیدای اجوف صاعده

چون انسداد در ورید بکلی از خاصرتین بوده و در وقت وقوع و غیره و در بد شکم منبسط گردند و خون بواسطه انقباض جوع قلب کنند و آنجا که انسداد در اجوف صاعده بود علامات نفخ در ریه پا بپرسد و دلی پیدا شود و تهیج از پائین ببالا حرکت کند و استسقاء زرد پیدا شود با وجود آنکه خون میتواند با عانت اجوف مائل قلب رجعت کند شخص میتواند مدت ها زندگانی نماید این عمل است که وریدهای تحت جلد شکم بحجم انگشت کوچک و متعدد بزرگ شوند و وریدهای اسفلی و وریدهای اعلا داخل شوند و بعلاوه بر این علامت که یکی از اسباب تشخیص مرض است تشريح مشاهده کرد که وریدها اسم له منبسط گشته و قائم مقام اجوف صاعده گشته

در انسداد و سر پیدای کبد

علیه که از انسداد این ورید پیدا میشود مانند آن است که در انسداد اجوف صاعده ذکر شد فرقی ندارد در ظهور و رفتار آن علل است که در ابتدا استسقاء زرد در این مرض پیدا شد پس آنکه شکم خیلی بزرگ شد اطراف صافله متنفخ گردند و در انسداد این ورید خون رجعت میکند با اجوف صاعده و ورید تحت جلد شکم بزرگ گردند

در انسداد اجوف مائل

انسداد این ورید بواسطه فشار یکباره است صلب که در مجاری و ریه می رسد مانند کواطر طافی و ابورپمای آتورق و مانند کجلا خود و ورید هم آمه سبب انسداد کرد و در این مرض نفخ و تهیج اطراف غالبه می رسد و این نفخ کاه در یک طرف پیش از طرف دیگر است و گردن بینی نفخ حاصل کرده

کرده صورت متفح و متنفخ و لبها بزرگ و کبود و جنبین سیاه گردند و کاهی رطوبت در سینه پدید آید و او رده اطراف غالبه و گردن حجم گردند و عسر النفس عارض شود با بواسطه اخراستنیجی در بدن بروز نکند و بعضی را ثقل راس و صیبات و کاه کاهی علامت سکتی بروز نمایند و اوقات علامات ملاک و خوف پدید بر فترت فرج شوند ولی بزودی عود کنند و در اغلب آنها مرض بمرکب است و در این مرض رجعت خون اعلا بیدن بقلب بواسطه بزرگ شدن و وریدها اسم له است چنانچه حجم او پنج برابر حال طبیعی بیشتر شود و سایر وریدها نیز که داخل او شوند نیز متسع گردند

در انسداد معده و مجاری ام الغالب

در معده های ماعده و دفع ماده بهم می رسد که مایه انسداد آنها میشود نوعی جونی و دیگر بواسطه تشنج کردن و طوبی ازاله بواسطه تورم او از برای نوع اول سبب حرکت نکردن خون است مانند تنگ شدن اجوف صاعده با دلیج غائر که در این صورت و در دماغ بزرگ با پاره گردند و رطوبت با خون خالص غشاء المخاطی تحت ام الرقیق و در مجاری دماغ و در جوف خود ام الرقیق نشینند و علامات مخصوصه این مرض مانند هذیان تشنج و اغما و غیره بروز کنند ولی هیچک اختصا صی ندارند که در این بواسطه آنها بتوان تمیز داد و برای علاج همه فدا می مکن آنکه وضع مرض را بقسمی بزرگ گردند که خون بکثر ساکن شود در آنها و گاه لازم شود که چند عدد دارو بدهند

در انسداد و تشنج مجاری هوائیه

اسباب زیادی هستند که مایه تنگی و انسداد مجاری هوائیه اند که بعضی از آنها در فصل جدا گانه بیان کرده و می کنیم مانند برونشیت و خناق و بعضی دیگر که اختصاصی دارند در اینجا مذکور می نماید بکلی از آنها که شدن فضای مجاری هوائیه بواسطه فشار و خنک که قصبه الریه و شاخه های او بواسطه مواد چندی فشرده شده و بهم می پیوندند چنانکه فشرده

شود قصبه الریه فشرحه شود بواسطه کواجر مجیم و همداغما بواسطه ابوریه ای و رقی و غل
 سلی و بعضی اوقات شاخهای قصبه الریه مسدود گردند از بهم آمدن جلد مرشان و تبدل
 شدن اغما به بندی سخت و محکم و گاه هبیرت روفی در غضروف لبضی در شاخهای قصبه
 پیدا شده مایه تنگی فضای او شود و در اینموضع چون هوا کمتر داخل میشود بویه صدای تنفس
 و زایل گردد و از بزرگ و پیوستن صدای سینه که در شنبه شود و اینجا که تنگی در قصبه الریه باشد
 این علامت در جمیع صدر بودند و عسر النفس عارض گردد و در هر فردی بودن نفس يك
 صوتی استماع گردد و خشن و اینجا که تنگی و انسداد در یکی از ثقب قصبه باشد بایک شش
 خارجی روی او افتاده باشد صدای تنفس طبیعی مسموع نشود از طرف علیل و وقتی که
 این تنگی در رقیبانیوی باشد ضعف صدای طبیعی با فقدان او از همان موضع احساس گردد

در تنگی جری

اسباب و تشریح تقریباً همیشه تنگی جری بواسطه ضخامت جدار او است و این ضخامت
 گاه حاصل میشود از ورم حاد و مزمن مانند اشتها که نفهمیده مشرب عرق خورند یا
 بواسطه ماندن شی خارج چون استخوان و سوزن و پول و غیره و در بعضی بواسطه
 مواد اسفیرومی و سرطانی است و باشد که سبب او بواسطه فشار سایر مواد بود چون
 عظم کاعده و زائک و مواد سلی و ابوریه ای و رقی و باشد که این تنگی و انسداد خلطی و
 تنگی در يك محل است یا در چندین محل بمسافت اندکی و اغلب اوقات تنگی در قطعه اعلاى
 مری و بعد از قطعه اسفل است یعنی در نقطه تنگتر الت و در این اختتام جز
 واقع در مافوق محل تنگی کشاد و جز مائحت تنگ گردد و عموماً جری کشاده مری را
 طبیعی باقی ماند و گاه ضعیف گردد و این ضخامت در رنج غاطی خاصه در رنج عضلاتی است
 و بواسطه حصول جراحت مری تنگ شده بقصبه الریه و با او رقی و جنب و پارچه و غل
 لمخانی عنق و با قاسم القند در پیداکند و این معبر حاصل شود مخصوصاً حاصل گردد
 و فتنه

و قه که سبب ورم سرطان باشد

علامات و تشریح در بلع اغذیه صلبه يك عسرتی بهم رسد که کلوهای غل
 چون بموضع تنگ شده رسد اندکی اینجا توقف کند و حس خجالتی و پیاو جعی
 در شخص پیدا شود و این حس را کردن یا در ریشیت قص یا در ریشیت ظاهر است مواضع
 موضع تنگی و بعد از جد و جهد زیاد و تشنج عضلات مری بالاخره غذا بگذرد و اینجا
 که تنگی در چندین محل باشد مری حساس کند که کوله غذا فی در چندین موضع است
 نماید و برای تحصیل عبور غذا مریض آب بدرقه کند و اینجا که تنگی در قطعه اعلاى مری
 باشد انکشتان از خارج کوله غذا و فشار دهد تا بلع گردد و چون عسر البلع شروع کند
 و زود بودن مایعات بن عسرت پیدا کند و چنان موضع تنگ گذر کند صدای غلغله
 شنیده شود و چون مریض بایند رجه رسد غذا در مافوق محل تنگ شده جمع گردد پس این
 مدتی بگذرد پس از مدتی بگذرد و بی حمت مانند نشی رشت یا با زحمت است اینجا که
 موضع تنگی در جری اعلاى مری باشد باز گشت غذا از هنگام اکل چون طولی خواهد
 کشید و چون تنگی نزد يك بمعک باشد که شی ملکول يك تا دو سه ساعات در اینموضع
 بماند و با وجود این مدت خون فی کند هیچ تغییری در غذا بهم نرسد و بند رقت در قلی
 از اینها آثار هضم نمودار شود در مایه غل بعنایه و قه که مری خالی است اغلب مری
 رنجبه نلارند و در بعضی بک خصوص اینجا که سبب فاده سرطان باشد در اینموضع
 لری جمع گردد که با زحمت زیاد و مریض او را دفع کند که از دفع او خیلی حسنتکی حاصل
 نماید اشتها مبتلای با مریض زود هزال یابند مخصوص اینجا که سبب سوء القنیه
 سرطان باشد

نکات و تشریح چون يك اتصال از مری بالات مجاور رسد بعضی
 پیدا شوند مثلاً اگر با قصبه الریه یا یکی از شاخهای او اتصال پیدا کند بلا واسطه بعد

از بلع سرهای بیای قنکی نفس پیدا شود و مریض از دخول غذا در مجرای هوا خفه گردد و آنجا که اتصال با جنب پیدا کند ذات الجنب شد پیدا حاصل کند و آنجا که باریه متصل گردد و پره متورم و نفوذی در مریض حاصل شده با غائر از ایا گرفته فاسد گردد و هم چنین اگر اتصال با غشاء الحارقی عنق با قاسم الصدر باشد و ما بلع غائر از ایا مملک حاصل گردد و چون با آور قنصل پیدا کنند نفوذ الدم شد پیدا حاصل گردد

تشخیص مریض از عسر البلع مدای تنگی در وجود تنگی نخواهد بود و از انداختن میل مری موضع تنگی نمی معلوم گردد و از برای تعیین کردن طبیعت مریض باید مقلدات مریض و علامات حالیه را معلوم کرد مثلاً اگر از خوردن مشروب محررق با آن بلع شی خارج بلافاصله و مری را و پیدا شود معلوم میشود که و مری است ولی اگر عرضش تند مریجی باشد و هر گاه کند با هزال و مریض در رسن وسط یا توقف باشد باید حدس نزد بوجود سرطان و اگر مریض ورم غده و اینه حجم داشته باشد و عسر البلع در حوض اسفل عنق باشد باید سبب همان غده دانند و دانست و اگر شخص مبتلا باشد بمریضی خطرناک در حلق و قصبه باید سبب آن مریض را دانست و حدس بجهت سلی میرود در وقتیکه شخص جوان و صاحب غدد غنای در گردن باشد و اگر موضع عسر البلع در مریینه باشد باید جستجو کرد که ابوریمیا وجود دارد در آورقی یا نه در وقتیکه سبب ابوریمیا باشد عسر البلع دائمی نخواهد بود

فقدان المعرفه معلوم است خطرناک و مهلك است
علاج آنجا که سبب تنگی ورم مزمن باشد امید فرج هست که در استعمال مصرفات چون داغ و شمع در موضع مقابل جان است و اشربه الكلن بنوشانند و بواسطه استعجال مبله های کوم الاستی که در مری آنها قطعه ابوری بسته باشند الت واضبط سازند و همچنان انداز انبساط میل را بزرگ نکنند با ابی و میتوان سر میل را از روغنی باشی باقی الوده نمود و آنجا که سبب سرطان بود باز باید موضع واضبط نمود ولی سودی ندارد و در این وقت باید خبر

باید خبر احتیاط کرد از انداختن میل که بخلاف شود

اسباب تنگی امعاء متنج میشود که بواسطه فشار خارجی چنانکه معاء مستقیم تنگ شود بواسطه مواد واقعه در حوضه کوچک و انعطاف رحم و هم چنین بواسطه اجتماع بر اثر شدن او و بنی تنگ شود بواسطه وجود اشیا خارجی مانند تنگ مراره و غیره یا حصول مواد پولیپی و کاهی بواسطه ضخامت اغشیه معاء است اشیا صلبه خلاف شرع میکنند و ملوث واقع میشوند بواسطه چسبند معاء مستقیمشان تنگ شود چه از ماده کوفتی چه از ماده سوزنی و بنی بواسطه حصول اجزای حیات دیگر تنگ گردد معلوم است سبب تنگی در این مواضع بواسطه از ابل شدن قطعه از مخاط و البتام او و اثر جراحت است و میشود که تنگی خلقی بود در این صورت کاهی یک سر پوش در حوض او پیدا شود و این سر پوش را از گردن مشقوق است با از اطراف او بجهت دفع بر اثر تنگی که در یک نقطه است و گاه در نقاط چند و گاه یک میلی مطر و گاه ناهشت هم دیده شده و آنجا که تنگی در نقاط متعدده بود معلوم است که سبب او مری بوده است و انداز تنگی هم بحسب رجه مختلف است تا با انسداد کلی و همیشه قطعه مافوق تنگی کشادتر از حال طبیعی و قطعه واقعه ماده او تنگ تر از آنچه جمیع امعاء میتوانند تنگ گردید ولی بعضی زیاد تر و بعضی کمتر است و اد دارند مثلاً در معاء صائم مادر و در قطعه اخیره معاء غلاظ کثیر الوقوع است خاصه در معقد و بقول بعضی اغلب بزرگتر از این معادن است و پست سالکی است و قبول دیگر در زنان از رسن سی یا چهل پنج گفته اند و در مردان از پنجاه تا شصت است **علامات و رتبه مری** موافق محل تنگ شده اختلافی در علامات بهر سبب آنجا که تنگی در مسافتی زیاد و قریب بمعدن باشد مریض اغلب اوقات فی رقیق نماید مخلوط با غذا و هوا و چون اعلای شکم برآمده و صوت نفخی از قعر او استماع گردد

وسوء هضم عارض و بر اثر کم و اختلال در عمل تغذیه حاصل گردد و در بعضی موارد این هزال باید
 و انجا که تنگی در رانتهای معاء و قاق و ابتدای معاء غلاظ بود عمل معده کمتر مختل گردد
 و شکم برآمده و متنفخ گردد و حلقه های معاء و قاق اغلب از زنجیر جلد نمایان شود
 و وجع در موضع مدام عارض شود و از سبب چیزی مفهوم نشود و بواسطه فقره صدک
 شکم زیاد گردد و مکرر برب موضع تنگ شک که صدک را که در گردن بواسطه جمع شدن مواد صلبه
 و ماف و اشتها کم گردد و سوء هضم پیدا شود و بعد از خوردن غذا نفخ شکم زیاد و قوی
 و درد عارض شود و خروج بر اثر کم گردد و در بعضی برخلاف کاهکاهی اسهال
 عارض شود و در برخی اسهال و پیوست متوالی گردد و در بعضی پس از پیوست
 چند روز بر اثری با هوا دفع شود که بعد شکم کوچک شد و متخفیف در کلیه علامت
 بمرسد و این علامت اخیر مخصوصا در تنگی معاء مستقیم دیده شود و در تنگی مستقیم
 پیچ و مغص عارض شود و در بعضی حصر مانعی در مستقیم گردد که لابد انگیشت بر ندهد
 مانع را دفع کنند و بعد از آن جلد و جبهه بسیار ماده دفع شود استوانه شکلی با بناف تنگ
 و انجا که تنگی در تحت ذویه عجز و قطن باشد انگیشت سبابه با و برسد و اگر بالا نرود بواسطه
 مبل مری یا در قطن با و برسد و موافق طبیعت مرض بطریق ازان خارج کردند و انجا که
 سبب مرض شی خارجی یا ماده باشد بعد از دفع ان ماده عمل الت بحال طبیعی برگردد و لی
 چون سبب التی باشد بعد از چند زمانی الت بکلی مسدود شد و در شکم مرض یا بر اثر علامت
 ابل و هزال شود

دوام مرض مختلف شود موافق سبب مرض انجا که سبب سرطان باشد مرض
 روز بروز ترقی کرده بعد از چندین ماه مرض هلاک شود و اگر تنگی از بروز ماده لیضه
 باشد مدت ها بهین حالت بماند
 تشخیص اغلب از تنگهای معاء مدتی ناشناس میماند زیرا که اغلب دفع براز
 میشود

میشود و بعضی هم مبتلا گردند باسهال و قولنج و هزال و اینجالت مشتبه شود بوم
 مزمن معده و امعا و بواسطه استسقاء طبعی و برآمدگی حلقه ها معاء باید بحال و حی
 تنگی در موضعی افتاد و چون اغلب بر و بر تنگی در معاء مستقیم است باید از حالت ان
 با انگشت مطلع گردید و اگر در چیزی یافت نشود دانسته شود که تنگی در محل دیگر است
 چون تنگی معلوم شد و محلش معین گشت باید طبیعت او را هم فهمید و لی این کار
 بسیار مشکل

فقدان المعز انجا که سبب مرض علق باشد که طیب بتواند دفع کند خطری ندارد
 و چون سبب دفع الت باشد و در بر و بر تنگی در معاء و بر تنگی در معاء و بر تنگی در معاء
 سبب اسهال و بر باشد خطرش بیشتر است و در معاء علیا خطر تر است تا معاء سفلا و حی
 در حرج اسفل مستقیم بود که جرح و طیب بتواند و با بانموضع رساند خطرش کمتر است
 علاج اگر سبب فشاری باشد که از خارج معاء رسد از جای کردن الت رفع میگردد
 و انجا که فشار بواسطه یکی از اجزاء باشد باید کاری کرد که او را از اثر معاء دور نمایند
 تا بعد اگر ممکن باشد با استعمال ادویه او را از ابل سازند و انجا که سبب تنگی غوالف انساج
 معاء باشد و محل او مافوق مستقیم بود هیچ چاره ندارد و هم چنین خیالی مشکل است اتساع
 او چون محلش و ازده سابقه طر از مفعله بالا بود پس از و به طبای بطور این و مشرق
 و دوش مستعجل آرند و ادویه نهی قوی بدی بخورند و تدهین موضع کنند و لی این ادویه
 منفعتی ندارد مگر مشغول مرض انجا که تنگی در مستقیم باشد و مجلدی بود که دفع نماید
 بر اثر زایل بماند و شد که وسعت موضع داد و برای این قبله در ان فرو بردند و جابج
 قبله و برای قرق بریدن چوب کنند با پای و ی که طیب واجب میداند که چون سبب کوفت
 باشد یا ورم مزمنی بود روغن جیره نمایند و انجا که مفعله مسدود شود و شوق مرض شرف
 مرگ باشد در خاصه موجب بطریق کلین مقعدی مصنوعی بنا کنند

در فوائدها و ابلای

چون معاء در موضع مسدود گردد و جمعی شدید در شکم پیدا شود و شکم بزرگ شده و بازو و پا
 از مفعله خارج نشود و فوق و قعر عارض گردد و قوائی بعد صفراوی بعد از آن برآیزی گردد
 سبب و تشريح مرض اسباب این مرض بسیار است بعضی از آنها غلبه ایشان در خارج
 و بعضی در انساج و بعضی در جوفها است که از بروز نبدی بعضی سخت در صفای و نبدی
 شدن ضمیمه اعور پاندهای شریک که التصاق میان هم پیدا کنند و مانند حلقه روده و اما
 نمایند و گاهی پیشتر که حود روده بروی یکی از این بندها حاصل شده پیچیده خفه شود و هم
 روده تنگ شود بواسطه حصول ماده قریب با و یا بزرگ شدن کبد و لحمال و نیز از اسباب آن
 فقدان مفعله خلطی و اسهال و سردی و سرطان و کلبه های روده و از اسباب آنکه محل آنها در جوف
 بکلی جمع شدن و از خشک شدن او است با وقوع شی خارجی مانند سنگ مرار و همته و
 کرم مفعله و فرو رفتن روده در خودش امراض متبیه از ابلای و سبب این است که مافوق موضع
 و ماتن ضیق گردد و ورم صفای عام پیدا شود چه از کشاد شدن معده و چه از پاره شدن روده
 و ریختن بر آن در صفای و پاره شدن روده نادر است که فقط بواسطه اتساع زیاد باشد
 و اغلب غایتن ابلای را و پیدا شده مورث فساد گردد و گاهی بواسطه التوالی معا حاصل شود
 علامات و ابلای و ابلای و سبب عرضش دفعی یا تدریجی است اینجا که
 تدریجی باشد قبل از بروز آن بعضی اختلال اند در الالهضم بهر سبب و این حالت مشاهده گردد
 چون سبب مرض جمع شدن و خشک شدن و باز باشد با وجود شی ای عارض گردد مانند خفافت
 جدار الت با سرطان و چون سبب اختناق معا باشد مانند بعضی ققهای مختنق و حصول
 بندهای غیر طبیعی بروز علامات فوری خواهد بود که در حالتی که مرض کال صحت را دارد
 بدون سببی معین یا بعد از اکل یا پس از نشی زیاد یا پس از بلند کردن مابری سنگین و
 کبد واحد و است در ناف یا در یکی از کودهای خاصه عارض گردد که بنوعی جمیع شکم
 فراگرد

ذکر کرد و این وجع متصل و یا تشنه است که مرض اسهال فرا بگذرد و اغلب آنها بروی خاک غلطند
 غلق و اضطراب زیاد را بخا بهر سبب در این بین قی صفراوی یا غذای عارض شود و دفع بران
 محال گردد و در ابتدا از فشار بر شکم و جمعی احساس نشود مگر موضع علیل کم کم شکم بزرگ
 شده استقاء طبعی در او حاصل گردد و طولی نکشد که حلقه های روده که مسع شده اند
 از زیر پوست دیده شوند و متشیخ گردند و در این وقت قولنج شدت نماید و از ابتدا صوت
 تغییر یافته بهم کشیده شود و عطش شدید عارض شده تنفس سریع و عسر گردد و بعضی ضعیف
 و سریع جلد گرم و ترک گردد و بعد از آن فوق دست داده قی برآیزی حاصل گردد که از عبور آنها
 از دهان و خلطی طعم بسیار بدی بجهت برض احساس شود در این وقت اغلب علامات مرض
 صفای بروز کنند که جمیع شکم از فشار موجه گردد و فوق متصل شود و خیلی موجه شود
 معدوم و چشمها عمیق گردند و هاله بقیشتی بد و بر آنها پیدا شود و جمیع صورت هلال بایک
 نمایی و غیر منتظم و بسیار سریع گردد و عرق سرد در جلد پیدا شده قوی فانی گردند و بعضی
 شود در صورتیکه مشاعر برجا باشند ولی اغلب بکند و ساعت قبل از مرگ رنجها بکلی
 گردند و عرض بکمال کند صحت بافته رفته رفته مرض همیشه حاد است خاصه و قتی که سبب ضیق
 مختنق باشد که در غیر اینچالت باشد که تا دو هفته مرض دوام پیدا کند باشد که مرض تشنفا
 گردد که قیهای برآیزی پس از چند بند آیند و باز و باز مفعله خارج گردند نفخ شکم زایل
 سرعت نبض کم شده قوی گردد
 تشنفا و ابلای و سبب و جمیع شدید و فوق و قی صفراوی و برآیزی و پیوسته دلیل
 بر خفگی روده هستند و اینجا که ماده در جاها نیکه قیق بروز میکنند نباشد شناخته شود
 که خفگی روده در داخل شکم است ولیکن خیلی مشکل است که بتوان طبیعت و سبب
 فهمید و اینجا که بروز علامات دفعی باشد معلوم که اختناق روده بواسطه بروز نبدی با
 حلقه است عمر طبیعی و اینجا که مرض پیوسته طبیعی داشته باشد یا آنکه پیوسته با اسهال

tarikhema.org

tarikhema.org

موازی کردند و در بعضی در یک موضع شکم و جگر احساس کند و شکم متنفخ شده و زال پیدا شود و در بعضی در موضع خالی است الی که در عضو پیدا شده و اینجا که سبب جمع شدن و خشک کردن بدن بود شناخته شود بواسطه بروز ماده که در سخت که واقع شده باشد در معبر یکی از اعضا غلاف مخصوص در یکی از کوبهای خاصه و اینجا که سبب انقباضی فاسیون باشد نیز از این بیان شود

نقد ماهره بسبب خطر است و در خطرش بحسب اسباب و محموله اول است اینجا که بسته شدن و جمع شدن بواسطه اسان است اینجا که سبب مرضی آلتی باشد تا امید حاصل است اینجا که با نرم صفاق مرکب شود منتهی به اکت است

علاج اینجا که از جمع شدن و خشک کردن بواسطه انقباض و یا پائینی او و بهر مسهله بکار روند و چون سبب مرضی آلتی باشد مسهلات مضر خواهند بود چون سبب اختناق باشد گاهی رفع اختناق کند و گاهی در اعظم مسهل ضرر دارد گاهی از اوقات نیز بخالص کلوله سرد میخورانند ولی اکنون مستعمل نیست یکی از معالجات بسیار با فایده استعجال بودت است که مثانه های غلیظی از رخ بروی شکم گذارند و اشربه بارده بالفعل بخورانند و اما له غایبند و گاهی مصرفات شدید بروی شکم مانند سوختن و زخم کردن و غیره بکافیه میشتد دفع مرض نمود و قبل از این معالجات بهتر است که استفهام در مافات نمود و ضمادات ملین و اسهال علق نمایند و معالجات سرد و گرمی مستعمل است و قبل که ترکیب با ورم صفاق با فایده باشد خاصه در این صورت ند هین با روغنهای زردی کنند و اینجا که شکم خیلی نفخ کرده برآمده شود و با دها باقی دفع نشوند با نروکان همیشه شکم را موریخ کنند تا بخارات دفع شود و تسکینی حاصل شود و با شد که بر او دفع بخارات حرکت دوی معارضه جعت مواد بخاری و برای بکدرند از موضع خفه شده اینجا که هیچ چیز منفعت نکند و بعضی قویا با جوت باشد بعضی بپایند که شکم را بکشانند و سروده با جال اصلی و رند و بعضی

بعضی منع از این عمل کنند اما چون در بعضی حکا میبرد امید هست که از این عمل کسانیش حاصل شود

در انقباض آلات بدن انسان و اساع

اساع عبارت است از این که شدن تجاویف و مجاری بدن انسان بیشتر از حال طبیعی و سبب اساع آلات مجوفه منعی است مدامی یا موقتی بجهت جریان مواد صلبه و رقیقه که در آن جوف عبور میکنند که آن منع لابد بسیار از انواع دارد جمع شدن در یک نقطه چنانچه در اندام و تنگی مذکور کردید و گاهی از اوقات سبب اساع آن است که طویله راه در آن حال طبیعی نشتر کند و فتواند از مجرای طبیعی خارج شود لهذا در آن آلت مجتمع کرد و اغلب اساعات شعبه قضیه الویه بدن واسطه است چنانکه در پرو و ن شبت کاپیلر بیان شد و باشد که بکجی منسج گردد بد و ن منعی آنرا و چنانچه در جها بهای سر پر قلب دیده میشود و بعضی از مصنفین این نوع اساعات را حمل کرده اند بر ضعف آلت که در آن از عمل او خود بطور شایسته بپاید و در هرجه اساع آلات مختلف است و اساع آلت گاهی منخامتش بحال طبیعی است و گاهی نازک گشته و زال پیدا کند و گاهی بخلاف فنجیم تران حال طبیعی شود و این زیادهای فحامت بخصوص در غشاء عضلاتی آلات است و باشد که اساع بدرجه رسید که قوه ادجائی آلت بکلی معدوم شود و باشد که مایه خونی و جریح و غائر اپای آلت گردد و مواد داخله او بخارج و بخته سبب علل دیگر گردد و اختلال که در اعمال بدن بواسطه اساع بهم میرسد آنها نیست که از بطور حرکت مایعات و اجزای

در اساع شاخهای قضیه الویه

تشریح مرضی اغلب اوقات يك با چندین لوله یا شاخه قضیه در جمیع امتدادشان متسع گردند و این اساع گاه بحری شود که آنکشت کوچک را توان در او داخل نمود و گاه

انتعاش فقط در یک نقطه مجری میباشد که در آن نقطه يك برآمدگی ملا حظہ شود که عظم آن
 يك از زن الی يك کرد و است و چنان میباشد که این حرف حاصل شده از جرم هر یک و لی
 چون خوب بشکافند معلوم شود که انتعاش شاخه قصبه از طریق بلا انفصال است
 و آنجا که چندین شاخه در پهلوی هم متسع گردند از اجتماع آنها يك ماده بزرگتری
 بهم رسد و هرگاه انتعاشهای بهم راه داشته باشند شپیر شود بمقاومت های سلی و
 باشد که در يك شاخه در نقاط چند انتعاش بهم رسد مانند آنکه خود در این صورت ^{سطح} ^{بواسطه}
 شباهتی به تسبیح انزانتعاش تسبیح خوانند هم صورت در موضع متسع شده بزرگ
 درمی شکل جمع شود و انتعاش موضع هر یک گاه بغضامت و قوام طبیعی است و گاه هیئت
 در وقت حاصل کنند و گاهی هزال یابند و در میان انتعاش شاخه های قصبه در موضع
 متسع اغلب اختلال در غشاء مخاطی و است و آنجا که انتعاش زیاد بود جرم هر یک ^{فشرده}
 شود و هواداخل او نکرده و انتعاش در جمیع اجزاء به هم رسد و غالب برونش ^{فشرده}
 قطعاً علا وضع مقدم او است

علامات ابتدای مرض هیپوفت مفهوم نکرده و چون مشاهده کرد و ادباً
 مرض چنان مفهوم کرد که مدت زمانی است یعنی چندین سال است که او شرف
 میکند و نفث زیاد و ری شکل و غلیظ و متعفن از سپینه او خارج میگردد و یکی از
 چیزهای مخصوص مرض آن است که نفث دفعه زیاد شود و مرض پس از چندین روز متوالی و
 عسر و جهد و جهد در کردن يك لوله از نفث ری شکل یا بوی سپر آدهان او خارج گردد و آنجا
 که انتعاش کم بود از پیکوسپون و اسکولاسپون غیر از علامات بدون شیت مرفن چیزی معلوم
 نشود و چون انتعاش زیاد و در چندین شاخه باشد و چون جرم ریه فشرده شده و هواد خارج
 و داخل نشود صوت قرع که آید و اگر گوشه را در صدای دم شدید و برون کوفتی که همراهی کند
 بارال رطب و عظم شنبه شود و این را گاهی مجردی است که مشابه شود با صوت غلغل
 این را

tarikhema.org

این را با کثرت نفث فقط علامتی است که میتوان با آن انتعاش شعب قصبه را تمیز داد و لی
 چون انتعاش کوچک باشد صدای دم و رال مفاسری شنیده شود که مشتبه شود با سلی و
 چون علامات عمومی خطر ناک در این مرض برونش ندارند اما چون اشتها بحالت طبیعی و بزرگ
 بدون نقصان است از سبب تمام این است و لی چون خروج نفث بی اندازه و مریض هزال
 یافته و علامات حایقی در آن موجود شود بهیچ وجه از سبب تمیز داده نشود

درمان و اشیای مرض رقان مرض مزمن که گاه گاه بواسطه عرض يك
 برون شیت حاد اشتداد پیدا کند و و ام او غیر معین و نادراست که منتهی بربك گردد و
 اغلب از ترکیب و با ذات الریه و سلی مریض هلاک گردد و باشد که انتعاش سبب غائز آید
 در این صورت نفس و نفث متعفن گردند

تشخیص این که انتعاش در جمیع ریه باشد اغلب مشتبه گردد با برون شیت مزمن و
 بواسطه شنیدن صدای غلغل و برونک او فونی و زیاد و نفث باید حدس بر عرض
 انتعاش شاخه های قصبه زد و آنجا که انتعاش مانند طاول بزرگ باشد مشتبه گردد با غا
 سلی و چنانچه پس از این ذکر خواهیم کرد در آن باب بواسطه علامات مخصوصه او تمیز خواهیم
 نقدیم ^{المعرفه} اگر چه بخودی خود خطری ندارد ولی مورت رنج مریض گردد و لی ^{بواسطه}
 مستعد سازد بجهت عرض ذات الریه و برون شیت حاد و بدین واسطه مرضی هلاکت
 رسانند و چون مدت او طولی کشید لا علاج است

اسباب نادراست در اطفال عارض شود و اغلب عرضش در مردان بزرگ است و
 اغلب منتج گردد از برون شیت مکرر و طریقه انتعاش معلوم است که از زیاد و ^{طون}
 مخاطی است که بزودی نتواند خارج شد لهذا اغرض را متسع سازد

علاج چون برای رفع انتعاش چاره نیست باید دفع برون شیت را نمود چنانکه با
 شده بعضی استرکین استعمال نموده اند ولی سودی ندارد

در اتساع جباهای پیرامون و زبکولی

این مریض عبارتست از اتساع عدد زیاد و از جباهای پیرامون
 علامات تشنجی چون سینه را بکشاند و به بخلاف حال طبیعی است یعنی سینه در پهلوی است
 و هیچ چنانکه پس از کشیدن سینه یک دفعه برآمد که در دو واسطه زیاد و حجم دایره میشود
 که قلب را بکلی پوشیده است و اغلب ریه بین بر وی یکد یک گرفته اند و قلب قاسم الصد
 تغییر مکان نمائند و مجاری جاذب پائین رود و جدا میگردد و در هر یک جن باکلی منبسط
 گردد و فاصله بین الاضلاع زیاد میشود و چون ریه را میباید و وانگشت بفشرد صد
 که پیلای سیون خیلی کم شنیده شود چنان نماید که هیچ او خفیه شده است و همان دو انگشت
 چنان احساس شود که کوب با بالشی از بر قور لمس میکنند و چون با جاقوا و بر اینند
 رطوبتی کم و تقریباً بدون خون است و چون در آب گذارند کمتر از ریه سالم فرو
 رود و چون بدقت ملاحظه کنند عدد زیاد و از جباهای پیرامون ریه که در حالت طبیعی است
 و حجم آنها از قدر آن زن تا بالا میبرد و این جباهای متسع شده گاهی هیچ برآمد
 نکرده و از سطح ریه تجاوز نکنند و گاهی هم بالا آیند و چون باین برآمد که افشانی
 خلای از هوا شوند و وی هوا از خود ریه تجاوز نکند که بمیان جنب افتد اما چون اتساع
 زیاد ما را محدود و جبابه پاره شده هوا در مابین جباهای تحت جنب اخل گردد و در
 وقت بعضی مواد صغیر بحجم مختلف در سطح ریه مشاهده کردند و آمیزیم بین الجنای
 که در ریه جلا اول این کتاب ذکر شده حاصل شود چون اتساع جباهای ریه زیاد شود
 احتیاج دارد و بر آن دم هم رسیده از آنست که چه از دایره شدن عروق شعریه و آمیز
 بادریکی از زمین واقع شود و بادریه و حجم قلب را نیز زیاد شود
 علامات از علامات این مریض است عسر النفس مدامی که گاه گاه شدت کند و
 سرخ و تغییر یافتن صداهای تنفس و قوع و تغییر بدین فتنی شکل صدر عسر النفس که
 یکی از

یکی از علامات عمومی مریض است گاه عروضی از سس طفولیت میباشد و بعد از سن پنجا
 نادر است و این عسر النفس از خستگی و از هر یک از نفسانی و صعود بموضع مریض و
 نفخ معده و امعاشدت باید که گاهی در شبها و قریب که مریض بخواب است یک حمله اختناق
 روی دهد و مریض از خواب برخیزد و به نشیند و بر پا خیزد و تا تواند نفس کشد و این
 حمله اغلب تا دو ساعت رخص شود گاهی اگر چه خفت پیدا کند بعد از دو ساعت و
 تا مدت بشدت باقی ماند که مریض را از خواب و دراز کشیدن مانع آید که همیشه خواب
 و بیکرت به نشیند و عروض این حمله ها گاه بلا واسطه و گاه بواسطه عروض بدون شیت
 حادث است و هر حمله عسر النفس مدامی را زیاد تر کند اما تغییر شکل سینه که اغلب در این
 مریض پیدا میشود مادام که سینه را دست بدارد و یک جزا و انجا که تغییر شکل در هر صد
 پیدا شود مشاهده نکرد و مگر در شب و صبح که سالها مبتلای باین مریض بوده اند در این
 سینه برآمد شود و فاصله بین الصلعی زیاد گردد و این برآمد که رسمت چپ بیشتر از
 راست است انجا که تغییر شکل سینه در یک جزا باشد اغلب تحت ترقوه تا روی سینه
 و قدری پائین تر است و این تغییر شکل در سمت چپ بیشتر از سمت راست است و
 که جبابه جاذب هم روی پائین رود و صوت محل معك كدر گردد و کبد از زیر اصلاخ
 کند و قلب پائین رود و محاذی شود بین الاضلاع هم با دهم و صدای تنفس از زیر ضلع
 اخیر با شنیدن با نته طنز و غرض و خجری مسموع گردد و چون سینه را فرغ کنند صدای
 بلند تر از حالت طبیعی است و قوع از تجاعی از حالت طبیعی خارج گردد که سینه در حال
 فشار بیشتر زور و در شود انجا که سینه خیلی منبسط شود صدای کدر تر گردد اما از
 اسکولاسیون صدای تنفسی که با بالون فانی گردد و بعضی صداهای غیر طبیعی مسموع گردد
 چون سوک و بیطانت و هوکو و غیره و در اغلب این مریضان قلب بزرگ دهد و چون دو
 بهر میاند نفخ در اطراف میگرد

دوام و رفتن و انتهای هر مرض. امفیزم در بکلیه ریه مرضی است مومن که ابتدا در پیشانی
صغری و قاع ریه بطی است چنانچه سالهای چند دوام نماید و گاه مثله است که در دو ماه منقبض
شده و در این صورت مرکب بوده با یکی از امراض قلبی یا ریوی است

تشخیص آنرا آنکه در این مرض تنگی نیست و مدت مدید طول میکشد و ابتدای برونشیت مزمن است
و بعد از سن پنجاه و ده نمیشود که در ابتدا عسر النفس خفیف عارض شده متدرجا باسن ترقی
کرده و با آنها درجه رسد و گاه کاه می بطور حمله شونت کند و همراهی نماید با سرفه و بعد با ناله
و صد ترغیب شکل پیدا کند خاصه از برونشیت قوه تا بالای پستان و باین موضع جدای تنفس کم یا
معدوم گردد و از ترقع صدامزاده از حال طبیعی است در الهای مختلف استماع گردد

تعلیمه المعرفه اگر چه صاحبان امفیزم میتوانند خیلی سمن نمایند ولی مرضی است که
مورث ریه صاحبش گردد و عمرش را کم کند و مورث بعضی عمل خطره کرد و تاکنون معلوم
نشده که منقبض بشود

اسباب مرض اغلب عروق این مرض بطور اذیت است در این صورت ابتدای برونشیت قبل
از بستن سالی است و اسباب اتفاق این مرض معلوم نیست هر چه بگویند نادر خواهد بود
علاج چون وقتیکه مرض مرکب شود با ناله حاد ریه و بعضی ریه باید لازم است که حفظ
صحت را بطوری نگاهدارند که ناله حاد عارض نگردد که چون مرض خفیف داشته باشند آب
مصلح الصدر بکار برد مرض راحت نماید و آنجا که مرض شدت کرده و با ناله حاد مرکب
گردد مصرفات جلدی در اطراف و مسهلات بکار روند چون عسر النفس شدید و صورت
سپاه گردد چنانکه علامات اختلاء و بیهوشی بقدر کفایت فصد نمایند ولی در این مرض
خون غالباً نفی ندر که با وجود فصد زیاد عسر النفس همچنان شدت باقی ماند و اینهمه
و ایضا از هر چه چیز انفع اند بخصوصه را آنجا که ترشح مخاط زیاد و دفع نفث مشکل باشد و
نافع است انداختن مشمع ذرا در بوی سبزه و آنجا که مرض در شش و عروق ضعیف المراج

مقدمات

مقدمات و منعشات وادویه معطنه مستعمل است و لباسها و آبهای کوفتی و نرگشیدن
آنرا کفایت دارند و نافع است استیجاء آبهای معدنی و از برای کم کردن عسر النفس مسکنات و
مخدرات بخصوص قویان نافع است

در اتساع قلب

این مرض عبارت است از نرگشیدن یکی یا چندین تجاویف قلب اتساع یا در تجاویف است
با در شقیب آنجا که در شقیب باشد عدم کفایت سربو ششها قبل از کشیدن و آنجا که در تجاویف باشد
چون هر ای که کند با ضخامت جدارها آن نیز در هر پرت روفی قلب و اتساع او کشیده و چون
هر ای که کشد با نرگشیدن قلب ابوریه های ثانوی با بسپو کوپند با بالطبع و آنجا که اتساع قلب
جدار و جال طبیعی باقی ماند از اساده کوپند و ما این دو قسم اخیرند کور و نیم و اتساع عمو
یعنی در هر جدار است با محد و در بک جوف خواهد بود و هر یک از این اقسام علائم ذکر میکنم
اما اتساع عموئی برای دانشن آنجا تجاویف قلب متسع شده اند لازم است که طبیب با تعقبات
گردد از هنگام تولد الی انتهای عمر تجاویف قلب متصل و بزرگ هستند اما این از یاد در جوف
بیشتر از برونش خواهد بود و همیشه عرض بطون پیش از طول آنها است و جوف این همیشه بزرگ
از جوف اسیه است که عرض وسطی جوف اسیه در چهار سالگی هفتاد میلی متر و در شانزده
تا بیست و نه سالگی صد و بیست و میلی متر است و در بطن این از یک تا چهار سالگی
صد و هشتاد میلی متر و از شانزده تا بیست و نه سالگی صد و هفتاد و هشت و از پنجاه تا
هفتاد سالگی صد و نود و شش میلی متر میرسد و حال آنکه در همین سن عرض بطن اسیه
صد و بیست و شش تجاویف نمیکند جدار قلب را اتساع عموئی باشد که جال طبیعی باقی ماند
ولی اغلب نازک تر گردد که در بطن اسیه محل بسپا ضخیمش پنج میلی متر و در نقطه اش
قطر یک میلی متر است و پوده بین البطنین کمتر نازک تر گردد و نازک قلب باخته یا بنفیس گردد
قوامش کم و گاه نرم و منقبض گردد و جدارها بوی هم افتند و آنجا که اتساع زیاد باشد

بخصوص چون از عرض متسع گردد شکل قلب در حالت طبیعی منحرف گردد نقطه او محو و خود
مدور گردد اغلب انشاع در بطن ایمن دیده شود اما نادراست که بطن ایسر تنها مبتلا
شده باشد و بسیار نادراست که انشاع محدود بدو هلیزها بود انشاع قلب اغلب همراهی
با اختلال دیگر در غشاء محیط بداد یا در عروق عظیم او

علامات آنجا که تجاويف قلب متسع شوند طپش قلب و خفقان عارض شود نبض لرزان
حرکت قلب در سطح زیادی از صدر مشاهده گردد و در بدن قوت و صدهای واضح و
صوت اولی همراهی کند با صدای ارتجاعی جام که با انگشت زنند و از قوع معلوم شود که در
محلی زیادی را گرفته یعنی منبسط شده و این زیادگی که در بطن انقباض خون را بلبل شود
در این مرض بزرگ و خسته و متعجب و لهما عظیم و سباه گردد و در قوت بزرگ پانفخ پیدا شده سر
ببالا نماید در صفاق و جنب بطنی در طوبیت نشتر کند و کبد بزرگ شده از بزرگتر از اشیاء تجاوز کند
و در حوض خلفی ریه بطنی خون مجتمع شده منتفخ گردد بالاخره در بطن هلاک شود چنانچه از ترقی مرض
و از بادی عسر تنفس و گردش خون و بواسطه ترکیبات مرض مانند ذات الریه و حمی
غانقرایی و غیره

تشخیص معلوم شود انشاع او بواسطه صوت که در از قوع وضع حرکت قلب و آشکار
اسباب و واجبات که این سه علامت با هم باشند دلیل است که انشاع همراهی میکند با نازک شدن
قد قه المحرق لجا که انشاع با نازکی باشد خطرش بیشتر و کوبه بالا علاج له است اما انشاع
ساده چون زیاد نباشد علاج پذیر است

اسباب مرض حاصل شود بواسطه جمع شدن خون در او بواسطه تنگ شدن ثقب یا در
آوردن بواسطه مانعی در ریه و باشد که سبب جمع شدن خون بواسطه فزونی قوت حرکت
قلب باشد و این فزونی بواسطه ورم غشاء داخلی یا غشاء خارجی قلب است که مجسم
شده منع حرکت دم نمایند

علاج باید کاری کرد که قلب بحال طبیعی برگردد که جدار ریه غلیظ گردد یا آنکه ریه تنگ نشود و
این کار باید رفع مانع و سست شدن را نمود اگر مرض ضعیف باشد مقویات مانند ادویه حریق
حد بدی و در لک بدن و استعمال در ایهای کورگی و قلبانی نمایند و فیه و در بطن الفضر
اما انشاع حوضی قلب انشاع حوضی قلب عبارت است از حاصل شدن کیسه ای در بطن
بجای مختلف که واقع باشد در ضخامت جدار قلب که از سطح خارج او برآمدگی پیدا کند و باید که این
تجاويف او بواسطه ثقب بزرگ یا کوچک دانه داشته باشد و این نوعی از بزرگتر پیمای حقیقی یا
ابو ریه ای غلط ثانوی نامیده اند

تشخیص مرضی تا مروز فقط در وضع مذکور شده که بطول ایمن مبتلا یا بطنی شده باشد و
عوم اصول او در بطن ایسر بوجه و اغلب محلش در نقطه یا نریک بنقطه است و بعد از نقطه
در قاعه لهذا محل او در انقباض قلب است که ضخامتش بالطبع کمتر است کاهی آن کیسه مانند
ان است که حفره در ضخامت جدار حاصل شده باشد بدون آنکه از خارج برآمدگی حاصل
نماید ولی اغلب اوقات یک برآمدگی بجم مختلف پیدا شود و اغلب این برآمدگی یک
سپارگی یا زیادگی با طبقه خارجی قلب پیدا کند و این مواد بزرگتری اغلب منفردند
باشد که تا چهار هر هم ملا خطه گردند و در جوف این ماده بعضی مواد منجمده بعضی پیدا
شود که قوام آنها بسته بطول مرض است و هر چه هم دور از جوف قلب شوند سخت
تر گردند و این جوف باشد که ده سانه بطور حجم با قطر پیدا کند و همیشه با جوف بطن
بواسطه ثقبه صافی اتصال دارد و چون این ماده را در وقتیکه مجسم هنوز نرم است
تشخیص کنند معلوم شود که از طبقه فراهم آمده است از خارج طبقه اول طبقه غشاء
داخلی قلب است که در روغنیم شده اند و هم الباف عضلاتی قلب اند که نازک و
رنگ شده اند سیم غشاء داخلی قلب است که ضخیم و سخت و کدر شده است و در

این طبقه سیم بعضی اشیا بجهت پیدا شدن و گاهی پیدا کردن این طبقه داخلی بواسطه تشریح محال گردد
 و چنان نماید که غشاء داخلی قلب چون بر تفسیر بین بطن و ابورسما دم داخل گردد در اغلب این
 اشاعات جوئی بعضی علا خطره دیگر در قلب مجرست مانند هیپررت ووفی و اتساع قلب
 علامات ناکنون علامات مخصوصه این مرض شناخته شده است و گاهی از اوقات بغیر
 وجع شدیدی در محل قلب باطنی و خفگی واضطرار پیدا شود و منتهی شود بمرور علامات مخصوصه
 قلب و اغلب بمرور این مرض و میرا بطور بطور است و مدتی هیچ علامتی از مرض قلب ظاهر
 نگردد بعد از آن علامت هیپررت ووفی ظاهر گردد و در اول این مرض نامعین و لطیف و اغلب این
 مرضی بمحاکات رسد بعضی بواسطه اختراق کسب ابورسما و برخی خون در میان کسب قلب
 و اگر متعاقباً باشد بواسطه حصول خون مغلطه است که تمیز اتصال قلب را با ابورسما بگیرد
 اسباب و لطیفه حصول این قبل از من نوزده سالگی دیده شده و اغلب عرضش در سن قی
 و کحول است و در وضع بدست بدو سر و سینه و حرکات نفسانی و قوت زدن کاهی چنان غرق
 که مسبب مرض شده اند و اغلب برفش بطور بطور است که هیچ مسبب مستعد و محصوله بولم
 نتوان پیدا کرد لهذا بعضی گویند که مسبب مرض رخاوت عضلات قلب کتاب مقاومت فشاری
 ندارد لهذا کم کم خود عضلات منبسط شده اخوکسب گردد و اغلب از صنفین بماند که مرض منبسط
 از جرح غشاء داخلی قلب و چنانکه ذکر شد کاهی هر سه غشاء قلب در کسب ابورسما و جوف
 دارند لهذا باید مسبب غبار از اختراق و جواحت کسب داخلی قلب بماند و بعضی بماند که یک نوبتی
 و برخی در غشاء داخلی قلب و عضلات و الباقی و غیر سبب موجب مرض شود

در امور ریسمای شریان حریف

تشریح مرضی اغلب اوقات یک کسب در بچگی و جوانی حاصل شود که ابورسما کسب نامند
 و بعد از آن که در هر جدار شریان پیدا شود اوقات ابورسما بعضی شکل خوانند و این
 همیشه باعث تنگ شدن بافتن و نرم شدن جوف مجاور خود گردد ابورسمای قاعده دماغ همیشه غلط
 نامند

نامند

نامند نگر دارند و این بواسطه نرمی دماغ است که ماده داخل را و میشود نه در غلظت بخلاف که
 ابورسمای طاقی عظم دماغ ساخته بخارج بآمدگی پیدا کند
 علامات و رفقا و مرضی چیز بعضی از علامات بدست نیامد مگر صلع و در واری و کج
 زایل شدن باصره و لطین و صرع و فلج و چیزی که ملا می است انتهای مرض است که کسب ابورسما
 پاره شده و بواسطه رسکته مراد در رسد و ممکن است که خون مغلطه تفسیر دماغ و در کوه
 شفا حاصل گردد

در امور ریسمای اورت

ابورسما عبارت است از یکم که حاصل شده باشد از اتساع جوئی یا کالی اغشیه شریان یا آن
 آنکه دو غشاء داخلی شریان منخرق شده باشد و خون تشر نماید در غشاء لحمی شریان با در
 مجاور و ماده حاصل کند

تقسیم ابورسما هر تقسیم که در عموم ابورسما کرده با ابورسمای اورت اطلاق میشود
 آنها از این قرار است اول ابورسمای حقیقی و عبارت است از اتساع تمام اغشیه عرق
 و این هم بدو نوع است یکی آنکه جمیع جدار منسج شود دیگر آنکه محدود باشد بیک جوئی او
 دوم ابورسمای غیر حقیقی است و او آن است که یک دو غشاء عرق یا دو غشاء خون در غشاء
 لحمی که منبسط شده جمع گردد و سیم ابورسمای حرکتی است یعنی آنکه ابورسمای حقیقی داخل شود
 با ابورسمای حقیقی یعنی آنکه در اول سه غشاء شریان جن با کلا منسج شده باشند و بعد در
 یک موضع غشاء داخلی و وسطی پاره شوند و خون بغشاء لحمی دم و کسب از او حاصل کند
 که کسب ثانوی باشد نامند چهارم ابورسمای دلی است که اورتی بابک و پدید جز کرکات
 پیدا کند چنانکه خون و پدید داخل او شود و ابورسمای اورتی بان منقسم شود بصدد
 و بطینی و ابورسمای صدری هم بان منقسم شود بجن صاعدی و جن نازل
 اما ابورسمای جن صدری

فشریح مرضی اغلبا وفات بر و نیز ابو ریمه در جوی صاعدی و قوسی است و این ابو ریمه
خیلی بزرگ که در جفتان که دو بر این قلب که در باشد که ابو ریمه فرم با آنکه متعده بود که در رفا
ما بین اغشاء قیاسا لم باشد و اگر اتساع کم باشد خون مغلطه در داخل کسبه پیدا نشود و در جوی
بزرگ که در بعضی انجمادات بعضی در او پیدا شود و اغلبا وفات اتساع در کل عرفا است
در تمام جدار او است و بندرت کسبه شکل که در ابو ریمه ای غیر حقیقی بر و نیز شغل اغلب
جوانان از او رقی است و شناخته میشود بوصول ماده در پهلوی او رقی که با هم در
باشد و آن نقطه اتصال او رقی با ماده حاصل شده محلی است که دو غشاء داخلی پاره شده
و خون غشاء الحامی را متسع ساخته و پس برده است و این غشاء الحامی افزوده میشود
الحامی واقع در اطراف او و غشاء جنب و سایر آلات مجا و نیز بواسطه ضخامت او
زیاد شود و در سطح داخلی و بعضی اشیاء منجمد پیدا شود و این همه ناهوار کرد و خوف
او حمل کرد و در خون مغلطه و این خون مغلطه کاهی مطابق که در قدیم توپن ان لطیفات
در مرگ واقع است و هر چه ابو ریمه قدیم تر باشد و ثقیب او کوچک تر بود و خون مغلطه
وصلب تر کرد و اینجا که ابو ریمه خیلی بزرگ شود مورث بعضی اختلالات خطیره که در
اجوز نازل فشار دهد و کلام خون در جوف او حرکت کند و هم چنین کاهی شرابان
سبب است که اسم له و فشار داده نکند و خون داخل کرد و هم چنین کاهی فشار بصب
معه دهد و بصب جالب حاجت مورث هزال آنها کرد و کاهی فشار بر شرابان و بر بادی
و خود قلب دهد و اختلا با جفا کند و باشد که فشار بر نحو الصدر دهند و اینجا که ابو ریمه
در قوس او رقی واقع شده باشد فشار بر قصبه الیه دهد و چون در قطعه نازل واقع
فشار بر مری دهد و کاهی فشار بر قوه دهد و او را از تن جدا کند و یا هر خطی که عا
باشد او را ضایع و فانی کند بدون آنکه انعطاف در هم شود
علامات اغلبا از این ابو ریمه ها ملحق در حالت کون میمانند که بکده ضربه پاره شده و
شعر

و شخص را از آن که بدون آنکه هیچ مرضی از او ظاهر شده باشد و بعضی از مرصه سینه شان تنگ شود
نفسشان کوتاهی کرد و در اینقدر کم میخواست که مفهوم در بعضی طبیبان غلبه خفقان و غشی
عارضی کرد و بواسطه طبع طبعی طبعی کرد که در سینه حساسی نماید و چون کوشش بعد از غلبه
ضربان غیر طبیعی پیدا شود که هر اهی کند با ضربان نبض که این گاه در پشت قفسه کاه در طرف
راست و گاه در طرف چپ و گاه از پشت او شنیده شود و نیز این ضربان را از ضربان قلب
بسیار متوان داد و این ضربان باشد که با چشم دیده شود که چون در پشت قفسه واقع شده
شده باشد در هر ضربان آن موضع بلند کرد و کاهی از او فوات صدای دم در تن شنیده شود
چون دست را بر روی او گذارند و سوراخ اتصال ماده ابو ریمه با او رقی تنگ باشد صدک
خوبتر که بر استماع کرد و اینجا که ماده ابو ریمه ای نرم باشد کاهی ممکن است که از فشار
بقاعه عجم او را که با بکلی معدوم سازند و از قریه صدای کدر شنیده شود و این کد و تر
در وقتی حاصل شود که ماده ابو ریمه ای با ستخوان چسبیده باشد و اینجا که غوا ابو ریمه
بداخل سینه بود بعضی اختلالات بواسطه فشار او بالات صدری پیدا کرد و همانند سرفه
و عسر النفس و اگر فشار بقبضه دهد و هوای بخوبی داخل سینه نکرده صدای تنفس کم گردد
شده و تفتخشن کرد و با فانی شود و اینجا که فشار یکی شناختن قصبه باشد علامات مذ
در همان طرف بر و تر کند و اگر مری فشرده شود عسر البلع عارض کرد و اینجا که فشار
در شرابان و بر بادی و قلب باشد عملهای اختناق شده و غشی عارض کرد و چون فشار
بر اعصاب دهد و جمع شد بد روی دهد و چون فشار با اعصاب باز دهد حس
نمای در آن دست پیدا شود و اینجا که فشار با اعصاب نخاعی دهد و اجاع عصبانی عارض
کوند و چون فشار با اعصاب بر عصب داجع دهد عملهای اختناق عارض شده خفه
کرد و اینجا که فشار بر شرابان باز دهد نبض از آن دست ساقط کرد و با خیلی ضعیف
کرد و اغلبا قریه نبض مطابق حرکت قلب نخواهد بود و اینجا که فشار بر بادی تحت

manooq.azlib.ir

نقوه دهد نفخ در آن دست پیدا شود و اگر فشار بر پد اجوف نازل دهد نفخ در صورت و دستها و مافوق بدن بهم رسد و دبد های کردن برک شوند و بعضی با حالت اغما هلاک گردد از ضایع شدن عظم و جمع شد بد عارض گردد مخصوص اگر اندام فقار باشد و کاهی باشد که اندام فقار بکلی خورده شود و خون داخل بقعه فقار شده بواسطه فشار بخار و فلفی دفعی عارض گردد و اغلب از این مرضا مخصوصی و قبلیه است و در قریب آن وقت باشد همیشه بکوضع نگاه میداند خود را حتی در سخت خواب هم که بنشیند خود را بقوام قدری مخفی کنند

دفعات و انتهای مرض

ملاحظه میشود و میتواند حجم زیادی پیدا بکند بدون آنکه هیچ پامدک از خارج حاصل نماید و بد فایده هیچ علامت فشاری در احشاء محسوس شود و این بجهت آن است که احشاء بواسطه جوگشتان جالجا میشوند و از موضع ابورسپما رو میگردند و بطریق ابورسپما در نزدیکی شریان اسمانی واقع شود بواسطه آنکه غصون مجاری جالجا در طرفین او منبسط شده اند بعضی علامات ظاهری گردند مثلا بکوعی مجسم و کاهی شد بد در بالای شکم یا در شتر اسف پیدا شود چون شکم و لمس و تحسین نمایند در شتر اسف چپ یا در ترقی کاه و آن طرف یا در محل محل ماده پیدا شود که موضع او از قریع کدی که صاحب ضریان است و چون کوش بر آن موضع نمایند همان اصولی که قبل ذکر نمودیم استا کو فند و چون هر اهری کند با عرض قلب پیش و عسر النفس و نفخ پیدا شود و اغلب این مواد منتهی شوند بپاره شدن

تقدیر المعرفه و علاج مانند مرض سابق است

در ابورسپمای دوط

در اغلب اوقات ابتدایک ابورسپمای ساده پیدا میشود در شریان مخصوصی مانند آن

و غیره

و غیره بعبور بواسطه راهی مابین ماده ابورسپمای و یکی از عروق پیدا شود مانند اجوف صا و نازل و شریان و رید و غلب و غیره و اینجا که در اجوف نازل کشیده شود دفعه عسر النفس و پیش قلب زیاد شوند جلد صورت آبی و سیاه گردد و او رده صورت و گردن و سینه جالجا دول پیدا گردند و بکاسته های محلی بوقدی حاصل گردد که در جانب بالای بدن بروز نش بیشتر است و اینجا که در شریان و رید کشیده شود با علامات همین نفخ است و اینجا که در اجوف صا کشیده شود در شکم گدازه پیدا شود با ضریان و نرم و در او بکوعی طنین و ضریان دمی پیدا شود که حضار مجلس هر نشنوند و نفخ در اطراف پیدا شود و عمو مایان کشیده شدن ابورسپما در و رید و قلب حدت در علامات هم رسد و در چند روز مرض هلاک گردد و بعد از مدت ناد و ماه مرضی نزدیک غایب و تشخیص این مرض بسیار مشکل و حصول این ابورسپما بر خطر مافزاید و علاج خیلی محال تر گردد

در اتساع او عید و عروق جذابه

عروق جذابه کاهی متسع میگردند و عروق بسیار نازک او کاهی بظلمت هر القدر شده است و این اتساع بایک نفخ در یک امتدادی است با آنکه در بعضی مواضع است که از هم جدا باشند مانند عروق و لاجون آنها بایک نیست و سوراخ کنند شری که در میان آنها است خارج شود و هم شان کوچک گردد و سبب آنها اتسادی است که در آن عروق پیدا شود و آن اتساع حاصل شود بوسه با فشار ماده دیگری و برای رفع آن باید سبب را غود و ازاله مانع را

در اتساع مری و خلق

اتساع مری خلقی است با غیر خلقی و در جمیع امتداد مری میتواند بروز کرد کاه هرات مبتلا است و کاه بکجه او در این صورت اخیر در مری بکوعی کسبه حاصل میشود چنانکه در اغلب مری مشاهده میگرد و این کسبه که دائما بواسطه اجتماع غذا در مری است اغلب

نوعی در حین اعلا جان است و علوی می شود بواسطه فشار شیء صلب و یکی که مدتی در حریف او مانده باشد بواسطه آنکه یک غشی در بلع پیدا شود همانند آنکه در تنگی ری ذکر شد و چون انشاع در هر هرری باد را مندا آن با مندا عرضش بواسطه جمع شدن غذا است درالت بواسطه تنگی مدای او و انجا که انشاع در حلق باشد و در حین اسفل خواهد بود در این صورت حلق یک کپس حاصل کند و این کپس را مفرج است یا متعده و انجا که انشاع در حلق با در حین اعلا ی مری باشد یا ماده در یکی از پهلوی های کردن باد هر دو طرف پیدا شود و این ماده که در نری و نریا پیدا است نرم میباشد و در وقت غذا خوردن بزرگ گردد و چون به پشت خوابد باقی نماید کوچک شود و اگر این پائین می آید فشار دهد بواسطه یک شدن غذا بد هان ماده بر طرف شود و در اغلب این مرضی بکثرت فحشاری پیدا شود یا غذا شان بدون اراده داخل هان گردد و با این طور غذا جمع شده در آن کپس خارج میشود و در هر مرضی با بوی عفونی در دهان شان پیدا شود تشخیص این مرض اگر در حین اسفل باشد قدری مشکل گردد و فقط چیزی که دلیل او است نخیار و بعضی نفس است علاج مرض حال است مگر آنکه منج شود از تنگی التي که قابل علاج باشد

در انشاع معده

تشخیص مرضی کاهی دیده شود که معده یک کپس بسیار بزرگ حاصل نموده گنج امعاء میسوزند بلکه ماحوضه خاصه میباشد و این بزرگی با در حین معده است با در انحنای در این صورت اخیر شکل معده تغیر خواهد کرد و تقریباً در جمع این اشتیاق تبیه اخیر معده است در این صورت انشاع بواسطه اجتماع اغذیه و اشتیاق در معده است و قتی که انشاع زیاد باشد معده نازک میگردد و هم در یک با چند نقطه از شدت انشاع مشقوب گردد و کاهی از اوقات معده با بعضی از

انصال

انصال پیدا کند و بعضی اوقات هیچ تغیری در رنج الت پیدا نمیشود و در این صورت چنان فرض میشود که انشاع معده فقط بواسطه پر خوردن است

علامات انجا که انشاع معده همراهی کند با وجود سرطان در بواب جمع علامات این مرض برین خواهد داشت و علامات مخصوصه انشاع از این قرارند و قتی که بدن حرکت دهند صوت غلغل و قرائی شنیده شود و از قوع شکم بالا ای شکم صوت آشکار و طبلی است و هر چه با این تروند صوت کدر تر گردد و این بواسطه جمع شدن رطوبت است در موضعی که از تغیر صیداهم تغیر بهم رساند و عموماً مرض حس نیستگی در شکم نمایند بدون آنکه از لمس هیچ ماده پیدا شود مگر و قتی که مرض همراهی کند با سرطان و اختلال در عمل هضم عجز میکند و اغلب عارض شود و همیشه انقباض در طوبت و غلغلی که باقی دفع شود زیاد تر از آن است که خورده شده است و هر چه انشاع معده زیاد تر گردد قتی که حاصل شود و قتی که جواب از او باشد کاهی از اوقات طویا جمعه در معده بخته داخل میشوند و از این دخول صدای غلغل شدیدی احداث گردد و در بعضی لایه شود که بمال برود و مقدار زیادی از رطوبت او را خارج شود

تشخیص هنگامیکه از قوع علل موضعی تشخیص داده نمیشود از قوع انشاع معده مشتبیه میشود با سندسقاء و فی حال معلوم است این اشتباه نخواهد شد زیرا که در سندسقاء شکم از پائین بزرگ شده و بالا رود بخلاف اینجا بعلاوه در این مرض بعد از هر قی با اجابت طبع شکم کوچک شود و از قوع تمیز کلی داده خواهد شد و لازم است تمیز آنکه مرض ساده است یا مرکب زیرا که بعد المعرفه و علاج بسته بان است

علاج انجا که مرض بدون ترکیب بود باید مقدار اشربه و اغذیه را کم نمود که اغلب بواب سطح تجویز بهیض دفع مرض خواهد شد و ادویه که حرکت طریق معده را زیاد کند بنی مستعمل اند مانند مصرفات و دوش و مقویات و مخ خوردن بعضی استرکیبی با بنی نافع دانسته اند

در باده شدن و مشقوب کردن بدن آلات بدنی فوراً یا بخودی خود بپاژ

شدن عبادت از تفرق اتصالی است که از تمدد و کشید شدن آلات بجهت پاره شدن و در
اعضاء پینه مقابل است با شکستگی در عظام پاره شدن حاصل میشود بواسطه قوا^{کنند}یکه عمل
بجها^ت مختلفه و مسافتی و بران یکدگر تفرق و اتصالی که در این حالت حاصل شود در نقطه
مابین این قوی با واسطه است و اینجا که سبب پاره شدن فشردن بود گفته میشود پاره
شده فشاری پاره شده حاصل شود در رنوح سالم با مرض و زخمی و جراحت و غائقی
و نازکی و هزال و تغیر نسج عباد مجرب و توبی کول و سرطان عده عالی هستند که مستعد
میسازند انساج را بجهت پاره شدن و ثقبه عبادت است از تفرق اتصال کاملی که متصل
سازد آلات محو^ت و با بیک الت دیگر با با خارج متغوب شدن از پاره شدن متما^ت این است
سورخ باینکه در حصول ثقبه بدون کشش و فشار است در این صورت حاصل میشود
بطور بطوی و از یک تغیری که در عمل تغذیه الت بجهت مثلا و ثقبه یک جراحی بجهت^{کنند} بجهت
و چون اختلافات بدوی بهیچ علامتی شناخته نشوند گویند که ثقبه شدن فور^ت است
ولی این لفظ غلط است ثقبه فرد است با متعدد کاهی چنان کوچک است که در ابتدا دیده
نشود

در پاره شدن و متغوب کردن بدن مری

گاهی اوقات از قی کردن مری متغوب میگردد و بجهت و چنان میاید که جلد و جبهه^ت کوفی
در قی بجهت پاره شدن کافی نیست بلکه باید ابتدا تغیری در نسج الت بجهت پاره شدن^{اغلب}
سبب پاره شدن مری زخمی و سرطان است متغوب شدن الت پیش از پاره شدن آن
دیده شده است متغوب شدن الت از خارج بل داخل از داخل بجای است اینجا که از داخل
بجای باشد سبب جراحات شی^ت خارجی است مانند سرطان و غیره و اینجا که از خارج
بل داخل باشد سبب اجور^ت پیمای و سرقا^ت است که فشار وارد آورد و گاهی هم بواسطه زخم
شدن غدد سلی شاخهای قصبه است یا دملی است که مجاور او باشد و در داخل
او کشد

او کشیده شود و گاه جراحات قصبه الویه اثر مری کند و اتصالی مابین این دو مری پیدا
شود

تشخیص مری عموما علامات غیره خوق مری بسیار مبهم است حدس بوجود آتی
شود در وقتیکه مدتها شخص علی^ت در مری داشته باشد و بعد در حین قی کردن بکوشش^{شد}
در مری به حاصل کرده که دیگر قی ممکن نشود و از پیش رطوبت در جوف قاسم الصد
خفگی در شخص پیدا شود متغوب شدن الت و وقت فهمید میشود تا پاره شدن چنانچه
قبل بیان شد که بجهت علامات میتوان تمیز یافت مری را با قاسم الصد و آوری و غشا
جنب و ریشی و قصبه الویه

تغیر^ت المری تقریبا همیشه مهلا^ت است اگر سبب کشیده شدن دمل خارجی در جوف
او باشد امید شفا هست

علاج چون بغشاء جنب و قاسم الصد را پیدا کند باید بکلی از هر نوع اشربه و غذیه
منع نمود و رف غطش بواسطه گذاردن قطعه یخ در دهان نماید که کم کم آب شود و توکیات
مرض را بطوری که انزواست معالج کنند و بواسطه حمام و لایتنی و مال مالک و بکوشش تغذیه
بدن کنند

در متغوب شدن و پاره کردن بدن مری

خرق معده علی^ت است خیلی نادر و همیشه بواسطه اسباب خارجی عارض میشود مانند نقطه
وضربه و فشار و ضغطه و قی عینف ولی در این صورت اخیر وقتی ثقبه یا اختراق دست
دهد که قبل مبتلا بعلتی بوده باشد از قبیل زخمی جو^ت او و غیر چنانچه در باب ثقبه فوق
مذکور کرد بد و اغلب تفرق اتصال که در معده عارض میشود ثقب خواهند بود و آنها با بواسطه^{سطه}
اسباب فزنیکی است چون فرودن استخوان با سوزن و با بواسطه اسباب شمبازی است
مانند اشربه محرقة و سمومات و غیره و آنها بقی بد و قسم عمل کنند یکی آنکه مجاور الت شد

نرم نمایند و قابل الاضمیال نمی کنند و بیم آنکه سبب تورم جراحات الت گردند و ثقبه حاصل
 کنند و اسباب نامیه و جباتی آنها هستند که يك تعبیری در تغذیه الت معده میدهند
 جدرا و زنازك و قابل الاضمیال کنند مانند جراحات ساده و سرطان و نرم شدن معده
 و دغای سلی تحت مخاطات تحت صفاق و غیره و گاهی معده بدون جهت متقوب گردد که
 شخص صاحب حیوان کمال صحت را داشته و طبع مرتبش مرضی ثقبه در معده دیده شده و این
 ثقبه را بعضی از اطباء حمل کرده و بمرم فلغونیائی بسیار سریع السیر و بعضی حمل نمایند به
 نرمی حاد معده چنانچه قبل ذکر شد که گاهی ممکن است بواسطه توشی معده نرم شده است و
 سورایز گردید

تشریح مرضی ثقب معده بطورهای مختلفه دیده شوند بعضی بقدری نازک باشند
 که قادر بر بیان معده ندانند معلوم نشوند و اغلب بزرگ ثقب از قدره شاه قمران و
 گاهی بزرگتر است و بیشتر اوقات ثقبه فرد است و گاه متعدد اطراف ثقبه بواسطه خنثی
 اسباب مختلف است مثلاً چون سبب سرطان باشد اطرافش صلب و در وسط پاد
 کنار جراحی است و اینجا که سبب جراحی است ساده باشد اطراف ثقبه کوکاست و بعضی
 اطراف او ناصافی و نازک است و اینجا که ثقبه از سرطان باشد اغلب بزرگتر و در
 بواب پادریکی از ذوالحنای معده است و اینجا که بواسطه جراحی است ساده عرض شوند
 در سطح مقدم با موخر خواهد بود و اینجا که سبب نرمی باشد اغلب را غشای یکپارست
 تقریباً در جمیع اشخاص که با این مرض میزند شکم بواسطه دخول رطوبت و بخار در صفا
 خلی منبسط میشود و صفاق متورم میگردد و چون عرضش بطور بطو باشد و انقباض
 بهر سه مانع آن گردد که در طبوبات در شکم نشتر کند

علامات و رفتار و انتهای مرض اغلب قبل از عرض ثقبه مرخص مبتلا گردد و با خنثی
 از اسباب محصوله ثقبه بزرگ میکند مثل سرطان و نرمی معده و غیره و گاهی عرض ثقبه
 بدون

بدون مقدمه است که در بعضی در بعضی صحت مبتلا گردد و بصورت ابتدا ی ثقبه فوری است
 که مرخص بدون سببی واضح که بعد از غذا مبتلا میشود بوجهی ثقبه که در ابتدا ی ثقبه
 و بر روی سرایت کند بجمیع بطون و اغلب در احوال مبتلا شود به تشعرون و بوی تھوع و
 عارضی گردد بدون دفع چیزی غلق واضطراب روی دهد بسیار گردد و بعضی صغیر
 و سریع گردد که جمیع علامات ورم حاد صفاق چنانچه ذکر کردیم نماید و از ۲ تا ۳
 ساعت مرخص هلاک شود

تشخیص وجع شدید دفعه عارضی شود و بعد از اوج جمیع علامات خطرناک مذکور
 دلیل خواهد بود بر حصول ثقبه در مجاری غذا و تشخیص محل آن ثقبه بواسطه فهمیدن
 حالت سابق مرخص است که اگر پیش از وقت مبتلا بعلتی بوده دلیل خواهد بود بر ثقبه
 و در بعضی حیوانات ممکن است که صاحب ثقبه مشتبه شود به مسموم ولی از ملاحظه لب
 دهان و تجزیه ماده مندرجی رفع اشتباه شود

مقدمه المعرفه خطره است ولی شفا محال نیست
 علاج پرهیز از جمیع اشربه و غذایه و بجز کتی نام و راحت معده از همه قسم حرکات
 و خوراندن و مالیدن توپاک بمقدار زیاد
 در میان ثقبه امعاء

اگر چه در جلد اول از ثقبه معاشاره شده است در این بحث نیز لازم دانستیم که
 شرح در این باب ذکر کنیم ثقبه امعاء و نوع است یکی آنکه از داخل بخارج سوراخ شود یعنی
 از مخاط کوفته بصفاق می رسد و بیم آنکه از صفاق بخاط سوراخ حاصل شود که سرایت
 آن ثقبه و یکی احشای مجاور است و نیز این نوع ثقبه گاهی توکیبی از عرض میشوند و گاه
 سبب شفا ی مرض دیگر گردند

نوع اول اسباب در هفت نقطه از امعاء که ثقبه حاصل شود در اشخاصی بزرگ خواهد گرد

mandarintarikhema.org

که مبتلا بمرضی حاد یا مزمن بوده باشد و از اراضی حاد از قبیل طیفونید و وسنطاریات
و ثقی که از طیفونید حاصل گردند در معاء دقاق است و از وسنطاریات و در معاء غلا
و از اراضی مزمنه که سبب ثقب معامیکو دند یکی سل جلد و معام و یکی سرطان آنها است ^{نکته}
از سل منج میگردند در ثلث اخیر معاء دقاق بروز کنند و بندرت در معاء غلاط و اینجا
که از سرطان منج میشوند بعکس آنها است یعنی در معاء غلاط است بندرت در معاء دقا
خواهد بود و گاهی اوقات امعاء متفوق میشوند بواسطه غانغریا اعم از آنکه سبب ^{حرق}
باشد باختناق و یا آنکه سبب اتساع و روده بواسطه شیخی خارجی اجتماع بوزن باشد و گاهی از
اوقات روده سوراخ گردد در حالیکه هر ضیق ظاهر ایسا لم بود و این بواسطه آن است که ^{حت}
بسیار کوچکی در معا یافت شود که اذیت بویض نمیرساند تا آنکه بکشد سوراخ شده آتش
بروز کند

تشریح مرضی حالت ثقبه مختلف گردد بواسطه سبب و که جوارحت طیفونید و وسنطاریا
و سل و سرطان و غانغریا هر یک حالت مخصوصی دارند و بعضی بکشد و بعضی بکشد و بعضی بکشد
و اغلب بکشد و گاهی متعده خواهد بود و نیز یکی این ثقب گاه مجدی است که انگشت ^{مشبه}
داخل و میتواند شد و اغلب بقدر سر سنجاق یا بوزن کتر نیست و اطراف این ثقب نازک یا
نرم یا صلب و یا قابل الاضمحلال اند و جلایه همیشه علامات ورم صفاق مشاهده ^{معد}
شد و گاهی روده التصاق باین الت مجوف پیدا کند و ثقبه روده داخل او شود مانند حلقه
روده بجم و فشانده و رجم و غیره و گاهی التصاق با عضلات شکم پیدا کند و راه بخارج راه ^{حلقه}
کند

علامات و زوایا در مرضی که از طیفونید و کومبند علامت بر آن که از سوراخ شدن روده
پیدا میشود به تفصیل بیان نمودیم و ان علامات علامات ورم صفاق بسیار حاد است
که منتهی میشود بمرگ و اینجا که ورم صفاق محدود باشد همین علامات بروز کنند و لیکن ^{نواک}
نواک

نواک ثقبه در سوراخ بر باشد و مواد در غشاء الحما فی تحت او ریخته بوزنی و مع حاصل شود
که چون او را بکشتا باندیم بمخلوط یا بوزن و بخار خارج گردد و چون مواد بوزنی ^{خل}
این دمل گردد در حشا بجلات دند پس از سده بسیار و اینجا که ثقبه داخل یکی از آلات
مجوف مانند فشانده و مجبل و غیره گردد بخار و مواد بوزنی از این تجا و بیف خارج گردد
معلوم است که سوراخ شدن و حلقه روده و اگر دوی هم است در حال حیوانی
توان تمیز داد و اینجا که صائم بقولون راه پیدا کند چون غلاء در معاء غلاط دگر توقف
نکند در بعضی هزال و تحول پیدا کند و چون بواسطه عملی انجلا را پیدا کند از خارج شدن
بخار و بوزن تمیز داده خواهد شد

تشنجی علامتی بمنظور اندازند مکن علامت ورم صفاق بسیار حاد که دفعه بوی
کند پاره شدن طحال گاهی مورث بروز و نیز همین علامات میگردد اما در این صورت
علامات فوق الدم داخلی هم بروز کنند که بجلا و جمع شدن بد فوری و غنیر ^{مشبه}
فوق عرق سرد و غشی و سایر علامات فوق الدم شد بد بروز کنند و گاه ورم صفاق
کرد و با ابل و وس که تشنجی در دست داده نشود مورث خطر است زیرا که علاج آنها از
بلد بکشد خیلی فرق دارد اما در ابل و وس اگر چه جمع در همه شکم است از فشار و بکشد ^{مشبه}
میشود ولی در صفاق در همه مواضع شکم است در ابل و وس پیوست خیلی و ^{معد}
که کار میشود در ابل و وس مدامی و بوزنی است در ابل و وس داخوردن بعضی صغیر و سریع
و بلند سرد میگردد و صورت متغیر شود

نقد المرفه یکی از اراضی بسیار خطرناک است و اینجا که ثقبه و صفاق کشوده شود ^{نواک}
بقی است و اینجا که غشاء الحما فی خاصه کشوده شود تقریباً با همیشه منتهی گردد بمرگ
چون یکی از آلات مجوف کشوده لا علاج است و لیکن خطرش چندان عظیم نیست و چون ^{سطح}
جلد بخارج کشوده شود جراحان میتوانند مسلط بر او شوند

علاج آنجا که روده بصفاق کشوده معالجه اش در محیط لطیف و بیدار شود که راحت نام و علم فشار بر موضع و بجز کتی و پرهیز از جمیع اغذیه و اشربه و خوردن تریاک بمقدار زیاد و اگر بعضی دهد و ارسال علق بموضع موضع و نهی روغن خاکسری نمایند و اگر دمل مجدداً حاصل شود بکشد باید ماریم خارج شود

نوع دوم ثقیبی که از خارج بلخ ^{شون} آنجا که در کوشدن ان ثقیبی که از خارج بلخ حرکت میکند اغلب بواسطه سرایت مزه بکربالت است که تاکنون بسیاری از آنها را ذکر کرده ایم و نیز ذکر خواهد شد

در مشقوب شدن ضمیمه اعور

نذر تا ضمیمه اعور در طیف و بیدار می شود و مشقوب می گردد بواسطه دانه های سالی و سرطانی این ضمیمه مشقوب شده است و اغلب اوقات مشقوب شدن او بواسطه دخول شی خارجی است در جوف او مانند بر اثر صفت شده و سست و در و هسته میوه و کرم امعا ثقیبه هائیکه در این ضمیمه حاصل میشوند عموماً بزرگند و اطراف آنها سیاه با نرم با غلظت باشد است و شی خارجی گاه بمیان صفاق افتاده و گاه در جوف جوف می افتد و عموماً این ضمیمه الصفاق با جدار حوضه خاصه با بایکی از حلقه های روده بهم می رسد و اغلب اوقات قبل از سوراخ شدن بعضی علامات مقدمه بروز کنند مانند جی و پیوست و عدم اشتیاق و بعد از آن دفعه ثقیبه حاصل شود جمیع علامات و رمم صفاق بروز کند و باشد که ثقیبه بدون مقدمه حاصل گردد و عموماً چون شی خارجی در میان صفاق افتد عرض منتهی بیک کرد و گاهی بالات مجاور الصفاق پیدا کرده کپسده انوا احاطه کند بدون آنکه ورم صفاق حاصل شود و گاهی ضمیمه با جدار شکم الصفاق پیدا گردد بخارج کشوده شود و باشد که در خود اعور کشوده شود و باشد که الصفاق بالات مجاور پیدا کرده بخوف او کشوده گردد مانند مثانه و عمر و علاج چنان است که در ثقیبه امعا ذکر شد

در ثقیبه جوف جوف شدن و پاره کردن بیک جدار قلب

اغلب

اغلب از تفرق اتصال بیکه دارد بقلب می آید خرقا است و پاره شدن و اجزاء قلب از هم جدا گردند از حیثیت آنکه اختلال در رنج الت رسیده باشد بان سبب باشد و خرق در تمام جدار قلب است با فقط در مستون عضلاتی و پاره شدن های و تری آن دما در اینجا ان خرق تمام جدار ذکر نمائیم

امسباب کاهی از اوقات قلب بخودی خود پاره گردد بدو سبب معین و بعضی اوقات هم خرق گردد بواسطه قوت شدید باد در حمله عسر النفس و اغلب عرض خرق بدو تغییر در رنج الت است یعنی بواسطه ورود ضربه شدید بروی سپنه اما خرق هائیکه بواسطه تغییر رنج الت عارض میشوند در نری ساده باد نری سریشی با جرح الت با دمل او است و باشد که از اتساع و پهن شدن و تنگی ثقیب الت عارض گردد و محل الخراق در بطن ايسر بیشتر از بطن ايمن است و در بطن ايمن بیشتر از دهنها عارض گردد و آنجا که سبب ضربه خارج بود باشد بطن ايمن بیشتر از بطن ايسر پاره شود نقطه و قاعه قلب بیشتر از سایر پاره شود و اغلب يك موضع پاره گردد بندرت متعدد بود و سعت خرق از سطح خارج بیشتر از داخل است

علامات و انتهای خرق اغلب پاره شدن قلب باعث حرك فوری است در حالت غشی غشی هم عارض شود بواسطه سقوط قلب از حرکت و بعلت دفع خون در غشاء خارج و بعضی احساس جی در قلب کرده فریاد نموده می برند و بندرت تا چند ساعت مرض نرسد بماند و غلظت و اضطراب زیاد نموده و بدنش پوشیده از عرق سردی شود نبض غلی و غیر منظم و بعضی احساس جی در ریه ها چپ نمایند که سرایت بیاز کند و در بعضی حالات در باز و می رسیده و اضطرابی بهم رسانند شبیه بانکه در عسر النفس عصبانی دانوهست بعد از يك یا چند حمله بجلالکت می رسد

تشخیص هیچ علامتی نیست که دلیل بر خرق قلب باشد در هر کهای فوری باید جلد بخرق قلب نزد با خرق او رفتن فرف الدم دماغی خیلی نادر است که مایکون باین زودی

خیلی متعشع شده و در جبهه حرارت بدن آنها کوشد خواب سبک و از سخت خواب سر بالا گذارند

دفعه دوم و انتهای مرض سیان و اغلب علامات مذکور چند و روز پس از آن بروز نمایند و باشد که پس از چند ماه یا چند سال بروز کرده و این بروز را دفعی یا تدریجی است پس از آنکه علامات بروز کردند و بروز بر و زرد تر باید باشد یا آنکه ناچند ماه یا چند سال هر چند در بخیر زیاده بمرکز رسیده در میان حمله های خفیفاتی و چرخشی و غشی و چهره در استسقا و با بحال شغای این مرض دیده نشده و میشود که ثقبه بوطا ایدان ولی هیچ علامتی در حین حیات بروز نکند و بعضی از مصنفین نقل میکنند که در بعضی تقریباً ده نفر هر چه در تشریح که تشریح میکردند این ثقبه را کشف و بافتند بدون ظهور هیچ علامتی در حین حیات

تشخیص مشکل است اشتباه این مرض با سایر سنگ جفم در بدن و از سایر بیماری جزئی در بدن زیرا که در اینجا ها درد و بران دم عینی نیست و تنگی ثقب و عدم کفایت تنفس فقط مرضی هستند که مشتبه میشوند با این مرض زیرا که بعلاوه علامتیکه به تمام امراض التیبه قلب شامل اند بدن بنفیس که در این صورت مقدمه مرض را باید فهمید که این عسر النفس اگر بگویم که معلوم است مابین بطین ثقبه هست زیرا که امراض التیبه در طفولیت نیست و چون پس از هر حمله عسر النفس غشی عارض شود این مرض مشخص گردد زیرا که در سایر امراض قلب اینقدر غشی عارض نگردد

نقله المعرفه بسیار خطیر است اسباب بواسطه نقصان غمواست علاج باید کردی که خون در ورید کمتر بایستد در این صورت گاه فصد نمایند و مرضی که مایه حرکت قلب گردد و غلبه و شرب به سر جفم بخورند و حمله ها مرض بواسطه او به ضد تشنج و فصد دفع کنند

در اخراق

در اخراق و متفوق شده و اکثری اغلب خرق آورقی در نقطه خواهد بود که مبتلا شد با تساع و ابور لیم و میشود که خرق در نقطه غیر متعشع باشد ولی همیشه در آن نقطه علتی خواهد بود که عرق شکنند شود و باشد که از قی جراحی تفرق اتصالی در آورقی پیدا شود اسباب خارج مثل ضربه شدید یا افتادن از محل منتهی موجب ابتلال و اخراق اغلب در آن جزء آورقی واقع شود که در میان پیکار واقع است و خرق او در صورت حرك فوری است

در بیان خرق در حین حیات از خرق رتین بکمالی از بخار بخور جنبه اخل میگرد و صورت دخول هوا در سینه میشود

اسباب در اخراق اول ذکر شد بکمالی اصل یعنی آنکه هوا در جوف غشاء جنب بطور تشریف اخل گردد ولی اغلب دخول هوا در جوف غشاء جنب بواسطه تفرق اتصالی در خود غشاء و یا بواسطه از او راهی در شعب قصبه بامری یا بهر با بخار ج پیدا شود اما اینجا که اختلال در ریه و جنب مرید باشد و ثلث از مرض سبب دخول هوا در جوف جنب بواسطه سوراخ شدن ریه است که با بواسطه در هر فردی برون نفس بکمالی از او هوا که داخل شعب قصبه میگردد و فوری هم داخل جوف جنب میگردد و ۹ عشر از مرضی سبب سوراخ خواهد بود که بکدام سلیجی که در سطح ظاهر ریه باشد نرم شد طبقه جنب ریه را سوراخ کرده هوا داخل جنب گردد اسباب دیگر که سبب حصول این مرض از این قرارند غارت با پاره شدن ریه بواسطه ضربه خارجی و مامیل و کاه از اوقا ذات الحجب ساده و مزمن صورت حصول این مرض میشود و این در وقت است که در وقت متشرع شده راه بشا خهای قصبه پیدا نماید و این ثقبه فرقی که با سایر ثقبه ریه دارد این است که سبب از خارج داخل است و اینجا که اختلال در آلات مجاوره باشد حاصل شود در وقتیکه بکراه غیر طبیعی در مابین جنب و آلات مجوف مجاور پیدا شود که آن

التجاور هوایا بر طوبت دیگر داخل جوف جنب کردند چه از غری وجه از حجاب اجز
و غیرها اینجا که اختلال در جدار صدر بوده باشد اغلب بواسطه در رفتن اسباب است
در سینه چه هر چه با جرح ریه نماید وجه نماید در صورت اول دخول هوای جوف
جنب بواسطه شاخهای قصبه است و در صورت دوم از خارج است حصول نفوذ
بجسب من مختلف است چنانکه قبل از سن ده و بعد از سن پنجاه نادر است و اغلب در
انرسن پست ناموسالک است و این هنگام مطابقه دارد با برونزسل و استعداد
در مردان بیشتر است تا زنان

علامات تشنجی موافق بیان که نمودیم معلوم شود که چه سبب اختلالات مختلفه در
صاحبان این مرض مشاهده کرد و آنها را به تفصیل در محبت خود ذکر نموده و خواهیم
نمود و در اینجا از مخصوصات خود عرض کرد که خواهیم نمود که در چون عرض از سل منج
کرد و در سمت چپ و دفعه بیشتر از سمت راست عارض شود و حال آنکه چون سبب
از ذات الجنب باشد در هر چه نفر هفده دفعه در طرف راست خواهد بود و وقوع مرض
در هر دو طرف نادر است و چون اغلب این مرض از برونز قصبه در ریه بهم میرسد
چون بدقت سطح ریه را مشاهده کنند آن قصبه را پیدا خواهند نمود و غشاء کاذب
یا چیزی دیگر روی قصبه را بکشد باید ریه را در میان آب گذاشته بدهند و در اینصورت
از خارج شدن هوا قصبه پیدا خواهد کرد و باید و باشد که قصبه ریه مسدود کرد و هوای
داخل شده در جوف جنب مجذوب شود پس از حرکت اثری از قصبه و هوا باقی نماند
و اغلب قصبه مفرغ میشود که متعدد باشند و عظمشان مختلف است که از تنه
تا چندین سانتیمتر خواهد رسید و اینجا که سبب سل باشد محل قصبه اغلب در نقطه
ریه خواهد بود و مقدار هوای داخل شده در جوف جنب نیز مختلف است که از
چند حباب هوا تا دو پست و پست شصت مکوب و دهه شک و عموما از بزرگ

تایلک

تایلک بطور است و چون سینه را بکشانند بخار با صلا خارج شود و اغلب بی پروا که متعفن
که بوی هیدرژن سولفور یا بوی غانغز یا د هید و اگر سینه را تحت آب یا توکل بکشانند و بخار
انوار گرفته بخرن کنند معلوم میشود که مرکب است از اوزت و اسپد کربونیک و گاهی هم هید
کربونیک و مواد جوانی در او میباشد و گاهی جمیع مواد کنند هوا در آن هست مگر آنکه اکثر نشانی
و اسپد کربونیکش زیاد بوده بخار یک ماده دیگری هم در جوف صفاق پیدا شود که آن را مایع باذن
و با بنوا سطر او را هیدرژن پتوآکس کوبند و بواسطه بخار و آب فشار زیادی بر ریه وارد آمد
هنا را باید و بجم او با مقدار بخار و آب نسبتی پیدا کنند که هر چه آنها را پاد شوند این لاغری شوند
بعلا و مخوف سینه انقباض پیدا کند و بخار جلین بیابن برده شود و قاسم الصدر و قلب از وضع
خود حرکت کنند

علامات در قیاد درد و ثلث از عرضا ابتدای مرض فوری است با برونز علامات زیاد با کم
بعضی اوقات برخلاف بطور مکرر در محبت است در صورت اول بکوجی دفعه در یک طرف سینه
بهرسد که هر چه با عسر النفس واضطراب و حس خفگی و گاهی از اوقات وجع با این علامات
همراهی کنند و این عدم وجع بواسطه آن است که فقط هوا داخل جنب کرد و در برونز وجع بواسطه
دخول بعضی رطوبات محترکه است در اینصورت قصبه ممتد میشود که برونز ذات الجنب شدید
عارض شود و رطوبت ریه متروک خواهد کرد و در بعضی از مرضا هنگام متعوب شدن غشاء
بکصدای شکسته شدن استماع کرد و احساس بر این کنند که شئی داخل سینه میشود و اینجا که
سبب ذات الجنب مزمن باشد عسر النفس را ابتدا با علامات دیگر برونز نمایند ولی در اینجا
بروز علامات نه بواسطه دخول هواست در جنب بلکه بواسطه رطوبت متروک در او است
شاخهای قصبه الیه و این رطوبت که مجاری هوا را بکشد بعد از دهان و مخزن برونز
و بعد از خالی شدن رطوبت هوای خارجی از آن قصبه داخل جوف جنب کرد و قاسم مقام ریه
شود و گاهی از اوقات قصبه بقدری کوچک است که رطوبت خیلی کم از او بیرون آمده داخل

شاخه‌های قصبه شود در این صورت عسر النفس اختناق که حاصل شود و طهوی خارج بمقدار
زیاد داخل جوف جنب گردد چون بواسطه طوبیت منحنی سابقه و پرفشده شده بود و
این هوا علامت تاز و بر وزن بکند مگر آنکه با عانت کوشش و آن وقوع وجود آنرا تواند ظاهر
نمود و آنجا که مقدار هوا زیاد باشد آن طرف سینه اتساع پیدا و تنفس با سکت کرد و فاصله
بین الاضلاع بزرگ و بوجبه کرد و باشد که این اتساع بر وزن بکند کبد و قلب و محال از موی
خود حرکت کنند و از قوع صدای بلبل شنیده شود و طبعی مقدار هوا خیلی زیاد شود چنان
سابق گفته شد و رت حاصل کند در ابتدای عرض صدای جالبلی است و چون طوبیت جمع شد
و ذات الجنب ظاهر شد صدای باین کدر و با لبللی خواهد بود و از کوشش دادن معلوم شود
که موی رت نفس ضعیف یا بکلی فانی گردد و بعضی علامت دیگر مانند نك مس و تنفس نفوس
و تموج بفرای استماع شوند صوت نك مسی عبارت است از صوت متصل که حاصل شود
از زدن بجام و غیره تنفس نفوس نك مس عبارت است از صدای نك که حاصل شود و قنکر در مفا
نك با بطریقی پف کنند و تموج بفرای عبارت است از آنکه هرگاه بکد فعه بعضی را حرکت دهند
در انوقت غلق حاصل شود شپیه بقلب بطریقی که نصف اب داشته باشد و پس از نك دان
او در این مفاصله میباید و نفث مختلف خارج کرد که اتمان از بنویز اکس میباشند بلکه
عوارض اسباب آند و صفات اعما و در امراض خودشان بیان شده و پیشتر و علامت
عمومی بدن بسته با سباب است و هنگام مرگ نیز مختلف است که از چند ساعت تا سی
ممکن است طول کشد و آنجا که منتهی نشینا کرد و نقاهت خیلی زیاد است و پس از صحت انقب
صدر ضعیف تر گردد و این انقب که بسیار زیاد است و بدنه نشود مگر آنجا که سبب ذات الجنب
تنفس و جمع دفعی در یک طرف سینه که هر اری کند با خفگی واضطراب و سایر علامت
ذات الجنب حاد دلیل است بر این که نقبه در مفاصله پیدا شده مخصوصا که این علامت در اشتها
بروز کنند که مدتی بجلل بر میندلا بوده اند خاص چون علامت سلی هویدا باشد و در
این وقت

اینوقت چون سینه را ملا خطه کنند علامت بنویز اکس مانند انبساط صدر و فقدان صوت
تنفس و صوت بلبل و سوزن رنگی و تموج بفرای ظاهر شوند در این صورت لازم است تشخیص
سبب بنویز اکس و بجهت این از فهمیدن مقد مات و حالت حالیه کافی است
نقله المعرفه مرضی است خطره قریب یا همیشه هلاک شوند
علاج جمیع معالجات در این مرض دل خوش کردن است و طبیب باید که علامت را تسکین
دهد و جمع و عسر النفس بجهت تسکین و جمع استفرغ دم نماید و آنجا که ضعف مانع باشد
در موضع شمع در ارج اندازند و عرقین بپاشند و افیون بخوراند همین معالجه از این
عسر النفس نفی نافع است آنجا که فشار بر ریه زیاد بود بعضی از معالجه منفعدی بجهت
خروج رطوبت و بخار پیدا کنند و این عمل غالباً بیشتر است

در انحراف و مقنوب شده حجاب حاجز

خرق حجاب حاجز در انسان بسیار نادر است و عارض شود بواسطه افتادن از موضع
مر قع و فشار زیاد بر وی شکم و جعد و جهد زیاد و این فشار را در موی که حجاب است یاد
الباقی عضلاتی او و از این تفرق اتصال احشای بلطنی مانند امعا داخل صدر میشوند و
فشار بر ریه دهند و او را بجنب اعلا و نند و قلب از موضع خودش منحرف گردد و این
واسطه چون خرق ملز کور قدری زیاد باشد فوراً شخص را هلاک نماید و یک حسرتی
در شخص پیدا شده اختناق حاصل شود صورت کبود گردد و خنک سرد و نیک پیدا شود
شخص بر ریه هلاک شود بعضی اوقات مرخص مدتی راه رود بعد بمیرد و گاه هیچ علامت خطیر
پیدا نشود فقط ضعفی عارض او گردد و بمیرد خرق حجاب حاجز تمیز داده شود از کشید
شکم و برآمدگی صدر و اختلال اعمال صدمتی و گاه این مرض ثانوی است که بواسطه
مرض الت حجاب و حاصل شود مانند مل کبد و کلینتین و طحال و سرطان معده و غیره
علاج ذلالت

خوق الحمال وکلبین وکبد وحراره

اغلب خوق این آلات عارض شود بواسطه ان موضع مرتفع و فشار زیاد بر وی شکم کبد
 کاهی پاره شود بواسطه نفوذ الدم داخل خود و لحال پاره شود در میان دانه و طبعی پدید
 پیر از خوق الحمال و کبد و طبعی در شکم و بخت شود بد و ناکه ورم صفای ازان منج
 گردد و اینجا که در پیش رطوبت خونی مورت ورم صفای گردد فوراً و جمع شد بدی
 عارض شود صورت کشیدک نبض صغیر و سریع و غشی روی دهد پیر از چند ساع
 لاده روی در بعضی هلاک گردد تشخیص مرض مزاج را بصورت یقین نیست و شبیه شود
 با متفوی روده یا خوق عروق شکم و گاه بواسطه مقدار مانع مرض میشود و حدس این
 مرض در حراره پاره شود بواسطه زیادتی اتساع او و قتل که مانع بایستی باعث
 شود عبور صغیر را کاهی بر و زان مرض بواسطه جریعت غشاء داخلی یا نونی و است و
 از خلف این مخزن جمع بسیار شدیدی بمرسد جمیع علامات ورم صفای حادث
 کند علاج راحت نام و خوردن افیون بمقدار زیاد است

انحراف و متقوب شدن مثانه

مثانه بواسطه اتساع زیاد از جمع شدن ادرار و پاره شود و بی پاره شود از افتادن
 از موضعی بلند و در در و ضربه و فشار زیاد و فشار بر مجرای در وقت وضع حمل
 پیر از خوق بول شریک پان یافته الحافی خاصه کند و موضع غانغوا یا کبر و اکوادر
 بصفاق موجب ورم شدید گردد معلوم است خوق مثانه مرضی است که اغلب
 شخصی هلاک کند و گاهی از قبل انداختن و بسیار توقف کردن در مثانه خوق
 دهد

علاج چون حدس بر پاره شدن مثانه دهند بواسطه انداختن میل مکرر یا توقف
 در مثانه بول را خارج کنند و اگر ممکن باشد که محل مجرای حوا تمیز دهند و بعضی را

بعضی

بعضی غویا باشد که ادرار در طرف دیگر جمع شود

در پاره شدن و متقوب گردیدن رحم

رحم پاره شود اغلب در وقت حمل و باشد که اجتماع محصولات طبیعی و غیر طبیعی در او
 با اتساع خود شریک شود چنانچه چندین سال طمث در رحم جمع گشته رحم بخته پاره شک
 خون بصفاق ریخته و او را منورم ساخته و بعضی را هلاک نماید کاهی بواسطه جراحت
 از رحم بالهت مجاریش پیدا شود چنانچه حکایت کردند زیرا که پیر از بیاض سالکی شکم که
 بزرگ شد و حبس طمث پیدا کرد و بعد فی مکرر عارض شد ماده سیاهی شبیه بچرم قوی
 گشته و هلاک شد چون تشریحش کردند دانه شکم که رحم بچم گشته شک و با معده ملصق
 شد و اهراردون پیدا کرد و ماده مذکور از رحم داخل رحم شک و معلوم شد
 که قرن الرحم با مستقیم راه پیدا کرده بخار و بل از فرج خارج میشد و باشد که در حالت
 غیر از این هم بواسطه جریعت متقوب گردد و تفصیل پاره شدن رحم در کتاب قابله کوی است
 باب هشتم در بیان امراضی که حاصل میشوند از تبدل آلات و محصولات طبیعی

در این بحث ذکر میشود اولاً از امراضی که متصف اند به تبدل انساج بیکدیگر یا نوعی تاز به
 و مانند انساج طبیعی ثانیاً از امراضی که حاصل میشوند از محصولات ثانویه طبیعی که بید
 یافت میشوند تبدل انساج بیکدیگر علامتی است که بسیار در انساج مشاهده میگردد
 و این تبدل مانند فیزی الوثری مشاهده شود در نمودن و در فقدان یکی از اعمال طبیعی که
 بعضی از انساج مفقود و بجای آنها فیج دیگر حاصل شود و لیکن مقصود ما از نوع تبدل
 است که منتسب با مرضی است از جمیع تبدلات انساج و را اینجا گفتگو نخواهیم کرد زیرا
 که بعضی از آنها اگر چه شناسائشان در تشخیص مرضی لازم است ولی در عمل چندین تک
 نمیخورد و را اینجا فقط گفتگو نمائیم از تبدل و حصول جریعت و مانی و قوی و غصه
 و غطی و بالاخره از بعضی پلیسها که حاصل میشوند از انساج غطاطی و عضلانی و بعضی

و غرضی طبعی تبدلات و محصولات تازه و در غیبت نسبی اتفاق هستند که نسبیاتی
 آلات را یک تغییر میدهند و ما به اختلاال آنها میشوند و باید آن محصولات
 دیگر که هیچ شباهت با نساج بدن ندارند تمیز داده شوند و آنها عبارتند از اول
 از مرهوبات یا محصولات غیر آلی مانند دویم انطویر و سیم آن محصولات ضعیفی
 که چون مجاور با نسجی شوند در او حلول کرده نسج او را تبدیل به نسج خودشان کنند
 آنها عبارتند از اول از توبی کوها و سیم از سرطان سیم بلا نور یعنی سرطان سپاه
 دقیق

قسم اول در تبدیل آلات یکدیگر و محصولات غیر طبیعی که شبیه انسان
 بدن باشند

در تبدیل آلات با نساج چوبی در کتاب پنجم ما از سمن مفروضه که عبارت است از ماده
 چوبی در غشاء لحمی گفتگو نمودیم در اینجا مد کور خواهیم نمود از اراضی که نسجی
 شود بیافیه چوبی با آنکه نسج چوبی او را احاطه کند با در او حلول نماید که با این واسطه
 در او هزال آید پس بد با یکدیگر و مرامعد و م سازد عضلات الاتی هستند که این
 مبادله در آنها هم میسر شد چنانچه الباف آنها زرد رنگ و جیشتان که با لخته فانی میشوند
 در این صورت همه آن عضله زرد رنگ شده چون روی کاغذ بپزند مانند چوب کاغذ
 لکه اندازند و اغلب اوقات این قسم از عضلات شکل و حجم طبیعی خودشان محفوظ دارند
 و عروق این عضله کوچک شده اعصابشان هزال یابند و این مرض بزرگند اغلب
 اطراف ساق و غالبه چنانچه در سابق در مرض موسوم به هزال تند ریخی عضلات دیگر
 یافت و در میان عضلات غیر آلی فقط قلب مبتلای این مرض میگرد و چنانچه بعد
 از این ذکر خواهد یافت و سبب این مرض در اطراف بجز کمری زیاد آنها است چنانچه اغلب
 عروضی در شیبوخ مفلیح و عاجز بینی که لابد باید بچرکت باید بماند حاصل شقی و

بهمین

بهمین واسطه است که از فنا با هزال اعصاب محرکه این مرض در عضلاتی که ان عصب و اعصاب
 میرفت عارض گردد و هیچ علامتی در حال حیات تمیز مرض را نمیدهد زیرا که این مرض هیچ
 وقت بجدی کامل نشود که عضو بهیچ وجه نتواند حرکت نمود و بعضی از اعضاء مانند
 غده لوز المعده و کبد و غیره مبتلای این مرض شوند و طبعی چون ابتلای آنها مخصوصا
 توبی کول است در وقتیکه از نسل ربه ذکر میکنیم بیان آنها نمیخواهد شد و بداند
 پسنان و کلبتین بنی با این مرض مبتلا گردند

در تبدیل قلب ماده چوبی و احاطه چوبی زیاد بود

در مردمان سمن و غیر سمنی که ای اوقات دیده شود یکمقداری زبانه از حال
 طبیعی چوبی بروی قلب جمع شده و این چوبی که زرد رنگ و خوش قوام است مخصوص
 جمع شود در قاعه و خلف الت و در شباهت رهای عرضی و در اطراف شرابان اکلیلی و
 کاهی بنی این ماده چوبی داخل میشود در میان الباف و آنها تا آنکه در بعضی اوقات
 الباف عضلاتی پیرنگ و زرد و شبیه شود بپیرنگ خشک و نرم شود و چاق و کاغذ
 چوبی کند و این تبدیل اغلب جزئی و محدود و بنقطه قلب است و این تبدیل از خاد
 بداخل است که باز الباف داخلی را میتوان شناخت با وجود این قلب خونریز
 هلاک می کند و پیاده شدن او در این مرض کمتر دیده شده است و سبب این مرض معلوم
 نیست زنان پیش از مردان مبتلا شوند بعضی بپایند که اغلب عروض او در مسلولی
 و هر اکی کند با تغییری مشابه در کبد و هیچ علامتی نیست که دلیل بر وجود این مرض باشد

در تبدیل انساج به نسج مای با سرن

نسج سردی اتفاق اغلب اوقات در مواضعی که مورد اصطکاک مکرر و غیر طبیعی میگرد
 حاصل میشوند بعضی اوقات حصول آنها در اطراف شئی خارجی است که آنها را احاطه
 کرده و فی الحقیقه از بدن خارج نمیشوند و نیز عارض شود در میان آلات که متحرک

کردند اند چنانکه در نرف الدم و مای کبیر منبج شده و جای انقطاعه از دماغ را که زایل شده میگردانند
 حصول یافته سرزنی شکل کبیر میباشند بدون منفذ و لهذا آنها را کبیر مینامند
 در اقسام کبیر کبیرها عبارتند از جوتهای غشائی بدون منفذ با شکل و حجم مختلف که
 نمونما ایند بطور اتفاقه در جمیع آلات بدن سوای غضروف غشائی که کبیرها از او ساخته
 شوند ضخامتش مختلف است با سطح خارجی خود ملتصق میگردد با انساج و آلات مجاور و
 سطح داخلی او که صاف و مانند اغشیه سرزنی است ملتصق میشود با مواد خیلی مختلف و اینها
 اغلب بطوبی مائی یا خون مغاطیه یا یم یا ماده چوبی یا قوی کول یا سرطان یا مالافوز یا در و یا
 مو یا اجسام خارجی است که از خارج داخل بدن شوند چون کلوله و غیره و این کبیرها اغلب
 فضا دارند باشند که فضاهای عذیه داشته باشند در صورت اخیر باشد که فضاهای از هم جدا
 با هم نه داشته باشند و اغلب اوقات در هر کبیرها یک ماده است و باشد که مواد مختلفه
 باشد و عموماً یک کبیر در بدن موجود میشود و باشد که متعدد بود چه در همان الت جود
 آلات مختلفه و در کاف صلب در بگون زیاد از هشتصد کبیر در بدن او شمرده و اغلب این کبیرها
 بواسطه غشاء لحمائی بالات مجاور ملتصق شوند و بعضی اوقات التصاق هم حاصل
 نکنند و آلات مجاور کبیر بواسطه فشار هزال پیدا کنند و گاهی از اوقات بکلی فانی شوند
 بعضی ماده جوهر کبیر قبل از وجود کبیر ترشح میکنند و بعضی خلاف این را معتقد اند این
 دو قول صحیح است و هیچیک عمومیت ندارد بعضی اوقات اول ماده در بطنه پس از
 از آن کبیر دور و را گرفته مانند ماده سکنه و بعضی اوقات اول از غشاء لحمائی کبیر
 حاصل شود بعد از آن کبیر ماده ترشح کند علامتیکه آن کبیرها حاصل میشوند بسته به فشار
 که بالات مجاور حاصل شود و عسرتیکه در عملان آلات حاصل میشوند و باین سبب کبیرها
 میتوانند مورث هلاکت گردند این کبیرها ممکن است معدوم گردند بواسطه جذب
 متشعه یا دره پیدا گردن آنها بخارج و این کبیرها مورث بعضی اختلالات گردند چنانچه
 منورم

منورم شوند و باین نشینند با بعضی قید بلاست حاصل کنند بخصوص مبدل شوند بعضی
 و عظم و اغلب از این کبیرها وقتیکه بدست بیایند علایشان عمل بدست

در کبیرهای دماغی

اغلب کبیرهای دماغ عجمشان کوچک است و در جوف آنها لکه طوبی است و همیشه حاصل
 شوند از سرزنی خون و این حصول کبیر بکلی از طریق شفا فی نرف الدم و نرفی دماغ است
 گاهی از اوقات در سطح دماغ یا در جوف او بخودی خود کبیر حاصل میشود بدون آنکه قبل
 از او چیزی ترشح شده باشد و این نوع کبیر بسیار نادر است و همیشه این نوع کبیر کبیر دود
 خواهند بود تشخیص آنها محال است زیرا که علامات عمومیست دارند

در کبیرهای سرزنی کبد و طحال

کبیرهای سرزنی کبد بسیار نادر است بلکه بعضی از مصنفین انکار وجود او را میکنند و
 میگویند که تمام کبیرهای سرزنی کبد دودی میباشد ولی مبرهن است که گاهی از اوقات
 که کبیرها فرد یا متعدد در میان کبد یافت میشود که در آنها طوبی است صاف مانند آب
 چشمه و چون این کبیر منورم شود طوبیت او کدر و سیرجی گردد و هرگاه خون بخوف کبیر در
 دنگ طوبیت سرخ گردد

در قار و انتهای مخرج
 رفتار و انتهای آنها مطابق است با کبیرهای دودی و علامت
 نبوده این دو مرض مشاهده میگردانند که حس منیس مان در این کبیرهای سرزنی زیاد است
 و باید دانست که فقدان این علامت دلیل کلی نبوده کبیر دودی نیست زیرا که در بعضی
 از کبیرهای دودی و سرزنی حس نادر است در حالت حالیه علم در حین حیات
 ممکن نیست تشخیص این دو مرض و این عدم تمیز چندان ضرری ندارد زیرا که علاج در
 هر دو مرض یکی است

در کبیرهای ساده کلینین

اغلبا وفات کبسه های سرزی بحکم مختلف در کلبه بن مشاهد میشود که غواغلبا نهاد و ما
کوفی کال است و بعضی در ماده لوله مادر غشاء الحما فی محیط عروق است و این کبسه ها فرد
متعدند و گاه بعدی ز یاد شوند که کوپادله بچیده اند و ماده مخصوص کلبه از فشار بکلی
معدوم شود و اینجا که کبسه در سطح کلبه باشد برآمدگی حاصل شده که شفاف و معلوم اند
مرطوبی زرد رنگ و بیاض البیضی و گاه مرطوبت کدر و ریخی با قوی است و باشد که در
تراکبی باشد و این کبسه ها در شپو بخ است و چون از این مرض وجعی پیدا شود و اختلا
در قوشخ ادرا دیم نمیرسد در مدت حیات ناامناست خاصه اگر حجم آنها کوچک باشد
و هرگاه اتفاقی بعدی بزرگ شود که از خارج برآمدگی پیدا کنند شپو گردند و بعد از نفوذ
از این ذکر خواهد شد و اگر از آنجا که بواسطه مقدمه مرض که هرگاه در این مدت
بجس البول شده و ماده هیدر تر نفوذ خواهد بود و باشد که بخود بخود یا بضرر بخود
گردد و تاکنون علاجی برای او نوشته نشده است

در هیدر تر نفوذ

عبارت است از جمع شدن یک مقدار از مرطوبت در کلبه اس و حوضه که بدو ادرا دیم
و بعد مشابیه سرز کوبند

تشریح مرضی چون سسی خارجی با علتی دیگر مانع شود از نفوذ بول را بنامه ادرا دیم
در کلبه اس و حوضه ها جمع شده اند و منبسط نماید و اینجا که مرطوبت فقط در حوضه
جمع گردد و یکماده گردد و در شکاف کلبه پیدا شود و از داخل بخارج بکلی فشار دهد و حجم
او را کم نماید بالاخر خود کلبه در ردوی ماده مانده کلاهی شود و اینجا که اتساع کرباشد
قوام کلبه بحالت خود باقی ماند ولی بعد برآمدگی حاصل کند که نرم و صواح بوده با
و در انتها جمع کلبه نرم گردد و مانند کبسه یازابی گردد و چون بشکافند پاره شود که
متسع و کلبه اسها عرضتر مانند قیفی شده اند و ماده های اولیه ذکر بیکال فشرده شده
هزال

هزال بایند و گاهی بکلی معدوم شوند و در مرطوبت مجتمعه او آورده و بیاض البیض همیشه
هست و اینجا که مرض قدیم بود و اینجا که راه کلبه بنامه حکمت مسدود نباشد و مرطوبت مجتمعه
مشابیه ادرا دیم باشد

علامات و تشخیص اینجا که در یکی از کلبه بن بوده باشد چندی در انظر و احسا
وجعی گردد و پس از مدتی در ان موضع ماده پیدا شود و صاحب برآمدگیهای چینه و در
قوع کدر که حجم او

و خروچ انباشته در قوعی است و هیچ اختلالی در ادرا دیم نیست و ماده بجز حجم آن
دیگر ندارد و اینجا که موقتا ادرا دیم کوبد که کلبه دیگر عمل نکند طول نکشد که شخص
بها لکت رسد و اینجا که مرض در هر دو کلبه بوده باشد شخص تا یک مدتی بکفتم بزرگ
زند کافی میکند و بعد بسرعت و بدون آنکه حدس بر مرض شده و بمبرد و مرگ وقتی است که
بکلی مانده از کلبه بن را هیدر تر باشد باوقتی که کلبه بن هزال یافته ادرا دیم دیگر بعمل نیاید
و داخل و در آن دم گردد و ممکن نیست این مرض را با پیوسته مشتبه کرد و زیرا که در پیوسته
همیشه قدری دیم در ادرا دیم هست و خود ماده از پلی تیت از فشار موحج است بخلا
این مرض از لمس و محل مرض و رفتار و باسانی از حمل و کبسه بیضی بن تمیز میدهند
و انگلیسها هر وقت که ماده ز یاد باشد با تو و کار دخالی کنند ولی خوب نیست زیرا
که اگر کبسه ساده باشد ضایع ترند کافی نیست و از طرف دیگر سوراخ او مورث تو
او گردد و سرم سرایت بصفاق نموده هلاک نماید و اینجا که کبسه خود بخود متورم گردد و در
ضد و سرم استعمال نمایند و چون دیم حاصل شد قبل از بروز زخمی و قی دایمی بجهت او
خارج کشانند و اینجا که کلبه بن هرد و مبتلا شوند پس از تولد عسر البول عارض شود
و پس از چندی به لاکت رسد و در ابتدا شکم را با تو دکان خالی نمایند و چون کفا
نکند ماده را بکلی بپرون آورند

در کسبه های پیشتین

پیشتین الاقی هستند که اغلب عاده های کسبه را بواسطه حجم و عدد و ماده که در جوفشان هست مختلف میگردند و نسبت بماده جوف آنها و این قسم کرده اند اول کسبه پیشتین و دوم کسبه های

سیم کسبه های دودی

در کسبه های پیشتین در پیشتین مخصوص در پیشتین است کسبه های مجتمعات مختلف با میشود که جوف آنها مقدار زیادی از شیم مخلوط بماده چرب و پیچیده و غلیظ دارد طول این موها از پیشتین الی پنجاه سانتیمتر است و جمیع الوان موئی در آنها مشاهده شود و این موها با از هم جدا هستند بامصلوق اند یکدیگر و بجای نخسپیده اند و قطعاتی در کسبه یافت میشود و دندان است بعد و مختلف گاه آزاد و گاه مصلوق بقطعه عظمی باغضروفی با یکدیگر خود کسبه است و اغلب اوقات این دندانها از دندانهای لطیف تر و باشد که از دندانهای ثانوی باشد و گاهی از سایر عظام بدن پیشتین در این کسبه ها یافت شود و در جوف این عظام و کسبه ها گفتگوهای زیاد شده است اما عموما باینند که آنها حاصل شده است از جنینی باین قسم که جنینی با افتخای نمیشود در پیشتین بکمال رسیده پس از آن است و مجاز و یک گشته و موی سرد دندان و عظام او باقی مانده و بعضی از اجزاء بخلاف نمیکرد و این کسبه ها منفعتی جز برای تشییع ندارند زیرا که در حال حیات مورث از تنی نگردد و شکم بزرگ نشود و گاهی خودی خود متورم و بالات مجاور مصلوق میگرد و چنانچه در بزرگ شده که از عجل یا مثانه یا مستقیم خارج گشوده شده است و اینجا که مورت جنینی مدتی پس از انقراضش باشد مانند ماه پیچ و شش مورث جمیع علامات حمل خارج رحم شود این باب را در کتاب فایده ای باید به تفصیل ملاحظه کرد

در کسبه های سرزی پیشتین با استسقای پیشتین

پیشتین الاقی هستند که اغلب اوقات مبتلای باین مرض گردند و این اختصاصی

اکثر

ان است که در جوف پیشتین از پا قوده تابست حبل است که نامیده شده تخم که من از آنها میتوانند بزرگ گردند و گاهی هم این حبا بجا در خارج پیشتین واقع گردند این صورت اغلب اطباء عقیده بر آن است که بواسطه بزرگ شدن آنها از پیشتین خارج شود و بعد بزرگ گردد

تشریح مرضی غنچه ها که در حالت طبیعی از سر سنجاق بزرگ تر نیستند و از پیشتین زیاد بزرگ شوند که گاه مانند استسقای رزی زیاد شد بد شکم و منبسط سازد و در طوبت قاسمی من دیده شده است در این صورت احشاء بطبیعی از محل خود حرکت میکنند و بعضی المصافات یا یکدیگر پیدا کنند و سطح این کسبه عموما ناهوار و قوز دار است مابین این قوزها شیارها پیدا شود و گاه چندین کسبه بجلوی هم باشند و کسبه است که در میان آن خانهای متعدد باشند اعم از آنکه یکدیگر بگروا داشته باشند یا اشتراک باشند و فاصل این خانها از بزرگ غشاء صفاق است داخل این کسبه ها ولی در طوبت جوف آنها مختلف باشد گاه مانند اب لمو و گاه قرمز و گاه سیاه است و باشد که سری باین سر پیشتین باشد و ضخامت این کسبه ها گاه زیاد و اغلب زیاد نادر است

علامات ابتدای مرض زیاد مجسم است که ابتدای بروز نرینه و جعی عارض و نه عسری در اعمال آلات پیدا شود بزرگ شدن شکم اول علامتی است که شخص را ملتفت میکند در این مرض شکم از پائین و از بزرگ باهر طرف بزرگ گردد و حال آنکه در حمل شکم از خط وسط بزرگ میگرد و هر چه نو کسبه بیشتر گردد میل بخط وسط کند و از خط بیست مقابل بازرگ گردد که چون مجسم زیاد شود ریه شکم هیچ فرقی از شکم زنان ابستین پیدا نکند و از سوراخ مخرج ماده را از فوق بطرفین با ساقانی جدا کنند امعاء بطرف فوق و طرفین روند و این ماده عموما مد و برابری است سطحش

صاف است و با بولمد که در بواسطه قطعه قطعه بودن مواد داخلی او در این صورت اخیر صلا
هر جانی مختلف است و هر حرکت موجب ظاهر نگردد و این عدم حس توجع با بواسطه خان خانه
بودن کبسه است با بواسطه مخالفت کبسه با بواسطه قوام و غلظت رطوبت مترشحه هر صورت باید
صحر حرکت موجب را حس نمی کنند با در یک علی نمایان شود و از وقوع صد که در است و اگر در
در میان کبسه باشد و لیس فرجه سپان حاصل شود و بواسطه بزرگی کبسه و فشار او بالات
بعضی اختلاف در بدن پیدا شود که فشار بر جمدهد و او را بطرف مقابل تقل دهد و آن
فشار بمثانه میل دارد از زیاد کرد و از فشار بمستقیم میویست عا^{ست} گشته بواسطه بزرگی
و نفخ در اطراف مفاصل پیدا شود با عسرت در عمل هضم و عسر النفس عارض گردد

دقار و دلم و انقباضی مرض و فساد مرض بطی است باشد که مدتی بیک غیج باشد ولی عموما
علی الدوام در زیاد است و دلم این مرض نامعین است که کامچهل الی پنجاه سال طول کشند
و رطوبت مترشحه بطرف مختلف راه بخارج پیدا کنند که از جدا شدن شکم با روده یا مثانه یا مجرای
باشد ولی اغلب بچوب مفاصل پیوندد در این صورت اخیر باشد که بواسطه عروض و رطوبت
بزرگی مرض ببرد و این در صورت نیست که رطوبت از مفاصل قانی خارج باشد و کاهی
استسقاء ذقی پیدا کند یعنی آنکه پوزن پان شدن کبسه مضطرب در اینجا بماند و باشد که
پس از بختی اب بمصفاق مجذوب شود و زن سالم ماند

تشخیص در چنین حیات ممکن نیست که کبسه ای بیضه را از کبسه های آبی دیگر که در
ضمیمه رحم واقع میشوند تمیز داد ولی این کبسه ها خیلی نادرند و هم از تمیز ندادن فوق
علامات و علاجم بجهت سید و با امرانی که بسیار شباهت دارد استسقاء ذقی و استسقاء
و حی است در استسقاء ذقی بکدام بیضی با سطحی صاف یا نااهویر مشاهده نمیشود و بجز
شکم از پائین بیابالا است در جمیع عرض شکم و حال آنکه در استسقاء بیضه در ابتدا ماده
بیضی شکل در یک سمت خط وسط شکم پیدا میشود و از وقوع در استسقاء بیضه که در

بیشتر



بیشتر از استسقاء ذقی است بخلاف حس توجع در استسقاء ذقی بیشتر است و از تغییر
وضع در استسقاء بیضه چندان فرق در کرد و رت پیدا نمیشود و حال آنکه در استسقاء
ذقی از تغییر وضع محل کد و رت تفاوت کند و درودها در استسقاء بیضه به پشت^{لب} و
واقعند و حال آنکه در استسقاء ذقی در وی اب ایستاده اند و فی الجمله حرکت دارند که
از همه اگر کسی شاهد کند که در کد اب در شکم دارد و چندین سال سلامتی مزاج دارد^{طبیعی}
یقین توان گفت که استسقاء بیضه است زیرا که استسقاء ذقی همیشه علامت و عرض^{من}
دیگر است و چون استسقاء ذقی مرکب شود با استسقاء بیضه حس توجع ظاهری پیدا شود
و چون با دست فشار دهند و رطوبت صفاقی را پس کنند احساس بکاماده دیگر شود
استسقاء و جمعی از این مرض تمیز داده شود باینکه همیشه در زو شکم واقع است و نادر^{است}
که از زو شکم تجاوز کرده بنا بر رسد و حس حرکت توجع هیچ نیست و بعلاوه طبع حس
شود و وجع در کشاله ران و قطن پیدا شود و از لیس محل و مستقیم معلوم شود که در^{آن}
شک و بعضی اوقات استسقاء بیضه با حمل مشتمله شود و برخلاف اما ماده در حمل
در زو شکم است و از لیس انگشت معلوم شود و بعلاوه حس بلوتمان پیدا شود
صدای قلب چنین شکمی در تمیز نمیکند و در عمل بیضی از اینکه ماده در یک سمت شکم است
مشتمله شود با استسقاء بیضه ولی در حمل شکمی زو بزرگ شود و هر اهی کند با اوجاع
و بعضی علامات عرضی و بعد از ماه پیچ بواسطه حرکت چنین و صدای قلب و تمیز این دو
داده میشود

تقدیر^{من} مرضی است پرخطر اگر چه نادر است که بخودی خود مورث هلاکت^{شود}
اما لا علاج است و هر چه زن جوان تر باشد و قنار مرض سر بجزر خوا هلد و اگر بک بیضه
فقط مبتلا باشد ممکن است زن حامله شود و بیا بد اما چون شکم زیاد بزرگ باشد و
سقط چنین و وضع محل قبل از مولد طبیعی گردد

اسباب اگر چه در وقتان غیر بالغ هم مشاهده شد ولی اغلب عروق در میان سن
چهل پنجاه سالگی است

علاج آنچه در عروق در عروق استسقاء مستعمل است مانند مدرات و مسهل
و معرقات و محلات و غیره در این مرض نیز مستعمل است ولی جز هذا در بعض و سوء
القنیه آن بجز نبوده اند و معالجات جراحی نیز فایده بخشیده است باین واسطه اغلب از اطبا
جز معالجات گاه کل مالی کاری نمیکند و نوک کار زن که در معالجات سر بری است چنان
در استسقاء ذوق بکار برده میشود در این بکار برده میشود و بعد از کسره ها باید مسکنه
شخص را بکار برده کار زن و هر وقت بزرگ شد باید عمل را مکرر کنند و پس از خالی
کردن آب رزق از تعفن بدن و بد و سرد و یخ تا سیم لازم است

در حصولات قری و بستر

گاهی بروی جلد و غشاء مخاطی خاصه در آن مواضعی که زیاد اصطکاک بهم رسانند با آنکه مجاز
هوا باشد بعضی محصولات قری مانند فلس سخت یا ماد هائی شبیه شمع غلیظ می آیند این
مناخها بمرکت و سطحی میباشند و همیوقت بجمیع از جلد تجاوز میکنند و اغلب از غشاء
جلد غلیظ می آیند که از نوپوشیده شده باشد و در زنان خاصه زنان مسن بیشتر از مرد
بروز کند و اغلب بک پاد و فانه است و باشد که بجلد زیاد در بدن نمود نمایند و انقباض
انها از روی ساقه بطور است و عروضشان عموما بلا جهت است و گاه از خورید و غلظه
حاصل شوند و طریقه بروز آنها هنوز معلوم نشده است و علاج آنها استسقاء است
این صحت باید ذکر کرد ان اراضی را که در یک جز از جلد با تمام او بعضی محصولات قری با
بشر نمود میکنند و آنها بچهار نوع اند اول بطور قری و پاد پس لپی بطور پاد پس
اول بطور قری است که شناخته شود بواسطه ضخامت بشر و حصول فلسهای سخت
و خشک و سفیدرهای شباهت این فلسها بفلس ماهی مایه ان شده که باین اسم

موسوم

موسوم نمودند و این علت اغلب خلقی و باشد که مولودی باشد در صورت اول عموما تمام بدن مبتلا
و در صورت ثانی اغلب محدود و بیک جز است و اینجا که عموما باشد کف دست و صورت و بجهت
انزاع و خزان

علامات اینجا که مرض خفیف باشد جلد بمرکت است و خشک و ضخیم و در روی و قطعه ها
بشر مرادی رنگ و خشکیه نمود نمایند و او را خشن و ناهوار نماید و گاهی بشیر ضخیم شود و از
جانب شقاق هم رساند و فلسهای سخت مرادی با سفید مرادی حاصل کند و این فلسها با
بخودی خود افتاده با مرکز بکند بدون احساس و عموما عرق بدن سده شده و چنان نماید
که تشعشع و جلد و بخند موضع است مانند کف پا و نیز بجل و سر و در وقت تولد این مرض
معلوم نکند و در مکرر پانزده روز بعد از آن و بعد از چهل سن زیاد شود بیشتر کرد و اینجا
مرض اتفاق بود ر قمارش خیلی سریع است و در بعضی از فضول بطرف شود هم چنین
بعضی از اراضی ذایل کرد و اینجا که اتفاق بود گاهی پس از چند سال معالجه کرد و هرگز
خود صورت هلاکت نکرد و مانع بروز مرض دیگر در جلد نشود و اینجا که خلقی بود با
هیچ مرضی شتبه نشود و چون اتفاق و موضع باشد مخصوصا جانی که خفیف باشد با آن
ولیکن در هنگام بروز بشر شباهتی بهم رساند اما بواسطه خشکی و سختی فلسها و ضخامت
مرادی جلد با ساقی فرق داده شود پس پاد پس و لپی از این مرض تمیز داده شوند از شکل
و قری و موضع

تقلید المعرفه اگر چه مهلك نیست ولی خطرناك است

علاج استسقاء در حمامهای بخار و آب گرم و ملعبات و تدبیر با و غشای الکلی

در بخی و پاد پس

این لفظ که در بخی عبارت از تبسوی است استعمال شده است از برای مرضی که
که در او اعم از آنکه لون تغییر کرده باشد یا نه بشر بطور قطعه های کوچک سفید رنگ

بعضی از وقت در قلب محسوس غشایی و غشاء لحمی و آخر در تحت مخاطی هیکل تبدیل عظم
نمیکردند اغشیه عضلانی و مخاطی بندرت تبدیل در آنها حاصل نمیشود و انساج غیر
بندرت تبدیل بعضی از وقت در قلب و عظم میگردند مانند غشاء کاذب و انجادات بیاض البیضی
و غیره در قلب و کسبه ها و مواد بعضی مخصوص در قلب و رحم و مواد اهلی که در
اغشیه شریانی بسته میشوند و این مواد غلیظی که انصاف با انساج پیدا میکنند گاهی
از اوقات مشاهده گردند و در هیچ انصاف در تجاویف غیر طبیعی که در تجاویف
طبیعی با حال مواد غلیظی دیده نشده است بخلاف ماده غضروفی که در اغشیه مری
بسیار دیده میشود چه با انصاف چه بدون انصاف و گاهی از اوقات اموات غلیظی با
غضروفی مانند جویات در روی نسج پاشیده شوند و بعضی از اوقات شبیه به نخها
غیر منتظم و ملتصق به نسج میباشند و گاهی مانند قشر تمام یک الت را احاطه نمایند و این
در وقت است که تبدیل در انساج غشائی باشد مانند کسبه و قشر و طحال و غیره و این
عظام اتفاقاً نسجاً همیشه یک طور نیست و گاه تمام اجزاء او یک قسم است که نسج محلی
با نسج صلب غیر داده نمیشوند و قوام آنها باشد که مساوی با کمتر یا بیشتر از عظام طبیعی بود
و در شبیه گاهی آنها را تمام آنها را حل میکنند که هیچ شباهتی با استخوان ندارند که در
وجود املاح فوسفاتی و گاهی هم آنان نسج در آنها مشاهده کرد خاصه در انساج غشائی
و در آنکه که خیلی شبیه اند به ماده صلبه غلیظ و قوام پلاست

در تبدیل آلات غضروفی و غشی قلب

بعضی اوقات در قلب محسوس غشایی و غشاء لحمی و آخر در تحت مخاطی هیکل تبدیل عظم
نمیکردند اغشیه عضلانی و مخاطی بندرت تبدیل در آنها حاصل نمیشود و انساج غیر
بندرت تبدیل بعضی از وقت در قلب و عظم میگردند مانند غشاء کاذب و انجادات بیاض البیضی
و غیره در قلب و کسبه ها و مواد بعضی مخصوص در قلب و رحم و مواد اهلی که در
اغشیه شریانی بسته میشوند و این مواد غلیظی که انصاف با انساج پیدا میکنند گاهی
از اوقات مشاهده گردند و در هیچ انصاف در تجاویف غیر طبیعی که در تجاویف
طبیعی با حال مواد غلیظی دیده نشده است بخلاف ماده غضروفی که در اغشیه مری
بسیار دیده میشود چه با انصاف چه بدون انصاف و گاهی از اوقات اموات غلیظی با
غضروفی مانند جویات در روی نسج پاشیده شوند و بعضی از اوقات شبیه به نخها
غیر منتظم و ملتصق به نسج میباشند و گاهی مانند قشر تمام یک الت را احاطه نمایند و این
در وقت است که تبدیل در انساج غشائی باشد مانند کسبه و قشر و طحال و غیره و این
عظام اتفاقاً نسجاً همیشه یک طور نیست و گاه تمام اجزاء او یک قسم است که نسج محلی
با نسج صلب غیر داده نمیشوند و قوام آنها باشد که مساوی با کمتر یا بیشتر از عظام طبیعی بود
و در شبیه گاهی آنها را تمام آنها را حل میکنند که هیچ شباهتی با استخوان ندارند که در
وجود املاح فوسفاتی و گاهی هم آنان نسج در آنها مشاهده کرد خاصه در انساج غشائی
و در آنکه که خیلی شبیه اند به ماده صلبه غلیظ و قوام پلاست

بهرند

بهرند مقاومت زیادی با گذر پیدا کند و بسیار شبیه گرد و در مل و سنک و ستونهای عضلانی
حیوان گردند و در آنکه شکلهای متغیر گرد و شبیه گردند استونهای سنگی ولی تبدیل نشود
عضلانی به عظم خیلی نادر است بخلاف در رتقب و سرپوشها که زیاد ملاحظه میگردند و در حقیقت
در سنگی رتقب قلب مذکور نمودیم سبب آنها اغلب بواسطه ورم و حصول خون مغالطه است
و گاهی هم بواسطه احتلال عمل تغذیه و سن زیاد مورث بر و زایل کردن علامات این مورث
قوت ضرایب قلب و صدای او است و چون فشار بر موضع قلب دهند و جعی پیدا شود که
مدتی هم پس از فشار باقی ماند و پیش قلب عارض شود و اکنون علامت مخصوصی
برای این مورث نوشته شده است و از برای تفصیل رجوع کنند به محبت تنگ رتقب قلب

در حصول غضروف و عظم در شریان

در جلد اول و قبکه از ورم شریان گفتیم و میگردیم بطریقه حصول غضروف در شریان
بیان نمودیم در اینجا فقط از حصول عظم در سطح داخلی شریان بیان خواهیم نمود اگر سطح
داخلی شریان بزرگ را بدقت ملاحظه کنند بعضی نقاط کوچک زرد رنگ دیده شود
که اگر غشاء داخلی شریان را بکنند آنها را بجا میآورند و گاه خواهند شد و آن آنها ملتصق
بسطح خارجی غشاء داخلی قلب هستند این نقاط بعد بزرگ گردند و ملتصق به غشاء و سطح
شریان شود و این غشاء وسطی نرم گردد و اکثر امراض شریان سببش از اینجا است که در
موتور آن دانه های زرد رنگ نقطه سختی پیدا شود کم کم بزرگ گردد و غشاء وسطی را احاطه
کند و بعد به غشاء داخلی نیز بزرگ شده قابل شود و لایق قطع عظم شده و مجاور خون جو
شریان گردد حصول عظم در شریان سبب ابو ریمه و تنگی شریان و عسرت دوران
دم و بسته شدن خون مغالطه میگردند در حقیقت حیات مشکل است حدس بوجود عظم
در شریان زرد ولی اگر گوش بر موضع نهند صدای اصطکاک احساس شود شبیه به
غشوی نرنگ

در بیان پلپ‌ها

باسم پلپ بعضی اجسام مختلف الحجم و شج واقع در تجا و بقیه از غشاء مخاطی مفرود
نامیده شوند و این محصولات چون در مواضعی یافت شوند که بچشم با اسباب دیگر احسا
گردند مانند جوف انف و خلق و مجمل و رحم و مستقیم و کونین و مجور و در تحت اداره
جراحی در اینها در اینجا گفتگوی از آنها نخواهد شد ولی آن پلپ‌هاست که در بعضی
مخفی میمانند و از وجود آنها مگر بواسطه اختلال بعضی اعمال اطلاع نمی‌رسد و اعمال
جراحی با آنها کاری ندارند در اینجا مگر بر غنائم و آنها پلپ‌های معده و امعاء و
واقع در مجاری هوا و قلب است

در پلپ معده و امعاء

تقریباً جمیع آنچه‌هاست که مانند پلپ در سطح داخلی معده و امعاء نمود می‌کنند از جنس سرطانی
که بعد از خواهم نمود ولی گاهی از اوقات در معده و امعاء پلپ‌های غاطی یا بعضی فرد یا
متعدد با دسته‌بندی دسته یعنی در کنار با دم نمود کنند که در چنین حیات شناخته
نشوند ولی چون حجم آنها مجدی کرد که عسرت در حرکت مواد غذائی پیدا شود بعضی
اختلالات پیدا شود مثلاً پلپ‌های مورت بر روی جمیع علاماتی که باعث تنگی مری
می‌گردد و چون در معده واقع شود با هیچ علامتی ظاهر نشود با آنکه عمل هضم موجب عسرت
و چون در جواب پیدا شود جمیع علاماتی که در اسفیر و موضع مذکور خواهد شد بروز
می‌کند و تشخیص بواسطه قول به لاکت رسد و پلپ‌های امعاء نیز در چنین شناخته
مگر اینجا که در جوف اسفل آنها واقع شود که از لیس با انگشت با بواسطه دفع باز کنند
خارج و پلپ‌های واقع در جوف اسفل امعاء مورت و وسط را با و پیوسته فرج می‌کند
معلوم است که اگر زیاد بزرگ گردد و راه عبور بزرگ را مسدود کرد اندک شخصی با علاما
ابتلا و مرگ پیدا شود اینجا که این پلپ‌های دم دار باشند ممکن است که کتله شده و

حرفی

مریض شفا یابد

در پلپ‌های مجاری هوا

مخاط حلقوم و قصبه الیه و ثقیلاً و نادراست که مبتلای به پلپ گردد ولی مصنفین تا
قریب به سی نفر نوشته‌اند که پلپ داشته‌اند
تشریح حرفی نسخ این پلپ‌ها بسیار مختلف است گاهی ماده ایست اسفیر و سی و گاهی
لبنی و گاهی غضروفی و گاهی عضلانی و باید که محالی باشد و حلقوم موضعی است که این
پلپ‌ها در آن بیشتر بروز کنند

علامات چون پلپ در یکی از شاخه‌های قصبه واقع شود بواسطه آنکه هوا کمتر داخل
در پی کرده ضعف در صدای تنفس پیدا شود و این ضعف در یک و سستی است محل و چون
پلپ در قصبه الیه و حلقوم پیدا شود اگر غموش گویا باشد و بدخول هوا مخالفت نکند
مدها ناشناخته میماند ولی نزد بادی بواسطه سرفه با عمل دیگر این مواد بلند شده بعضی ا
شوند و گاهی هم از دهان حلقوم تجا و ز کرده و لبه او را مسدود کنند در این صورت
عسر النفس شدید عارض گردد که اگر ماده رجعت نکند پیش از آنکه هیچ امدهای بعضی
بتوانند رساند بجهلاکت رسد و باشد که ماده رجعت کند و بقا صله چند روز
باده عارض گردد و گاهی از اوقات در پلپ حلقوم بعضی علامات بهر سده مثلاً
خشن و گاهی بکلی مفقود گردد و سرفه عارض شود و این صدای سرفه گاهی شبیه است
بصدای صاحبان خناق و گاهی از اوقات با نفث ماده قرمز و عضلاتی خارج شود
و آن عبارت است از قطعات پلپ کتله شده احساس شی خارجی در حلقوم
نموده شود و عسر النفس عارض شده صدای سینه از هر دو طرف ضعف پیدا کند
دقت را اینمیز نامعلوم و همیشه فتنه بزرگ گردد بواسطه اختناق

علاج فقط کاربکه هست این است که حلقوم را سوراخ کنند و پلپ را بر می آورند
و بعضی از افراد سبیل سی شکل پلپ را حلقوم و قصبه بر می زنند لهذا لازم است که
هر وقت علامات پلپ این مواضع بر می زند املاح زینتی استعمال کنند

در پلپ قلب

تاکنون آنچه در امراض قلب با اسم پلپ نوشته اند اطلاق میشود بخون مغلطه و
مغی و الی کون معلوم شده است که در جوف قلب بعضی مادی که بعضی بر می زنند
که بکلی شبیه اند به پلپ های جوف انف و بر می و الی این حالت بسیار نادر است و قاعدتاً
فراوان نیست مثال نوشته شده است و در این هشت مثال که پلپ ها هم در نباله
دار بوده اند هفت عدد از آنها در هلیز این و یکی در هلیز این بوده است و در نباله
او در هلیز این در ریه بقیه بوطال واقع شده باشند و در پنج مثال پلپ از ریه مابین
و هلیز و قلب تجا و نز کرده داخل بطن شده بود و حجم آنها از تخم کبوتر تا بقدر تخم مرغ
دیده شده بود هیچ آنها کاهی عضلانی و کاهی بعضی است و علامات این عرض علامات
قلب است با خفگی زیاد و عدم انتظام قلب

اما انجا و ات خوف قلب

در قلب اغلب نخست امراض مغلطه مختلف القوام و اللون و حجم و عدد بحالت آزاد
با با الصفاق پیدا میشود

تشریح مرضی خونهای مغلطه که در جوف قلب پیدا میشوند و قسم است یکی غشی
آنکه بعد از حرکت پا در جوف مورت بسته میشود و یکی آنکه در جوف جیات منعقد شده
مورث بعضی اختلالات مخصوص کنند و آنها که در جوف مورت یا پس از آن پیدا شوند
اغلب سیاه و غم و قابل الاضمحلال و باید دانست بعضی آنها کلاً باجن پوشیده شده اند

از یک

از یک طبقه یا خاکی بعضی غشی است مختلف شبیه بیان که در روی خون صلبان و بر می
منعقد میگردند این نوع خونهای مغلطه در هر دو قلب معایت می نمایند منعقد شوند
بسیار و بر می است که گاه یک یا چندین جوف قلب را منبسط سازند و در جوف عروق
پنجه و نز کنند که جوف آنها را مسدود سازند و زن آنها از یک تا ششصد گرم
شده است و همیوت الصفاق بقلب می زنند اما ان خونهای مغلطه که در جوف جیات
منعقد شوند بزرگ با سفید بر مادی باز در می پیاشند و هیچی دارند بعضی با قوه ارتجاعی
و با ستونهای عضلانی قلب ارتباط می رسد و جدا می شود و هلیزها با ستون ملتصق
و این الصفاق با بلا واسطه است یا بواسطه غشائی است کاذب و این غشاء دلیل
خواهد بود بر اینکه سبب این تغلط و مری بوده است و عدد و حجم آنها بطوری است
که در نوع اول مذکور شد و کاهی از اوقات در جوف آنها دم یافت شود و محل
این بر می باد و محلی در و از قلب است چون او رده که بر می با خون حرکت نماید و خوف
مغلطه و و از آن احاطه نماید ولی اغلب ترشع بر می بواسطه غشاء داخل قلب
خواهد بود که پس از ترشع خون در و از ترشع کرده او را احاطه نماید و این
خونهای غشی همیشه که بکلی حل شده مفقود کردند و آنها که محبوس نشوند بعضی
علامات در حالشان پیدا شده از نکشان باخته و بعضی کردند و در بعضی عروق
متصل گردیده اند کافی نمایند بعضی از آنها تبدیل کردند بغضروف با عظم و سبب
اختلال و و از آن دم کردند چنانکه در رتگی ثقب فکر کردند

علامات انجا که حجم آنها عجله کوچک بود که مانع حرکات سر و پشته او و و از
دم نکرد هیچ اختلالی پیدا نشود که دلیل بر وجود آنها کرد و در غیر از آن بعضی
مخصوص پیدا شوند مانند آنکه اصوات قلب ضعیف و پوشیده شوند و کاهی عجله که
شوند که شبیه کردند بصدا و دم و انجا که حجم خون مغلطه بقدری باشد که جوف

قلب را پس از اصوات و ضربان قلب غلط و در هم کردند و از قریع کد و سرت موضع قلب زیاد شود و عسر النفس و قهوع و قی عارض گردد و نبض ضعیف و غیر منتظم گردد صورت سپاه و اطراف سرد شوند و انما عارض شد مرض بجلالت رسد معلوم است شدت وضعف علامات بسته بحجم و محل این مواد است

تشخیص تاکنون علاماتی پیدا شده است که بواسطه آن بطور یقینی تشخیص مرض داده شود و چون بقدر در شخصی بروز کند تا انوقت هیچ مرض قلب مبتلا نبود باید حذر نزد به شدن ماده پلیپی در جوف قلب و هم چنین است اگر در میان یک عرضی حادث و یا مریض بصورت مفقود و عسر النفس عارض شده و اصلال در اعمال قلب حاصل گردد

تقدیر المعرفه معلوم است که همیشه با خطر است

اسباب اسباب این مرض یا مکانیکی است یا تمویجی است یا مکانیکی بواسطه جمع مریض است که در دوران دم می رسد مانند تنگیهای غیب و غیره و اسباب عمومی هم بود و قسم است یکی ورم غشاء داخلی قلب است در این صورت همیشه رانده بواسطه غشاء کاویجی قلب متصل خواهد بود بیکر آنکه اصل سبب رخود آن باشد که با سانی غلیظ گردد و موصولی های معدف در آن و بعضی از امراض ورمی مانند ذات الوبه و ورم حاد

علاج تاکنون هیچ علامتی یافت نشده است که رفع این انجادات را بکنند بعضی فصد ا نافع و بعضی مضر دانند و برخی اشر به زیاد که در آن املاح قلبی داخل کرده باشند بکامیرند

در وثر تاسیون قلب

گاهی از اوقات در سطح داخلی دهنه ها و در روی مری و پیشها بعضی اشیاء می بینند که موسیولا نیک آنها را بد و نوع قسمت کرده است یکی را نغویهای ترکیبی و دیگری نغویهای

نغویهای کولوله نغویهای ترکیبی بسیار هستند و بدانهای کوفتی با واسطه گرد و خار صاف آنها را از کوفت میدانست ولی امر ورم معلوم شده است که اینها هیچ دخلی بکوفت ندارند و حاصل شده اند از نغویهای غلطه و محل آنها در ضلع از ادره و پیشها و اغلب در بطن و پیشتر هر چه کند با تنگی قلب و صلابت مری و پیشها نغویها کولوله عبادتند از کبیره کولوله صفی که جحششان از بطن بخود تا تخم کبوتر است سطح خارجی آن صاف و سفید نزدیک است و ضخامت این کبیره یک میلی متر است قوامشان مانند پاشن الیض بخت شده و معلومند از جوی سپاه رنگ دقت و یا بخت شده و گاه خونی است مری یا مری خالص و این دانه در بطن این و اسیر بالتساوی بروز کنند و بقلب اتصال دارند بواسطه رنگدانه که آن بستنهای عضلات قلب می پیچد

اسباب مسبب این دانه اغلب بواسطه ورم غشاء داخلی قلب است و باشد که سبب معلوم نگردد و تمیز آنها هیچ علامت مخصوصی داده نمیشود و اغلب هم هیچ اختلالی در اعمال بهم نمی رسد و اینجا که جحششان مجدی باشد که مورث بروز اختلالات کردند علامات معاینه بخوبی است که در تنگی قلب مذکور شد و اگر این وثر تاسیونها کانه شوند تا نغویهای غلطه میتوانند سبب انسداد شریانی گردند

در محصولات غیر طبیعی که در بدن مشابه می دارند

قبل از گوشت که بجهت مخصوصی میشود که در بدن انسانی محصولات بمرسد که در بدن وجود داشته باشند که بعضی از آنها غیر الی و اثرشان در بدن فقط بواسطه حجم و ثقل و ثقل و مانند حصاة و بعضی از آنها نیکو بواسطه حجم و ثقل در بدن اثر کنند و طبیعت و صاب حیاتی مخصوص باشند مثل دیدن آن بالاخره بعضی محصولات غیر طبیعی دیگر هستند که در میان انسان می بینند و بعلاوه آنکه در موضع بواسطه حجم و ثقل و فشار اثر میکنند اثر مخصوصی هم بکل بدن دارند مانند دانه های سلی و سرطان و غیره

در محصولات غیر از بعضی حصا

حصا عبارتند از محصولات غیر طبیعی و غیر از مختلف شکل ولون و حجم و علف و قوام
و ترکیب شیمیائی باشند که در جرم آلات متشکل شوند ولی اغلب برونشان در
طبیعی بدن اند حصا در حقیقت شیئی خارجی هستند که در بدن پیدا میشوند و هیچ
حیاتی از برای آنها نیست و هرگز انصاف نیکی با آنهاست که در میان آن برون کرده اند
و چون حصا در تجاویف بدن برون کنند بواسطه مر سوب شدن از رقیق است که در
جوف میباشد ولی چون در میان جرم آلات برون کنند بواسطه تشیع غیر طبیعی آن است
و در اغلب از نقاط بدن سنک دله میشود مانند حارره و مجاری صفرا و مثانه و کلبه
و ریه و مفاصل و اوج و مجاری بول و لوز تین و مجاری اذن و غده بلق و
مجاری معده و غده دودی و مجاری غذا و غده لوز المعده و رحم و مخزن منی و سینه
و ما در اینجا از جمیع حصا گفتگو نخواهیم نمود و الا آنها که جزو اجزای بدن ثانی آنها که
جزو تشريح مرضی و صفی از آنها باشد آنهاست که علامت مرض دیگری خواهند بود و
اینجا ذکر می نمایند و ذکر می کنیم حصا نفوسی یا حصا تبدیلی و انهای سلی و غیره را
سنک در بدن انسان یافت میشود بهر شکلی که خیال بتوان نمود و عموما سنکها صاحب
سطوحند حجم آنها از هر سنجاق تا تخم غاز است و عموما حجم آنها نسبت معکوس دارد با
عده آنها و جمیع سنکها مطبوع اند ام از آنکه ان طبقات مسهم روی یکدیگر بوند با غیر
و ترکیب شیمیائی آنها جمیع مختلف است چون اغلب آنها بواسطه مر سوب شدن اجزاء پدید
حاصل میشوند و میتوان گفت که ترکیب شیمیائی آنها نسبت دارد با ترکیب شیمیائی اجزای
کننده از هر اغلب سنکها متشکل شده اند از املاح آهکی که متحد شده باشند با یکدیگر
و طریق حصول آنها هنوز محقق نشده است بقدری که هرگاه ولوبیت مستخرج و مخزن خونی
زیاد بماند یا آنکه مانع در خروج آنها حاصل شود مانند تنگی مجری و زیاد شدن یک

علاک

مربک کننده ان ولوبیت سبب وجود آن سنکها شود و شرایط منزل و آب هوا و تغذیه و غیره
اسباب مستعد حصا اند تورم الت بواسطه تغیر دادن ترکیب شیمیائی رقیق مستغیر و
بعضی از اجزاء مانند بیاض البیض و خون نقطه اصلی و مرکب سنک میشوند و هر شیئی صلب که
داخل تجاویف بدن گردد بنی مایه حصول سنک گردد و تشکیل حصا بطور ابرمان است
علامات سنکها بسیار مختلف اند بعضی موضعی و بعضی بکلی مجهول است
علامات موضعی آنها هستند که از حرکت نسج بهم می رسند و گاهی از اوقات علامات خطیر
بروز نکند مگر وقتیکه سنک جلیجاشود مثلا وقتیکه بقعه داخل یک مجرای گردد که سنک
تواند باشد که بواسطه ناهوارش حرکت نماید و اگر در حین دخولش مجرای مانع گردد خروج
و ولوبیت مستغیر و علامات حسنی از ولوبیت زیاد گردد و اگر ان ولوبیت مفسد بدن باشد
مانند ادرا از جاذبش علامات خطیر دیگر روی دهند بعلاوه بعضی علامات بواسطه
حل سنک و حجم او و صافی یا ناهوارری او و کثافت حس مرضی برون کنند و هم چنین
علامات دیگر بواسطه فشار ملام بالت پس از چندی برون نکند چون ورم مزمن و
جواحت و ثقب و دمل و گاهی از اوقات جز یک حس ثقل چیزی بکلی عارض نشود و باشد
که با وجود حجم بزرگ و عده زیاد مورث هیچ اختلالی نگردد خاصه در وقتیکه سنک در
جوف الت باشد جمیع علل سنکی رفتارشان مزمن است و نظری در برون علامات نسبت
و پس از پدید آمدن بایرون آوردن سنک جمیع علامات بطور فزونند اما در اغلب
از زمان کم باز یاد عود کنند و از برای تشخیص سنک باید طبیعت اختلال اعمال و
طریق برون آنها را ملا خطه کرد و از لمس و سمع و دخول مبل تمیز داد ولی علامت بقی
توبیرون آمدن سنک است اگر محل سنک دالات ریه بود یا آنکه مانع شود اجزاء
بکلی از اعمال لازم و در مغز که در پو خط و برای بعضی از سنکها علائح مختص است بخروج
آنها و با حل کردن و بعضی بحفظ صحت شخصی

در مراده و سایر مجاری صفر اغلب اوقات سنگهای مخصوص پیدا میشوند که آنها را سنگ
صفر امینا منک

تشریح حرفی و خواص فیزیکی و شیمیایی سنگهای صفر تقریباً جمیع سنگهای صفر
حاصل شده اند از کلسترین و یک ماده ملونی که نسبت مابین این دو از برای این سنگ
هشت الی نود و چهارم از برای ثانی از دوازده الی شش است و گاهی پیدا شده است که
فقط سنگ حراره از کلسترین مرکب بوده است در اینصورت کلسترین سفید رنگ و
سبک و در اکثر احوال جوشن بتمامه محلول است و گاهی از اوقات دیده شود که سنگهای این
بکلی مرکب اند از ماده ملونه زرد با سبز صفرای که متحد شده باشند با قدری از خاک
قدری فنغات و کوبونات و مشوب با قدری منبری با قدری رنگ آهن در آنها با
و نادر است که عدد سنگهای مراره واحد باشد و اغلب متعددند و نادره از عدد دهم در مراره
دیده شده و حجم آنها از قدری زن تا تخم مرغی است و وزن شان عموماً از ده تا دوازده
است زیاد با کم هم میشوند و جمیع اشکال دیده میشوند و رنگ آنها گاه سفید و گاه سیاه
اغلب زرد رنگ و سبز رنگ است و قوام شان چندان صلابتی ندارد مگر وقتی که از
مرکب شده باشند و بعضی بیک نخ میباشند ولی اغلب صاحب طبقات هستند با این
مختلفه و محل آنها در مجاری صفری است و اگر گاه در جرم کبد دیده شوند باید معتقد
شد که اول در مجاری صفر منعقد شده و بواسطه پادشده مجری مجرم کبدی آمده و بعد
مجری ملتحم شده است

علامات و فرقان باشد که سنگهای متعدد در مجاری صفر بهم رسد و در حین
هیچ علامتی با اختلالی در اعمال پیدا نشود چنانچه در اغلب نخستها خاصه بعضی شبنج
شود که حراره بکلی از سنگ محلی است و مدت زمانی است که صفر نتوانسته داخل
اوا شود و حال آنکه مادام الحویه هیچ وجع و اختلال در عمل هضم و ظاهر نبوده و باید

ملاحظه

ملاحظه کرد که این عدم اختلال در صورتی است که سنگها در میان مراره محبوس شوند و حرکت
نموانند نمود و همین علم علامات و اختلالات در وقتی است که سنگ در مجرای مراره
واقع بشود بخلاف در وقتیکه سنگ در مجرای کبد یا مجرای ششاعشری بود که در اینصورت
چون عسرت در حرکت وجود پان صفر بمرسد با آنکه بکلی راه مسدود کرد و سبب بوق
علامت عکس میگردد اول وجع در بیم بوقان سیم اختلال چندی در عمل هضم بوق
این علامات هم بطور از زمان است با بطور حاد

بوق از علامات بطور حاد

چون سنگ در داخل یکی از مجاری صفر آلود که بزرگتر از جوف او باشد وجع شدید
که اغلب مورخه و خنج و فزع گردد احساس شود و محل این وجع در محل معده باشد
این است سرایت کند تا شان و کوبن و از فشار بموضع اشتداد بمرساند و در بعض
دولا و ضم شده روی زمین پا درخت خواب خود بغلطد بعلاوه حس خفگی و عسرت
در سینه بمرسد و اضطراب زیاد حاصل کند تهوع متصل عارض شود بواسطه
رطوبتی لایح با صفرای زرد با سبز رنگ دفع گردد در اینصورت باید موضع سنگ
غیر از مجرای ششاعشر باشد با آنکه مجری بکلی مسدود نگشته باشد و چشم و صورت
زرد گردد و این زردی گاه در همه بدن بوقر کند و همیشه که اسهال عارض گردد
و با اغلب مرضی پیوست دارند با وجود این وجع و اضطراب ندارند و بیض سرعت
پیدا نکند و میل کوم نشود و هرگاه حی و بزرگند دلیل بر آن است که مرض با علقی
و رمی مرکب شده است و قمار این علامات بطور اتصال است که گاه ششاد
نماید متدرجاً با بخته دفع گردند از آنکه سنگ محل اصلی خود عود کرده با داخل
عشر شده در صورت اخیر همان روز با فردای آن روز باین دفع خواهد شد و
نیم صفر آنکه در مراره با سایر مجاری مجری جسد شده بود بواسطه قی با باین دفع گردد

دوام و انتهای مرض دوام هر حمله مختلف است اغلب در چند دقیقه تمام شود و باشد
که تا شانزده ساعت بطول انجامد و چون حملها مکرر گردند دوامشان زیاد شود
انجا که دوام حمله که باشد بعد از دفع شدن حواسالت و زردی لون چیزی باقی نماند
و چون دوام حمله چند روز طول کشد و باز بزرگ گشته و حسی مشتعل گردد و بعضی اوقات
که دلیل بر دیرم کبد با یکی از مجاری صفر باشد و نرگند و اغلب خروج سنگ از مجرای
اشا عشر در اشا عشر است و باشد که مراد پس از آنکه با اشا عشر باقیون التصاق
دسانه پاوه گردد و سنگ با نخا و فته و سنگی که با اشا عشر افتد میشود که اندوهان پیر
ابد و باشد که چون با معا افتد بواسطه بزرگی حجم و درجه این افتاد چه بعد از افتادن
بامعا و بزرگ شدن در آن راه عبور بر آن را مسدود کند و مورث بزرگتر علامت
ابلا و پس با اختناق معا گردد و میشود که داخل صمیه عور گردد و مورث ورم و فرقا و
ورم صفاق شود و بندرت این سنگها از جدار شکم خارج گردند و باشد که از شکم
و جمع و دوام او و در بعضی بجا که رسد چنانکه در بعضی در هذبان شد بد با تشنج با اغما
بمیرد و اغلب مورث ورم شد بد خاصه ورم صفاق خواهد بود و باشد که حمله
بطوری مکرر گردد که در بعضی فرصت صحت و قوت پیدا نکند و مرهونال و تحویل میرد

در بزرگتر علامت بطور ارمات

گاهی اوقات در مل مجاری صفر مورث بزرگتر علامت میشود که دفاتر شان بطور
ارمان است که در شتر اسبف ایمن و جمعی متصل و مجهم بهم رسد که تا پشت سر است
عمل هضم عسر شود و پیوست عارض گردد و بزرگتر سفید شود و بوقان مل می رود
و در بعضی ضعیف بهم رساند و هزال حاصل کند و از قریع موضع کبد عموما چیزی
معلوم نگردد و گاهی اوقات بکاماده محدود و میتوان کرد که سخت و غیر منتظم
باشد و جمعی در او نبود باشد که از فساد حس که بیطاسیون بواسطه اصطکاک
درملها

درملها بیکدیگر پیدا گردد و گاهی اوقات حس و جمعی در ماده هم رسد و این بواسطه آن است که مرگ
بجاری اشاعه واقع است و محبوس گردد و صفر را که در حراره مجتمع شده سبب انتساع مراد میشود
و باشد که سالها از بعضی با بختالت بماند تا آنکه سنگها از یکجا از مواضع مذکوره فوق خارج
صی حاصل گردد

تشخیص قولنج کبدی از ورم صفاق شراسیف ایمن تمیز داده شود باینکه در ورم صفاق
وجع باندل فشار است و باید و همیشه همراهی کند با حسی غلا و قولنج کبدی انجا که قولنج کبدی
چند روز طول و چنانچه در کتب مذکور ورم صفاق با ورم مجاری صفر تشخیص
مشکل خواهد شد و چون در علاج فرقی نیست چنانکه خطری در عدم تمیز نخواهد بود
از ورم کبدی و ورم اشا عشر قولنج کبدی با سانی غیر داده شود از قولنج ابلا و سی بواسطه
پیوست ملایم و قی که منتهی شود و جمعی بزرگتر شکم و تغیر سیما و صغر و بطو بنض تمیز
داده شود از قولنج کلیه بواسطه محل و جمع و سرایت و ابالات تناسل و اطراف مسافله و
تغیر اینکه در ورم مجاری هم رسد مشخص گردد از جمع عصبانی با فته های کبدی فرود آید
شود مگر بواسطه عدم بوقان و در آن وجع عصبانی و انجا که رفقا و عرض حزن باشد بیشتر
گردد بیکجا از اراض الیه کبدی ولی اگر در بعضی زمانی قبل مبتلا شده بیک یا چندین حمله
کبدی و هرگاه که حجم طبیعی خود را نگاهدارد معلوم است که اراض الیه و مران نیست
و هرگاه صفر از مراد جمع شود از مل کبدی مفروق گردد باینکه حمل همراهی کند با حسی و
وجع و حس حرکت و جمعی در مل کبدی کمتر است و در تحت جلد نفخ بهم میرسد و قبیله
حده و بوجود حمل زده شود باید در برابر مرض نفخ مل نمود و از برای پیدا کردن
آن باید مدفوع را در آبکش مانند و بختی باب چندین دفعه چندین فرو برد تا
ماده بر آن خارج شود و سنگ در آن میان باقی ماند

تقدیر المعرفه مرضی است باینکه بواسطه رنج که بمویض میدهد و اراضی را که

سبب انباشت

اسباب نادراست در اطفال که قبل از پانزده سالگی دیده نشده است و عموماً در سن چهل سالگی است و هر چه سن بالا رود بیشتر احتمال و استعداد بیشتر شدن دندان بیشتر از غده ان مبتلا گردد که حرکتی که با بیشتر شخص را مبتلا سازد و بداند که بیشتر و غویبند کان بیشتر مبتلا شده اند تا بسا بر ناس کو با بهین واسطه باشد که در بیشتر از ناستان بروز نکند و توقف باد صفر و مراد بهر سببی که باشد مورد انباشت و عمل بکند و در اغلب اشخاص که سنک مراد پیدا کنند کسری بن صفر بیشتر از حالت طبیعی خواهد بود

علاج اول شرط چنانچه در قولنج کلبه و کوه خواهد شد تخلیه باد است بواسطه بر باد که هر ساعتی بکنند مخور اند که دفع و جمع شود و اگر بعضی قوی باشد فصد کنند و ترا لوی موضع اندازند و استیمام در ماء فات کنند و اضلاع ملینه بموضع اندازند و بعضی استعمال بخار و اجتر از ضماد و اند شربت و یم ان است که باید سنک را خارج ساخت و از برای این مسهلات و مقببات بکار بوند مسهلات بر قوم مانند روغن و نمک فقط مسهل اند که مستعمل اند شربت یم این است که کاری کنند که سنک آب شود و بکوبد و بزنند این معالجه را باید بجای هر جمله نمود و از برای این دو مران صاحب در اخر همانه چهل هم عسلو بکند و ای پیل که مدتی اعتماد از برای ان بود و ان عبادت است از برای اطو لغور یک و در وجو اسباب طریقی که از یک الحها کوم او را در شربتی داخل کرده بنویسند و این دوا را تا پانصد گرم باید متدرجاً خوراند و اغلب کتاب آلات تغذیه بحال این نوع دوا را مدام اندازند ولی اکنون اعتقاد مردم باین معالجه که شک بعضی باین قسم دوا را استعمال کنند و روغن کویک شصت گرم اطو چهار گرم قند سی گرم در شبان و روزی از این است املح قلبانی در استیمام و نوشیده که مانند یک بوفات و سود و آب ششی و بخر آن

و بخر آن است که مریض را باب کرم معدنی قلبانی فرستند و عمل قلبانیات ان است که صفر را دقیق نریزند و زرد تر خارج میشود لهذا سنک نمیتواند بخیل گردد و بواسطه همین عمل بود که قدام آب بعضی نباتات را مانند کاسنی و شاهتره و غیره میخورانند

در انباشت بول

چهار قسم انباشت است که در کپشان یکی باشد و بواسطه حجم مختلف گردد در مجاری بول به هم میرسند اول انباشت است که در کپشان دویم و یکهای هستند که در کپشان از سنجها تجاوز نکنند سیم و یکهای هستند که در کپشان از مجاری او را بزرگتر نیستند و مستعد از انباشت خارج شد و انباشت اگر در کپشان چهارم سنکهای باشند که بخودی خود نتوانند از انباشت خارج شد و انباشت را بپایین و ما در این صحت ذکر کنیم مگر از ان سنکهای که در بزرگتر با کلبه واقع باشند زیرا که چون سنک داخل مثانه گردد و عمل جراحی گردد

تشریح مرضی و در کپشانی سنکها انچه در کپشانی سنکها از پاد مختلف و عده بنی معین نخواهد بود و عموماً حجم سنکها نسبت معکوس دارد با عددشان چنانکه کاهی از اوقات بکسک کفایت کند بجمه و بکودن موضع و اشاع ان خوف و حال آنکه ماده هرا سنک بکلی از آلات دیده شده بدون آنکه موضع وسعت زیاد بهم رساند این سنکها جمیع اسکالوا ممکن است و اگر باشند سطحشان کاهی صاف و کاه نا هوایر لوفشان کاه قرمز و کاهی زرد و کاهی سفید کاهی رهای کاهی سپاه است باشد که یک سنک صلیب الوان مختلفه گردد چه سطح ظاهر چه در طبقات داخله بعضی از انها مجردی بنشیند که با چکش شکسته نشوند و کاه مجردی بنشیند که با انگشت خورد گردد انها سبک خلی بنم باشند چون در هوا بمانند بسیار سختی و صلابت بهم رسانند از انچه به شیمیای دیده شده که این سنکها از فواید مختلفه حاصل شوند اغلب از اسید اوریک و اورات و موفیک و اورات و سود و اورات و پو طاس و اورات و شو حاصل میشوند و بعضی از فوسفات و شو و فوسفات و ویمبر حاصل

کردند و بعضی از غوسفات امونیا کو نیز می حاصل شوند و بعضی از کوبونات دوشو و کوبونا
 دو نیز می حاصل کردند و بعضی دیگر کردند از اکسالات دوشو و اکسالات دمونیاک و بعضی
 نیز از دمونیاک و سبلس و آهن و کلرید و ایت دمو نیاک و ادر و البومین و بیه مینو و
 بعضی مواد آله باشد مانند تلاتین و غیرین دمو و مواد مختلفه ملونه دله شود و کوبی است
 کوبیتال لیه است و بعضی فقط غیر کوبیتال است بعضی هم موثرتر میباشد بعضی از
 محال است بالنسبه بهم و بعضی دیگر غیر موثرتر اند بخوبی که هر طبقه مقدار ای از املاح داد
 در بعضی یک قطره در هر یک ملاحظه میشود که هیچ نسبتی بسایر اجزاء طبقات ندارد و غالب
 سنگها بواسطه آن قطره که می خورند بود و این نقطه از اشیا مختلفه میشود که بعضی از آنها
 از اسید و اسید با اکسالات و سوسمینونند و بعضی از خون مغاط حاصل میگردند و کاهی وقتا
 بواسطه اشیا است که از خارج داخل حوف طبیعی کردند و این نقطه را هسته گویند و بنا
 قشر خوانند و باشد که برگیه هسته و قشر یکی باشند مخصوص وقتیکه سوسینیک و سوسینیک
 شده باشند و چون فصلی در سوسینیک پیدا شود اختلاف در برگیه طبقات بهم رسیده
 بوی مانند اشیا خارج سبب اختلاف چندی در آلات مجاری و خود شوند که کاهی
 عبط بخود در امتنع و کاهی متورم و مجروح گردانند و کاهی جویم کلیه بواسطه فشار و داخل
 بخارج هزال یابد و جویمش مفقود شود و تبدیل گردد بکپسه که در جوفش بطوبی باشد
 که در آن اوری بافت شود و این حالت را استقای کلیه نامند که قبل از کشته شده است
 علامات باشد که سنگ در کلیه منجمد شود بدین آنکه موثرتر و نیز هیچ اختلافی در
 درالت واقع خود چنانکه در تشنج بعضی اشیا صریک با چندین سنگ در حوضه این
 ملاحظه کرد بدین آنکه در حال حیات احساس وجع کند با علامت دیگری از آن بود
 کند بعضی اشیا صریک باشد شوند در صحت کامل و بدون هیچ وجع از اقسام تلاته اولی ها
 اغلب اوقات از مجرای بولشان خارج گردد بعضی کاهی که احساس وجع قلبی در کمر آنها
 که بعد

tarikhema.org

که بعد از افتادن یک با چندین سنگ از مجرای بول بکلی دفع شود ولی اغلب اوقات دخول
 سنگ در بویخ با حصول او موثرتر و نیز بعضی علامات شدید که در که ان مرض القوی
 کلیه گویند از این قرار مرخص متدرجا با دفعه و جعی شدید و فاحش متصل با اشتداد در قطن
 و عموما در یک طرف او احساس نماید که با اندک حرکت بافتا و اشتداد یابد و از اینجا سراسر است
 کند بچال خاصه با مثانه از محل بویخ و نیز سراسر است کند در مرغابین و ان خذارت در دین هم
 و مدد میدهد و در تشنج شود در مردان سفید سیال اکثرا مشاهده میشود و قوی کواکی عا
 گردد و خواب زایل شده اضطراب حاصل گردد و نشستی در یک وضع محال گردد در بعضی متصل
 حرکت کند و بعضی در هنگام اشتداد وجع در روی خاک بغلطند و کاهی از اشتداد وجع
 هذیان جنونی با تشنج روی دهد و اینجا که کلیتین مختصر در فرد بود با آنکه در هر دو بویخ سنگ
 یکدفعه داخل شود و تشنج در او را در معدوم گردد چون فرد بویخ کلیتین نادر است و اغلب سنگ
 در یکی از بویخین داخل شود و تشنج بول قطع نشود بلکه کم شود و آن بول کاهی صاف و بزرگ
 و کاهی در دایره است که در آن دانه های مخاط مخلوط با خون داخل است و خروجهش با کربا
 قطره قطره است و خروجه او هر اهی کند با درد و بیخ مشانه و کاهی از اوقات با وجود این
 علامات نبض بحالت طبیعی باقی ماند ولی اغلب سریع و جلد گردد و سعی عارض شود و قی
 ان مرض این علامات متصل و کاهی اشتداد یابد و عموما دوا مثل ادر ۴۴ الی ۴۶ ساعت
 بعد از این مدت علامات خطر با فانی شوند و در بعضی دفعه بحالت سلامتی عود کنند
 این حالت دلیل است که سنگ بجای اصلی رجوع کرده با مثانه رسیده در صورتی که
 اغلب از حوضی پس از چندین زمانی یک با چندین رمل از مجرای بول خارج کنند اگر چنانچه
 پس از این علامات خطر باقی ماند و سنگ از جای خود حرکت ننماید کلیه متورم
 شود و جمیع علاماتی که در ورم کلیه و ورم حوضه مدکور شده اند بویخ کنند
 در این صورت کاهی خرابی کلیه بحال می افتد و تشنج سریع باشد که در چند روز مرخص

tarikhema.org

بجلاکت رسد و گاه بطور این بر قنار خواجه هم رسد و عرک در این صورت عارض گردد
 با بواسطه ورم صفای بعد بخوبی ورم با وسرایت گردد ما باشد با بواسطه قای قوی و حال
 با بواسطه عرک اعصاب و عرض هذیان و تشنج بعضی بمرند با واسطه حمای داری و
 نادر است که حمله های قولنج کلیه منحصر بفرج باشد و اغلب از انشعاب که یکدفعه متلا
 با بمرض شده اند پس از زمان طویل با قصر حمله دیگر با نخار وی دهد و بتدریج فاصله
 بین دو حمله کمتر گردد در بعضی بالاخره بجلاکت رسد و گاه از اوقات بغیر سنک جمع
 فشار بکلیه دهد و او را مضحی ساخته تبدیل سازد بکسبه محتلی از ادرار که سابق
 با اسم استسقاء کلیه مذکور شد بعضی از مرضا پس از حمله دوم و سیم صحت یابند بعد
 انحاء علامات سنک مثانه بروز کنند در این صورت هم اگر سنک را از مثانه برکنند
 میشود که دوباره سنک دیگر قولنج شود

تشخیص سنک کلیه بطور یقین تمیز داده نمیشود مگر در صورتیکه یک یا چند
 سنک ریزه دفع شود و با تمام علامات یک حمله کلیه بروز نماید و قولنج کلیه مشتبه
 نمیشود مگر با قولنج کبدی با دفع عصبانی خاصه و بیضه و یا بولم با قولنج غیر از این
 اولی ذکر شد و بطریق تمیز از دو مرض اخیر را نیز ذکر خواهیم نمود
 تقدیر المعرفه اگر چه مرضی است خطر و خطرات و بسته است بزیادتی و بویژه
 های قولنج کلیه و دوام هر حمله او

اسباب اگر چه سنک مثانه موافق حسابی که موسس و سیو یا کرده نصف مرضا
 کمتر از چهار ده سال داشته اند ولی چنان مینماید که انجمن سنک در کلیه اطفال ^{است} نادر
 زیرا که بندرت قولنج کلیه در اطفال بروز نموده است و بویژه نایب و حال آنکه سن
 و قوی و سن کحول و سن شیوخ علل کلیه که جهتش انجمن سنک باشد کمتر در
 میشود استعداد دوزان کمتر از مردان است و حرکت کم بیاشته در مرضی اطفال اگر چه

در

در همه اطفال پیدا میشود ولی در عوارض خط استوا بیشتر است و در بعضی از بلاد
 مخصوصا بیشتر است و حال آنکه در مجاور همان محال یافت نمیشود و بعضی از غذا
 ها را با اسباب حصوله و مستعدا میداند مانند مواد ازته سبب حصول فوسفات دو
 شو و فوسفات دمو نیل منیزیم و اسید اورتیک میگردد و حال آنکه اغذیه نباتی
 موجب حصول کربونات دو شو و غیره میشود و خوردن تو شک خبیلی سبب اسهال
 دو شو میگردد و ولی نباید اعتماد بر پایدی بر اثر انحاء داشت و این مواد اثر نادرند مگر
 در وقتیکه استعداد مخصوصی در بدن بوده باشد و بعضی قائل هستند که حرکت
 زیاد باعث تعریق کلی گردد از جهتیکه گرم کردن بول سبب مر سوب شدن املاح
 او میگردد و اگر چه این قول بحسب فیزی الوثری درست و صحیح است ولیکن تجربه شکینا
 هنوز بخوبی معلوم نشده است

بعضی از امراض مانند تنگی مجرای بول و تنگی عنق مثانه از جهت منع ادرار باید قاع
 و مانند ادرار در مثانه و کلیتین سبب مر سوب املاح او میشوند و بنی چنین
 توقف زیاد در ریه و عادت زیاد در حبس کردن بول و طایر تجربت خود بحقیقت
 رسمی نگرده است

علاج در علاج سنک در مجاری مذکور چند شرط لازم است اول باید
 باید علامات حاده را که انجمن باشد سنک حاصل میشوند بطریق نمود و
 باید املاذ که در خارج شدن و حل نمودن آنها سیم باید سته ضرر و هر چه در بطریق
 قرار داد که دوباره سنک در انجا حاصل نشود

چون به لبتر مرضی وارد شوی که مبتلا بقولنج بوده باشد و چون امکان جایز است
 خارج ساختن نیست لابد باید تسکین در اوجاع در بعضی نمود و از برای این عمل
 قویا باید متدراجا بخوراند شاید بعضی راحت در دخت خواب بماند باین

ضم که هر نیم ساعت موافق استعداد مریض از نیم کند تا یک کند مگر آنکه در بعض
از جنس بیفتند آن وقت قریباً یک را قطع نمایند و در همین وقت بنی جان است
مما ذات ملبسه که در آنجا قریباً لودایم داخل کرده بر موضع مرض اندازند و
بعد از یک ساعت در حمام نیم گرم بنشانند و بعضی بگویند که مقدار زیاد از
مدر بنوشانند بجهت برون شدن سنگ با دراز و قیامی مگر مصلح استعمال مکرر
خواهند بود و لازم است که بواسطه حقنه یا مسهل امعاء تخلیه سازند خاصه
در وقتیکه خواهند از شدت قی قریباً که از مفعله داخل بدن کنند و بجهت
دفع قی امعاء و ای جویش را با آبهای سرد بمقدار قابل بنوشانند
اگر علامات ورمی پیدا شود ارسال علق بموضع نمایند و ضد نفوذ شایسته
در ورم کلیه ذکر شد بکار برند و چون علامات بر طرف شوند اگر چه سنگ
در کلیه بماند باید بدانند که او را خارج کنند و با محلول کوبه یا آنکه کاری کنند که
توان اینکه الان هست نشود از اینکه حمام زیاد سرد اشربه و ای جویش را بنوشند
و در امعاء معدنی که در آنجا ماده قلیائی دارد و در آنجا زیاد بنوشند آنجا که
سنگ ادا سپید او را حاصل شده باشد فقط اغذیه نباتی و گوشت سفید یا
گوشت ماهی بخورند خاصه سبزیجات زیاد بخورند و اشربه الکلی و قهوه و
دانه کبکی ترک سازند همین اغذیه بکار میرود و در وقتیکه سنگ از فوسفات یا چیر
دیگر مرکب شده باشد

دکبان نموموی از مجاری بول و خروجهش را از آنجا

مونی که از مجاری بول خارج میشود برون نفع است اول آنکه مواز خروج مجاری
بول روئید باشند و از آن مجاری خارج شود و نیم آنکه کبسه های پشیمی از مثانه
کشوده شود سیم آنکه مواز خارج داخل مثانه گردد

چون

چون فقط در خود مجاری ادرار روئید شود بزبان فرانسه طری شبان پس گویند آن
مرض باید استسقط کرد مونی را که از خارج داخل مجاری بول گردد و بعد خارج کرد
با آنکه مبدئ سنگ مثانه گردد و بنی باید از این مرض خارج کرد کبسه ها را که در بنی
پیدا شوند و حاصل شده باشند از باقی مانده جنین از قبیل دندان و مو و آنجا کشتی
شوند در میان مثانه و موی که از کبسه پشیمی با ادرار دفع شود از طری شبان پس
داده میشود بوجوه ماده در نزدیکی بنیستین خاصه چون با بول چیز دیگر از باقی مانده جنین
دفع گردد

علامات مرض چون مودر مجاری ادرار روئید شود کاهی بدون احساس هیچ چیزی
دفع گردد ولی اغلب اوقات عسر البول عارض شده ادرار تیره یا خون ادراری
گردد بواسطه اختلالی که در کلیتین یا مثانه بهم رسد و موهائی خارج میشود
که بدون ترکیب بود یا مخلوط گردد با سنگ ریزه یا اینکه بسطح سنگ چسبیده شده باشد
و یا در جوف او بماند

طری شبان پس ساده بسیار نادر است و تقریباً همیشه مثانه یا کلیتین محل اختلال
ذیاد شوند و بعضی مواد هستند که میتوانند با مومشبتیه گردند و آنها از این
قرارند اول نخهای غیر بنی دوم نخهای مخاط سیم نخهای باض البیض منجمد شده چهارم
نخهای گتان یا بنیره و غیره پنجم موی حیوانات دیگر که اتفاقاً با دستی پس از خروج ادرار
در میان مثانه انداخته باشند

اسباب مرض این مرض هم در مرد هم در زن دیده شده و در هر سن دیده
شده بدون آنکه فهمیده شود چه حالتی در مخاط بهم رسد که سبب نمومشبتیه گردد
و اغلب همراه است با سنگ یا با ورم مجاری ادرار
علاج عموماً بوسیله بجهت دفع این مرض پیدا نشده است و عمدتاً علاج ورم و سنگ است

که با ترکیب کرد

در انجادات واقع در ریه

مصنفین از انجادات عظمی یا سینه کی واقع در ریه مدق تفکر کرده اند و اغلب آنها
علامات چندی بر خطر وجود آنها حمل کرده اند چنانچه کولین صاحب او را سبب
تنفس عصبانی میدانست و مل سل را از او فهمیده بود و لا ینک بحقیق
رساند که این انجادات علاوه بر آنکه سبب هیچ انجادی نمیکرد و خودشان حاصل
کردند از مبدل دانه های سلی و حصول او جهدی است از طبیعت برای شفای سل
و نیز محقق ساخت که از وجود او در حین حیات هیچ علامتی هویدا نمیکرد و جمیع
مصنفین بعد از آن این مسائل را تحقیق رساندند بجلای و سنک بکماه و دیگران
که در ریه شیوخ دیده میشوند و انجادات است از ماده سپاه شیب به ذغال
که چون در موضع جمع شود مصنفین او را بجای سفیر و سوس و سلطان سپاه
فرض میکردند و موسیوما لالیس کیو در سنه ۱۴۵۰ مسیح محقق خود که او نیست
مگر زغال که در حین حیات در ریه متشکل نمیکرد و بمول مصنف مذکور
این ماده سپاه در او خوسن شباهت پیدا میکند بحاصل شدن مخصوص جمیع
در سوان آخر زندگی که در ابتدا مانند غباری در مجاری هوا ریخته شود تا آنکه
بیکدیگر مجتمع شده و چنان غماز که این ذغال هیچ تغییری در نسج
نده نمیکرد و صورتی که حجم زیادی برساند که انوقت بساختهای کوچک شریانی با
آورده با قصبه الیه فشار دهد و آنها را از لیاقت تنفس انداخته و شیوخ صاحبان
ذغال ضعیف و کواشتمی و لا غر کردند و سرفه خشکی را بر آنها پیدا شود که قذیف
خارج کند که در میان رطوبتی لریخ با خون آلوده شود و در بعضی وقتها
خفی با اشک موجود کرد و صوت قوی با انگشت اغلب را موضع که نقطه ریه است
کدر است

که راست و صلا ی دم در موضع شنیده شود

تخصیص در حین حیات مشکل است داده شود مگر بواسطه سن که سل در
شیوخ نادر و این مرض مخصوصا در شیوخ میباشد و با اعتقاد مصنف مذکور اجتماع
ذغال در ریه باشد که سبب موت شیوخ گردد و آنکه کرون فضای تنفس و وجود
مواد ذغالی بر خطر اغلب اراض حاده یا خرفه سینه شیوخ بیفزاید

در ریه نریست

اغلب اوقات در وی حیوانات مختلف بعضی موجودات دیگر که صاحب حیوة
مخصوصی باشند پیدا میشوند که غیر از وی حیوانات نمیتوانند تغذیه نمایند و
نمیتوانند تولید نمایند بعضی هستند که نمیتوانند غیر از نسج مخصوصی که بجهت
آنها معین شده است نمکن نمایند مثل شیخ در ریه جلد و این حیوانات را بشیر
باز از پت گویند و آنها منقسم میشوند بدو نوع نوعی در حرم احشایا در بعضی
تجاریف بدن یافت میشوند مانند روده و مجاری صفرا و غیره و آنها را بفراشه
آن تو زرا گویند یعنی کم و نوع دیگر آنها هستند که در سطح ظاهر نمکن دانه
و از زیر و فضا امت جلد تجاوز نمکنند و آنها را ای نردا گویند

فقره اول در باب ذقیهای داخلی

اگر چه حیوانات داخل را در تمام اسنان میتوان دید ولی بعضی هستند که
مخصوصا پس از مخصوصی هستند و بعضی دیگر بسته باب و هواست و سبب
مستحک آنها چنین است که نمکن در منازل مرطوب و اغذیه در ریه و عموما
تمام شرایطیکه بجهت بدن دانات دارد و فقر را مجبوران دانات میباشد بجلای
بر این شرایط شرط مخصوصی هم در خارج لازم است و این شرط خارجی کاهی بچک
قوی است که مکرر با معاد را اغلب زغال بدن این حیوانات یافت میشود

و این شرط را سو القیه و دوی گویند با بنواسطه در علاج این اراضی شرط اول دفع بادیه است و بعد استعمال ادویه که مشهورند بادیه و به صد کرم ولی انتخاب این ادویه بسته است بنوع کرم و محل آن و میان این ادویه عمل بعضی بطور لمبت است و بعضی جویقنی مثل مسهلات و مقببات

باز از پنهانی مجاری غذا

کرمهای مافعه در مجاری غذا دو قسم است اول آنها که استوانه و مضطرب میباشند مانند دود الخلد و نیم آنها هستند که مانند نوار چین و صاحب مفاصل باشند مانند حب الفروع و حببات

در میان حببات

حببات از قدیم الایام ذکر شده است ولی اعتقاد طبای سلف چنین بود که آنها که زمینی هستند که از توقف آنها در مجاری غذا تعبیر شکلی پیدا کرده اند از آنکه تشریح با علا درجه کمال رسیده معلوم میشود که این دو حیوان بواسطه اختلاف نسج یکی از هم جدا هستند حببات حیواناتی هستند استوانه و عموماً از هیچکس الی بیست چهار رسانند بطول آنها است و از دو تا پنج میل بطول دارند و در آنها صاف و باری و لون آنها سفید مایل بزروری با سر خست آنها که بدن آنها نیم شفاف است بعضی از آنها خاصه آلات تناسل آنها میتوان دید و بدن آنها از سمت قدام خیلی نازک است و در آنجا منتهی میشود پس رانه کوچک که دهان آنها و سمت خلفی او منتهی میشود به نقطه و مقعد آنها در نزدیکی نقطه شبک لکشا عرض پیدا شده است در ماده آنها در محل اتصال د و ثلث مقلم با ثلث مؤخر یک محلی است که تنگ شده و در آنجا ثقبه است جهت آلات تناسل و این ثقبه منتهی میشود بجایی تنگ که او متصل میشود بیک دمی و شاخ و آن رحم منتهی میشود به بیض

خیاطه

خیاطه شکل که آنها احاطه میکنند مجاری غذا در نزدیکی است بشکل چنگالی کوچک و واقع است در نزدیکی مقعد و بند پنهان میکنند مجاری غذا و محل انقباض چنان میباشد که در معاد فاق است و چون بمعد و معاء غلاظت را دفع میجو را از بدن خارج کردند و عموماً علا آنها زیاد است که گاه تا سیصد بک شده است و عموماً در اطفال خا از سه تا ده سالگی عارض شود و هر چه سن بالاتر رود کم تر وجود شوند و گفته اند که در زنان و اشخاص بلخی مزاج و آنها بیکه سبزی آلات و بقولات و نشاسته زیاد میخورند حاصل میشود و امکان در طبعی و هوای سرد و رطوبت از اسباب مستعد اند با بنواسطه فقر بیشتر یافت شود علامات و عوارض اینکه از وجود آنها بهم میرسد و نفع است ضعی و عمومی علامات موضعی و جمعی شدید با خفیف در شکم و مالش و نفخ و اسهال و سفید زبان و کثرت سبلان براق و ترشی و متعفن شدن نفوس و غلظت و کثرت نفی با فقدان باقی قاعه بودن آن علامات عمومی است با خنکی صورت خفکی چشمها و پیدا شدن آنها که بود و در چشم و اتساع حدقه و خارش مزمن و قرچیدن آن و هزال و بی انتظامی و بیض و اضطراب و رخواب و جستن از خواب و تمام اختلالات دماغی مانند هذیان و تشنج و اغما و فلج و سهر و سیات و غیره و وجود همه علامات با هم یا بعضی و ن بعضی محقق اند بر وجود حببات نیستند فقط علامت محققه خروج یک یا چندین کرم است از دهان یا مقعد و بعضی اطفال با ایشان هستند که بدون بروز هیچیک از علامات مذکور بفواصلهای مختلفه یک یا چندین حیوان از دهان یا مقعد آنها خارج میشود و بعضی اوقات اطفال علامات حاده بروز نمیکند مانند آنکه غشی کرده و بدن آنها سرد شده و حرکات تشنجی و آن زیاد عارض شده پس از چند ساعت باز در نوک میز یا غذا خارج شده بحال اول عود کنند و گاهی از اوقات باشد که عدد زیادی از این کرمها در یک حلقه روده مفتوح داخل گردند و مؤثر بود تمام علامات اختناق امعا گردند و هم باشد که چون عدد حجم آنها زیاد گردد

باشد بزرگ شود و اگر نباشد حاصل گردد و در زنان باشد که این کومها در مجبل و فنج داخل
شده موجب سخت سفید گردد و ختران کوچک بواسطه تحريك الات تناسل آنها که از
ان خلش حاصل میشود عادت میکنند بطبق و زنها بهین واسطه مبتلا میشوند بحقوق

پیری

علاج همان ادویه ضد کرم در اینجا نیز مستعمل است مگر آنکه در اینجا بطور حقنه استعمال
کنند مانند اسنتین و سنبل الطیب و کافور و غیره و روغن خاکستری و روغن سوسن
و غیره بدهین کنند و اغلب این دواها را با روغن تسکین حکه هوشب و قوت
خواب یک استکان آب سر حقنه نمایند و اگر کفایت نکند اما له ملین نمایند که هم برای زخم
کرم با او خلط شود و نیز نافع است اما له ابهای معدن و کور دی نیز مستعمل است اما له
روغن زیتون با آب آهک یا سولفور و قیاسیوم

در تری کوسفال

این کرم خیال است طول او از نیش سانه کمتر است و ثلث اندام او شعری است
ثلث دیگر و در هر یک یک دارد سر او در انتهای نازک است و بر ماده او معین اند
نوا از ماده کوچک تر و انتهای بچیم بچیم تر از ماده است و بر عکس ماده وجود این
کومها در معاء غلاظ است خاصه در اعور و عدد آنها زیاد است با کرم در یک نفر
تا هزار شمرده است و در مردان نادر است چون مورث هیچ علامتی نمیکرد و در حال
حیات شناخته نمیشود

در بیان حب القرع

سبب آنکه این کرم در حب القرع گویند آنست که شبیه است به نواری مفصل دار و نمک
دار در معاء داف انسان و بعضی حیوانات و این کرم از قديم الايام شناخته شده است
و طاعت زمانی دو قسم از این کرم را بیک اسم بخوانند و طحال از یکدیگر متمایز است

منع عبور پازر و مورث ابلا و س کردن و کاهی از اوقات دیده شده است که حیات داخل
مجادری صفر او داخل مراد شده مورث تحريك و غدغه کبد و ورم او گردد و در اغلب
امراض حاده و مزمنه باشد که حیات دفع گردد از برای مصنفین ماکد شده این یکی از علتهای
مخصوصه این امراض بود و هیچ دلیلی با غیرض فلا رند

علامات چون اطفال بفاصله های چند حیات از آنها خارج شود باید بواسطه حس
سده ضرر و پیری که در وجود نیاید که در منازل خشک و هوای منزل کنند و اغلب
مقوی بخورند و ملبوس بکوک و سایر ملوفات بکار برند و بجهت دفع کرم موجود ادوی
ضد کرم مانند روغن نوک بکار برند بنم شغال غبار و را بخورند با آن یک ناسه شغال
او را و اسنتین و روغن کافور و کلل باد و روغن کوچک و جلب و پروند نیز مستعمل است

در بیان دود الح که بفراشته

این قسم کرم عموماً بعد از زباد در معاء غلاظ خاصه مستقیم پیدا میشود و از حیوانات تخم
نوع آنها با نر و ماده است نرها سه میل طر طول دارد و نر آن که مثل خط است سفید
و با فوه او جمعی در انتهای مقلم او که بنم شفاف میشود بیک جسم دیگری که کویا و بدن
برآمدگی است یک لوله تنگی که حری باشد دیده میشود و آن حری منحنی میشود بیک جسم دیگری
که کویا معله باشد و انتهای مؤخر او که قدری بلامه است مانند پیچ بد و سر خود گردیده است
و ماده آنها طویل تر از نرها است که نایک سانه طر طول آنها است و در انتهای خلفی
منحنی میشود بیک نقطه بسیار نازکی و انتهای مقدم شبیه به نرها است و این کرمها
در اطفال و جوانان زیاد است و باشند که مد فوعه بوزان این کومها پوشیده شوند و بلای
آنکه در شخصی علت و علامتی پیدا بود و کاهی از اوقات وجود این کرمها موجب حکه بسیار
شدیدی گردد در مفعله که حرکت میشود بلخا زانند و آنکشت داخل مفعله کردن مخصوص
در شبها شدت کند و این حکه و خارش مایه آن میشود که اگر حکه بواسطه پیری در مفعله

باشد

که یکی را حب القرع با کرم مجرد و نیم را حب القرع عرض کوپند اما حب القرع مجرد کوهی است
که بدن او متکاثف و محکم شده و مفصل و پا دارد و نکش میبند است و طول او از شش
تا هفت ذراع است ولی تا شصت ذراع هم دیده شده است از قوام فنی شده است
بخش بار یک که او را عنقا و کوپند که در آن سر او واقع است و عمده تن برین قطعه است
که اگر این قطعه را با ذره بین ملاخط کنند مثل پوست خار نخ است و چهار کلاه مدور
دارد که در تحت آنها ثقب هان واقع است و در نقطه این قطعه یک بوامدگی است که
احاطه شده است از یک هاله مدوری که عبارتند از چنگالهای بسیار کوچک که
واسطه با قوت تمام خود را بخاطر امعای حسبانند و با بنواسطه کرم را حب القرع مصلح
کوپند و عنقا و کرم است از فواصل کوچک و نازک که هر یک بسمت اندام هر یک
عرض تو گردد و در اینجا از شش تا هفت میل به طر عرض و قدری بیشتر ارتفاع میدانی
کند و هر یک از آنها ای اندام مفرد و شبیه اند به تخم کدو و با بنواسطه این نام را با آنها
میدهند در وقتیکه هر یک از آنها از هم جدا شوند و در کنار آن حب القرع ها الا
تناسل واقع است و جزو اسفل ان متشکل میباشد از دم این حیوان را که دیده شده است
و این بواسطه آن است همیشه از جن خلقی این کرم یک با چندین از این حبه ها جدا شده
دفع میگردند و در عرق بسیار نازک در طول این حیوان عبور میکنند و این حیوان
هر زمانه پوست میباشند یعنی بز و ماده ندارند و تخم ندارند و عموما یکدانه بیشتر
از این کرم یافت نشود و با بنواسطه او را کرم مجرد کوپند ولی الان معلوم شده است
که بیشتر یافت میشود

علامات و تشخیصی باشد که موجود شود بدوین علامت با در بخت در بدن چنانچه
شده است که اشخاص با جمیع کمال چند دانه از این کرم بفاصله چند از آنها خارج میشود
ولی عموما این از آنکه یک نمومعنا به میگرد مورث بر و زاختلان موضعی می

گردد

گردد از آنجمله است قولنج شدید و ضعف مختلف بدوین آنها شدن با سهال و اغلب
خارش در ریه قعک و بعضی در ریه پنهان کرده استها کاهی کرم و کاهی زیاد و اغلب مختلف غیر
واشتها خاصه در زنان و هم در زنان بیشتر از مردان علل عصبانی پیدا شود مانند صید
و طنین و لاله لاله با صر و جع و در فم معد و اختلال در عمل لجت در اخود را اغلب
کمپهن ال بهم و سینه و بعضی مجبور گشته دست از شغل و عمل خود بردارند

اسباب کرم حب القرعی زنان پیش از زهره دان استعداد دارند و اغلب بر و ش
از سن چهار تا پنجاه و چهار است ولی اغلب از پانزده تا چهل سال است و بیشتر
و شراطی که مورث خنای زن کوپند موجب بر و زاین کرم میگردند و بدین واسطه
در فقر و امکانه مرطوبه و اغذیه در پیه میشود

علاج این کرم از اسباب کرمها و بوی معالجه شود و از برای او استعمال میکنند
دبش فوثره بز و بز و دو و متقال کوپند که کرمها بکنند و پس از چهار ساعت مسهل
بجهت خروج کرم میدهند و بعضی عصا و او را از یک کدند تا غنچه میدهند موافق
سن و بعضی تعفین اتی کوچه های او را با یک ماده دیگر حب میکنند بعد از هر
از آن تعفین حب ساخته از آن ماده حب مستعمل است موافق سن بعضی صبح ناشتا
مطبوعی از ریشه او از یک نیم تا یک مثقال آنرا سولفوریک داخل او کرده بنوشند
و پس از دو ساعت مسهل روغن بدهند و بنفشه مستعمل است دیشه نازک آنرا
بطور مطبوخ از ده نازده تا یک سیر که او را خورده کرده پست و چهار ساعت
در دوازده سیر آب بمالند و صبح او را جوشانیده تا نصف شود و از وقت صاف
گرفته سه قسمت نمایند و هر قسمت را بنیم ساعت فاصله بدهند اگر ریشه نان
نباشد بکنند او را بدهند بصر صورت و قهقهه کرم بنای فتادون بگذارد باید جستجو
کرد تا سرا و پیدا شود که تا سرا و پیدا نشود معلوم است که کرم باقی است

در حب القرع عربی

حب القرع اندامی دارد بمن بامفاصل بالوفی و مادی عوضش از بازده الی چهارده صلی
 بطر است درازی او عموماً از شش تا هشت زرع تا پست ذرع هم دیده شده است
 بعضی دیک فرو رفتگی دارد که با دهان انجیوان باشد و از طرف چالی کوچکی آن
 و مانند حب القرع تنها مصلح نیست محل این کرم در معده دقاق است و ملاخه
 شود در شمال از نیکستان و طریقه غواها با اعتقاد بعضی آن است که هرگز نه مندرجا
 بدنیال بکد بکوی چسبند و با اعتقاد بعضی دیگر آن است که این حیوان در غوص حب
 جمیع دانهائی است که او را کرب میکنند ولی این دانه را ابتدای غوص جدی و فیک
 بهم است که فصلی از برای آنها مشاهده نمیشود و آنکه غواها بواسطه غوص و در شش
 دانه است از یکدیگر و فزق مابین این دو قسم حب القرع این است که در این کرم اخیر
 و مادی و سرش در از قلع از نیکالها اندارد و چالی در از طرفین دارد و دانه
 حله ندارد و مفاصل آنها عرضشان پیش از طولشان است و سوراخهای تناسل و
 توالد در میان دانه کشیده میشود و در حب القرع مجرای اندام سفید و سرش صاحب
 دانه است و در ابتدای سر را جدر خپکالها است و انتهای سر او برآمدگی دارد و
 حجم تراست چهار چالی که در چهار حله دارد هر دانه طولش پیش از عرض او است و
 سوراخ تناسل و توالد در طرفین واقع است

علامات موضعی و عمومی که از این حیوان بروز میکنند ماقدیم است علاج آن خلصه
 و زرشه و سایر ادویه مذکوره در علاج کهها است
 در پختها بلکه خارج از مجاری غده هستند

حیوانات داخلی که دندکی میکنند در غیر مجاری غده هفت نوع اند بعضی از آنها
 حیواناتی هستند که هیچ آنها استوانه شکل است از قبیل فیل و استر نکل استر نکل بطور

و نیم



و نیم و بعضی دیگر حیواناتی هستند که هیچ آنها عرض و پهن است از قبیل دو
 مون ششم نظر است و برخی دیگر حیواناتی هستند که آنها را حبیبی و مناخین
 شرحی زیاد از برای آنها نوشته اند و ما آنها را در مبحثی جداگانه مذکور میکنیم
 فیلو یعنی عرق مدنی

این کرم که در پیاده هزار سال است شناخته شده اندامی دارد استوانه شکل که طول
 او از چند سانتی متر تا سی قدم میشود حجم او گاه بانداز مضبوط است که تا مایل بطور
 قطرواشته باشد گاه باریج و خم است و گاه دانه بکو و خوش بچید و طرف او
 نازکتر از سایر اندام است چکی از طرفین او سر او واقع است که شناخته میشود
 از نقطه سباهی و طرف دیگر او که صاحب چپکالی است با اعتقاد بعضی هم و با اعتقاد
 برخی دیگر که اندک نادر است که این کرم بکی باشد و کامش در زیر جلد در غشاء
 لحمی مابین عضلات و کثرت بروزش در آلات باطنی است اول باها
 بعد از آن تونز که بعد ساق در آن و در جلد پیضه و دستها و پهلوی کفل
 پستان در خاصرتین انگاه مرفوع بعد در بدن در نیکستان و بعضی از قطعات
 اسباب بخودی خود دیک نشانه مخصوصه بدو شود در سر پستان افریقیه و سنکال و
 بعضی از مواضع بنکی دنیا و اسباب

علامات گفته اند که ممکن است چندین ماه بلکه یکسال وجود این حیوان در
 بدن باشد بدون آنکه اختلالی در بدن ببرد و گاه خارش جزئی در نقطه مکا
 کرم پیدا شود و از آن جلد مانند او رده نمایان گردد و چون حیوان برای جوف
 حرکت کند غشاء لحمی و جلد ضخامت بهم رساند و یک دملی در موضع پیدا شود
 چون آن دمل را بکشانند در مز کور میان ریم الجوان دیده شود که بواسطه
 یک مقام با چوب میتوان او را بلند کرد و بدو سران چوب پیچید و از برای

آنکه کرم بنامه بیرون آید باید چندین روز پانچندین هفته صبر نمود بعد از آنکه کرم بکلی خارج گردد و زخم التیام یابد خزان نو صاحب که شخصی را در پارسه از سنکال آمده بود و این مرض را داشت معالجه نمود اختصاصاً برای او نوشته است اولاً بخواست و طوبی سفید شیرین رنگ خارج گردد که کوباید و طوبی است که در جوف حیوان است دوم چون این طوبی را از زهر بین ملاحظه کنند که در هر از همین حیوانات کوچک در او موجود است و چنان مینماید که تا هنگامیکه این کرم تغذیه و غوغا نماید مینماید که تا معلوم نمائید با آنکه مورث بکدام عریضی در زهر جلد گردد و چون بخواند تواند نمود و تخم کند بر آن میشود که جلد را سوراخ نماید و با این واسطه حمل بر او نکند و از طوبی بیرون آید اگر و کرم را از که مهادین جنس خودش بیرون دیند در حقیقت جای شک است که این حیوان بجای خود را همیشه بیرون میریزد و الامورث مواد زیاد و باطن بود اگر چه این مرض چندین خطری ندارد ولی گاه وجع عجدی شدید و ورم موضع عجدی زیاد است که استخوانی و عریضی هلال یابد

علاج و قبیله ورم شدید باشد اضماعه ملعبه اندازند و منتظر باشند که حمل کشود شیء بعضی برانند که از اینها باید جلد را کشود به صورتی پس از آنکه کرم نمایان شد او را با این چوبی نازک با مقاش گرفته بکشد تا بجای که مقاومت کند و بعضی بمانند که اگر یابن شود و جعی شد بید و قلم و نیای زیاد و غایت را بادی دهد ولی کوباید در اینها اعتدال نموده اند بعل از اینکه بان حدی که با یک کشیده شود کشیده شد و زخم را بپوشانند و در دو سه بار عمل را تازان کنند و از برای خروج جملها دکنند و بفساد و خارج بکنند با غن واد و بیکه از داخل با خارج استعمال بکنند بجهت کشیدن کرم کوباید غریب باشند و طوبی مکان کرم عجدی عین بود که با آلات وادوات نتوان گرفت باید دانست که مطبوع فلفل است در دم عرق و تقویر و محلول سولیمه انداخته استعمال کنند و خارج حب لغزو

tarikhema.org

املاح ذبیقی و کوروی مستعمل اند بعضی از مصنفین دو قسم دیگر از عرق مدی می دانند یکی را فیلو دیمعه نامند که در غده معده و تحت ملتحمه و داخل چشم ممکن میکند و دیگری قصبه الیه نامند که در قوب و کوبهای پائین پیدا میشود و از هنر این دو نوع خوب شناخته شده است

استرانکل

این کرم که گاه مستبد با حباب میشود کرمی است استوانه شکل و قی من رنگ که از طریق نازک میکوبد و در یکجا از و طوف او دهان واقع است بواسطه شش بولمکی و در انتهای دیگر او حبابی که از او دگر او بیرون می آید در ماده ها این انتها علامتی ندارد که معین باشد این حیوان در انسان از شش تا ۹ سانتیمتر طول پیدا کند ماده او طی بلتر از خواست و در میان حیوانات از دو تا سه سانتیمتر خواهد طول پیدا کرد و بختیافته انگشت کوچک میشود این کرم نادر الوجود آن کلپتین دیده میشود و از آن علامت برف می کند که از سنک کلپه بر میزنند همانند صبح و بول الدم و حبس البول و ماده موایج در موضع کلپه که از جهات مختلفه میتواند کشود شود

تشخیص در حین حیات مشخص نشود مگر آنکه از مجرای بول خارج گردد و با بدان چنان که بواسطه انصاف دوده بنامه از مجرای بول خارج میشود با استرانکل مشتبه نمیشود و غیره و هم چنین فیبرین های رنگ باخته که بود از چند روز از اشتیاقی که بول اند گرفته اند دفع میشود قهیر داد و ناگون چیزی برای علاج این کرم بدست نیامده

اسبیر بطور

این کرم در اندن اول در مثانه دو ختری نیست و چهار ساله که حبس البول بود و کرم بعد از آن در مثانی و بنادر مثانه زنی نیست و شبیه له بر و زهر نموده قدام کرم

از هشت نوده میلیمتر است قدری از طرف قدام پیچیده است سرش بپایه شده مانند استوانه
مقطوع است و انتهای دیگرش در جنب زرها طویل و بالهای بسیار نازک دارد و در ماده کوتاه
و نازک است

نورسیم

این کرم مخصوص ملاحظه شده است در انگلیستان و کور و کور و در میان عضلات خصوصاً
غیر قان و هم دیده شده است در عضلات حجابی و کام و خور و مجرای بول و در قلب و
الات مجوفه تا کنون دیده نشده است این کرم در میان کبیره های کوچک است اندک مثل استوانه
بسیار کوچک است و در وضع بر روی خود پیچیده است و چون پیچ او را بکشند یک سیم سفید
طول او می باشد و یک هفت صدم قطر او است برای بدین او باید در زیر بیکار بود و در صیاجاً
او هیچ علامتی پیدا نمیشود که دلیل بر وجود آنها گردد

او و کبد

حیوانی است که در جابجا و مجاری صفرا و انسان و بعضی از حیوانات پیدا میشود شبیه
به بیشتر فرنگی پدیدست در قدام یکجائی دارد که کوباکون او باشد که از بالای و یک
بجهت و یکیدن است و از آن عروق منشعب میشود که به جمیع اندام ممتد میگردد و از آن عروق صفر که
فقط غذای او است می کشد یک قدری عقب کردن بر آمده با قوه انقباضی دارد که کوباکون او است
عقبتر از آن یک مجرای دارد برای گرفتن مواضع فلان حیوان و در انسان از پیچ الی بازده میلیمتر
و از وجود او علامتی شبیه بعلامات آسید فالوسیت بر میزنند ولی تا کنون معلوم
نشده است که بچه چیه پیدا میشود و بچه علامت حلس بر وجود او توان زد و بچه قسم باید
معالجه نمود

موسسیم

نزدمان صاحب هشت عدد از این حیوانات در جلد به شخص مستی پیدا کرد و فلان حیوان
هشت

هشت يك میلیمتر است

یطول سیم

لوکارن صاحب در بول ذی قدری از این جنس کرمها پیدا کرد پس از آن و لیمپاک پس از
مرک در کلبه همان زن همان کرم را پیدا نمود و در اینج میلیمتر عرض او و میلیمتر است
شکل آنها بیضی است جانب پشت آنها قدری محدب است و شکشان فرو می کشد راست

در زرمهای جیبی

قدما با سیم کرمهای جیبی که هیداپند می نامیدند بعضی خشک بندهای جیبی و بعضی از آن
انسان عادت مرئی و مواد کبیره مختلفه را مخلوط هم میکردند و در او خورده هفدهم عیسوی
حارتمان و ملبرون و قلبانی اختلافی در میان این هیداپندهای قدما پیدا کردند و بلا
ولا نیک این کرمهای جیبی را انواع نموده اند اکنون آنها را با این قسم قسمت میکنند اول
سپستی مرک دوم الی نوک سیم آسید فالوسیت

در سپستی مرک عبارت از حیوانی است جیبی که اندام او استوانه مانند با اندک چین است
و منحنی میگردد و یک جیبی عمیق از هر طوبی شفاف شبیه بدم و انتهای دیگر او که تقریباً
و راس آن کوپند در اطراف او چهار خرطوم است و منحنی میگردد و یک ناجی که فراهم است
از چنگالهای بسیار کوچک

در الی نوک کرمهای جیبی که بد نشان صاف و نو یک به بعضی است و سر آنها
مانند ناجی است که فراهم آمده از چنگالهای دو صنف و چهار خرطوم دارد و این کرمها
همیشه محبوس هستند در یک کبیره و دی که در آن میان آزادند اگر طوبیت جوفان
کرمها شفاف باشد بخوبی دیده میشود که در آن کبیره طوبیت کبیره بزرگ کرمها
دانه از زنی سفید می کشند و برای بدین این کرمها باید با دزیرین آنها را ملاحظه نمود
و اغلب مصنفین آنها را زمان اول قول حب القرع دانند

mandarinkhema.org

tarikhema.org

اسیر فالو سپست عموما که مایه هستند حیاتی بدون واسطه و محتوی باشند
در یک کسبه دودی بد و نقصان بزرگی آنها از یک از نرین تا بعد سر طفل در وقت تولد میباشند
ولی اغلب از نرین و کور و غا و نرین کنند بدن آنها مدور و پائینی است با جدار نازک و شکنند
که هیچ بعضی را و مشاهده نمیکرد و قوه او بجای و انبساطی دارد پس نیکند با دودی لون باشند
و در بعضی نقاط سفید کدر مشاهده شود که دلیل اند بر ضخامت جدار آنها بعضی اوقات یکی
از آنها که به نوبت کامل رسیده از جیب اصلی جدا میشود و خودش کسبه دودی نازک و بسیار
که در جوف هریک از این کرمها هست آب است که قدری ماده پاره ای بعضی را و هست
کسبه که این حیوانات در آن محتوی اند سخت است و مرکب است از لطیفات چید و بسیار شبیه
بویات مفاصل ضخامت آنها تقریباً بعد کسبه است و بعضی اوقات در بعضی مواضع این کسبه
تبدیل گردد به ماده غضروفی با غلظتی و سطح داخل این کسبه ها مفرغ و تراست از غشای صاف
به افشید سرخی که از او و بطوبی شفاف تر شمع میشود که این کرمها در میان آن شناورند و این
بطوبیت مانند بطوبیت جوف هریک از کرمها است سطح خارجی این کسبه بالآت مجاور ملتصق
میکرد و آن آلات فشرده شده هزال حاصل کنند اما هیچ وقت معدوم نشوند
علامات و رفتار مرض چون رفتار مواد دودی بسیار بطوری است میشود که حجم زیادی
بهم رساند بد و آنکه وجود آنها هیچ علامتی مکشوف نگردد ولی گاهی بعضی علامات مرضی بواسطه
فتاد و عضو علی با آلت مجاور بر و نرین نماید مثلاً چنانچه مرض در جدار معا باشد بواسطه
منع عبور باین علامات ابلا و بر و نرین کند آنجا که بر و نرین ماده در معا باشد جمیع علامات
که از فتاد و معا بر و نرین نماید ظاهر شوند و آنجا که ماده دودی بجای برآمدگی پیدا کند بعضی
علامات عده از او پیدا گردد مثلاً شکل این مواد اغلب کروی است و یک مقدار و مت و انجایی
دارند و اغلب حس حرکت موی پیدا شود و چون قوه کشند صلا که راست و دست است
حرکتی کند شبیه موی که از نرین ساعت در نرین دست حادث گردد هرگاه در وقت زدن
دست

دست بر او نهند و این صلا را موسوم کرده اند بنام صوت مواد دودی که در حقیقت مخصوص این
مرض و بواسطه همین علامت میتوان غیر مرضی را و همیشه احساس غلبه و فقدان او بواسطه
زیاد متشنج شدن کسبه دودی بواسطه ضلای آن عموماً این کسبه ها مورت و نرین و جعی میباشند
آنجا که ماده کوچک باشد با آنکه با آلت و کسبه فتادند هدا باشد که مدت مدیدی دوام نیابد
بدون آنکه هیچ اختلالی در عمل تغذیه بر سرسد و در صورت غیر این حالت هزال و سبک مرضی را و
سازد بعضی اوقات و جعی شدید پیدا شده می بر و نرین کند و نرین آنها بواسطه ضربه وارده بر
و متورم شدن کسبه دودی است و از این ورم نمودن کسبه ها و بزرگ شدن و بعضی آنکه در
جوف آنها باشد و بطوبیت کدر باریم خالص گردد
انتها و دام مرض باشد که شفا باید بواسطه پاره شدن کسبه و نرین کرمها بخارج
و بعضی اوقات منتهی گردد بهلاکت بواسطه عسرت با منتهی که از آنها در بعضی اعمال عکس بدیهیم
رسد و گاهی از اوقات چندین دفعه ورم در کسبه بهم رسد و جعی عارض گشته هزال
حاصل شده قوی ضعیف شوند و بار و نرین علامات حاده شخص مرضی هلاکت گردد گاهی بر و نرین
بواسطه پاره شدن کرم است و در یکی از اعضاء صفاق و چون بجای کشیده شود اگر کسبه بزرگ
باشد بواسطه زیادای ورم و قول بواسطه جذب بریم منتهی بمرگ گردد و دام مرض بسیار مختلف
از شش ماه کمتر نمیشود تا سی سال هم دیده شده
تشخیص مرض آنجا که بر و نرین کسبه ها دودی را آلات عمیق باشد با آنکه استخوانی آن
آلت را پیوسته اند هیچ حجه غیر مرض داده نشود مانند کسبه های دودی که در معا و نخاع
سپیده و عرق شکر بهم رسد اما چون بجای برآمدگی پیدا کند که بتوان احساس نمود بواسطه علامت
مخصوصه که بیان شد خاصه بواسطه حس صوت دودی با صدای نرینی او را از سایر مواد می
توان تشخیص داد اما حیف که این حسن موقتی و گاهی مفقود است بعضی باینند که در مواد بزرگ
طبیعت آنها هیچ نتوان تمیز باید و در کار و محسوس استعمال نمود تا از طبیعت و بطوبیت مرضی

تمیز مزاج شده شود ولی این عمل چون کاهی خطر است و از برای معالجه هم چندان فائده در
 تشخیص ندارد نباید استعمال نمود
 مقدمه المعرفه همیشه مرضی است خطره ولی بواسطه موضع مرض و حجم او و بعضی اوقات
 دیگر مانند فشار بآلت رتبه خطرش زیاد گردد
 اسباب تاکنون سببی نیست نیامده و در حیوانات نشخوارکن بواسطه رطوبت هوا
 و خوردن علفهای تر کبسه های دودی زیاد موجود شود
 علاج جهت منع بروز کبسه های دودی باز فایده کبسه های موجوده بعضی دواها نوشته
 مانند خوردن نمک طعام و استقامت در آبهای شور و خوردن کلیل و غیره ولیکن از آنجا
 در علم تاکنون نوشته نشده است که غری از آنها مرتب شده باشند آنجا که کبسه در ظاهر
 باشد و دست با و برسد بواسطه چاقو یا خنجر و بن بکشانند استعمال خنجر و بن در وقتیکه
 کبسه مجاور کبسه صفای باشد بهتر از چاقو است بواسطه آنکه التصاق در اطراف خنجر
 میرسد و مانع میشود از پیش رطوبت را در میان صفای که اول بقدر یکپول سپاه آن
 مذکور در اینجا از ماده که پیشتر برآمده میکند از چوب اسکان بسته شد بترند و یک خنجر
 دیگر بکشانند بچوبی طوری که چندین دوز و قشر و قشر بکشانند تا آنکه بمیان کبسه
 چون خواطر جمع شدند که التصاق در دوز خم بچوب سپیده با چاقو با استعمال خنجر و بان
 کبسه را بکشانند و بعد از آن دواهای پدید در جوف کبسه کنند تا بسبب التصاق
 جدا رها شود و اگر ورم بروز کند چه قبل و چه بعد از بن بدن معالجه ورم کنند

در کبسه دودی کبد

در هیچ یک از اعضا بقدر کبسه دودی بروز نمیکند و موضع این کبسه اغلب
 عموماً آلت و بندرت در سطح قطعه راست استعالهش بیشتر است از سمت چپ و کاهی در جوف
 مجاری صفراوی بروز میکند و فشار بآلت دهد و مرث هزال کرد و ولی هیچوقت منع حیوان
 صفرا

صفرا و خون را در صفرا مجاری صفرا نمیکند و با بنواسطه است که برقان و استسقای
 در این مرض بندرت پدیدار شود
 علامات و جمیع معجزه در بن شراب سیف بمیرسد و یکماده در تهیگاه نمودار گردد که در او
 فرسپان هیدانه احساس شود عمل تخلیه بطی و عسر گردد و بواسطه فشار و بعد از گاه
 فی عارض گردد و گاه بواسطه فشار در مجاری صفرا و حجاب حاجز برقان و استسقای
 ذوق حاصل گردد و عسر النفس نیز پیدا شود میتوان این ماده کشته شود در صفاق و
 معده و معالج و جنب و ریه و از جلد شکم بخارج باین وسایط نتایج مختلفه حاصل شود
 اگر بصفاق کشته شود ورم صفاق حاد و فی عارض گردد و منبر عمل آلت کرد و هم چنین
 اگر بجنب کشته شود ولی که خطر تر است و تا از کشون صدر و خروج کرم شفا حاصل گردد
 که در جوف ریه داخل شود بواسطه نفث ماده دودی خارج شود کاهی بواسطه ریه
 برخلاف اولاد کبسه جنب کشته شده بعد داخل ریه میشود چون بعد و امعاء کشون
 شود مواد دودی بواسطه قی با بر این بخارج و نخته شود و بندرت جلد شکم را منبسط
 نموده نازک نمایند و بالاخره بخارج کشی شود

تشخیص مرض از هیپرت دوفی ساده تمیز داده شود باینکه در هیپرت دوفی اگر
 چه بزرگ شده ولی شکل طبیعی را از دست نمیدهد بخلاف در این حالت که شکل آلت
 تغییر یابد و در هیپرت دوفی از اس و با فشار و امانل توام کبد بحال طبیعی است و در
 این مرض احساس ماده متسوج گردد و چون قوع کنند کاهی حس فرسپان بعضی صدای
 دودی در کبد شود فقط بواسطه حس این صد است که کبسه دودی را آن کبسه مائی
 میتوان تمیز داد بواسطه مقدمات میتوان این مرض را از دمل و سرطان فرم شده و
 صفراوی تمیز داد زیرا که در دمل در ابتدا علامات موضعی و عمومی ورم کبد و قی
 خواهند نمود در سرطان حجم آلت بسیار بزرگ گردد و در سطح افنا هوا رها

چند که قوام نشان مختلف است بدانشی هلال و زک کاهی و سق القنبره سلطان محمد سیدان
 صفراوی بواسطه موضع ماده و قوام آن در جهالت دارا سنک که سخت و ناهوار است
 و چون فقط ممکن از مایع باشد وجود موج شدن فوراً نماند گاه بگاه تمیز داده شود
 نقدی المعرفه مرضی است خطیر چه بواسطه موضع و چه بواسطه طریقهای که منتهی
 میگردد چه بواسطه عدم اطمینان باد و پیر جات و طر حرض منتهی شفا میگردد و جانب
 علاج نامشده اصمیحی من را بحال طبیعی و میگردد در این زمان و کامه صاحب
 جرات آن نمود که بواسطه بطاسم کو سبتک بنویسد که قبل از کوه ماده را خارج کند و بعد از
 دفعه نتایج خوب بود این ناعه اگر چه نتایج خوب دارد ولی بیشتر منفعت کند در وقت
 ماده خبیلی عجم نبود و کبسه او متورم نشد و مریض ضعیف بود

در کبسه کوی کلبه

این مرض که در انسان نادر است در کوسفند عجمیت دارد و از برای این مرض و هک
 هنگام اول اندک ثقل و وجعی بواسطه حجم و فشار کبسه در موضع کلبه احساس شود
 و بعد از زمانی طویل کبسه دودی در موضع با کلاله کلبه کشیده شود و از آنجا
 کرم از مجرای بول خارج کردند که بعضی از آنها ناقص و برخی کامل میباشند حجم بعضی
 از آنها بقدر بخودی بعضی دیگر بقدر کرم و میشود و اینکه این کرم با این حجم از مجرای بول
 خارج میشود بواسطه آن است که نرم و قوی و قوامی دارد بلند شده پس از خروج حالت
 خود رجعت کند و خروج این کرمها اغلب بخت و بلا میجو است کاهی از اوقات در
 برخی پی را موقعا مسدود کند و مورت بر و زنجیر علامات قولنج کلبه میگردد خبیلی
 نادر است که این کبسه ها از جدا از خلقی شکم خارج با در میان دوده کشیده شود
 کبسه های دودی کلبه کمتر از کبسه های دوی کبدا است هم چنین در انسان خفیه کبسه
 از حیوان است زیرا که در حیوان عروق غش در غده و کلبه بکده فداست اما در انسان

در کلبه

در کلبه افروز کبسه های دوی کلبه انبساطی پیدا کند و ماده او خال یا بدانی عاز
 کلبه شود و کاهی بدل شود بختله و نبوری
 علاج علائق در صورتیکه کبسه دودی بخارج راه پیدا کند بطوریکه در وقتیکه
 بطاسم باید کشود ولی چون از خارج برآمدن نداشته باشد باید بحال خود گذارد
 در کبسه های دودی رحم و منبره های او

در خالای رحم حقوق در فضای خود او کبسه دودی دیده نشده ولی در مجرای منتهی
 کند در هنگام حمل اغلب از این کبسه ها از بندل خیم بر و نر کند و این کبسه ها و اسافی زیادی
 داده اند ولی عموما مولد دوی کوبند

علامات و انتهای مرض در ابتدا حال است تمیز دادن مولد دوی و از آن حمل
 و ط چون حشمت بزرگ کرد و بعضی برآمد که بواسطه مسکی و نموش از عرض شکم تمیز
 هم داده شود بعضی گفته اند که بعد از ماه و نر گاه کاهی ببول خون از او پرون شود
 بعد بعدل کرم و غر و ج رطوبتی مائی تا آنکه کسوده بخارج کرم و د و این خروج کرم عموما
 از ماه سیم است تا ماه پنجم بندرت مرود تا از این مدت است ولی بیشتر با جمیع علامت
 حمل تا موعده برسد پس از خروج حشمت زن باز میتواند آبستنی شود و چون اینها هیچ
 از برای زن ندارد مگر آنکه هر گاه کند بانرف الدی شد بد و ط طفل در همان اوائل
 شود

علاج اگر نرف الدی شد بدی دوی دهد و بواسطه لمس انگشت تمیز مرض شود
 بواسطه تحریک تشنجات رحم با انگشت او را گرفته بیرون آورند و آنجا که کبسه های
 دودی در پیشتین بر و نر کنند بعلاوه علامات مخصوص کبسه دودی جمیع علامات
 کبسه های مائی پیشتین که قبل از کس شد بر و نر کنند
 در کبسه های دودی سرتین

اغلب که مهای پسر و دم که با نشت خارج میگردند مبدئشان در کبد است ولی گاهی این
مرض میتواند بخودی خود در ریه بروز کند و محلش گاه در سطح الت بلافاصله ریه
جنب است و گاهی در عمق است در صورت اولی باشد که تنگی نفس بروز نکند و
صدای قریع در موضعی محدود گردد و در همان موضع صدای تنفس قانی گردد
انجا که محل مرض در عمق باشد گاه مورت نفث الدم شود و یکو جمعی میسر و صدر را تنگی
نفس پیدا شود ولی همچو تبز او داده نشود مگر آنکه بعد از چند روز یکی یا بیشتر از آن
خارج نشود پس از خروج کسپه یک مفاده در ریه عباد که هرگاه کوچک باشد گاه التیا
یابد و هرگاه بزرگ باشد با آنکه کسبه متورم گردد جمیع علامات دق بروز نکند

در کسبهای دودی دماغ

بروز این مرض در دماغ بسیار نادر است مخصوصی رس جوان و قوف باشد که
مدتی بروز نکند بدو آنکه هیچ علامتی از آن ظاهر نشود ولی چون اندک جمعی حاصل
گردد بعضی علامات خطر و مختلفه پیدا می شود چنانچه در بعضی صداع شدیده و فلج
و تعدد و اغما و تشنجات که اغلب مانند صرع عارض شود با اختلال حواس و فضا
باصره و جمیع این علامات میشود که موقفاً قانی گردد و دوباره عود کند تا آنکه
در رسد و محال است تمیز مرض در حال حیات

در بزبتهای خارجی که ابی دق و اوینه

بزبتهای خارجی عبارتند از آنهایی که در میان جلد پیدا شوند مانند سرکوبیت
بعضی حیوانا جری با در سطح او مانند شیش و کیک
اما جری مرضی است مسری و متصف به بروز زندهانی زیاد در وی جلد حبابی
شکل با شفا و چکه زیاد بواسطه وجود یک حیوانی مخصوص از نوع عنکبوتی که او
اگر جری بکوبند با سرکوبیت انسانی نامند اگر حیوانی است از نوع عنکبوت
که با چشم

که با چشم دیده میشود بقدر یک سر سنجی و سفید رنگ چون در بزبتهای بی نگاه کنند مانند
یک کتف کوچکی نمایان شود با هشت یا بعلاوه در وی و بعضی رشتهای لبی میباشند
و وجود این حیوان در جری حبابها نیست بلکه در سخت بشتره یک سناری است بعد از چند
میلیمتری برای خود درست کند شبیه بشیار بسیار نازکی که از سر تو زنک میسرند که این
شیار یک سرش منتهی میشود و حباب و سر و یکوش منتهی گردد و برآمدگی بسیار کوچکی که در
حیوان در او ممکن دارد این حیوان همیشه خط راست حرکت کند هرگز منحنی نرود و در
۴۴ ساعت حرکت او را یک میلیمتری فرزند اند این حیوان در صاحبان جری موجب
و عذاب و همیشه کمتر از عدد حبابها است بجا است که در جلد میسرند که با آن حیوان
شب گرد باشد که شبها بیرون میمانند جلد را چیدن میسازند و چون روشن شود
از وی خود ساخته کام گردد و باین واسطه سرایت او در شب بیشتر است و اغلب
در مواضعی ممکن کند که اصطکاک کمتر دست دهد

علامات در آن تقاطع که اگر آمد و داخل شد یک خارشی میسرند که از تحریکی
باید بعد یک یا مدتی صغیری قومن با سفید رنگ جلد پیدا شود و بی وی صفات حباب
دایمیا کنند و اغلب ابتدای بروزش در میان امان دست و قسط است و از آنجا نشا
بدن سرایت کند جلد مابین حبابها بلون طبیعی است و در عیالوی و چندی از آن
یک خط سفید رنگی با جلد و چند میلیمتری جلد میشود که حبابها بلا واسطه منتهی
بان خط میگردند و این خط همان شبیار است که حیوان برای خود سازد و در یک
طرف منتهی یابد و این حبابها یک حکه پیدا کنند که مرضی از خاراندن میسرند و
و طوبی او را خارج کرد که میسرند که در اشخاص ذی الحس و دمووی المزاج این حبابها
صفات حبابی بر می حاص کنند و گاهی اوقات بعضی شوریات و یک مانند او تمام
اگر فواکیما و لیکن و غیره بر یک یا عرض گردد و سبب اشکال در تشخیص شوند

دفعه های مرض در هوای گرم و جوانان و مردمان قوی خلیج و فساد مرض
 اسرع است و نسا و پیر در میان امراض خطر مرده بکوتی نمیکند و قوالد بکوتی
 بمنزله اندک و یا بچس حرکت مانند و بعد از رفع شدن مرض و باده بقوت اصلی
 مراجعت کنند و باشد که چندین سال دوام بمرساند بدون آنکه اختلال نرپاد
 در مزاج بمرسد و همچوقت بخودی خود مورث هلاکت نشود
 تشخیص گاهی بسیار آسان است و چون اشتباهی در تشخیص او بمرسد باید
 مامل کرد بواسطه های دیگر درست نمیزداده شود از لیکن و بدو بکو یعنی حله
 نمیزداده شوند باینکه اغما بمراتی هستند مملو و دانه خشک و بجلا و لیکن
 در سمت و حش و جوب در سمت انور و عضون مفاصل حاکنه و حله جوب هم
 از حله لیکن است و حله بجلا و دانه آنکه مرض است دانه اغلب بمرش در پشت
 و کف و سمت و حش و خلفی اطراف است و بواسطه حاد اندن باده کوچک سببا
 رنگ در نقطه او پیدا شود بواسطه خرم خون و بسته شدن در ان موضع امراض
 حبابی مانند اکبر و غیره او و نمیزداده شوند باینکه در اکثر ما چندین حباب
 بکوضع مجتمع گردد و ان موضع متورم گشته حبابهای کوچکی گردند و شبان و اکا و انجا
 پیدا نشود
 تقدیر المعرفه همچوقت بخودی خود مورث خطری نمیکرد
 علاج چون مرضی است موضعی بمعالجات موضعی باید علاج نمود امری
 کوکود از همه ادویه جات بهتر است باین طور مر و غن چهار جو کوکود بکثر
 نسخ و بکو دو غن ۳۲ جو کوکود هشت جو قلیا چهار جو طریقه استعمال
 ان است که اول مرض را از لباس عاری کرد و بک با صابون بشویند و خشک
 کنند پس از ان بدن او را در یک دفعه دو غن مملو کنند پس از ان بانی حمام
 در برونند

و بشویند باز بخورد و دو غن مملو نماید تا سه روز دفع شود
 در اقسام شیش
 سه قسم شیش میباشد شیش سر شیش بدن شیش پیون و قنای و لی کشیده اندام بدن
 ان سینه شان فرق دارد شیش سر و مادی و قطعات شکمشان از هم ممتاز هست
 شیش بدن سفید رنگ و قطعات شکمشان از هم ممتاز نیست شیش مور پیون
 بدن و سینه شان از هم تمیز داده نشود شیش سر اغلب رفق و امتیاض پیون
 مبتلا بان شورات مزمنه سر پیدا شود تا قنای اغلب مبتلا بان قسم شیش کو کند
 وجود این شیشها کو با بواسطه سر است شخصی است بجهت دفع اغما باید مورا
 شانه کرد و کوتاه نمود و شیشها بصابون کو بار و غن اسطوخودوس و قنای
 صغیر جوش غود و دو غن جیوه اغما را میکشد اما شیش بدن و قنای باید با
 مورث بعضی اختلالات در جلد شود مانند حباب بر می و دانه های قومن و حش
 و غیره در این صورت حمام کو کردی و قلیائی و استعمال قلیا لازم است و سینه
 ضروری و باده برون شیش مور پیون در زنجیر و دیش و اب و در زها است
 برون این شیش مورث خارش شدید و لکهای قومن گردید و بجهت دفع ان قلیا
 در کبک
 کبک جانوری است که هر کس سوزش و مکیدن انرا فهمیده است اقسام چند
 از کبک شناخته شده اند مثلا کبک آدم کبک سل کبک و بویه کبک موش که همه
 اینها از یکدیگر جدا اند و یکسوی دیگر در یکی دنیا جنوبی هست که در جلد و
 مبر و و او را کبک غواص گویند ماده این قسم حیوان در زمین باغ با در میان
 پاشنه فر و مبر و در ابتدا چندان سوزشی احساس نشود و ان موضع بواسطه نقطه
 سیاه رنگ شناخته شود که بزودی ماده در ان موضع بمرسد و بر می از ان خارج
 شود

manuscripta.org

tarikhema.org

• حادی جباهای سفید که تخم آن حیوان است و گاهی دیده شده که این حیوان با غش غش
موضع و قرحه عظم گردد

علاج بابک سوزن باید موضع را کثود و آن کپسه را در او برده و آن آنکه
کثوده شود و زخم را با نینا کو با کحل باید پوشاند و زخم را برض اغلب و سبها
چون در هر هستند

در نوپ کول بطور عموم

لفظ نوپ کول را حکمای سلف حتی بطراط استعمال میکردند و در مواد صغیر مختلفه که در
داخل یا خارج بدن نمویسند و اولی معاصرین استعمال میکنند و در بابک حصول
مخصوصی که این دانه ها عبارتند از اجسامی سفید زرد رنگ با رمادی که شکلات
عموماً و در مجسمات از دانه خشتی شالی دانه کاسی یا از زنی است و هیچ
آلای با نینا کو در آنها مشهود نگردد و در ابتدا صلب و شکننده بعد نرم شده مانند
میل بخاج ریخته میشود و در جای آنها یک حفره باقی میماند که گاهی هم تبدیل فیما
باجسام اهکی و فلسی و از آنکه به بعد آنها را دو قسم فرض نمودند نوعی آنها
هستند که این دانه ها جدا جدا و نوع دیگری آنکه آنها بهم میخافند

تشریح مرضی در درجه اول این دانه ها اجسام صغیری و مادی رنگ قرم
شفاف و گاه پیرنگ با قوامی سخت و اغلب مد و در ماده اش متخلل الجنس و مجسمات
چنانکه گوشت بقدر ادرف است در این هنگام دانه های اریزی نماید شوند گاهی
از اوقات ذره بنویسها شدند و چنان نماید که غباری و مادی و رنگ در جوف
الت ریخته شود و در این صورت آنها را غبار نوپ کول گویند بعد که بیک جی
و سیدند بکنقطه زرد رنگ در محل از آنها خاصه و در مرکز شان پیدا شود
و بعد ریح این لون جمیع دانه را فرا گیرد و حجم دانه هم زیاد شود که بعد هستند

کپلا

کپلا سبک بعد را دای شود و اغلب این دانه ها بهم متصل شده حجم زیادی پیدا کنند که ماده آنها از رنگ
جنس و سفید رنگ و کدر و شکننده مانند پنبه در زرد و آنکشت خورد شود این حالت را
خام نامند گاهی از اوقات مخصوص در پیر بعضی آنکه این ماده بطور دانه نمودار شود بیکاده است
غیر منتظم که در میان او دانه های اریزی و غیره نمودار شوند و این حالت را نفوز دانه رمادی
نامند چون این دانه ها بلا واسطه با واسطه ملتصق اند با لایق و با لایق مجاور و دهند و
هزال گردند ان آلات متفوق کرده مجاری غیر طبیعی در میان آلات حاصل کن و سبب فرجه و
عظم گردند و عروق را منشق نموده گاه مورث زرف الدم شد بد شود گاهی بعضی از عروق
مسدود و عیای آنها عروق دیگر تولید نمایند طولی نکشد که این دانه ها تبدیل در طبیعت
بهم رسد گاهی نرم شده بخاج ریخته شود و گاه خشک گشته تبدیل بمواد اهکی گردد ابتدای
عموماً از مرکز با اطراف است این دانه ها چون نرم شده اند کم کم بکلسه هندی حاصل کنند
مانند لیس کردن پنبه فاده بعد از زجت و قوام دیم در آنها بجز سید این دیم کالی خفیم و بی بود
زرد و تر از غیر و دانه است گاهی در کرب شود از دوجن یکی رقیق و قدری شفاف و یکی کدر
بدانه های پنبه در این حالت این ماده بخاج ریخته و در جای تفرق اتصالی بهم رسد که در آلات غشا
بصورت جوامع مختلفه در آید و در احشاء مورث حصول خضره ها گردند که آن خضره ها
گاه از غشاء کاذب مفرقش گاهی از اوقات قطعه از آلات که میان دو ماده دانه واقع شده
باشد جدا شده با دیم خارج گردد و گاه این مواد تبدیل گردند بمواد اهکی و این تبدیل که بکلی از
طریقهای شفا است اغلب در پیر و در غده لمفاویک دیده شوند گاهی هم بعد از خاج
دیم بطریقها باشد که بعد در سبب ریه متکثر خواهند نمود تفرق اتصال حاصله التیام یابد و
شفای حریف گردد این دانه ها بعد مختلف در یک الت و بد درجات مختلفه دیده شوند اغلب
اوقات این دانه ها در آلات چند روز دارند بخصوص در اطفال در شبان اکثر محذود

در يك الت است و اغلب برون رانها در جبهه است و بعد از آن در شیان و در معای و قاق و غلا
و غده قصبة الیه و غده مجاوره امعا و غده عنق و صفاق و جنب عظام و ام الرقبه و دماغ
کلیه و الحال و کبد است در اطفال بعد از سه غده قصبة الیه بعد غده مجاوره امعا و معای
و قاق است بعد غشاء جنب و الحال و صفاق و کبد و معای غلاط و امین و کلیتین و دماغ
و پیکار و پندرت در غده لوز المله و غده و ذی و بیضتین و مجاری بول و رحم و بیضتین
که بیشتر از اینهای اخیر مبتلا گزند و باید دانست که پس از سن پانزده این دانهاندرت غیر
دیو بر نرکند

علامات و رفتار در علامات موضعی تو بر کول چون زیاد مختلف است در ایجاد کوی آن
او نشود اما علامات عمومی در هر جمیع محای که باشد همراهی با با خشکی لون جلد و رخاوت
عضلات کند قوی ضعیف بمرساند هزال علوی که در کاه و قات از ایند احمی علوی شود
غالب و قات برون رحمی در هنگام نرد شدن دانهاندرت و این جمیع کاه متصل و کاه دایره
بطور قیاسات است و جمیع علامات دق در او هست و در وقت خوابیدن عرق پیداشود
و از ابتدا عده کلبه و لهای خون که شود و طالیاف او تغیر نکند مگر هنگام حرکت شدن
با ورم در هر موضعی که تو بر کول پیداشود عموما ابتدا بیرون و از او نامعلوم است و قیاس
بطور از زمان است و کاه بخصوص در اطفال که تو بر کول در چندین آلات بلکه دفعه پیداشود
و قات از زمان است و طالیاف از طالیاف نمیکشد که علامات در یکی از آلات مبتلا شده است
پیدا کند

تشخیص مرض انجا که مرض بطور امراض حاده شروع کند مشنبه به بیضتین و کوی
و هر که طفل ضعیف یا ناقه باشد که حای متصل پیدا شود و چندین هفته دوام نماید اگر
هیچ اختلال موضعی هم بیرون نکند حلس طیب به بیرون تو بر کول باید باشد و چون تو بر
از ساء

از ساء امراض پشته مورث بیرون رانهای قی شود و طیب لایزم است که چون شفق را بیند
باقیه و قوی آن تحلیل رفته و تب مدام با در قیاسات عارض شده و شبها عرق کند حلس بیرون
تو بر کول نکند

نقد منظره اگر چه مرضی است خطیر ولی ممکن است علاج شود

اسباب مرض اگر چه مرضی است ادنی اما لایزم نیست که اطفال جمیع مضمون مسلول
گزند و غالب بیرون رانها است از جمیع محمولات غیر طیبی تو بر کول بیشتر دیده
شود در اینها

علاج و قیاسه انسل ربه و خندانید که میکنیم به تفصیل از معالجات این امر این
خواهد شد اینجا فقط قواعدی را که از برای نگاهداری اطفال که بواسطه او ت یا سبب
مستعد این مرض میگردد بیان میکنیم هم اینکه طفل متولد شد باید او را باید به قوی
مخرج سبب اغلب بیرون رانها در اوقات بکود است و بمنزل خوش آب هوا منزل دهند و قیاسه
او را از شیر باز میدارند غذاهای خوب بخوراند خصوصاً بگوشت و ترله و گوشت سفید
و مرغ و قدری شراب خوب و اشیاء قیاسه از قیاسه گوشت سرخ کرده و غیره بخوراند و اگر
و اگر سوء هضم و اشتهای او کم شود و پیره مانده پوست کینه و غیره بکار بندند با قیاس
از غذا قدری پسین با و بخوراند و در رانهای شور اغلب استعمال کرده بدینا مالش دهند
و اگر خواب طفل کم شود تو پاک استعمال نمایند و چون طفل به سن هفت و هشت برسد او
ببور زش وادارند و در رانهای او و دانه با اجهای معدنی با در استعمال نمایند چون
جلد بنای با خن را کدازد و باز او پیره و جلدی بکار بندند

در تو بر کول اقبین

و مردم دانه امین شناخته میشود و بوجود دای تو بر کول در غشاء الحامی غت صفاق
تشریح مرضی اشتباهی که با این مرض میزند غشاء صفاق دماغ شفاف و بدون انصاف

و کاهی اندک از وجب بمرساند و با انگشت چسبد و طبقه و مانی این غشاء بواسطه ^{این} قوتی
 که در میان غشاء الحجابی تحت او متراش می شود قدری برآمد شود هم چنین قدری
 در طوب در تجا و بف دماغ متراش کرد ام الرقیق بخون گردد کاهی هم یکماه حساب آن
 او برپوش کند و بخصوص در او مشاهده شود داغهای چندی صغیر سفید رنگ باقی
 نیم شفاف و مدور در این داغها صفا آنکه از برای تو بر کول مدکور نمودیم کلاسیا
 و عدد داغها که تا سه مرتبه محل آنها باد چنان غلب دماغی است و کاه در توفی های او
 عروق زنده ها ام الرقیق صلابت بمرساند خفامت پیدا کند و با عرق غائر عت او ملتصق
 شود و هم چنین با سطح داخلی که ماده رمادی دماغ متصل شود و جرم دماغ در این نوع کاه
 با بنفیس گشته و این نرم اغلب درها عده دماغ واقع شود و بعلاوه در اغلب اطفا لیکه با این
 مرض میزند در بعضی آلات دیگر مخصوص در پیهین و آنها مشاهده میشوند و اغلب
 بر و زواخا در دیر اسبق از بر و زواخا در امین است

علامات سه هنگام بحجه علامت این مرض فرض شده است و اغلب هم حالات گفته
 از برای او پیدا میشود و این نوع در اشخاصیکه مبتلا بر مرض سل هستند با هیچ علتی در آنها
 نیست بعضی حالات در مرض پیدا شود که چندان محل اعتنای کسانی نمیکرد و عده
 هوالا است که رزک در بعضی باخته و با خلاق شود و در اتمام این حالت از چند هفته تا چند
 ماه است و در ابتدای بروز مرض سه علامت عده پیدا شود اول صداع دوم قی سیم بیوست
 صداع اغلب در چپه راست و بعضی اوقات در قاعده و کاهی در قف است و عموما وجع
 شدید ندارد و متصل است اما با فاصلهای چند موقعا عده می شود بد شود که طفل زیاد
 کند و حرکت اندام و شعاع زیاد و مورث از باد او شوند و در چپه و خسر از مرض از
 ابتدای مرضی کند و مد فو عرق کاه غذا است که در معده بود و کاه صفرا و کاه مخاط
 و این قی را می کند با کمی اشتها و هم چنین در کل این مرض با بیوستی می رسد که کاه با

های

های بسیار شد بد دفع نشود بعلاوه این علامات بعضی علامات دیگر که مدامی نیستند
 و رایج با مرضی کنند بعضی از آنها مضطرب و بعضی متوحش و بعضی کوفتی پیدا کنند
 و کاهی کاهی زیاد مخصوصی نمایند که بعد از آن سبات بمرسانند و صورت که اکثر
 اوقات باخته است کاه بر او ریخته و او را با چپین و چشم ها روی هم گذارد
 شود که چون بخوابند از هم باز کنند مرضی مقاومت نماید و مد کاه متسح کاه
 ضیق شود و اغلب وجه دندان حاصل اید در تشنجات در عضلات صورت و ^{بعضی} اند
 اطراف بدن بمرسد و چنان میباشد که اغلب مرضا و در بمرسانند و نبض اغلب
 سریع و قدری غیر منتظم است و هم چنین است حالت نفس کاهی از اوقات حس
 جلد زیاد شود و زیاد شود در هنگام دیم اشتداد در این علامات بمرسد اما با
 که وقوفی در حالت مرض موقتا بمرسد و طبیب و پرستاران چنان پیدا کنند که
 مرضی شفا یافته و بعد دفعه تشنجات تمام عارض شوند که در حقیقت فصلی
 نمایان از برای هنگام اول و دوم پیدا شود و بنحی که در هنگام اول ذکر شد صداع
 کاه کاهی شدید شود که بعد از آن اشتداد داغهای دمی دهد و اگر با در بعضی حرفت
 جویهای سستانه دهد و کلمات را پیدا کنند و چشم نمی بیند و کاه کوشش نمیشود
 و حس جلد بر طرف شود و بعضی تشنجات چند پیدا شود و نبض بطی و غیر منتظم
 و هم چنین است نفس مختل و حیرت ملمس چندان نیست و قی تمام شود و قی
 بیوست بحال خود باقی ماند بول کاه حبس شود و کاه بی ازاره دفع شود و مشک
 پشت چسبد و کم کم خنده قی بیوست پیدا شود و تمددات در اطراف بمرسد
 و سر عقب افتد و کاهی تشنجات کزازی پیدا شود و سیمای تغییر کلی پیدا کنند و
 خاصه صورت هوالا پیدا کند عرق سرد و لایح کاه در غشاء و کاه میانه تشنجات
 مرضی هلاک شود

دوام مرض و انتهای مرض اغلب در دو هفته اول مرض منتهی شود و بندرت از
 هفته سیم تجاوز کند و گاه در سه روز نیز همین اختلاف در تمام هنگامات هست
 همین نوعی در دو روز و نه امین شبان بروز کند مگر آنکه شبان نبض از ابتدا بطی است
 عرضش همیشه در میان سل بر پاست
 تشخیص ورم ساده امین تمام مرض است که با این مرض مشتبه میگردند زیرا که صد
 وقی و بیوست واضطراب و اغما و فلج در هر دو ظاهر میباشند ولی بروز و زنیقتاش
 بیک نوع نیست در ورم ساده امین این علامات با اتصال واحد و باشد بروز می کنند
 و ان اشتدادات موقتی گاه گاه در این مرض بروز کرده و بعضی را بفریاد میآورند که در وقت
 نیست بجلا و کبول و غیره بخون در ورم ساده امین مانند جمیع او را بر میآید پیش
 و اندام بروز علامت مخصوصه قیغوبند از ان با ساقی تمیز داده شود
 مقدمه المعرفه کوپا انتهای مرض همیشه برك بوده است و هیچوقت شفا یافته
 تشخیص مرض همان سوء مزاجی که مورث بروز تو بکول میباشد در اینها هم هست
 در شبوخ تاکنون دیده نشده در شبان نادر است ان سن دو تا هفت عموما مشاهده
 کرد و گاهی پس از امر از حاده مخصوص بعد از جمیبات بقوری بروز کند
 علاج ادویه ضد ورم و مصرفات جلدی و مسهلان و محلات خاصه ذبیق
 اضمه بارده بالفعل بروی سر و غیره تاکنون فائده بخشیده است ولی بجهت تنگی
 نبودن طبیبان کم است که طفل دمووی خراب و سه علت ذی لونی بگوش اندازند
 و اشتباه مبرده بروی سر کنند و کلل بخورانند و روغن خاکستری بروی سر
 کردن بمالند و نیز در صورت لزوم مسهل از روغن کرچک و غیره بخورانند
 و مصرفات جلدی مخصوص شمع ذرا در عی بروی سر اندازند
 در تو بکول دماغ

دماغی

دماغی سلی مجبج صوری که مذکور شد در دماغ ملاحظه شوند عدد آنها از دو تا
 دوازده است و محل آنها بسیار مختلف است در نیمه های دماغ پیشتر از مرکز
 او مشاهده کرد و گاهی در میان دو ماده دماغ بروز کند حرم دماغ که دماغی سلی
 احاطه دارد گاهی سالم و گاه پیخون است باشد که نرم گردد یا صلابت حاصل کند
 اگر این دماغ در بالای دماغ باشد گاه مورث ورم صفاق یعنی مشیمه گردد
 علامات و رفتار مرض باشد که دماغی سلی مدتی بروز داشته باشد و هیچ
 بهم نرسد ولی اغلب صلاعی میسرند که موضع ان نسبتی بموضع معلول ندارد و
 این صلاع گاه جلدی اشتداد نماید که مرض را بفریاد آورند و هر گاه بادی
 وضعف و مستی و بد خلقی و اندوهگینی و بعضی حرکات تشنجی از یک طرف یا طرف
 بروز کند و باشد که مانند مصر و عین بنوبه بروز کند و در یک ثلث از عرض
 حسن جلد مختل گردد و باشد که زیاد شود باصره کم یا معلوم گردد که حوله روی
 دهد و گاهی از اوقات در او اخو مرض عقل نرا بل شود گاهی هذیان و اغما پیدا
 و چون اغلب اوقات این مرض همراهی کند باسل بر به با امعا بعضی علامات دیگر نیز
 پیدا میشود که نمیتوان بخصوصه نسبت با این مرض داد بعضی از مرضا متد رجبا
 بهلاکت میرسند و بعضی دیگر در میان تشنج دفعه میرند دوام مرض نامعین است
 زیرا که ابتدای او مشکل است دانسته شود ولی پس از بروز علامات دوام از
 شش ماه تا چندین سال است
 تشخیص بسیار مشکل است زیرا که هیچ علامت مخصوصی ندارد ولی از مقدمه
 این حالات میتوان حدس بر وجود مرض نزد مثلا اگر مرض خنازیری باشد و غده
 در کلو باشد باسل بر به نادر باشد و رنگ جلد باخته بود صلاع و فلج غیر
 باشد معلوم است که تو بکولی در بدن موجود است

تقدیر المعرفه بسیار خطیر است

اسباب مرض زنان پیش از زوان استعداد دارند قبل ازده و سال و بعد از بیست و نه
نشانه است مخصوص بوزنش و اطفال است از سن سه تا ده سال سابق اسباب همان
سوء مزاج تو بگویم است

علاج علاج مخصوصی نمیتوان ذکر نمود بلکه باید دفع علامات شد بدو نمود مثلا
دفع صناع ذالواند از نزد و شمع ذواخ ولد و پیر صد وری مستعمل دارند

در سبب

سل مرضی است که از قدیم الایام ذکر شده است

تشخیص مرضی مواد دانه در سبب به بصورت مختلفه مشاهده کردند و صورتها اختلا
فند که دانه در درجه اول دانه در چنانچه ذکر شد بقدر دانه های مرز جلا جدا
با محبت عا در سطح با جوف بر پیداشوند و عدد دانه ها که کم و گاه زیاد است و محل آنها اگر
چیز جمیع جاها را بر پیداشوند بوی کنند و عروق و غلظت آنها غلبه نقطه دیر است و
بدری نقطه نزدیک بار مادی در مرکز آنها پیداشد بعد عبارت بحیطان و آنها کنند
در درجه دوم این دانه ها یک یک با معاینه کنند به نرم شدن و الت مجاور افشا
میدهند و صورتها در این سطح بر پیداشوند و آنجا که چند دانه با هم یکی شوند نشانه
که در میان آن دانه ها بود بر طرف کرد و پیر از نرم شدن دانه ها طوی نمیکشد که تغییر
در اندازه بمرسب یک طویتی دمی حاصل میشود و این طویت یک با چند دانه از سبب
شاخها با احبابا قصبه از پیر و سور رخ میکند و این ماده غجاج دفع شود و بجای او
یک حفره پیداشود که با اصطلاح مفاره اش گویند که طویت او گاه خیلی کم است و گاه
فندق در جای کبر و گاه بجای است که تخم غان یا مشت ادم بزرگ را جامد دهد و
سطح این حفره ها با صاف یا بوی یک پیر است در این صورت معلوم میشود که چند
باید بهم

باید بهم اتصال داشته باشند و گاه بعضی بر پا و بندها و پستان که آنها بنشینند و غشا
و بعضی اوقات هم آنها حاصل میشوند و اگر دیکه صمد و دشه اند و باشد که این عرق
درست مسدود نشود باعث

نرفالدم شد بد باضعیف کرد و و باشد که همین خون و بخت شده در غا و منجر شده
بواسطه فشار یک بجز مبدع مایه سد نرفالدم کرد و این حفره ها جدا نشان حاصل
شد از بیخ بر پیر که صلابت حاصل کرده و در خلل فشرده دانه های سلی بدرجات مختلفه
نموده است و بندرت جوف این غاها خالی است و اغلب در میان آنها لطیفی سفید
ذره در یک شبیه بپیم شراب و پیری از دانه های سلی وری کند هر چه دانه های سلی
بزرگتر شود شرابان ملگور از آنها و رتی کرد و و با بنواسطه خون و پیری هر چه
شدت میکند کمتر مجاور هوا میشود و غلبه برسد و جوف آنها بکفرق و پیری
موجود میشود و در اطراف دانه های سلی احاطه میکند و آنها متصل میکند و بدین
دیکه چون شرابان قصبه از پیر و شرابان اصلایع و غیره و این شرابها دانه های غان
خونبر که بواسطه شرابان و پیری تغلب برسد و ساقها و کاه اوقات دانه های
سلی بند پیر کند بماده آهکی و استخوانی از بن سپدن خون با آنها این غاها کاهی
اوقات در جوفشان غشاء کاوی پیداشود در این صورت چون محل آن در سطح بر پیر
با غشاء جنبه التصاق پیدا کند و مانده شفا می گردد

در تغییرات اتفاقا که در هر سبب پیدا شوند

اختلال اتفاقا که در این مرض در پیر و غشاء جنب مشاهده میشود ابتدای ذات الیه
ذات الجنب و التصاق و پیر است بجنب جولست غشای مخاط مجاری هوا از خلقوم تا
انتهای شعبه غلبه این مرض را می دارد و قلب مانند سایر عضلات در این پیر
کند و غشای مخاط مجاری تغذیه نیز اغلب مجروح شوند بخصوص معای و قاق

نزدیکی عروق در تحت غشای مخاط معده و قاق و غلاظ اغلب قوی کول برون می کنند و غلظ
 لمفاتیک کوه و قصبه الریه و المعاء اغلب مبتلای بدانهای سلی هستند در ثلث از حوض
 کبد مبتلا به تب بدلی چوبی که در کوبان برض کبد مخصوص مرض سلی است که در سبب او اراضی^{بده}
 نشود طحال و کلیتین و بجهن و رحم و صفاق بندرت با این مرض عرض شوند هر وقت^{بده}
 که در صفاق مزمن دیده نشود حکما سلی است کاهی از اوقات داغهای اریزنی سلی^{بده}
 شود و از قرار مشهور آلات داخلی فلشان زیاد از وزن وسطی متعارف است
 علامات مرض سلی دو هنگام بجهت این مرض فرض شده یکی از ابتدای بودن زانها^{بده}
 نرم شدن داغها و یکی از وقت نرم شدن داغها تا بعد از آن
 هنگام اول ابتدای مرض بدون سبب واضح و طوی بقدر معجم است بعضی از اشخاص^{بده}
 هزال با اینداشته مفقود و عسر النفس پیدا کنند و سرفه عارض آنها که دو و این سرفه
 کاه خشک و کاهم را می کند با نفثی صاف و ششخص خیابان می فهمد که زکام شده است و آن شغل
 خود باز نماید بجهت آنکه هنوز زانها باقی و عمل هضم بقاعده است و در برون زانها^{بده}
 شود شبها در بک عضو مانند قالم سینه و اس و کف دستها عرق حاصل شود و بوی^{بده}
 این عرق در وقت خواب است اما در وقت بیداری خشک شود و در بعضی برون زانها^{بده}
 نفث الای است خطره و نفث الدم که ماسن هفت دینه نشاء و از آن سن تا پایان خفیلی^{بده}
 نادر است در زنان پیش از مردان مشاهده شود در مردان عرق و نفث پیش از خفیلی^{بده}
 و بعد از خفیل یک پنج است در زنان از نوزده سالگی تا چهل سالگی و از چهل تا شصت^{بده}
 پنج سالگی یک پنج کم میشود و این دلیل محکمی است برای دیبالتی که میگویند نفث^{بده}
 مسلول این قائم مقام حبض میشود بعضی و جمعی و پشت پادشاهانه از یکطرف با از^{بده}
 طرف احساس کنند سبب این نوع بواسطه عروق ذات الجناب است در موضع داغها^{بده}
 و در بعضی بواسطه جمع عصبانی اعصاب بین الاضلاع است اگر در این هنگام ضعیف^{بده}
 قوی

قوی کنند چنان وقت در صدای سینه پیدا نشود کاهی یکقدری در یک نقطه محدودی صدای^{بده}
 کرد و این نقطه اغلب در تحت قوه و عافوق کتفا است از گوش دادن بعضی علامات^{بده}
 شوند و لا تعبیری در صداهای طبیعی سینه پیدا شود و یک صدای غیر طبیعی پیدا^{بده}
 که انوا موسوم نموده اند به رال اول تعبیری که در اصوات سینه پیدا میشود یک تعبیری^{بده}
 در نسبت دوام و شدت صداهای جباری چنانچه در حالت طبیعی صدای تنفس نرم و^{بده}
 ملائم و معتدل است در دام و هنگام فرو بردن نفس تقریباً سه مرتبه بیشتر از هنگام^{بده}
 بیرون کردن است ولیکن این نسبت در مرض سلی تغییر کلی پیدا کنند که دفعه^{بده}
 دوام خروج نفس بیشتر شود بحدیکه این نسبت طبیعی معکوس شود بعلاوة صدای تنفس^{بده}
 در هنگام خروج بحدیکه صدای تنفس بصوت دم و صدای و این اصوات فقط^{بده}
 در موضع معلول مسموع شوند و در اواخر این هنگام و قبل که دانه ها میخوابند^{بده}
 نرم شوند بکوال که بطنانی که کاه جبارهای او بزرگ و خشک شنیده شود که او^{بده}
 به کلمات سک بعضی تراک خشک و کاهی صدای تراک مرطوب شنیده شود و عکس این^{بده}
 جبارها کم است و شنیده شوند وقت فرو بردن نفس و در بعضی از مرضا کاه^{بده}
 اسهال روی دهد که بسته شده و کاه عود کند
 هنگام دوم مرض سلی در این هنگام سرفه زیادتر و معصب تر گردد و خاصه در^{بده}
 شبها با این بجهت مرضی از خواب بازماند و قذف از لون سفیدی و وی سبزی^{بده}
 اما کدر و بی هوا و صاحب خطوط زرد گردد و در بعضی داغهای سفید مانند^{بده}
 چغته ناداغهای پیری دیده شود بعد از آن جمیع اجزای آن مانند هم شده و در^{بده}
 پول شود و کاهی و درش بریده است مانند نشان شیر و خورشید و زرن او سنگین^{بده}
 تر شود و به تعویب فرود و این حالت عموماً چند روز قبل از موت بروز^{بده}
 و عموماً طبعی در قذف نسبت و مانند طعم متعارف با بدهان است و در بعضی^{بده}
 خروج

قد فحشته دایه شود مثل آنکه فی کند و در این هنگام نفث الدم کمتر بدیده شود و هم خط
 کمتر است عسر النفس و اجاع سینه شدت میکند و چون موضع را نمایند صد آنکه
 باشد و از گوش دادن رلهای رطب شنیله بعد از زیاد و صوت تنفس در موضع معلوم
 فانی شود و بعضی از صوت قصبه شنیله شود بالاخره برونک او فونی مسموع شود و چون
 مرض شدت کند و مفارقه حاصل شود بعضی رلهای خبیثی رشت استماع گردد که شنیله
 است بخلاف آنکه این صد که گاه میشود که از دور هم شنیله شود و خود مرض هم گاه
 میشود و آنجا که ثقبه مفارقه مسدود گردد با آنکه مفارقه بکلی خالی شود این صوت استماع
 نشود و برای شنیدن آن لازم است که سوراخ مفارقه با شاخهای مفارقه و له داشته
 باشد و خود مفارقه هم ملوین باشد انوقت از گوش دادن صوت مفارقه حاصل گردد و این
 صوت عبا و است از صدای که زبر گوش مسموع میگردد که هر چه مرض نکند از این
 موضع شنیله شود و در اطفال تا سن پنجمه الکی اگر چه غارهای بزرگ هم جاد
 شده باشد این صدای شنیله نشود علامات شنیله شوند بعلامات ذات الحجب و ذات
 الریه و تشخیص مرض را طبیب باید بطور نفی علامات مخصوصه این امراض بداند و در
 صدر بعضی علامات مخصوصه در این هنگام پیدا شود که بعلاقه هزال زیاد که در تحت
 و فوق قفوه بدیده شود و مقدار اول در چین فرو بردن نفس بجزک مانند و قطر عرضی سینه
 کم شود و سینه تنگ گردد و شنبه شوق لبینه جری اگر در هنگام اول این مرض جمعی مریض
 نبود در این هنگام عارض شود و اگر در این هنگام عارض شده بود در این هنگام شدت
 کند و باشد که اشتداد او و نری دود فیه باشد صبح و عصر بطور مواظبتین و عین
 و این جمعی و رت از زیاد می ضعیف شود زبان همیشه پاک و غطش باقتلاف و شنبه که
 و گاه فانی شود و بسبب اختلال در غشاء مخاط معده و امعاء و گاه بدون اختلال در غشاء
 ولی بواسطه سرفه زیاد و در این هنگام اسهال شدت نماید و گاه دفع شدید باز عود کند
 و در آخر

و در آخر مرض بجهت مسدود نشود و گاه مریض کند با قولنج یا بعضی مریض در مجاری تنفس
 جراحی بجهت مسدود و رت بر و ز اختلالات چند گردد و چنانچه اگر مریض مریض شود احساس
 وجع در مفاصل و غضروف در قی شود و عسر البلع عارض گشته قدری از فشار و بابت
 از مریض بزرگ گردد و چون جراحی در حلقوم بود احساس وجع در مقابل غضروف و در
 و حلقه شدت صوت متغیر شود و گاه فانی گردد و هزال شدت کند قوی فانی گردد و در
 زنان طبعت بسته شود و این اسهال دلمت اغلب از ابتداء مرض است و قوه با ما از ابتداء
 ساقط گردد و یکی از اختصاصات سعال آن است که اطفال بقراری شوند یعنی از وقت نام
 اغنا حاصل کند و عرض در ابتداء مرض مهموم است ولی در هنگام دوم این حالت
 دفع شود و طول امل پیدا کند و هیچ گاه مرگ نکند اگر چه مرض طیب هم باشد و این
 دم در ابتداء مرض بحالت طبعی است و چون دانه نام شود و در اطراف موضع
 تو بزرگ شود و نرم شده و نرم پیدا شود و عا الباف خون زیاد شود ولی این زیادای الباف
 خون تا آخر مرض دوام نکند بلکه انوقت نقصان بدین بقیه انحالط طبعی هم کمتر
 شود و کلیه ها از ابتداء مرض کم شوند و بنا بکفایت مویس و آندال میان صد و هشتاد
 میرسد و بهیچ وقت هفتاد نشود و حال آنکه در کلوزانسی هم تجاوز نمیکند و همیشه
 چون خون در طرفی بماند و غلظت پیدا کند غشاء کاذبی که در دو و خون منور
 بسته میشود در اینجا هم بسته شود سابق بر این چنان گمان میکردند که چون زن
 حامله شود سعال بحالت خود میماند و پس از وضع حمل شدت پیدا کرده زود ابراهام
 کند و این چنین است با اعتقاد اکثر معاصرین عرض جمعی از ابتداء مایه اشتداد افتاد
 مرض میگردد و در قاعده غلبه اوقات بطور انهمان است و بطور اتصال و با
 که چند دفعه بهبودی در حالت مریض پیدا شده پس از زمان چندی و باین شد
 نماید تا آنکه مریض بحالت دسل و کاه و اوقات مدیدی مریض بحالت کمون است

که مرض دوزخ و زهر و زرق است و غارهای بزرگ حاصل شده و ناله سرفه
 مرض شود با وجع احساس کند و طحال حاصل کند و اسهال عارض شده و قی
 اسکا و شود و باشد که دقار مرض بطور حاد و زهر نماید که در شش هفته ای و ماه
 مرض هلاک شود در این صورت مرض بیشتر در اطفال مشاهده شود و در سالی
 عروص و زهرش پس از حیات حاده است مثل ذات الجنب و ذات الیه و سینه
 و تبغوبند و بندرت دقار مرض مانند تبغوبند است که صلح شده بد عارض
 سیمای حافت خوابهای پریشان و هذیان روی دهد و دندانهای باره سیاه
 و قدری قراقر و خاصه این ظاهر شود و حرکات بی اختیاری او تا در روی
 و نیز نبضات از قبیل بی ثباتی و اگر مزولکهای حصبه در جلد بروز کنند
 دوام مرض دوام این مرض زیاد است خاصه در شبان و شبونخ چنانکه تا چهل
 سال هم دوام کند ولی اغلب از ده سال است و در صورت حاد و باشد
 که یکماه بیشتر دوام نکند
 انتهای مرض قله چنان مبداء است که انتهای این مرض بطور لوفم علا
 است و معاصرین دیده اند که مستحی شفا نمیشد است
 ترکیبات در چنانچه ذکر شد جوهرات عجایب تغذیه و تنفس و ورم مزمن
 که با قوی کول باشد و نیز ورم امین سلی از انجمله پاره شدن مایع و کوی و جویان پر
 از مجرای خارجی کوی و بین متورم شدن غده جذابه و سورخ شدن و به است
 نیز ترکیب ذات الیه و ذات الجنب است
 تشخیص مرض در هنگام اول مشتبیه بود با ناله و طی بواسطه موازنه علا
 بخوبی تمیز داده شود مثلاً چون سرفه بلا جهت عارض شود که خشک باشد و
 دوام کند یا آنکه قند فی خارج شود که با کف و سفید باشد و مدتی بماند و
 و قوی

دقارش تغییر نماید طیب با بدست مرض سل زند و ناله که در ناله و به پس از
 چند روز ناله نشت تغییر نماید که با اصطلاح عوام گویند بلع نخته میباشد هم
 چنین حلس بر وجود مرض سل بیشتر زده شود در صورت هزال مرضی
 آنکه محی علت دیگر موجود باشد و بنی حلس بر وجود سل بیشتر گردد و در صورت
 نفث الدم روی دهد و اگر علامات قوعه و سمعه بطوریکه ذکر یافت پیدا شود
 تشخیص ثابت است و گاهی از اوقات تمیز هنگام اول مرض را بطور نفی میتوان
 داد تمیز مرض در هنگام دوم آسان است زیرا که بعلاوه صفات قذف و هزال
 و اسهال و از قوع و تنمع علامات مخصوصه و بدست میباشد و سل حاد هم
 بواسطه عدم علامات مخصوص ذات الیه و ذات الجنب و غیره باسانی تمیز
 داده شوند و بنی چون بصورت تبغوبند بروز کند بواسطه بنون قراقر و لکهای
 علامی در عاف و غیره تمیز مرض داده میشود
 تقریر المعرفه تقریر میا کل مرضی هلاک شوند ولی دیده شده است خاصه در
 هنگام اول که مرض دفع شده است عروص بعضی علامات مانند نفث الدم
 مکرر و صبحی شب و عرق زیاد و اسهال بر خط مرض میباشد
 اسباب از مسائلی که حل نشده یکی سبب سل است ولی بعضی سبب
 مستعد و بعضی اسباب محصوله بجهت مرض ذکر شده اند از اسباب مستعد
 یکی است که در جمیع انسان مشاهده میشود ولی زیادی بروزش موافق
 پادرس از این قرار است اول از انبست تاسی و بعد از نسو تا چهل و بعد از نفا
 پست و بعد از چهل تا پنجاه و بعد از پنجاه تا شصت و بعد از تولد تا سی
 و بعد از شصت تا هفتاد و بعد از هفتاد تا هشتاد و بعد از هشتاد تا
 نود و بعد از نود تا صد در زنان زیادتر از مردان است اگر چه اشتیاق قوی

المراج هم مبتلا میشوند ولی عمد و زور و جراحت و جراحتی است در بلد بک سبب
و سفید هر دو مسکن داشته باشند سببها بیشتر مبتلا شوند و یک عشر
از مرض بطور اذیت مبتلا اگر چند در هر دو و زور و جراحتی است
در بعضی مواضع بیشتر است مثلا در سود و از اموات مسلول و در بدن و لذت
و پادیس که هواشان کوفتر است و در المانی خیلی بیشتر از بطور زور و جراحت
خیلی کمتر از شهرهای بزرگ یافت شود و طوبی منزل و فقر و افول و کارهای
ضروری و مورث و زور و جراحت و چون در شهرهای بزرگ این سه فقر خیلی
معمول است با قیاس و سطر بیشتر است

اما اسباب محصور سابق و زور و جراحت را یکی از اسباب مرض مبتلا نیستند و
چنین است تحریک غیر و جراحت بیشتر سبب مرض است مثلا در افول معلوم
که نسبت سل با و از این نسبت میباشند ولی در زور و جراحتیها این نسبت
میباشد که از بطور یک خسته نکند که با معین باشد سابق بر این نفت الدم و یکی از
اسباب مرض مبتلا نیستند ولی برخلافی است بلکه سل موجب او شود و کارهای از او
این مرض سل پس از جراحت و زور و جراحتی خاصه پس از جراحتی تفویذ و سرخچه و ابله
گاهی زور و جراحتی بواسطه اسباب ضعف بدن مانند باسپوس و سیلان شیر
و غیره و سابق بر این چنان تصور میشد که مرض سل سری است ولی معلوم
شد که نه چنین است

علاج ذکر شد که شفای مسلول بحال نیست ولی باید مقرر شد که علم ازین
این مقصد جاد و یقینی حاصل نگردد در اینجا معالجات مستعمله در این مرض را ذکر
دادیم اول ادویه ضد ورم است که بسیار استعمال میکردند ولی جمیع اشخاص
تجربه کردند که حال دانسته اند که بجز از رفع بعضی علامات و ترکیبات مرض
چون

چون ذات الجنین ذات الوبه ثری ندارد مگر ضرر خاصه فصد که خیلی مضر است
میان ادویه جات کل بطور دکان در این اواخر بسیار استعمال میشد ولی انهم
حالا متروک است نفع طعام بمقدار منقسمه از دو تا هشت گرم هر روز بخورند
چند در آب چه در زمان سوکریات و بواس و فوئاس و فوئاس و در شربطال و اسید سبب
بند و یک و بد چه بخورند و چه باستنشاق مفید بنفعا دهند چنان است غلظت
و بلساها و املاح کوکودی و ابهای معدنی و مسکن در طول و کنا و در پادیس
بد و رد و ف و چند سال است که روغن ماهی پدید شد و در مرض سل مستعمل
اگر چه دفع مرض را نمیکند اما خیلی تسکین میدهد و مدتی مرض را بحال خود نگه
میدارند و نمیکند از ترقی کند بهتر است در مستعملین به سل روغن ماهی را قبل
بخورند و بولا بات گرم سپرد و در چشمه آبهای معدنی بپزند که هم از آنها بخورند
و هم استعمال در آن نمایند و بهتر از همه ملاحظه شده ضروریست که در منزل خوش
منزل دهند و غذای خوب بخورند بعضی سراغ بخورند اما تغذیه با شیر حی
مدتی طول کشید معده را بقوت کند بعضی علل پیدا شود مانند اسهال و غیره
لهذا بهتر است که غذای قلیل المقدار و کثیر الکلیفه

علاج ضروری در هنگام اول راحت دهند مرض را و مشروبات الحار و قوی
مستعمل چون انجیر و خرما و عناب و سیستان دهند گاهی هم شیر دهند اما کم
لحم پخته بخورند و ادویه حره و عطره چون اسطوخودوس و کلینق و ادویه جات
نبی مستعمل است هم چنین ادویه افیونی نیز خوب است و بجهت عسر النفس
اسید سینا بزرگ بکار برند و بجهت کم کردن عرق و اوجاع صدری بعضی
ادویه مخصوص لازم است مثلا بجهت نفت الدم در اشخاص قوی المراج فصد
لازم است ولی اگر ضعیف باشند باید قابضات بکار برند چون عصا و زیتا

و مطبوخ کاشو و اشربه جامضه و حب زجاج سفید و شور و سبک کوبه و در غریب
و عقداطراف لازم است و اگر با پنهان رخ نشد بخ و آب سرد با حجامت بزرگ بروی
صدر رکذارند و بجمعه اسهال چونکه سبب و اغلب بروز دانه های سلی است در
امعا باید مقدار غذا را کم کنند و غذاهای کم فسله دهند و بعضی مشروبیات
چون آب پنخ و غیره بخوراند و اما له اند سفید تخم مرغ و لوبانم بکنند و شور
و و پیوت و شربتهای تر پاک دلو بکار برند و از برای تحریک قوه معده ادویه
و دوائ جوش و آبجای معدنی مستعمل اند و خودی است که قبل از هر غذائی پاک
کرم پین بخوراند و اگر سبب اسهال نرمی مخاط امعا باشد و باقی هر چه کند
اب و بشی بخوراند کم کم و قدری تر پاک و مشمع مفرج روی معده اندازند و بجمعه
کم کردن عرق سوز استات و دلباب از پاک کنندم ناد و کندم شنبه بخوراند و هم
نافع است مطبوخ پوست کنه کنه و عاققوهای سفید و اگر عسر النفس باشد با
و سبب جمع شدن رطوبت در شعب قصبه باشد شربتی از بلبان پول بخوراند
یا اگر مس با سبب عسل و از هر جهت را بکار آید می باشد و هم نافع است انداختن
ضماد های محر که چون خردل در مواضع مختلفه و بنوع پاک و بلاد و و نافع

در سبب قصبه الیه

بروز دانه های سلی در غده شاخه های قصبه الیه که در نصف اموات سلی جوان
ملاحظه میکنیم در مرضی است ثانوی و چندان در حین حیات معلوم نباشد و در
اطفال همیشه با سبب ریه همراهی دارد و مرث بروز بعضی علامات مخصوصه
با بنواسطه لازم است که مختصری از این مرض اطفال بیان شود

تشریح مرضی دانه های سلی در غده شعب قصبه عموما بطور نفوذ است و ابتلا
این غده از مرکز محیط است و این دانه ها بطور یک در سبب ریه مدکور شد

پس از

پس از اندک زمانی بزم شوند و غده مبتلا شده بچشمان زیاد شود که بقدر شاه بلوطی
بشو و غده مبتلا شده عموما از پنج و شش بیشتر نیست و گاهی هم غده اطفال زیاد شد
بیکدیگر نوبت یک شده بقدر سببی حجم حاصل کنند و این حجم مخصوص است بغده و آنچه در
شعب قصبه و دانه ها که در میان شاخه ها هستند هرگز بچشمان زیاد از قدری نمیکند
و این غده عموما در میان کبسه نازکی هستند و آن کبسه ملتصق میشود با دانه های سلی
این دانه ها چون مجاورند با آلات مختلفه فشار بر آنها میدهند و هم با آنها ملتصق گشته
در جوف ان آلات ریخته میشوند چنانچه در یک شاکه در میان او رقی باشد و آن
با و رید شربانی با الجوف اعلی کسوده شده است و هم چنین فشار میدهند بشعب قصبه
و ریه و عصب ریه و معده و عری

علامات و تشخیص مرض

از قوام یک بکیت مصنفین مسطور است هیچ علامت مخصوصی که بجز این مرض باشد نیست
مگر اختلا لای که حاصل میشود در اعمال احشاء مجاور بواسطه فشار ماده و چون ساق
ها از فشار بر الجوف و مجاری هوا و مری به تفصیل بیان نموده ایم در اینجا از آنها گفتگو
نمیشود از فشار بعقب ریه و معده صدای سرفه و از متغیر شود و بعضی عملها
احتشای عارض میشود و سرفه شدید سپاه سرفه حاصل گردد از سبب غده شاخه های قصبه
باشد که بعضی اختلالات در اصوات ریه بمرسد مانند آنکه صدای تنفس سخت شود
و مدت خروج نفس طول شود و صدای دم قصبه پیدا شود و استماع این اصوات مخصوصا
در اعلا ی صند و طهر است و بروز این علامات سمع و فشار بر احشاء بسیار میباشد
و بطور نفیبه است بواسطه تغییر وضع تشخیص و غیره و با بنواسطه تغییر این سبب
مشکل است خصوصا چون اغلب همراهی کند با سبب ریه و فقط چنانکه اختصا می کند
علاماتی است که از فشار بر احشاء و آنچه در ریه پیدا میشود

نقد المعرنه اگر چه از امراض خطرناک است ولی خطرش کمتر از سلسله است
اسباب این مرض جمیع من طفولیت مستعد عرض این مرض می باشد پس هائاسن بازده بیشتر
مستعد عرض می زند و در سن بلوغ فرقی پیدا نمیکند
علاج مانند آن است که در سلسله مرده مذکور شد
سل غده امعاء که بفرانسه کاروگویند

کاد عبادت است از عرضی که متصف است بجز و ضایعاتی سلی در غده ماسا سقا
تشریح ^{مورد} غده ماسا بقایونک میشود که از قدر خود تا شاه بلوط شود بعضی
سخت با نرم از اجتماع چند غده در شکم پیدا میشود که چون شخص چندان سمن نداشته باشد
از پس احساس می کند و این مواد شاه بلوطی می تواند بشود و غده غده مبتلا شد
از پیچ و شش بیشتر نسبت و گاهی هم غده آنها زیاد شده بیکدیگر فاذل شده با متحرک اند با
غیر متحرک در ابتدا چون انغد در آید و انهای صغیر سلی در جوف آنها دیده میشود
که هیچ آلت فیمابین آنها سالم است ولی با اندازه که مرض ترقی میکند و آنها بزرگ شد
نزدیک شوند بالاخره جمیع غده تغییر حالت پیدا کند و شبیه شود به شاه بلوط
که پوست او بست کنده باشند و باشد که این مواد یک کپسه درج و در شان می رسد
و نرم شوند و گاهی تبدیل شوند بماده آهکی و عموما صفاق سالم میماند اما همیشه
مرض هر ای دارد با بوز و انهای سلی و آلات دیگر مخصوص در ریه و امعاء

علامات ابتدای مرض مجهول و اغلب از عرضی و گشای باخته شود و ضعیف
شوند و آلتی مبتلا با سهال هستند پس از مدتی شکم آنها بزرگ شود و اگر سمن
زیاد نباشد چون سمن نمایند بعضی انهای صلب بچرکت با متحرک در قریب
باقی که احساس شود و از فشار بر آنها احساس جمیع نشود مگر بندرت و در
اغلب مرضی سهال عارض میشود و سبب این سهال وجود جراثیم است که
که باین

که باین مرض هر ای دارد اشتی که بحالت طبیعی و گاه کم میشود زبان قریبال است و
هیچ وقت قی عارض نمیشود و چون شدتی در مرض باشد حتی وقتی عارض شود هنوز
و تحول و روی دهد و اطراف سافله بالنسبه لاغری تر از اطراف عالیه گردد و اغلب
اوقات سبب این علامت خطرناک وجود انهای سلی است در االت دیگر مانند ریه
امعاء و انجا که غده ماسا بقایونکها می باشد است و اغلب هیچ اختلالی در خراج پیدا
نمیشود چنانچه دیده شده است بعضی از اشخاص که در نهایت صحت خراج بوده اند
و بواسطه بدون مرض مرده اند و در تشریح ظاهر شده است وجود انهای سلی و غده
ماسا بقایونکها مانند سیدله دردی که کشند در عین سلامت و آنکه اسهال
در ماسا رقیای او شصت غده مبتلا شده بحجم مختلف پیدا کرد و میل قی یکد و خفزی
در نهایت صحت خراج بود و در االت سوخت پس از پنج ساعت مرده و از ده ماده سلی
در غده ماسا رقیای او پیدا کرد

دقتار و دلم و انتهای مرض دقتار این مرض بسیار بطی است و تعیین و نام
وسلی او هم محال است بشود و انجا که مرض مختصر یا مبتلا ی غده ماسا بقایونکها باشد
اغلب منتهی بقایونکها گردد و چون اغلب اوقات مرض هر ای دارد با سوء خراج
و ترکیب است با سلسله ریه و غیره منتهی بمرک خواهد شد

تشخیص مرض بسیار مشکل است تشخیص مرض خاصه در اطفال و فقط علامت
که مخصوص است از برای وجود مرض وجود انهای سلی است در غده ماسا
نقد المعرنه انجا که این مرض بدون ترکیب باشد و در هیچ آلتی و انهای سلی
موجود نباشد اغلب منتهی بشفا میشود و هر چند سن مرضی بیشتر خطر
مرض کمتر است و وقتیکه غده دخلی بزرگ و حی و قی و سهال و هزال بهم
رسد منتهی بمرک خواهد شد

اسباب مرض قبل از سه سالگی تقریباً دیده نشد و اغلب عروضش از سن پنج تا ده است و از ده تا پانزده نادر سپرها از دواخته ها مستعد ترند و سابقا چنان است که در عوم سوء القبه سالی بیان شد

علاج اول باید سته ضروری را اصطلاح نمود که در اطاق خوش هوا و روشن منزل دهند و دلاک معطر و خشک بجلد کنند و استیام در آبهای شور و کوی و بدی نمایند و اعذبه مقویه باندازه قوه هاضمه شان بدهند و املاح چندین بخورند و مقویات قویه و مسهلات و املاح رقیق و غیره مصرفند و غن ماهی و بدی و پونا سپوم مستعمل است

در بزرگسالان سلی در کلبه

تشریح مرضی دانه های سلی خاصه در اطفال جمیع صور مذکور در کلبه بزرگ کنند و اغلب بزرگان در ماده قشری کلبه است و گاهی یک کلبه دانه های سلی را احاطه کند

علامات آنجا که دانه های سلی را می بینیم و سابق مجاری بول نداشته باشد یا غیر او محال است اما چون دانه های سلی نرم شوند و در کلبه آنها با حوضه کلبه کشی شوند داخل بول شده از مجرای خارج شوند که در هنگام بول کردن ادراک کنند کل الود است و چون بماند دانه های واقع در آن را سبب کردند که چون با ذره بین انداخته امل خطه کنند کلبه های غالی و گاه کلبه خونی تمیز داده میشوند بعلاوه بکاماده آلی که در قشرهای ابدی حل نمیکند و مانند آنکه املاح قویه فغات و اورات که مرصوب در بول میباشد در قشرهای حل میگردند مقدار این ماده مرصوبه بالنسبه کم تر یا بیشتر در فاصله شب و روز بلکه در هر فاصله بول کردن و قشکه این علامت در شخص مسلول باشد باید حدس زد که کلبه هم مبتلا شده است و

اسباب

اسباب مرض بطوری است که سابق ذکر شد و علاج هم نداده بجهت ناشناس ماندن او

امراض خفازی مالا دی اسکی فولین

این مرض عبارت است از مرضی خراشی که هر احوی میکند با اختلالی چند در آلات لبه و عظام مخصوص بوزنش به بزرگ شدن عروق جذبه است بطور ارفان

تاریخ مرضی از بقراط تا کنون جمیع مصنفین با مسام مختلفه از این مرض ذکر نموده اند

تشریح مرضی اغلب اوقات بلاجهت غده تحت فک اسفل و غده طرفین کردن حجم کردند و همین تغیرگاه سرایت کنند بغده شاخهای قصبه و بینی و بزرگند غده ما سارپقا و غده زیر بغل و کشاله ران و حجم این غده از قد زندق تا تخم مرغی شود و درجه اختلال این غده مبتلا شده مختلف است که بعضی صلب و بعضی نرم و برخی شبیه بکوبشت کوساله خخته و شسته شده شوند و در میان آنها دانه های سلی متفرق با جمیع دیده شوند و این دانه های جمیع حالات مختلفه مذکور مرئی شوند و اغلب آنها بول نشسته کشوده بخارج کردند و صورت ناسورهای چند کردند و جلد موضع صالح کردند

الآت مجاوره با غده بینی بزم نشینند و بعضی صلا بتهما حاصل کردند و عظام خاصه عظام اسفنجی مخصوصا عظام در مع و مشط از دست و پا و انا مل و اندام تقفا و جز مفصلی عظام طویل مبتلا بوزرم عظم و وزرم ضریح و قرحه و زرمی کردند و در آنها دانه های سلی بحالات مختلفه مشاهه کردند و چون اغلب این امراض متعلق بحال است در اینجا مفصلا از آنها ذکر نخواهیم نمود و اشنا صبله از این مرض میبرد غالبشان دانه های سلی در آلات دیگر خاصه در ریه آنها مشاهه شود

علامات اشنا خفازی جلد سفید و نازک و براق و پشت کلی کمرنگ است و در اغلب اندک فرجی دیده شود و اعضا پشان مدور است و فک اسفل آنها عرضی شبیه بمریج میگردد لبها و پره های بینی عریض و جنتین برآمده و

مفاصل بزرگ و قد کوتاه یا خیلی دراز شود سر بالنسبه بزرگ باشد و از طفولت این
اشخاص مبتلا گردند بگرام و رهد و سبلان دیم از کوش و اسهال و نبضات حجاب
با حجاب ریجی در جلد مخصوص در جلد صورت و سر و خلف کوش و غوث عضلات
در اعضا کم است و در دست و شونده و آلات تناسل و هضم کم قوت اند و شخص
بالغ شود در زمان حیض و پریود نکند و با سانی سقط جنین کنند
علامات و قیام مرض علامت موضعی است با عمومی موضعی که مختلف است
با اعتبار محل آن است که در ابتدا ی مرض است از قبیل تهیج سفی شکل غده در
فک و کون که بوجع و متحرکند و از هم جدا که طول نکشند بزرگ شده هم
منفصل گردند و گاه چنان بزرگ شده که محور عرضی بدن از حال طبیعی و چندان
شود و گاهی انقدر بزرگ اندازد مانند و گاه تحلیل روند و گاه نرم شد بپیم
بهر حال چون حس قوی در آنها وجود پیدا کند و سرسید کشنده شوند و ری رقیق با دانه های
پنیری شکل خارج شود دهن زخم گاه بسته و گاه باز و گاهی ناسور شود چنانکه
جلد ناسور نازک و کبود و منسلخ گردد و هرگاه زخم ملتحم شود از جراحات
با بلند و پستی همیشه باقی است ممکن است سایر غده هم متعجب شوند و ممکن
بطور جذامی در صورت بروز کرده او را فانی کند و بنی دملهای بارد و زرقاط
مختلفه بدن بروز کنند و بعضی از مفاصل متورم شوند و نیز ضریح و عظام
متقرح گردند با نرم شوند و در ابتدا ی بروز علامت موضعی و گاه قبل از بروز
انها دنگ مرضی باخته و پرموده شود مزاج ضعیف گردد و در اغلب سوء هضم و اسهال
عارض شود و عدد کلبولهای خون نقصان پذیرد بول بزرگ و رقیق شود و در
مخصوصی کم گردد و این علامت وقتی در او پیدا شود که مرض ضعیف شده با
و در صورت قوه توشیح کم شده و وزن مخصوصی باقی شود و نرا در کوه و گاهی هم
بیاضی

بیاض السیف و آن بافت شود و از آنچه ذکر بافت هزال بافت شده قوی فانی
در صورت ترکیب با ملزیمه و غده قصبه حج و قی و قول عارض شده مرض
هلاک شود در صورتیکه غده مبتلا شده کم باشد و پیشتر که مرض متعجب
گردد که گاه رطوبت غده جذب شده و با اغلب بپیم نشینند و پس از خروج دیم
خشک شود و باشد که مواد متعجبی بصلابت حالت آهکی گردند و انجا که عظام مبتلا
شده باشند عسر العالج گردد و محتاج بجرّاح شوند و چون مرض متعجبی شفا
پیدا نشود و بصورتی بسیار طولانی خواهد بود و بعضی تغیراتی که در مزاج پیدا
مانند رسیدن مجد بلوغ یا عروض یکی از جهات از خوب یا اویزد در این مرض ممکنند
و اغلب ابتدا ی عروض مرض در بهار یا آخر زمستان است در بهار شدید شود
و در تابستان خفت یابد و گاه بعدی خفت در تابستان حاصل کند که مشتبیه
بصحت شود و در زمستان و بهار دفع این شیب را میکنند و هو قدر شفا کامل
شود نادراست که مزاج مرضی بکلی سالم گردد و با بواسطه طولی نکشد که مرض بصورت
دیگر بروز نکند
تشخیص مشتبیه شود با تهیج در غده جذامه انجا که تهیج و رمی باشد متعجب شود
اناسیاب بحر که مثلا غده کون و تحت فک اسفل متعجب گردد در اطفا که بشیر یا
کلی در سر نشان پیدا شده باشد بخلاف در تهیج خنازیری که بخودی تهیج گردد و بعلا
اگر و رمی باشد موجب است بخلاف در انجا و جمع ندارد اگر هم باشد بواسطه ترکیب
با ورم است و انجا که غده جذامه بواسطه مرض مزاج متورم شود همراهی کند با دانه
متعدده و در بعضی حصول انحاء ذکر شد و بعلاوه دیم او را اگر بچپوان دیگر بگویند
مبتلا شود بپیراجه و بنی همراهی کند با پاک بند ی دانند
تقدمه المعرفه از اعراض خطیره است و خطرش زیاد و کم شود بواسطه کم و زیاد شدن

tarikhema.org

غده مقومره

اسباب در تمام اسنان دیده شود و اغلب عرضش در اطفال مابین ۵ تا ۱۰
اول و دوم است و در شیبوخ نادر است و طوبت منزل و عدم آفتاب و غده
و اجهای برف از اسباب مستعد مرض میباشد و از همه اسباب قوی تر می باشد
است و نه آن است که تمام اطفال بلکه از پیر و معاد رخسار بوی بعمل ایند خدا

باشند

علاج مرضی بهترین معالجه حفظ سته ضروری است مثلاً در هوای خشک و خنک
و منزل پاک و با آفتاب و غذاهای مقوی خاصه کباب و حبوبات بسیار و
باقدم کنند و لباس پشمی بپوشند و کاهکاهی بدوزند و استحماد در آب
گوگردی و آب دریا و اجهای معده نمایند و بنی استحماد در اجهای بوم داد و دید
کنند و از این اجهای مذکور بنوشند و مطبوخ بک کرد و با عصا و او را بخوراند
مخصوصاً از خاج و داخل لازم است و بهترین املاح بدو بتوید و در و فر و بدک
دو تو با سیم خواهد بود و مقدار شربت بتوید و در و فر و بک خود با هشت نخود است
و بدو در و تو با سیم را در اطفال از یک نخود تا هشت نخود و در مردان از پنج نخود تا
یک مثقال استعمال کنند و بعضی از اطبا کلو در و از می خوراند و لی اثنی عشر
خوب معلوم نشد و در استعمال آنهم وقت لازم است معالجه موضعی بجهت
تجهع غده و عظام نه هین با روغن زیتون که یک پیستم وزن آن هیدر و کلات
و مونیال اگر داخل کنند عمل جذباتش بیشتر شود و بنی نه هین روغن بد مستعمل
و جواحت را با شراب و مطبوخ پوست کنه کنه و غیره بشویند و برای جواحت
و رمی عظم و سلخ جلد بعضی معالجات جراحی لازم است که بیان آنها در کتاب
جراحی شده است یا میشود

در سرطان

در سرطان بطور عموم که بفرانسه کانسر گویند

سرطان عجله و تازمینی است تا زردی و هیچ شباهت با سبب بدی که سبب مایل
با فساد و فرا رفتن اجزاء مجاوره و چون او را بپزد او زرد و باره اغلب عود
کنند چه در موضع چه در موضع دیگر و از امر اخصی است لا علاج و اثر کلی در رخسار
انسان میکند و حاصل میباشد سوء خراجی را که سوء خراج سرطان گویند

تاریخ مرضی حکمای یونان بواسطه شباهتی که در آورده مواد سرطان با پاهای
خوچک پیدا میشود این اسم را با دغا دند کو یا بعضی را هم عقیده این بود که یک
حیوانی از جنس خوچک پیدا میشود و بدو را میخورند از زمان البقرطالی حال جمع
مصنفین از این مرض گفتگو کرده اند ولی مخصوصات تشریحی و از پنجاه سال
قبل بنای شناختن را گذارند از جمله اطباء انگلیس بنیم و این بنی و از حکای ابطال
ادکاپا و از حکای فرانسه دو کامبه و کور دلبه مصنفین هستند که در این مرض بسیار
گفتگو نموده اند و صفات تشریحی او را بخوبی شناسانده اند و چند سال است که
بواسطه ذریب بعضی اختصاصات در مواد سرطان پیدا کرده اند و با این همه مواد
چندین که تاکنون از امراض سرطان فرق داده نمیشود فرق میدهند و این مرض
بودن نوعی تقسیم نموده اند نوعی را اسقروس و نوعی را سرطان صلب و فی سرطان
سرطان نرم گویند و حکای انگلیس این نوع را دو جنبه دانند ولی سایرین یک مرض
دانند ولی بدرجات مختلفه و از این دو نوع بعضی صوری دیگر بجهت لون و شیخ
و غیره فرض کرده اند که بعد از کوش خواهد شد

تشریح مرضی شیخ اسقروس که صاف و کاهی نا هوا را است کاهی از اوقات مجم
الت زباد و کاهی کم شود و لون آن سفید رنگ یا مایل بکبودی است قوام آن بیه
خون تا حالت غضروفی است و قتی که بخوراند او را بپزد و مغاوت مخصوص می باشد

اذا شنید شود قبل از آنکه اسقبر و سرخرم گردد اگر موضع بزرگ شده و ملا خطه کنند
 يك شنج مخصوصی سفید رنگ بارمادی و نیم شفاف ملا خطه گردد و این شنج حاصل
 از دو چیز یکی پاجن البیضی و دیگری لبضی است که انما ده سپاخ البیضی در فاصلها
 شنج لبضی ممکن شده اند و شکل او کاهی شنبه است بخانه دینور و گاه الباقی بطور
 بندها از خرک باطراف کشیده شوند و این تارهای لبضی کاهی از ماده سرطانی بخاک
 کنند باین واسطه اختلاف در میان مصنفین پیدا شد که بعضی کابل شده اند باینکه
 این الباقی حاصل شوند از تبدیل غشاء الحامی و برخی باینکه شنجی است تان اما
 در ماده بیاض البیضی هیچ اختلافی نیست که ماده ایست غیر طبیعی که بعد از بی
 اسقبر و سرخرم با کشیدن چاقوی روی موضع این ماد خارج میشود و این
 شیره سرطانی گویند در اسقبر و سرخرمها خیلی سخت عروق مشاهده کردند و در آن
 بوزن عمد و اسقبر و سرخرم متحرک است ولی متدججا با آلات مجاوره التصاق پیدا
 کند و از حرکت بیفتد در این هنگام بعضی مواضع اولین شود و شبیه شود بزرگ که
 قدری خون داخل شده باشد طین نرمی مخصوص حاصل شود در نقاط مرتفعه
 آن و متدججا سرایت بجلد با غشاء مخاط مجاوره و سرخرم و سرخرم و سرخرم و سرخرم
 گردد و وسعت هر تفرق اتصال مختلف است و در سطح آن بعضی انگای رهای
 با بنضی پیدا شود و در میان آنها طوبی تند و متعفن بجرسد و بندرت نفوذ
 الدم در موضع عارض میشود و اطراف این جوارح صلب یا بکشته یا بویله است
 اسقبر و سرخرم عارض شود در رحم و آلات غددی چون پستان و بیضه چون اغلب
 بوزن و سرخرم است که حرکت است از غشاء الحامی و لبضی باین واسطه در معده
 و مستقیم بشیر و سرخرم

تشریح سرخرمی سرطانی دماغی شکل
 این نوع سرطانی دماغی ایران گویند که



جم

جرم او شبیه است بحجم دماغ اطفال و از برای این سرطانی نیز و هنگام است هنگام
 اولی که ایام خاهی و ناری می نامید میشود شنج و بحجم مختلف و سفید و نیم شفاف و شبیه
 به پیر خورک است و چون فشار بر او دهند یا پشت چاقی بر او کشند و طوبی سفید
 شیراز آن خارج گردد و در هنگام دوم که جرم سرطانی نرم میشود شبیه شود بخرم و گاه
 هم احساس غیج حقیقی در او شود و چون او را بیزند يك شنجی هم موثر در بعضی
 الاجزاء سفید رنگ از آن خارج شود که قدری رنگهای پشت کلبی در میان آن
 مشاهده شوند مانند آنکه چون مغز اطفال را میزنند مشاهده کردند و شنج سرطانی
 نیز حرکتی است از دو ماده یکی شنجی است الحامی و یکی لبضی که در فاصلهای آنها ماد
 دیگری است سفید رنگ شیری شبیه عاده دماغی که چون فشار دهند از میان
 شنج لبضی خارج شود در میان ماده سرطانی دماغی بخلاف اسقبر و سرخرم و سرخرم
 و در پیدی بسیار هست سرطانی دماغی باشد که در میان جرم آلات نفوذ میکند
 و آنها را فرا گیرد و گاهی از اوقات مخاط است از کسبه و حاصل کند ماده بسیار
 عجمی که گاه مد و ر و گاه قطعه و کثیر الاضلاع است و موسس و سب و سب و حکایت کند
 از سرطانی که بوی ران شخصی بود که حجم او مساوی بود بدن بحجم يك نفر آدم
 الحلقه و این سرطانی اغلب اوقات مجروح شود و بنفش رنگ شود و وسط آن بوی
 شود از تارچه های حیوانی و از آن بکر طوبی عفن خارج شود و گاه کاهی قطعه
 بزرگ از آن جدا شده پیفتد و بواسطه کثرت عروقش نفوذ الدمهای شده
 عسر العالج روی دهد و این فرض در جمیع اسلج و آلات بدن بوزن کند و بوی
 اختلاف قوام و لون چندین قسم از برای فرض کرده و بزرگ اسم مخصوصی داده
 که بیانشان حاصلی ندارد مگر يك نوع آنی که بعد از کوفته می خواهم غوی و سرطانی سرخرم
 نامیده شده بجهت آنکه در میان شنج آن و طوبی مانند سرخرم جمع میشود

بعضی از مصنفین او را سرطان جدا نموده بجهات چند اقل بواسطه فقدان
هنگام حامی و نارسایی و هم بواسطه فقدان عروق در جرم او سم بواسطه ندرت
حصول جراحت

علامات یا نشانه‌های این مرض بطور عموم مشکل است و علامات موضعی او
بجست مکان و اتفاقات دیگر بسیار مختلف میشود اینجا که بروز مرض در آلات
غایبه باشد بعضی اختلافات در اعمال پیدا شود که هیچ وجه اختصاصی
ندارد و اغلب بروز آنها بواسطه فشار اورت یا الت مجاور است گاهی
در ابتدای مرض یا چندی پس از بروز او یعنی پس از چندی که سرطان
معینی پیدا کرد و دفعه واحده اختلالی پیدا شود در بدن مانند نفخه و غیره
این نفخه و الت اگر در ابتدای مرض یعنی قبل از حصول جراحت عارض گردد سبب
عروض او را نمیتوان بیان نمود مگر بواسطه تشنج خون مجاری عروق و در موضع
معلول چه در هر یک که هنوز سالم است و اغلب عروق نفخه و الت هنگام بروز
است مخصوص اگر جمیع عروق گردد و یکی از علامات که از سرطان بروز میکند
وجع است و این وجع اغلب متصل و ناخصل است گاهی بدو انتظام شدت
و اینجا که وجع خیلی شدید باشد و در قوای شخص تحلیل رود و زود تر هلاک
گردد و اغلب شدت وجع بعد از عروق جراحت است میشود که در ابتدا
مرض وجع هیچ بروز نکند بدانکه وجع یکی از علامات مخصوصه سرطان
نیست و بسیار دیده شده است خاصه که ان سوء القنیه سرطانی هلاکت
اند و املا و جوعی در آنها نبوده و اینجا که سرطان در آلات رئیس نباشد
گاهی میشود که یک جمیع زبانی بجهت ساند بدن آنکه هیچ اختلالی در عمل
تخلیه بدن حاصل نشود در این صورت هم مرض به هنگام نوبت وجع
میرسد

میرسد

شدن بودی خراج فاسد گردد و اینجا که بروز مرض در آلات رئیس باشد طولانی
گردد که جمیع خراج مبتلا شود و مرض هنر ال بافته قوی و ضعیف گردند و بکریک
نزدیکی در او پیدا شود و بروز این زردی اول در صورت و بعد از آن
است و این لون زیاد شود هر وقت سرطان مجروح گردد و از بروز کلیه این
علامات حاصل میشود سوء خراج سرطانی در این هنگام دیگر مرض خففت حاصل
نکند بخلاف بروز بروز زشتی باید و اگر او را ببرد و خارج سازند بعضی
آنکه مرض زایل شود و وقت تشنج را هلاک سازد بواسطه بروز ماده سر
چید را موضع چه در موضع دیگر و نفخ در اطراف پیدا شود و هنر ال زبانی
و گاهی عظام می‌گردد که زبانی حاصل کند بواسطه جذب شدن ماده ال
انها که باند حرکتی شکستگی در عظم حاصل شود با وجود این اختلافات
در اغلب از هر مرضی عارض نشود مگر در او اخر مرض که چون عارض گردد دلیل است بر آنکه
مرض نزدیک است هلاک گردد

دقت در تمام و انتهای مرض اغلب رقار و متراجه است و میشود که مدتی
حاصل کند اما چون نرم و مجروح شد در ترکید است و سرعت در سلبت پیدا شود
و ابتدای بروز مرض در یک بلچندین نقطه از بدن و ماده محدوده است اما بعد از بروز
شود و ان الت معلول آلات مجاوره و این مبتلا و فاسد سازد و ام این مرض فامعین
گاهی در دو یا سه ماه جمیع عواقب خود را طی کند و گاهی چندین سال طول کشد و اغلب
از نه الی پانزده ماه طول کشد و چنان مینماید که اغلب حرك انتهای این مرض است
تشخیص مرض اراض سرطانی بتمیز نشان بطور عموم مشکل است بجز از علامات موضعی
و تشنجی که بجز این مرض این اراض اند علامت مخصوصی برای استعلام و حصول این
مرض نیست فقط علامات که عمومیت دارند و جوعی خاص موضع و کولر کولر بودن

نرم شدن و مجروح گردیدن ماده است در کاه بدن و سن شنجی نیست است
 علاج فقط معالجه که از برای سرطانی دماغی هست متعلق است جراحی که او را
 بواسطه بریدن با سوزانیدن زایل کند و چنان میباشد که اگر این عمل هم نکند و بعض
 و مرض را بحالت خود گذارند بهتر خواهد بود زیرا که پس از بریدن مرض و بمان عود کرد
 مرض را زودتر هلاک کند
 سرطانی که متعلق اند باعضای خارجی چون متعلق مجرا حند در اینجا بانی از آنها
 نشود فقط مذکور داریم سرطان دماغ و ریه و مری و معده و کبد و سرطان کلیتین را
 سرطان دماغ
 اغلب اوقات سرطانی دماغی همراهی کند با سوء القیه سرطانی یعنی آنکه سرطان وجود
 در سایر آلات بدنی هم داشته باشد و کاهی هم میشود که مفردا حاصل شده باشد بدو
 سرطان در سایر اعضا و از اقسام سرطان اسقبروس و سرطان دماغی بیشتر از سایر
 در دماغی نمیکند مخصوصا نواحی در نیم کره های دماغی است و عدد و حجم مختلف
 دارند بحدی که در دماغ کوچک هم دیده شده است و کاهی از اوقات ماده سرطانی
 مخاط است از کپسه و کاه بد و نکبسه است در این صورت اغلب اوقات جرم دماغ
 مبتلا شده است و اغلب جرم دماغ در همان موضع نرم گردد و اینجا که ماده سرطانی
 از سطح دماغ تجاوز کند امین و غطام بینی مبتلا شوند علاماتی که در سرطان دماغ
 بروز کنند مانند علامات سایر مواد دماغی است مثل توب کول و غیره از آنجمله است
 صداع و اختلال حواس و تشنج و فلج عام باجن بالآخره اختلال عقل و کاهی تشنج
 در جرم دماغ و تشخیص سرطان دماغی از سایر مواد دماغی نسبت به علامات عمومی
 که مخصوص هر سو خراجی هست و غیر از این هیچ علامت مخصوصی از برای مرض نیست
 حتی وجع ناخسی

سرطان

سرطان آلات صدری

وجود سرطان در ریه بین بسیار نادر است و اغلب عرضش همراهی میکند با مرضی دیگر
 وجود مختلف و حجم مختلف بر ضخامت ریه بین با دردی غشاء جنب ریه با اضلاع حجم
 و کاهی از اوقات سرایت کند بجدار صدر و او را زایل کرده از خارج ظاهر میشود و با
 که سرایت کند بقسم الصدر و از اینجا غشاء قلب و بخود قلب عارض گردد و مرضی قصیه
 الویه و آورقی و اجوف نازل و شریان و ریه و در ریه شریانی کاهی بواسطه ماده
 فشرده میشوند و کاهی ماده سرطانی مجرای مجری میشود که بطرف جوف صدر را بکلی میگیرد
 و کاهی از اوقات ماده سرطانی مجروح گردیده مورث ظهور جوفه عظیمی در میان ریه
 میگردد که محمول است از ماده سبز رنگ و اغلب اوقات ماده سرطانی همراهی کند با التهاب
 یا با تشنج طوبقی مائی با و کاهی مجرای جوف جنب با در جوف غشاء قلب و آن قطعه ای
 که مبتلا نیست بسرطان مبتلا شود با مقبرم سرطان ریه و سایر آلات صدری علامت
 مخصوصی ندارند که آنها را از سایر مواد تمیز دهند بجز بکطرف صدر باقی با در صورت
 همان طوری و تشنج کردن و صورت و جوف عینی و اتساع او ریه سینه و گردن و عسر
 البلع و عسر النفس و اتساع در صدر از سمت مبتلا شده و بواسطه ماده خارج از
 یکی از نقاط صدر و کدورت صوت قلب و ضعف صدای تنفس و مانند خروج نفس
 شنیدن صوت از سینه و کدورت اصوات قلبی علامتی هستند که دلالت میکنند بر
 وجود ماده سرطانی در صدر و در وقتی که مرض خیلی انبساط پیدا کرده باشد اما قسبه
 ماده خیلی زیاد نیست بحسب عدد باشد ولی کوچک باشد تمیز داده نشود و در او
 مرض که علامات عمومی مرض ظاهر شوند و راههای غددی بروز کنند و بطور کلی
 که علامت مخصوص غار است حاصل شود شکی در تمیز نخواهد بود و اما تشخیص این
 مرض را بطور نفی باید داد و نیز شربوبیت در جوف جنب و اجزای آورقی و

هستند که علامتشان شبیه بعلامت ماده سرطانی است از نرسیدن رطوبت در جوف معلوم میکند که کدورت در هر جامه مساوی است در این که در این مرض کدورت در هر جامه مساوی است بمرضی که مریض باشد

سرطان حری

سرطان حری که اغلب اوقات از نوع اسقر و بواس است عموما واقع میشود بشکل مواد محلول و مابین اغشیه مختلفه مری و کاهی از اوقات بطور طبقات محطه طبقات حری احاطه میکند چون مواد سرطانی مخرج کرد جدا حری را بایل سازد و التصاق بقصبه الویه و بر پیر ساند و جدا را بخارانی را بیل ساخته بخوف انها اتصال باید فضای تنگ و کاه بکلی مسدود گردد در مافوق موضع مسدود شده فضای مری مسدود که غذا در اینجا جمع شده بکنوع نضجی در اینجا مری ساند و در موضع مسدود فضای مری تنگ گردد و در ابتدا حری علامتی که بروز کند بکفوع کوفتگی از یک نقطه حری مخصوص در جوف اسفل و بطور ملایم احساس شود و عبور را غلبه صلبه مشکل گردد و کاهی هم با مقدار زیادی از مخاط رطوبتی بکورد مخاطی این علامت کم کم اشتداد یابد و همیشه بیرون ریختن غذا بلا فاصله بعد از خوردن نیست و اغلب اوقات چندین ساعت و هم چندین روز در فضای متصل شده از حری میماند و اغلب بکشتی او شبیه بعل تشویر و بعضی اوقات حری گویند و این توقف غذا هر گاه بجمع شد در سینه و پشت و پیوست با علا در جبهه کال است و قیهای مکرر را جسی صلب که مریض را بچنان خفه کند با عروق زیاد و جثا و وجع ملایمی که در وقت خوردن غذا اشتداد یابد هم چنین پس از نوشیدن مایعات و کاهی این وجع شده بدین شود چون اوجاع عصبانی بعد چون بلع محال شود مریض ناچار شود بخوردن غذا های رقیق و کاهی از اوقات نرفالدهی عارض شود که مواد مری هم در آن پافت شوند

شوند و کاهی چون از طرف قصبه الویه و بخلاف او لمس نمایند بخصوص در جوف اسفل کدورت میتوانند سختی و صلابت و تجمیع حری را احساس کنند و از نرسیدن مبل مری میتوان محل و مقدار تنگی را فهمید و این علامات افزوده میشوند علامات سوء القبه سرطانی و باشد که بک وقت بدین جهت با سبب حرکت عنفی صلی تراکی شنبه شود و حقی صدر مری رسد که سبب اخراق ماده است و این اخراق سبب مبل گردد عرض ذات الیه و اگر نرسد مری شود و چون ماده غذائی از اینجا داخل جوف مری میشود و مورت بوقت بعضی علامات مخصوصه مبل گردد مثل سرفه و خسق بعد از غذای آب و کاه و جمع شدن عارض و یکی اضطرابی مری دهد که منقح شود بغشی و قی عارض شود و مواد مستحربه داخل است با غدا و خون و سیرم و بعضی اوقات متعین شبیه به پیر فاسد شده چون بایند رجه و سطلوی نکشد که مریض هلاک شود و این هلاکت بواسطه نقصان تغذیه و عرض قول است از تنگی مشحون و غیر مبل دهند تنگی سرطان مری را باینکه اخراقی و اولی موقتی است و از عسر البلهای که سبب مری خود مری نباشد و از فشار خود مری باشد از رقتا ر خود اصل و فرو رفتن مبل مری تمیز میدهند

علاج این مری مبل کردن در تغذیه مریض است که بچیز خجسته خجسته او بدین تغذیه مریض است و از برای این باید مبل وارد معده کرد و غذاهای مقوی و مایع داخل و چون مری قوی کند فرو بردن مبل محال گردد در این صورت اما له از معای مستقیم باید کرد

در سرطان معده

در جمیع علل سرطانی سرطان معده در جوف ان بیشتر عارض گردد و در سرطان معده از سرطان رحم و پستان عرضش کمتر است و اغلب بیرونش بعد از پنجاه سالگی و در اتفاقی بواسطه ترشی یا ضربه در اشتقاق مبلکه مستعد بسوء القبه سرطانی مورت بیرون او مبل گردد

تشریح می نماید. اغلب ماده سرطانی در میان اغشیه مختلفه معده نشتر کرده و منبسط میگردد
و این اغشیه ضخیم و صلب شوند و صورت اسفروسی با شبر حاصل کنند و بعضی الباف
سرطانی بغشاء عضلانی معده منتهی گردد و نیج او را تبدیل به نیج سرطانی نماید و گاهی
ماده عضلانی در یک موضع مخصوص رتوباب و انحنای کوچک معده جمع شود غلاف معده
در ماده سرطانی قومن و بنفشی و نرم گردد و جراثیم در ماده بمرسبه مرکز او را خاک
کند و اطراف جراثیم گاهی نرم و گاهی صلب و گاه بزرگ و گاهی جراثیم بصفاق برایت
گردد و او را منقبوب سازند و اغلب اطراف این جراثیم بعضی التصاقات بمرسبه
و معده را با اعضا مجاوره خود چون کبد و غده لوز المعده و مجاری جلیز و غیره متصل
کند فضای معده گاهی کوچک و گاه بزرگ شود

علامات ابتدای مرض نامعلوم و حرکتش خیلی بطی است و گاهی در ابتدا میل بخند
کم شود و بعضی اصاع غیر منتظم پیدا شود که پس از اکل غذا زایل گردد و گاهی هنگام
هضم ثقلی در معده احساس شود و گاهی آنقدر که در وقت هضم را بکند که شخص خجسته
رزد و بسیار کم است و هضم اغذیه بلخلاف غذا و شخص متغایر است و
گاه گاهی احساس قولنج های شدید میشود در بعضی غمگین و بدخلق شود و گاهی کس
علامه در شخص پیدا شود و این علامات گاهی بفاصله های کم و امیکند و گاه در باز
شد بدتر و چون کند که بعد از غذا یک ثقل و وجع در معده بمرسد و جشاحا
بی بوی یا بوی تخم مرغ متعفن شده خارج شود و بندرت بفاصله های خیلی
زیادتی عارض شود اشتها فانی گردد و بدو آنکه در بعضی از غذا متفر داشته باشد
و بیوست شدیدی پیدا شود بعد ازی که بود بیشتر میشود و اگر نبود پیدا شود
اغلب عروض آنها بلا واسطه بعد از غذا است و گاهی از چند ساعت الی چند روز
فاصله پیدا کند و گاهی خیلی بعید تر باید که در ماده مخمره مرکب است آن
واغذیه

واغذیه و بعضی مواد غذائی دیگر و گاهی بعضی منسوجاتی در معده پیدا شود که شبیه
بجس ناضج و گاهی این وجع مانند او جاع عصبانی معده عارض شود و یکماد
فوق ناف احساس گردد و گاهی هم موضع وجع در سمت چپ ناف یا در اضلاع
غلاف است و حجم ابتداء بقدر رشت با تخم مرغی است موافق آنکه معده بزرگ
با کوچک شود موضع ماده متغیر شود و بواسطه قرح و آو رطی ساده متحرک میگردد
و صدای دم در او رطی پیدا شود بواسطه فشار دم در او و گاهی بهیچ وجه احساس
ماده نشود مگر آنکه یک صلابت و کشیدگی در جدار معده پیدا شود عطش زیاد
خواهد بود زبان گاهی کم رنگ و قوی صاحب باره بزرگ است و گاهی خشک و قوی
و شقایق در است هزال عارض شود صورت زرد گاهی مثله که بعدی جمیع بدن
کند و جمیع علامات دوی باشند و گاه از رند که دوی پنج شش و خضرتی شود بدو
صعوبت مواد مخمره یک لونی حاصل کند که مخصوص بر ماده سرطانی است که سببا
مانند جرم قهوه است و گاه گاهی بفاصله های مختلفه مرضی خون قی کند و بجای
اسهال عارض شود که بهیچ چیز بند نشود و صورت رنگش رو زرد و زرد گشته و
تاو شود و تحول با تخی در حبه رسیده نفخ در اطراف بمرسد برفک بامو که در هین
پیدا شود که قهقهه الجیش مرکب میباشد و گاهی عروض حرك زود و بواسطه
و رمی است که در سینه با صفاق ترکیب میشوند و دام مرض کمتر از شش ماه
نیست و اغلب از دو الی سه سال طول کشد و امید و نجات هیچ نیست
تشخیص تشخص را ابتدا مشکل است ولی چون ماده در بالای ناف احساس
شود و معده متسع گردد و سابق علامات نپیدا شوند اشکالی در تشخیص
نخواهد بود

علاج دوی جوش و ابهای الکلی و تخم رات مخصوص تر باک و بعضی

۵۹۳

مقرحات و عجزات در ردی شکم عرض حرك را بجا خبر اندازند

در چهره اجات ساده معده

دکتر رضا مرحوم سند کتاب ناقص ماند ۱۲۴۴

نصرت طبیب




BLANK PAGE

۵۹۴

۵۹۷

BLANK PAGE



Foliated 4118190
JM



END OF REEL
PLEASE REWIND

